

Amblyopone emeryi (Saunders, 1890)**VU**

Categoría UICN:	Vulnerable
Criterio UICN:	D2
Nombre Vulgar:	
Tipo:	Arthropoda
Clase:	Insecta
Orden:	Hymenoptera
Familia:	Formicidae

Área de distribución

Se conoce exclusivamente de la localidad tipo (Tánger, Marruecos) y de Punta del Carnero (Algeciras) (Tinaut, 1988).

- Mundial: El género es de distribución paleotropical, con algunas especies distribuidas por Asia central y región mediterránea (Baroni Urbani, 1978; Brown, 1960).
- España: De este género se conocen exclusivamente dos especies en la península Ibérica (Tinaut, 1988; 1989). Ambas son del sur peninsular, pero *A. emeryi* se conoce exclusivamente de la Punta del Carnero.

Hábitat y Biología

Matorral poco denso, con influencia atlántica y cercano al borde del mar y por tanto con alta humedad ambiental. Como *Anochetus ghilianii* que también vive en el mismo área, aunque es un po-

co más abundante, ambas tienen un tipo de vida muy similar: hipogeas y depredadoras y son ambas además relicticas del Terciario, perteneciendo a un género típicamente tropical.

Factores de amenaza

Actualmente el problema es la urbanización y construcción de edificios.

Medidas de conservación

Conservación del hábitat.

Bibliografía

- Brown, W.L. 1960. Contribution toward a reclassification of the Formicidae, III. Tribe Amblyoponini (Hymenoptera). *Bull. Museum Comparative Zoology*, 122: 145-230.
- Saunders, E. 1888. On a collection of ants from Gibraltar and Tangier. *Ent. Month. Mag.*, 25: 17.
- Saunders, E. 1890. Aculeate Hymenoptera collected by J.J. Walker, Esq. R.N. F.L.S. at Gibraltar and in north Africa. *Ent. Month. Mag.*, 26: 201-205.
- Tinaut, A. 1988. El género *Amblyopone* Erichson en la península Ibérica (Hymenoptera, Formicidae). *Misc. Zool.*, 12: 189-193.
- Tinaut, A. 1989. Contribución al estudio de los formícidos de la región del estrecho de Gibraltar y su interés biogeográfico (Hym., Formicidae). *Graellsia*, 45: 19-29.

Autores: M^a D. Martínez y A. Tinaut

