

Categoría UICN:	Vulnerable
Criterio UICN:	B1ab(i,ii,iii)
Nombre Vulgar:	
Tipo:	Arthropoda
Clase:	Insecta
Orden:	Hymenoptera
Familia:	Formicidae

Área de distribución

- Mundial: A nivel mundial esta especie se conoce exclusivamente de ambos lados del Estrecho de Gibraltar. En Africa vive en el norte de Marruecos (Brown, 1978).
- España: En la península Ibérica se reduce su distribución al litoral costero entre Punta del Carnero y Tarifa, pudiendo ascender en altitud hasta las Sierras de Luna (Tinaut, 1990) y los Alcornocales.

El género es de distribución Paleotropical (Brown, 1978) y su presencia en la península Ibérica es claramente relíctica del Terciario.

Hábitat y Biología

Matorral y bosques con influencia atlántica y cercanos al mar. Como *Amblyopone emeryi* Saunders, 1890 que también vive en el mismo área, aunque es un poco más abundante, ambas tienen un tipo de vida muy similar: hipogeas y depredadoras y son ambas además relícticas del Terciario, perteneciendo a un género típicamente tropical.

Factores de amenaza

Esta especie ocupa un área de presencia inferior a 1.500 km². Además, aparece en menos de 10 loca-

lidades (en este caso no distantes entre sí más de 100 km).

Esta especie presenta un interés científico especial por tratarse de un elemento relíctico del Terciario conocido a nivel mundial únicamente en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar.

La mayor parte de su distribución está muy sometida a presiones urbanísticas en las inmediaciones de la Punta del Carnero (Algeciras) ya parcialmente urbanizada y en donde se sitúa la población más abundante. Su distribución coincide también con los bosques de elevada humedad ambiental por su proximidad al mar, situados en las inmediaciones de la Sierra de Ojén. Estos bosques están protegidos, por lo que esta parte de la población quedaría fuera de peligros más o menos inminentes.

Medidas de conservación

Evitar la roturación o edificación al menos en parte del litoral y conservación de los bosques de laurisilva.

Bibliografía

- Brown, W. Jr. 1978. Contributions toward a reclassification of the Formicidae. Part. VI. Ponerinae, Tribe Ponerini, Subtribe Odontomachiti. Section B. Genus *Anochetus* and Bibliography. *Studia Entomologica*, 20: 549-652.
- Collingwood, C. A. 1978. A provisional list of Iberian Formicidae with a key to the worker caste. *Eos*, 52: 65-95.
- Tinaut, A. 1990. Contribución al estudio de los Formícidos de la región del estrecho de Gibraltar y su interés biogeográfico (Hym. Formicidae). *Graellsia*, 45:19-29.

Autores: M^a D. Martínez y A. Tinaut

