LISTADO SISTEMÁTICO, SINONÍMICO Y BIOGEOGRÁFICO DE LOS ÁCAROS ORIBÁTIDOS (*ACARIFORMES: ORIBATIDA*) DEL MUNDO
(Excepto fósiles)

(15ª actualización)

http://bba.bioucm.es/cont/docs/RO_1.pdf

LUIS S. SUBÍAS

Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad Complutense. Madrid 28040. E-mail: subias@bio.ucm.es

(Publicado originalmente en *Graellsia*, 60 (número extraordinario): 3-305 (2004). Actualizado en junio de 2006, en abril de 2007, en mayo de 2008, en abril de 2009, en julio de 2010, en febrero de 2011, en abril de 2012, en mayo de 2013, en febrero de 2014, en marzo de 2015, en febrero de 2016, en febrero de 2017, en enero de 2018, en marzo de 2019, en enero de 2020 y en marzo de 2021)

ÍNDICE

ORDENACIÓN SISTEMÁTICA DE FAMILIAS Y GÉNEROS 1-15

LISTADO SISTEMÁTICO DE ESPECIES 16-434

ÍNDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS 435-446

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ESPECIES Y SUBESPECIES 447-532

ORDENACIÓN SISTEMÁTICA DE FAMILIAS Y GÉNEROS

[162 familias, 1.306 géneros y subgéneros (+ 449 sinonimias), y 11.325 especies y subespecies (+ 1.594 sinonimias): 3.911 Paleárticas, 1.133 Neárticas, 1.976 Etiópicas, 2.621 Orientales, 1.542 Australianas, 138 Antárticas y subantárticas (islas subantárticas), y 2.333 Neotropicales]

Suborden **ORIBATIDA** Dugès, 1834

Infraorden **PALAEOSOMATA** Grandjean, 1969

Acaronychoidea Grandjean, 1932
Acaronychidae Grandjean, 1932
- ***Acaronychus*** Grandjean, 1932
- ***Archeonothrus*** Trägårdh, 1906
- ***Loftacarus*** Lee, 1981
- ***Stomacarus*** Grandjean, 1952
  (=***Amuracarus*** Lange, 1975)
  (=***Andacarus*** Grandjean, 1958)
- ***Zachvatkinella*** Lange, 1954
  (=***Himalacarus*** Sheals, 1965)

Palaeacaroidea Grandjean, 1932
Palaeacaridae Grandjean, 1932
- ***Palaeacaroides*** Lange, 1972
- ***Palaeacarus*** Trägårdh, 1932
  (=***Traegardhacarus*** Zachvatkin, 1945)

Ctenacaridae Grandjean, 1954
- ***Beklemishevia*** Zachvatkin, 1945
- ***Ctenacarus*** Grandjean, 1939
  (=***Gradjeanacarus*** Zachvatkin, 1958)
- ***Gilarovella*** Lange, 1974
- ***Neoctenacarus*** Moritz, 1974

Adelphacaridae Grandjean, 1954
- ***Adelphacarus*** Grandjean, 1952
- ***Aphelacarus*** Grandjean, 1932

Infraorden **PARHYPOSOMATA** Balogh *et* Mahunka, 1979

Parhypochthonioidea Grandjean, 1932
Parhypochthoniidae Grandjean, 1932
- ***Parhypochthonius*** Berlese, 1904

Gehypochthoniidae Strenzke, 1963
- ***Gehypochthonius*** Jacot, 1936

Elliptochthoniidae Norton, 1975
- ***Elliptochthonius*** Norton, 1975

Infraorden **ENARTHRONOTA** Grandjean, 1947

Brachychthonioidea Thor, 1934
Brachychthoniidae Thor, 1934
- ***Brachychthonius*** Berlese, 1910
  (=***Brachychochthonius*** Jacot, 1938)
- ***Eobrachychthonius*** Jacot, 1936
- ***Liochthonius*** Hammen, 1959
- ***L. (Afroliochthonius)*** Mahunka, 1995
- ***Mixochthonius*** Niedbała, 1972
- ***Neobrachychthonius*** Moritz, 1976
- ***Neoliochthonius*** Lee, 1982
  (=***Moritzichthonius*** Pereda *et* Iturrondobeitia, 1990)
  (=***Paraliochthonius*** Moritz, 1976 *nom. praeoc.*)
- ***Papillochthonius*** Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
- ***Poecilochthonius*** Balogh, 1943
- ***Sellnickochthonius*** Krivolutsky, 1964
- ***Synchthonius*** Hammen, 1952
- ***Verachthonius*** Moritz, 1976

Heterochthonioidea Grandjean, 1954
Heterochthoniidae Grandjean, 1954
- ***Heterochthonius*** Berlese, 1910
- ***Neovochthonius*** Judson, 2009
  (=***Neochthonius*** Karppinen, 1984 *nom. praeoc.*)
- ***Ovochthonius*** Rjabinin, 1977

Trichthoniidae Lee, 1982
- ***Gozmanyina*** Balogh *et* Mahunka, 1983
  (=***Marshallia*** Gordeeva, 1980 *nom. praeoc.*)
- ***Nipponiella*** Gordeeva, 1980
- ***Trichthonius*** Hammer, 1961

Arborichthoniidae Balogh *et* P. Balogh, 1992

- ***Arborichthonius*** Norton, 1982

Nanohystricidae Norton *et* Fuangarworn, 2015
- ***Nanohystrix*** Norton *et* Fuangarworn, 2015

Cosmochthonioidea Grandjean, 1947
Cosmochthoniidae Grandjean, 1947
- ***Cosmochthonius*** Berlese, 1910
- ***C. (Nanochthonius)*** Subías *et* Gil-Martín, 1995
(=***Microchthonius*** Kahwash, Subías *et* Ruiz, 1989 *nom. praeoc.*)
- ***C. (Nortonchthonius)*** Jorrín, 2014
- ***Krivolutskiella*** Gordeeva, 1980
- ***Phyllozetes*** Gordeeva, 1978

Haplochthoniidae Hammen, 1959
- ***Amnemochthonius*** Grandjean, 1949
- ***Haplochthonius*** Willmann, 1930
(=***Tetrochthonius*** Hammer, 1958)
- ***H. (Senilochthonius)*** Mahunka, 1992

Pediculochelidae Lavoipierre, 1946
- ***Paralycus*** Womersley, 1944
(=***Pediculochelus*** Lavoipierre, 1946)

Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947
- ***Similochthonius*** Mahunka, 1985
(=***Sphaerochochthonius*** Mahunka, 1985)
- ***Sphaerochthonius*** Berlese, 1910
(=***Sphaerochthoniella*** Mahunka, 1985)

Atopochthonioidea Grandjean, 1949
Atopochthoniidae Grandjean, 1949
- ***Atopochthonius*** Grandjean, 1949
- ***Phyllochthonius*** Travé, 1967
- ***Pterochthonius*** Berlese, 1913

Protoplophoroidea Ewing, 1917
Protoplophoridae Ewing, 1917
- ***Arthrhoplophora*** Berlese, 1910
(=***Neoprototritia*** Shereef, 1978)
(=***Triplophora*** Mahunka, 1977)
- ***Bursoplophora*** Subías *et* Pérez-Íñigo, 1978
(=***Csibiplophora*** Mahunka, 1984)
- ***Cryptoplophora*** Grandjean, 1932
- ***Grandjeanoplophora*** Balogh *et* Mahunka, 1979
- ***G. (Tauroplophora)*** Gordeeva, Niemi *et* Petrova-Nikitina, 1998
- ***Hauseroplophora*** Mahunka, 1977
- ***Protoplophora*** Berlese, 1910
- ***Prototritia*** Berlese, 1910
(=***Aedoplophora*** Grandjean, 1932)
- ***P. (Siciliophora)*** Bernini, 1983

Hypochthonioidea Berlese, 1910
Hypochthoniidae Berlese, 1910
- ***Eohypochthonius*** Jacot, 1938
(=***Afrhypochthonius*** Balogh, 1958)
- ***E. (Neoatrichosus)*** Fernández, 1984
- ***Hypochthonius*** Koch, 1835
- ***Malacoangelia*** Berlese, 1913
- ***Nothrolohmannia*** Balogh, 1968

Eniochthoniidae Grandjean, 1947
- ***Hypochthoniella*** Berlese, 1910
(=***Arthrochthonius*** Ewing, 1917)
(=***Eniochthonius*** Grandjean, 1933)

Psammochthoniidae Fuangarworn *et* Norton, 2013
- ***Psammochthonius*** Fuangarworn *et* Norton, 2013

Lohmannioidea Berlese, 1916
Lohmanniidae Berlese, 1916
- ***Annectacarus*** Grandjean, 1950
- ***Bedoslohmannia*** Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
- ***Cryptacarus*** Grandjean, 1950
- ***Dendracarus*** Balogh, 1961
- ***Haplacarus*** Wallwork, 1962
- ***Heptacarus*** Piffl, 1963
(=***Neotrichacarus*** Hammer, 1973)
(=***Pseudocryptacarus*** McDaniel, Norton *et* Bolen, 1979)
- ***Javacarus*** Balogh, 1961
(=***Tongacarus*** Hammer, 1973)
- ***J. (Euryacarus)*** Woolley, 1966
- ***Lepidacarus*** Csiszár, 1961
- ***Lohmannia*** Michael, 1898
(=***Michaelia*** Haller, 1884)
- ***L. (Carolohmannia)*** Norton, Metz *et* Sharma, 1978
- ***Meristacarus*** Grandjean, 1934
(=***Javalohmannia*** Hammer, 1979)
- ***Meristolohmannia*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Mixacarus*** Balogh, 1958
(=***Hamacarus*** Hammer, 1977)
- ***M. (Phyllolohmannia)*** Balogh *et* P. Balogh, 1987
- ***Nesiacarus*** Csiszár, 1961
- ***Ozacarus*** Colloff *et* Halliday, 1998
(=***Austracarus*** Balogh *et* P. Balogh, 1983 *nom. praeoc.*)
- ***Papillacarus*** Kunst, 1959
- ***P. (Vepracarus)*** Aoki, 1965
- ***Paulianacarus*** Balogh, 1961
- ***P. (Millotacarus)*** Balogh, 1961
- ***Reptacarus*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1995
- ***Strinatacarus*** Mahunka, 1974
- ***Thamnacarus*** Grandjean, 1950
(=***Asiacarus*** Krivolutsky, 1971)
- ***Torpacarus*** Grandjean, 1950
- ***Ululohmannia*** Mahunka, 1987
(=***Austracarus*** Mahunka, 1984)
- ***Xenolohmannia*** Balogh *et* Mahunka, 1969

Mesoplophoroidea Ewing, 1917
Mesoplophoridae Ewing, 1917
- ***Apoplophora*** Aoki, 1980
- ***Archoplophora*** Hammen, 1959
- ***Dudichoplophora*** Mahunka, 1982
- ***Mesoplophora*** Berlese, 1904
(=***Phthiracarulus*** Berlese, 1920)
- ***M. (Parplophora)*** Niedbała, 1985

Infraorden **MIXONOMATA** Grandjean, 1969

Hipoorden DICHOSOMATA Balogh *et* Mahunka, 1979

Nehypochthonioidea Norton *et* Metz, 1980
Nehypochthoniidae Norton *et* Metz, 1980
- ***Nehypochthonius*** Norton *et* Metz, 1980

Perlohmannioidea Grandjean, 1954
Perlohmanniidae Grandjean, 1954
- ***Hololohmannia*** Kubota *et* Aoki, 1998
- ***Perlohmannia*** Berlese, 1916
- ***P. (Apolohmannia)*** Aoki, 1960
(=***Neolohmannia*** Bulanova-Zachvatkina, 1960)

Collohmanniidae Grandjean, 1958
- ***Collohmannia*** Sellnick, 1922
(=***Phthiracaroides*** Štorkán, 1923)

Eulohmannioidea Grandjean, 1931
Eulohmanniidae Grandjean, 1931
- ***Eulohmannia*** Berlese, 1910
(=***Arthronothrus*** Trägårdh, 1910)

Epilohmannioidea Oudemans, 1923
Epilohmanniidae Oudemans, 1923
- ***Epilohmannia*** Berlese, 1910
(=***Lesseria*** Oudemans, 1917)
(=***Sinolohmannia*** Balogh *et* Mahunka, 1979)
- ***E. (Neoepilohmannia)*** McDaniel *et* Bolen, 1989
- ***Epilohmannoides*** Jacot, 1936
- ***E. (Neoepilohmannoides)*** Subías, 2020

Hipoorden EUPTYCTIMA Grandjean, 1967

Euphthiracaroidea Jacot, 1930
Oribotritiidae Balogh, 1943
- ***Austrotritia*** Sellnick, 1959
(=***Macarotritia*** Pérez-Íñigo, 1986)
- ***Indotritia*** Jacot, 1929
- ***I. (Afrotritia)*** Mahunka, 1988

- ***I. (Zeaotritia)*** Mahunka, 1988
- ***Maerkelotritia*** Hammer, 1967
- ***Mesotritia*** Forsslund, 1963
  (=***Entomotritia*** Märkel, 1964)
- ***M. (Perutritia)*** Märkel, 1964
- ***Oribotritia*** Jacot, 1924
  (=***Berndotritia*** Mahunka, 1987)
  (=***Philotritia*** Mahunka, 1988)
  (=***Plesiotritia*** Walker, 1965)
  (=***Tritia*** Berlese, 1883 *nom. praeoc.*)
- ***O. (Mahuntritia)*** Niedbała *et* Liu, 2018
- ***Paratritia*** Moritz, 1966
- ***Protoribotritia*** Jacot, 1938
- ***Sabacarus*** Ramsay *et* Sheals, 1969
- ***Terratritia*** Ramsay *et* Sheals, 1969

Euphthiracaridae Jacot, 1930

- ***Acrotritia*** Jacot, 1923
  (=***Rhysotritia*** Märkel *et* Meyer, 1959)
- ***Bukitritia*** Mahunka, 1990
- ***Euphthiracarus*** Ewing, 1917
  (=***Brasiliotritia*** Märkel, 1964)
  (?=***Hummelia*** Oudemans, 1916 *gen. inq.*)
  (=***Niedbalaia*** Mahunka, 1999)
  (=***Parapocsia*** Niedbała, 2014**)**
  (=***Pseudotritia*** Willmann, 1919)
- ***E. (Pocsia)*** Mahunka, 1983
- ***Microtritia*** Märkel, 1964
- ***Sumatrotritia*** Mahunka, 1989

Synichotritiidae Walker, 1965

- ***Apotritia*** Norton *et* Lions, 1992
- ***Sabahtritia*** Mahunka, 1987
- ***Synichotritia*** Walker, 1965
- ***Temburongia*** Mahunka, 1990

Phthiracaroidea Perty, 1841

Phthiracaridae Perty, 1841

- ***Atropacarus*** Ewing, 1917
  (=***Helvetacarus*** Mahunka, 1993)
- ***A. (Rafacarus)*** Niedbała, 1981
  (=***Neosteganacarus*** Balogh *et* Mahunka, 1992)
  (=***Nortonacarus*** Balogh *et* Mahunka, 1992)
- ***Hoplophorella*** Berlese, 1923
- ***H. (Kakophthiracarus)*** Mahunka, 1992
- ***H. (Mantigueracarus)*** Balogh *et* Mahunka, 1992
- ***H. (Rhacaplacarus)*** Niedbała, 1986
  (=***Plonaphacarus*** Niedbała, 1986)
- ***Hoplophthiracarus*** Jacot, 1933
- ***H. (Austrophthiracarus)*** Balogh y Mahunka, 1978
  (=***Antarctoplophora*** Mahunka, 1980)
  (=***Fuegoplophora*** Mahunka, 1980)
- ***H. (Besuchetacarus)*** Mahunka, 1985
  (=***Neokakophthiracarus*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
- ***H. (Calyptophthiracarus)*** Aoki, 1980
  (=***Hauserophthiracarus*** Mahunka, 1982)
  (=***Phrathicarus*** Niedbała, 1994)
- ***H. (Notophthiracarus)*** Ramsay, 1966
  (=***Arphthicarus*** Niedbała, 1994)
- ***H. (Phthirarica)*** Mahunka, 1982
- ***H. (Protophthiracarus)*** Balogh, 1972
  (=***Notophthiracarus*** Balogh *et* Mahunka, 1967 *nom. praeoc.*)
  (=***Sturmacarus*** P. Balogh, 1984)
- ***H. (Steganacarellus)*** Mahunka, 1986
- ***Phthiracarus*** Perty, 1841
  (=***Ginglymacarus*** Ewing, 1917)
  (=***Hoploderma*** Michael, 1898)
  (=***Hoplophora*** Koch, 1835 *nom. praeoc.*)
  (=***Peridromotritia*** Jacot, 1923)
- ***P. (Archiphthiracarus)*** Balogh *et* Mahunka, 1979
  (=***Archiphthiracarella*** Mahunka, 1996)
  (=***Microphthiracarus*** Mahunka, 1982)
  (=***Paraphthiracarus*** Aoki, 1980)
- ***P. (Metaphthiracarus)*** Aoki, 1980
- ***P. (Neophthiracarus)*** Balogh *et* Csiszár, 1963
  (=***Neoprotophthiracarus*** Mahunka, 1980)
- ***Steganacarus*** Ewing, 1917
  (=***Niedbalacarus*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
  (=***Trachyhoplophora*** Berlese, 1923)
- ***S. (Pluristeganacarus)*** Subías, 2019
- ***S. (Tropacarus)*** Ewing, 1917
  (=***Calhoplophora*** Berlese, 1923)

Infraorden **HOLOSOMATA** Grandjean, 1969

Crotonioidea Thorell, 1876

Trhypochthoniidae Willmann, 1931

- ***Afronothrus*** Wallwork, 1961
- ***Allonothrus*** Hammen, 1953
  (=***Parallonothrus*** Badejo, Woas *et* Beck, 2002)
  (=***Pseudonothrus*** Balogh, 1958)
- ***Archegozetes*** Grandjean, 1931
- ***Mainothrus*** Choi, 1996
  (=***Altrhypochthonius*** Weigmann, 1997)
- ***Mucronothrus*** Trägårdh, 1931
- ***Trhypochthoniellus*** Willmann, 1928
  (=***Hydronothrus*** Aoki, 1964)
- ***Trhypochthonius*** Berlese, 1904
  (=***Albonothrus*** Tseng, 1982)
  (=***Trilohmannia*** Willmann, 1923)
  (=***Tumidalvus*** Ewing, 1908)

Malaconothridae Berlese, 1916

- ***Malaconothrus*** Berlese, 1904
- ***M. (Trimalaconothrus)*** Berlese, 1916
  (=***Zeanothrus*** Hammer, 1966)
- ***Tyrphonothrus*** Knülle, 1957
  (=***Fossonothrus*** Hammer, 1962)
- ***T. (Cristonothrus)*** Subías, 2004

Nothridae Berlese, 1896

- ***Nothrus*** Koch, 1835
  (=***Angelia*** Berlese, 1885)
  (=***Gymnonothrus*** Ewing, 1917)
  (=***Vigilomicrozetes*** Tseng, 1982)
- ***Novonothrus*** Hammer, 1966
- ***Trichonothrus*** Mahunka, 1986

Crotoniidae Thorell, 1876

- ***Austronothrus*** Hammer, 1966
- ***Camisia*** Heyden, 1826
  (=***Uronothrus*** Berlese, 1913)
- ***C. (Ensicamisia)*** Kunst, 1971
  (=***Ivarsia*** Karppinen *et* Krivolutsky, 1987)
- ***Crotonia*** Thorell, 1876
  (=***Acronothrus*** Berlese, 1916)
  (=***Westwoodia*** Cambridge, 1875 *nom. praeoc.*)
- ***Heminothrus*** Berlese, 1913
  (=***Paulonothrus*** Kunst, 1971)
- ***H. (Capillonothrus)*** Kunst, 1971
  (=***Ovonothrus*** Kunst, 1971)
  (=***Paracamisia*** Olszanowski *et* Norton, 2002)
- ***H. (Platynothrus)*** Berlese, 1913
  (=***Neonothrus*** Forsslund, 1955)
  (=***Sigmonothrus*** Chakrabarti *et* Kundu, 1978)
- ***Holonothrus*** Wallwork, 1963

Infraorden **BRACHYPYLINA** Hull, 1918

Hipoorden PYCNONOTICAE Grandjean, 1954

Nanhermannioidea Sellnick, 1928

Nanhermanniidae Sellnick, 1928

- ***Bicyrthermannia*** Hammer, 1979
- ***Cosmohermannia*** Aoki *et* Yoshida, 1970
- ***Cyrthermannia*** Balogh, 1958
  (=***Linothrus*** Tseng, 1982)
- ***Dendrohermannia*** P. Balogh, 1985
- ***Masthermannia*** Berlese, 1913
  (=***Phyllonothrus*** Sellnick, 1959)
  (=***Posthermannia*** Grandjean, 1954)
- ***Nanhermannia*** Berlese, 1913
- ***N. (Nippohermannia)*** P. Balogh, 1985
- ***Notohermannia*** P. Balogh, 1985

Hermannioidea Sellnick, 1928

Hermanniidae Sellnick, 1928

- ***Galapagacarus*** P. Balogh, 1985
- ***Hermannia*** Nicolet, 1855
- ***H. (Heterohermannia)*** Woas, 1992
- ***H. (Phyllhermannia)*** Berlese, 1916
  (=***Lawrencoppia*** Jacot, 1936)
- ***Neohermannia*** Bayoumi *et* Mahunka, 1979

Hermannielloidea Grandjean, 1934
Hermanniellidae Grandjean, 1934
- ***Akansilvanus*** Fujikawa, 1993
- ***Ampullobates*** Grandjean, 1962
- ***Baloghacarus*** Balogh *et* Mahunka, 1981
  (=***Baloghacarus*** Mahunka, 1983 *nom. praeoc.*)
- ***Bullibates*** Subías *et* Shtanchaeva, 2012
- ***Hermanniella*** Berlese, 1908
- ***Hermannobates*** Hammer, 1961
- ***Issaniella*** Grandjean, 1962
- ***Mahunkobates*** Călugăr, 1989
- ***Sacculobates*** Grandjean, 1962
  (=***Bruneiella*** Mahunka, 1997)
  (=***Dicastribates*** Balogh *et* P. Balogh, 1988)
Plasmobatidae Grandjean, 1961
- ***Malgachebates*** Fernández, Cleva *et* Theron, 2011
- ***Orbiculobates*** Grandjean, 1961
- ***Plasmobates*** Grandjean, 1929
- ***Solenozetes*** Grandjean, 1931

Neoliodoidea Sellnick, 1928
Neoliodidae Sellnick, 1928
- ***Neoliodes*** Berlese, 1888
  (=***Liodes*** Heyden, 1826 *nom. praeoc.*)
  (=***Udetaliodes*** Jacot, 1929)
- ***Platyliodes*** Berlese, 1916
- ***Poroliodes*** Grandjean, 1934
- ***Teleioliodes*** Grandjean, 1934

Plateremaeoidea Trägårdh, 1926
Plateremaeidae Trägårdh, 1926
- ***Allodamaeus*** Banks, 1947
- ***Balogheremaeus*** Arillo *et* Subías, 2006
- ***Calipteremaeus*** Paschoal, 1987
- ***Lopheremaeus*** Paschoal, 1988
- ***Paralopheremaeus*** Paschoal, 1987
- ***Plateremaeus*** Berlese, 1908
Pheroliodidae Paschoal, 1987
- ***Lopholiodes*** Passchoal, 1987
  (=***Octoliodes*** Paschoal, 1987)
- ***Lyrifissiella*** Paschoal, 1989
- ***Malgacheliodes*** Fernández *et* Cleva, 2010
- ***Nooliodes*** Paschoal, 1989
- ***Pheroliodes*** Grandjean, 1931
  (=***Andesperuviella*** Paschoal, 1989)
  (=***Hammeriella*** Paschoal, 1989 *nom. praeoc.*)
  (=***Neonooliodes*** Hunt, 1996)
  (=***Paschoalia*** Subías, 2004)
  (=***Pedrocortesia*** Hammer, 1958)
Licnodamaeidae Grandjean, 1954
- ***Flammaeremaeus*** Balogh, 1968
- ***Hexachaetoniella*** Paschoal, 1987
- ***Licnodamaeolus*** Covarrubias, 1998
- ***L. (Nacunansella)*** Fernández *et* Cleva, 1998
- ***Licnodamaeus*** Grandjean, 1931
- ***Licnoliodes*** Grandjean, 1931
- ***Novazelandiella*** Paschoal, 1989
  (=***Darthvaderum*** Hunt, 1996)
  (=***Labiogena*** Hunt, 1996)
- ***Pedrocortesella*** Hammer, 1961
  (=***Acupedicellus*** Hunt *et* Lee, 1995)
Licnobelbidae Grandjean, 1965
- ***Flabellobelba*** Pérez-Íñigo, 1995
- ***Licnobelba*** Grandjean, 1931

Gymnodamaeoidea Grandjean, 1954
Gymnodamaeidae Grandjean, 1954
- ***Adrodamaeus*** Paschoal, 1984
  (=***Heterodamaeus*** Woolley, 1957 *nom. praeoc.*)
- ***Arthrodamaeus*** Grandjean, 1954
- ***Gymnodamaeus*** Kulczynski, 1902
  (=***Donjohnstonella*** Walter, 2009)
  (=***Heterodamaeus*** Ewing, 1917)
  (=***Johnstonella*** Paschoal, 1983)
  (=***Odontodamaeus*** Paschoal, 1982)
  (=***Pleodamaeus*** Paschoal, 1983)
- ***Jacotella*** Banks, 1947
- ***Joshuella*** Wallwork, 1972
  (=***Nortonella*** Paschoal, 1982 *nom. praeoc.*)
  (=***Paschoalia*** Özdikmen, 2008 *nom. praeoc.*)
  (=***Roynortonella*** Walter, 2009)
- ***Plesiodamaeus*** Grandjean, 1954
Aleurodamaeidae Paschoal *et* Johnston, 1985
- ***Aleurodamaeus*** Grandjean, 1954
  (=***Trichodamaeus*** Mahunka, 1984**)**
- ***Austrodamaeus*** Balogh *et* Mahunka, 1981
  (=***Idiodamaeus*** Paschoal, 1984)

Damaeoidea Berlese, 1896
Hungarobelbidae Miko *et* Travé, 1996
- ***Hungarobelba*** Balogh, 1943
- ***Protodamaeus*** Subías, 2019
- ***Tokukobelba*** Lamos, 2016
Damaeidae Berlese, 1896
- ***Acanthobelba*** Enami *et* Aoki, 1993
- ***Allobelba*** Kunst, 1961
  (=***Metabelbella*** Bulanova-Zachvatkina, 1967)
- ***A. (Dyobelba)*** Norton, 1979
  (=***Heterodamaeus*** Mihelčič, 1964 *nom. praeoc.*)
  (=***Mirobelba*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994)
- ***A. (Parabelbella)*** Bulanova-Zachvatkina, 1967
  (=***Akrodamaeus*** Norton, 1979)
- ***A. (Paradyobelba)*** Miko *et* Ermilov, 2021
- ***Belba*** Heyden, 1826
- ***B. (Caenobelba)*** Norton, 1980
- ***Belbodamaeus*** Bulanova-Zachvatkina, 1967
- ***B. (Lanibelba)*** Norton, 1980
- ***Damaeus*** Koch, 1835
  (=***Hypodamaeus*** Bulanova-Zachvatkina, 1957)
- ***D. (Adamaeus)*** Norton, 1977
- ***D. (Epidamaeus)*** Bulanova-Zachvatkina, 1957
- ***D. (Eudamaeus)*** Pérez-Íñigo, 1987
- ***D. (Kunstidamaeus)*** Miko, 2006
- ***D. (Paradamaeus)*** Bulanova-Zachvatkina, 1957
- ***D. (Spatiodamaeus)*** Bulanova-Zachvatkina, 1957
- ***Dameobelba*** Sellnick, 1928
- ***Metabelba*** Grandjean, 1936
- ***M. (Neobelba)*** Bulanova-Zachvatkina, 1967
  (=***Pateribelba*** Mourek, Miko *et* Bernini, 2011)
- ***Nododamaeus*** Hammer, 1977
- ***N. (Dasybelba)*** Woolley *et* Higgins, 1979
  (=***Quatrobelba*** Norton, 1980)
- ***Nortonbelba*** Bernini, 1980
- ***Porobelba*** Grandjean, 1936
- ***Protobelba*** Norton, 1979
- ***Subbelba*** Bulanova-Zachvatkina, 1967
- ***Tectodamaeus*** Aoki, 1984
- ***T. (Tamdamaeus)*** Miko *et* Ermilov, 2017
- ***Tokukobelba*** Lamos, 2016
- ***Weigmannia*** Miko *et* Norton, 2010
  (=***Gerdia*** Miko *et* Norton, 2010 *nom. praeoc.*)

Polypterozetoidea Grandjean, 1959
Polypterozetidae Grandjean, 1959
- ***Polypterozetes*** Berlese, 1916
Podopterotegaeidae Piffl, 1972
- ***Podopterotegaeus*** Aoki, 1969

Cepheusoidea Berlese, 1896
Cepheusidae Berlese, 1896
- ***Cepheus*** Koch, 1835
  (=***Pelonia*** Grube, 1859)
  (=***Tegeocranus*** Nicolet, 1855)
- ***Compactozetes*** Hammer, 1966
- ***Conoppia*** Berlese, 1908

(=***Balzania*** Jacot, 1929)
(=***Phyllotegeus*** Berlese, 1913)
- ***Eupterotegaeus*** Berlese, 1916
(=***Diodontocepheus*** Mihelčič, 1958)
- ***Hypocepheus*** Krivolusky, 1971
- ***Ommatocepheus*** Berlese, 1913
- ***Oribatodes*** Banks, 1895
- ***Pilocepheus*** Pérez-Íñigo, 1992
- ***Protocepheus*** Jacot, 1928
- ***Reticulocepheus*** Vasiliu *et* Călugăr, 1977
(=***Cubacepheus*** Balogh *et* Mahunka, 1979)
(=***Geocepheus*** Sitnikova, 1979)
- ***Sadocepheus*** Aoki, 1965
(=***Hamotegeus*** Balogh *et* Mahunka, 1969)
- ***Sphodrocepheus*** Woolley *et* Higgins, 1963
- ***Tereticepheus*** S. Bernini *et* Bernini, 1990
- ***Tikizetes*** Hammer, 1967
- ***Tritegeus*** Berlese, 1913

Cerocepheidae Mahunka, 1986
- ***Bornebuschia*** Hammer, 1966
- ***Cerocepheus*** Trägårdh, 1931
- ***Dicrotegaeus*** Luxton, 1988

Eutegaeidae Balogh, 1965
- ***Atalotegaeus*** Luxton, 1988
- ***Birotegaeus*** Luxton, 1988
- ***Dudichella*** Balogh, 1970
- ***Eutegaeus*** Berlese, 1916
- ***Neoeutegaeus*** Aoki, 1964
- ***Neseutegaeus*** Woolley, 1965
- ***Pareutegaeus*** Woolley, 1965
- ***Porrhotegaeus*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Pterozetes*** Hammer, 1966

Salvidae Özdikmen, 2008
- ***Salvus*** Özdikmen, 2008
(=***Brazilobates*** Koçak *et* Kemal, 2008 *nom. praeoc.*)
(=***Pterobates*** Balogh *et* Mahunka, 1977 *nom. praeoc.*)

Nodocepheidae Piffl, 1972
- ***Nemacepheus*** Aoki, 1968
- ***Nodocepheus*** Hammer, 1958

Tumerozetidae Hammer, 1966
- ***Tumerozetes*** Hammer, 1966

Gustavioidea Oudemans, 1900

Anderemaeidae Balogh, 1972
- ***Anderemaeus*** Hammer, 1958
- ***Luxtoneremaeus*** Balogh *et* P. Balogh, 1992

Astegistidae Balogh, 1961
- ***Astegistes*** Hull, 1916
(=***Cultrozetes*** Sellnick, 1922)
- ***Cultroribula*** Berlese, 1908
- ***Furcoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***F. (Mexicoppia)*** Mahunka, 1983
- ***Furcoribula*** Balogh, 1943
- ***Lamellozetes*** Covarrubias, 1967
- ***Maorizetes*** Hammer, 1966
- ***Monofurcoppia*** Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1995
- ***Quadroribula*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
- ***Sulcoribula*** Hammer, 1971

Multoribulidae Balogh, 1972
- ***Multoribula*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Peloptoribula*** Mahunka, 1984

Ceratoppiidae Grandjean, 1954
- ***Amazoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Austroceratoppia*** Hammer, 1979
- ***Ceratoppia*** Berlese, 1908
(?=***Notaspis*** Hermann, 1804 *gen. inq.*)
- ***Ceratorchestes*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***C. (Paraceratorchestes)*** Ermilov *et* Kalúz, 2012
- ***Comeremaeus*** Hammer, 1962
- ***Dendrozetes*** Aoki, 1970
- ***Macquarioppia*** Wallwork, 1964
(=***Macquariella*** Wallwork, 1963 *nom. praeoc.*)
- ***Metapyroppia*** Woolley, 1969
- ***Negroppia*** Vasiliu *et* Călugăr, 1977
- ***Notoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Paraceratoppia*** Rjabinin, 1982
- ***Parapyroppia*** Pérez-Íñigo *et* Subías, 1979
- ***Pseudoceratoppia*** Hammer, 1967
(=***Hauseroceratoppia*** Mahunka, 1980)
- ***Pseudopyroppia*** Rjabinin, 1987
- ***Pyroppia*** Hammer, 1955
- ***Trichoppia*** Balogh, 1961

Peloppiidae Balogh, 1943
- ***Ceratoppiella*** Hammer, 1977
- ***Metrioppia*** Grandjean, 1931
(=***Peloppia*** Sellnick, 1931)
- ***Paenoppia*** Woolley *et* Higgins, 1965

Gustaviidae Oudemans, 1900
- ***Gustavia*** Kramer, 1879
(=***Neozetes*** Berlese, 1885)
(=***Serrarius*** Michael, 1883)

Liacaridae Sellnick, 1928
- ***Adoristes*** Hull, 1916
- ***A. (Gordeeviella)*** Shtanchaeva, Subías *et* Arillo, 2010
- ***Birsteinius*** Krivolutsky, 1965
- ***Liacarus*** Michael, 1898
(=***Leiosoma*** Nicolet, 1855 *nom. praeoc.*)
(=***Leuroxenillus*** Woolley *et* Higgins, 1966)
(=***Stenoxenillus*** Woolley *et* Higgins, 1966)
- ***L. (Dorycranosus)*** Woolley, 1969
- ***L. (Procorynetes)*** Woolley, 1967
- ***L. (Rhaphidosus)*** Woolley, 1969
- ***Opsioristes*** Woolley, 1967
- ***Planoristes*** Iturrondobeitia *et* Subías, 1978
- ***Scarabacarus*** Shtanchaeva *et* Subías, 2010

Xenillidae Woolley *et* Higgins, 1966
- ***Choixenillus*** Subías, 2016
- ***Neoxenillus*** Fujikawa, 2004
- ***Xenilloides*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
- ***Xenillus*** Robineau-Desvoidy, 1839
(=***Banksia*** Oudemans *et* Voigts, 1905)
(=***Dinoxenillus*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
(=***Kochia*** Oudemans, 1900)
(=***Pseudocepheus*** Jacot, 1928)
- ***X. (Stonyxenillus)*** Woolley *et* Higgins, 1966

Tenuialidae Jacot, 1929
- ***Ceratotenuiala*** Aoki *et* Maruyama, 1983
- ***Hafenferrefia*** Jacot, 1939
(=***Hafenrefferiella*** Sellnick, 1952)
- ***Hafenrefferia*** Oudemans, 1906
- ***Peltenuiala*** Norton, 1983
- ***Tenuiala*** Ewing, 1913
- ***Tenuialoides*** Woolley *et* Higgins, 1966

Niphocepheoidea Travé, 1959

Niphocepheidae Travé, 1959
- ***Niphocepheus*** Balogh, 1943

Zetorchestoidea Michael, 1898

Zetorchestidae Michael, 1898
- ***Belorchestes*** Grandjean, 1951
- ***Litholestes*** Grandjean, 1951
- ***Microzetorchestes*** Balogh, 1943
(=***Diorchestes*** Grandjean, 1951)
- ***Saxicolestes*** Grandjean, 1951
- ***Strenzkea*** Travé, 1967
- ***Zetorchestes*** Berlese, 1888
(?=***Leptorchistis*** Canestrini *et* Berlese, 1885 *nom. praeoc.*)
(=***Phyllorchestes*** Mahunka, 1983)

Eremaeoidea Oudemans, 1900

Caleremaeidae Grandjean, 1965
- ***Caleremaeus*** Berlese, 1910
- ***Caucaseremaeus*** Subías *et* Shtanchaeva, 2006
- ***Cristeremaeus*** Balogh *et* Csiszár, 1963
- ***Epieremulus*** Berlese, 1916
(=***Carabodoides*** Jacot, 1937)
- ***Megeremaeus*** Higgins *et* Woolley, 1965
- ***Veloppia*** Hammer, 1955
- ***Yungaseremaeus*** Balogh *et* Mahunka, 1969

Aribatidae Aoki, Takaku *et* Ito, 1994
- ***Aribates*** Aoki, Takaku *et* Ito, 1994

Kodiakellidae Hammer, 1967
- ***Kodiakella*** Hammer, 1967

Eremaeidae Oudemans, 1900
- ***Asperemaeus*** Behan-Pelletier, 1982
- ***Carinabella*** Hammer, 1977
- ***Eremaeus*** Koch, 1835
- ***Eueremaeus*** Mihelčič, 1963
  (=***Kartoeremaeus*** Higgins, 1979)
- ***Tricheremaeus*** Berlese, 1908

Oribellidae Kunst, 1971
- ***Kaszabobates*** Balogh, 1972
  (=***Gobiella*** Balogh *et* Mahunka, 1965 *nom. praeoc.*)
- ***Oribella*** Berlese, 1908
  (=***Infernobates*** Karppinen *et* Poltavskaja, 1990)
- ***Pantelozetes*** Grandjean, 1953
- ***P. (Montizetes)*** Kunst, 1971
- ***P. (Oribellopsis)*** Kunst, 1971
  (=***Gemmazetes*** Fujikawa, 1979)
- ***Proteremaeus*** Piffl, 1965
  (=***Sibiremaeus*** Rjabinin *et* Krivolutsky, 1975)

Amerobelboidea Grandjean, 1954

Ctenobelbidae Grandjean, 1965
- ***Ctenobelba*** Balogh, 1943
  (=***Elapheremaeus*** Grandjean, 1943)
- ***C. (Aokibelba)*** Subías *et* Shtanchaeva, 2013
- ***C. (Berndamerus)*** Mahunka, 1977
- ***C. (Bifurcobelba)*** Subías *et* Shtanchaeva, 2010
- ***C. (Caucasiobelba)*** Subías *et* Shtanchaeva, 2010

Amerobelbidae Grandjean, 1954
- ***Amerobelba*** Berlese, 1908
- ***Hellenamerus*** Mahunka, 1974
- ***Mongaillardia*** Grandjean, 1961
- ***Rastellobata*** Grandjean, 1961
- ***Roynortonia*** Ermilov, 2011

Eremulidae Grandjean, 1965
- ***Austroeremulus*** Mahunka, 1985
- ***Caveremulus*** Mahunka, 1983
  (=***Berndbella*** Mahunka, 1985)
- ***Eremulus*** Berlese, 1908
- ***Mahunkana*** Koçak *et* Kemal, 2008
  (=***Fenestrella*** Mahunka, 1987 *nom. praeoc.*)
- ***Pseuderemulus*** Balogh *et* Mahunka, 1968
- ***Reteremuloides*** Mahunka, 1989
- ***Reteremulus*** Balogh *et* Mahunka, 1966

Damaeolidae Grandjean, 1965
- ***Caudamaeolus*** P. Balogh, 1988
- ***Costeremus*** Aoki, 1970
- ***Damaeolus*** Paoli, 1908
- ***Fosseremus*** Grandjean, 1954
- ***Gressittolus*** Balogh, 1970
  (=***Fijirella*** Hammer, 1971)

Eremobelbidae Balogh, 1961
- ***Eremobelba*** Berlese, 1908

Heterobelbidae Balogh, 1961
- ***Furcodamaeus*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
- ***Haplobelba*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Heterobelba*** Berlese, 1913

Basilobelbidae Balogh, 1961
- ***Basilobelba*** Balogh, 1958
  (=***Hammation*** Grandjean, 1959)
- ***Xiphobelba*** Csiszár, 1961

Ameridae Bulanova-Zachvatkina, 1957
- ***Amerus*** Berlese, 1896
- ***A. (Neamerus)*** Willmann, 1939
- ***Andesamerus*** Hammer, 1962
- ***Caenosamerus*** Higgins *et* Woolley, 1969
- ***Ctenamerus*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
- ***Haplamerus*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
- ***Hymenobelba*** Balogh, 1962
- ***Pteramerus*** Balogh, 1964

Oxyameridae Aoki, 1965
- ***Oxyamerus*** Aoki, 1965

Platyameridae Balogh *et* P. Balogh, 1983
- ***Gymnodampia*** Jacot, 1937
  (=***Cristamerus*** Hammer, 1977)
  (=***Defectamerus*** Aoki, 1984)
- ***Platyamerus*** Balogh *et* P. Balogh, 1983

Staurobatidae Grandjean, 1966
- ***Staurobates*** Grandjean, 1966
- ***Stauroma*** Grandjean, 1966

Spinozetidae Balogh, 1972
- ***Grypoceramerus*** Suzuki *et* Aoki, 1970
- ***Iberoppia*** Pérez-Íñigo, 1986
- ***Spinozetes*** Piffl, 1966
  (=***Mirus*** Kulijev, 1967)
- ***Yambaramerus*** Aoki, 1996

Oppioidea Sellnick, 1937

Arceremaeidae Balogh, 1972
- ***Arceremaeus*** Hammer, 1961
- ***Tecteremaeus*** Hammer, 1961

Machadobelbidae Balogh, 1972
- ***Machadobelba*** Balogh, 1958
- ***Ramogneta*** Karppinen, 1966

Rioppiidae Balogh *et* Mahunka, 1977
- ***Rioppia*** Balogh *et* Mahunka, 1977

Decoroppiidae Mahunka, 2009
- ***Decoroppia*** Mahunka, 2009

Autognetidae Grandjean, 1960
- ***Austrogneta*** Balogh *et* Csiszár, 1963
- ***Autogneta*** Hull, 1916
- ***A. (Conchogneta)*** Grandjean, 1963
- ***A. (Rhaphigneta)*** Grandjean, 1960
- ***Cosmogneta*** Grandjean, 1960
- ***Eremobodes*** Jacot, 1937
- ***Parautogneta*** Golosova, 1974
- ***Triautogneta*** Fujikawa, 2009

Thyrisomidae Grandjean, 1954
- ***Banksinoma*** Oudemans, 1930
  (=***Thyrisoma*** Grandjean, 1953)

Oppiidae Sellnick, 1937

[**Antilloppiinae**] Mahunka, 1985
- ***Joboppia*** Ruiz, Mínguez *et* Subías, 1988
- ***Neoppia*** Bhattacharya *et* Banerjee, 1981
  (=***Antilloppia*** Mahunka, 1985)

[**Paternoppiinae**] Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 2000
- ***Paternoppia*** Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 2000

[**Lanceoppiinae**] Balogh, 1983
- ***Acutoppia*** Balogh, 1983
- ***Basiloppia*** Balogh, 1983
- ***Chavinia*** Hammer, 1961
- ***Cycloppia*** Balogh, 1983
- ***Drepanoppia*** Balogh, 1983
- ***Geminoppia*** Balogh *et* P. Balogh, 1983
- ***Globoppia*** Hammer, 1962
- ***Laminoppia*** Hammer, 1968
- ***Lanceoppia*** Hammer, 1962
- ***L. (Baioppia)*** Luxton, 1985
- ***L. (Bicristoppia)*** Subías, 1989
- ***L. (Convergoppia)*** Balogh, 1983
- ***L. (Hamoppia)*** Hammer, 1968
- ***L. (Lancelalmoppia)*** Subías, 1989
  (=***Radamoppia*** Mahunka, 1994)
- ***Loboppia*** Balogh, 1983
- ***Membranoppia*** Hammer, 1968
  (=***Nesoppia*** Luxton, 1985)
- ***M. (Pravoppia)*** Luxton, 1985
- ***Operculoppia*** Hammer, 1968
- ***Otoppia*** Balogh, 1983
- ***Polyoppia*** Hammer, 1968
- ***Processoppia*** Balogh, 1983
  (=***Rhaphoppia*** Balogh, 1983)
- ***Pustuloppia*** Mahunka, 1994
- ***Setoppia*** Balogh, 1983
  (=***Tectoppiella*** Mahunka, 1984)
- ***Trematoppia*** Balogh, 1964

[**Nosybelbinae**] Mahunka, 1994
- ***Nosybelba*** Mahunka, 1994

[**Oppiinae**] Sellnick, 1937
- ***Aeroppia*** Hammer, 1961
  (=***Paraeroppia*** Sanyal, 2009)

- ***Aethioppia*** Balogh, 1983
- ***Afroppia*** Koçak *et* Kemal, 2008
(=***Xenoppia*** Mahunka, 1982 *nom. praeoc.*)
- ***Amerioppia*** Hammer, 1961
- ***Coetzeella*** Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2107
- ***Erioppia*** Balogh, 1983
- ***Exanthoppia*** Balogh *et* P. Balogh, 1983
- ***Fusuloppia*** Balogh, 1983
- ***Goyoppia*** Balogh, 1983
- ***Heteroppia*** Balogh, 1970
- ***H. (Tanzoppia)*** Mahunka, 1988
- ***Laroppia*** Subías, 1989
- ***Lasiobelba*** Aoki, 1959
(=***Cilioppia*** Balogh, 1983)
- ***L. (Antennoppia)*** Mahunka, 1983
(=***Daedaloppia*** Balogh, 1983)
- ***Lemuroppia*** Mahunka, 1994
- ***Neoamerioppia*** Subías, 1989
- ***N. (Ameriglobopppia)*** Subías, 1989
- ***Niloppia*** Balogh, 1983
- ***N. (Hanoiella)*** Ermilov *et* Starý, 2018
- ***Oligoppia*** Balogh, 1983
- ***Oppia*** Koch, 1835
(=***Dameosoma*** Berlese, 1892)
- ***Paroppia*** Hammer, 1968
- ***Pluritrichoppia*** Subías *et* Arillo, 1989
- ***Pseudomultioppia*** Subías, 2018
- ***Quinquoppia*** Tseng, 1982
(=***Damaeoppia*** Ohkubo, 1995)
- ***Sphagnoppia*** Balogh *et* P. Balogh, 1986
- ***Taiwanoppia*** Tseng, 1982
(=***Vietoppia*** Mahunka, 1988)
- ***T. (Paragloboppia)*** Subías, 1989
- ***Tectoppia*** Wallwork, 1961

[**Multioppiinae**] Balogh, 1983

- ***Anomaloppia*** Subías, 1978
- ***Condyloppia*** Balogh, 1983
- ***Cryptoppia*** Csiszár, 1961
- ***Cubaoppia*** Balogh, 1983
- ***Graptoppia*** Balogh, 1983
(=***Frondoppia*** Mahunka, 1983)
- ***G. (Apograptoppia)*** Subías *et* Rodríguez, 1985
- ***G. (Stenoppia)*** Balogh, 1983
- ***Helioppia*** Balogh, 1983
- ***Intermedioppia*** Subías *et* Rodríguez, 1987
- ***Javieroppia*** Mínguez *et* Subías, 1986
- ***Multioppia*** Hammer, 1961
- ***M. (Furculoppia)*** Balogh, 1983
- ***M. (Hammeroppia)*** Vasiliu *et* Ivan, 2009
- ***M. (Multilanceoppia)*** Subías, 1989
- ***Octoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Pararamusella*** Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
- ***Pseudoamerioppia*** Subías, 1989
(=***Minoricoppia*** Pérez-Íñigo Jr., 1991)
- ***Pulchroppiella*** Balogh, 1983
- ***Ramonoppia*** Morell, 1990
- ***Ramusella*** Hammer, 1962
(=***Alcioppia*** Balogh, 1983)
(=***Amolops*** Hull, 1916 *nom. praeoc.*)
(=***Bioppia*** Mahunka *et* Paoletti, 1984)
- ***R. (Dosangoppia)*** Ermilov *et* Frolov, 2019
- ***R. (Insculptoppia)*** Subías, 1980
- ***R. (Insculptoppiella)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***R. (Rectoppia)*** Subías, 1980
- ***R. (Sabahoppia)*** Mahunka, 1987
- ***Ramuselloppia*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***Sceletoppia*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
- ***Tainsculptoppia*** Subías *et* Shtanchaeva, 2011
- ***Uroppia*** Balogh, 1983

[**Pulchroppiinae**] Balogh, 1983

- ***Multipulchroppia*** Subías, 1989
- ***Pulchroppia*** Hammer, 1979

[**Arcoppiinae**] Balogh, 1983

- ***Arcoppia*** Hammer, 1977
(=***Chuoppia*** Tseng, 1982)
- ***Basidoppia*** Mahunka, 1983
- ***Mimoppia*** Balogh, 1983
- ***M. (Dysarcoppia)*** Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
- ***Porrhoppia*** Balogh, 1970
- ***Similoppia*** Mahunka, 1983
- ***S. (Reductoppia)*** P. Balogh, 1984
- ***Wallworkoppia*** Subías, 1989
(=***Wallworkella*** Balogh, 1983 *nom. praeoc.*)

[**Brachioppiinae**] Subías, 1989

- ***Austroppia*** Balogh, 1983
- ***Brachioppia*** Hammer, 1961
- ***B. (Kokoppia)*** Balogh, 1983
- ***Brachioppiella*** Hammer, 1962
(=***Ugandoppia*** Mahunka, 1988)
- ***B. (Gressittoppia)*** Balogh, 1983
(=***Jermyia*** Mahunka, 2002)
- ***Brassoppia*** Balogh, 1983
- ***B. (Plaesioppia)*** Balogh, 1983
- ***Ctenoppia*** Balogh, 1983
- ***Gittella*** Hammer, 1961
- ***Leptoppia*** Mahunka, 1997
- ***Pletzenoppia*** Balogh, 1983
- ***Setuloppia*** Balogh, 1983
- ***Trapezoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1969

[**Medioppiinae**] Subías *et* Mínguez, 1985

- ***Congoppia*** Balogh, 1983
- ***Discoppia*** Balogh, 1983
- ***D. (Cylindroppia)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***Medioxyoppia*** Subías, 1989
- ***Microppia*** Balogh, 1983
- ***Miroppia*** Hammer, 1968
- ***Multimedioppia*** Subías, 1991
- ***Quattoppiella*** Hugo-Coetzee, 2014
- ***Ramuloppia*** Balogh, 1961
- ***Rhinoppia*** Balogh, 1983
(=***Kunoppia*** Mahunka, 1987)
(=***Medioppia*** Subías *et* Mínguez, 1985)
- ***R. (Paramedioppia)*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000
(=***Bipectinoppia*** Subías *et* Shtanchaeva, 2011)
- ***Serratoppia*** Subías *et* Mínguez, 1985
- ***Solenoppia*** Hammer, 1968
- ***S. (Campbelloppia)*** Luxton, 1985

[**Oppiellinae**] Seniczak, 1975

- ***Belloppia*** Hammer, 1968
- ***Berniniella*** Balogh, 1983
- ***B. (Canaloppia)*** Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
- ***Dissorhina*** Hull, 1916
(=***Cosmoppia*** Balogh, 1983)
- ***Elaphoppia*** Balogh, 1983
(=***Parasynoppia*** Aoki, 1983)
- ***Hypogeoppia*** Subías, 1981
- ***Kulievia*** Vasiliu *et* Ivan, 1999
- ***Lauroppia*** Subías *et* Mínguez, 1986
(=***Abchasiella*** Gordeeva *et* Tarba, 1990)
(=***Ctenoppiella*** Gordeeva *et* Karppinen, 1988)
- ***Liacaroppia*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***Moritzoppia*** Subías *et* Rodríguez, 1988
(=***Dentoppia*** Gordeeva, 2001)
(=***Drukoppia*** Gordeeva, 2001)
(=***Moritziella*** Balogh, 1983 *nom. praeoc.*)
(=***Tetroppia*** Gordeeva, 1999)
- ***M. (Pentoppia)*** Subías, 2020
- ***Neostrinatina*** Mahunka, 1980
- ***Neotrichoppia*** Subías *et* Iturrondobeitia, 1980
- ***N. (Ancestroppia)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***N. (Confinoppia)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***Oppiella*** Jacot, 1937
- ***O. (Moritzoppiella)*** Gordeeva, 2000
- ***O. (Perspicuoppia)*** Pérez-Íñigo, 1971
- ***Pseudobrachioppiella*** Tseng, 1982
- ***Ptiloppia*** Balogh, 1983
- ***Tripiloppia*** Hammer, 1968
(=***Autoppia*** Golosova *et* Karppinen, 1983)
- ***Tuberoppia*** Golosova, 1974

[**Oxyoppiinae**] Subías, 1989

- ***Acroppia*** Balogh, 1983
- ***Baloghoppia*** Mahunka, 1983

- ***Foraminoppia*** Subías *et* Arillo, 1998
- ***Fossoppia*** Mahunka, 1994
- ***F. (Multifossoppia)*** Subías, 2017
- ***Foveolatoppia*** Mahunka, 1988
- ***Lineoppia*** Balogh *et* P. Balogh, 1983
- ***Mahunkella*** Balogh, 1983
- ***Oxybrachioppia*** Subías, 1989
- ***Oxymystroppia*** Subías *et* Shtanchaeva, 2011
- ***Oxyoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***O. (Aciculoppia)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***O. (Dzarogneta)*** Kulijev, 1978
  (=***Fineoppia*** Khanbekyan *et* Gordeeva, 1991)
  (=***Pectinoppia*** Subías *et* Rodríguez, 1986)
- ***O. (Oxyoppiella)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***Oxyoppioides*** Subías *et* Mínguez, 1985
- ***Sacculoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1968
- ***Separatoppia*** Mahunka, 1983
- ***Subiasella*** Balogh, 1983
- ***S. (Dividoppia)*** Mahunka, 1987
- ***S. (Lalmoppia)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
  (=***Cassioppia*** Poltavskaya, 1994)
  (=***Pararectoppia*** Mahunka, 1987)
- ***S. (Lucioppia)*** Mahunka, 1985
- ***S. (Paralalmoppia)*** Subías *et* Shtanchaeva, 2012

[**Mystroppiinae**] Balogh, 1983

- ***Cheloppia*** Hammer, 1971
- ***Corynoppia*** Balogh, 1983
- ***Karenella*** Hammer, 1962
- ***K. (Glabroppia)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***K. (Stakarenoppia)*** Subías *et* Rodríguez, 1986
- ***Mystroppia*** Balogh, 1959
- ***Rugoppia*** Mahunka, 1986
  (=***Mahnertella*** Mahunka, 1997)
- ***Stachyoppia*** Balogh, 1961
- ***Striatoppia*** Balogh, 1958

Epimerellidae Ayyildiz *et* Luxton, 1989

- ***Enisella*** Ayyildiz *et* Luxton, 1989
- ***Epimerella*** Kulijev, 1967
- ***Luxtonia*** Mahunka, 2001

Lyroppiidae Balogh, 1983

- ***Lyroppia*** Balogh, 1961

Granuloppiidae Balogh, 1983

- ***Enantioppia*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Gigantoppia*** Mahunka, 2008
- ***Granuloppia*** Balogh, 1958
  (=***Pocsoppia*** Mahunka, 1984)
- ***Hammerella*** Balogh, 1983
- ***H. (Bornemiszaella)*** P. Balogh, 1994
- ***H. (Interoppia)*** Mahunka, 1987
- ***H. (Parawoasella)*** Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2012
- ***H. (Varioppia)*** Mahunka, 1985
  (=***Woasella*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
- ***Senectoppia*** Aoki, 1976
  (=***Macrosoma*** Hammer, 1979)

Teratoppiidae Balogh, 1983

- ***Granuloteratoppia*** P. Balogh, 1988
- ***Leoppia*** Pérez-Íñigo, 1983
- ***L. (Brasiloppia)*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
- ***Teratoppia*** Balogh, 1959
  (=***Cretoppia*** Mahunka, 1986)
- ***T. (Teratoppiella)*** Balogh, 1983

Sternoppiidae Balogh *et* Mahunka, 1969

- ***Sternoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1968
  (=***Synoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1969)

Machuellidae Balogh, 1983

- ***Gredosella*** Gil-Martín, Arillo *et* Subías, 2000
- ***Machuella*** Hammer, 1961

Papillonotidae Balogh, 1983

- ***Papillonotus*** Wallwork, 1961

Tuparezetidae Balogh, 1972

- ***Tuparezetes*** Spain, 1969

Quadroppiidae Balogh, 1983

- ***Borhidia*** Balogh *et* Mahunka, 1974
- ***Hexoppia*** Balogh, 1958
- ***Quadroppia*** Jacot, 1939
- ***Q. (Coronoquadroppia)*** Ohkubo, 1995

Trizetoidea Ewing, 1917

Cuneoppiidae Balogh, 1983

- ***Cuneoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1969

Suctobelbidae Jacot, 1938

- ***Allosuctobelba*** Moritz, 1970
- ***A. (Helvetobelba)*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999
- ***Coartobelba*** Mahunka, 2001
- ***Condylobelba*** Mahunka, 2001
- ***Fenestrobelba*** Balogh, 1970
- ***Interbelba*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
- ***Kuklosuctobelba*** Chinone, 2003
- ***K. (Niosuctobelba)*** Chinone, 2003
- ***Neosuctobelba*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Novosuctobelba*** Hammer, 1977
- ***N. (Leptosuctobelba)*** Chinone, 2003
  (=***Madabelba*** Mahunka, 2009)
  (=***Nasobelba*** Mahunka, 2005)
- ***N. (Suctobelboides)*** Pankov, 1997
- ***Parasuctobelba*** Hammer, 1977
- ***Parisuctobelba*** Higgins *et* Woolley, 1976
- ***Persuctobelba*** Mahunka, 2000
- ***Rhynchobelba*** Willmann, 1953
  (=***Rhinosuctobelba*** Woolley *et* Higgins, 1969)
- ***Rhynchoppia*** Balogh, 1968
- ***Serratobelba*** Mahunka, 1984
- ***Sucteremaeus*** Golosova *et* Krivolutsky, 1975
  (=***Kathetosuctobelba*** Chinone, 2003)
- ***Suctobelba*** Paoli, 1908
- ***Suctobelbata*** Gordeeva, 1991
  (=***Unicobelba*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999)
- ***Suctobelbella*** Jacot, 1937
- ***S. (Flagrosuctobelba)*** Hammer, 1979
- ***S. (Ussuribata)*** Rjabinin, 1975
  (=***Bruneibelba*** Mahunka, 2001)
  (=***Discosuctobelba*** Hammer, 1979)
- ***Suctobelbila*** Jacot, 1937
  (=***Reticobella*** Hammer, 1962)
  (=***Rhynchobella*** Hammer, 1961)
  (=***Suctoppia*** Balogh, 1958)
- ***Suctobelbiloides*** Mahunka, 1988
- ***Zeasuctobelba*** Hammer, 1966

Rhynchoribatidae Balogh, 1961

- ***Eurhynchoribates*** Miko, 2016
- ***E. (Orinchobates)*** Miko, Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
- ***Rhynchoribates*** Grandjean, 1929
- ***R. (Parhynchoribates)*** Miko, 2016
- ***R. (Rhynchoribatodes)*** Miko, 2016
- ***R. (Tectorhynchoribates)*** Miko, 2016
- ***Suctoribates*** Balogh, 1963

Trizetidae Ewing, 1917

- ***Trizetes*** Berlese, 1904

Otocepheoidea Balogh, 1961

Dampfiellidae Balogh, 1961

- ***Beckiella*** Grandjean, 1964
- ***Dampfiella*** Sellnick, 1931

Tetracondylidae Aoki, 1961

- ***Afrotocepheus*** Mahunka, 1985
- ***A. (Didierotocepheus)*** Mahunka, 1994
- ***Borneremaeus*** Mahunka, 1991
- ***Bulbocepheus*** Mahunka, 1988
- ***Carabocepheus*** Berlese, 1910
- ***Cavernocepheus*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***C. (Paracavernocepheus)*** Ermilov *et* Starý, 2018
- ***Dolicheremaeus*** Jacot, 1938
  (=***Tetracondyla*** Newell, 1956)
- ***Fernandocepheus*** Mahunka, 1982
- ***Fissicepheus*** Balogh *et* Mahunka, 1967
- ***F. (Psammocepheus)*** Aoki, 1970
- ***Flagellocepheus*** P. Balogh, 1984
- ***Hydroecocepheus*** Corpuz-Raros, 1979
- ***Leptotocepheus*** Balogh, 1961
- ***L. (Longocepheus)*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Lophotocepheus*** Balogh *et* P. Balogh, 1983

- ***Neotrichocepheus*** Hammer, 1973
- ***Papillocepheus*** Balogh *et* Mahunka, 1966
(=***Clavazetes*** Hammer, 1966)
- ***Paradolicheremaeus*** Tseng, 1982
- ***Pentacepheus*** Corpuz-Raros, 2004
- ***Plenotocepheus*** Hammer, 1966
- ***P. (Neotocepheus)*** Hammer, 1966
- ***Pseudotocepheus*** Balogh, 1961
(=***Constrictocepheus*** Grobler, 1998)
(=***Nesotocepheus*** Hammer, 1972)
- ***Seboetocepheus*** Mahunka, 1985
- ***Spinotocepheus*** Hammer, 1981
- ***Trichocepheus*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Trichocondyla*** Balogh *et* P. Balogh, 1986
- ***Umashtanchaeviella*** Ermilov, Anichkin *et* Tolstikov, 2014
- ***Wallworkodes*** Subías, 2021

Otocepheidae Balogh, 1961
- ***Basiceramerus*** Corpuz-Raros, 1979
- ***Eurostocepheus*** Aoki, 1965
- ***E. (Cerostocepheus)*** Mahunka, 1973
- ***Ikarotocepheus*** Mahunka, 1988
- ***Kalayaan*** Corpuz-Raros, 1998
- ***K. (Rimandocepheus)*** Corpuz-Raros, 1998
- ***Megalotocepheus*** Aoki, 1965
- ***M. (Archegotocepheus)*** Mahunka, 1988
- ***M. (Dicondyla)*** Aoki, 1965
- ***Ocellotocepheus*** Mahunka, 1989
- ***Otocepheus*** Berlese, 1905
- ***O. (Acrotocepheus)*** Aoki, 1965
- ***O. (Hexatocepheus)*** Wen, 1993
- ***Otopentacepheus*** Corpuz-Raros, 2007
- ***Papuacepheus*** Balogh, 1968
- ***Philippotocepheus*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
- ***Samarocepheus*** Corpuz-Raros, 1990
- ***S. (Kaibacepheus)*** Corpuz-Raros, 2004
- ***Trichotocepheus*** Aoki, 1965

Tokunocepheidae Aoki, 1966
- ***Tokunocepheus*** Aoki, 1966

Carabodoidea Koch, 1843
Carabodidae Koch, 1843
- ***Afticarabodes*** Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
- ***Antongilibodes*** Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014
- ***Aokiella*** Balogh *et* Mahunka, 1967
- ***Apotomocepheus*** Aoki, 1965
- ***Archegocepheus*** Aoki, 1965
- ***Austrocarabodes*** Hammer, 1966
- ***A. (Austroflexa)*** Subías, 2019
- ***A. (Baloghodes)*** Mahunka, 1986
- ***A. (Synkrotima)*** Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017
(=***Rwandabodes*** Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2019)
(=***Zimbabwecepheus*** Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2017)
- ***A. (Uluguroides)*** Mahunka, 1983
(=***Ngorongobodes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
- ***Bathocepheus*** Aoki, 1978
(=***Philippobodes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
- ***Bovicarabodes*** Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
- ***Bunabodes*** Fujikawa, 2004
- ***Camcarabodes*** Ermilov *et* Starý, 2018
- ***Carabodes*** Koch, 1835
(=***Neocepheus*** Willmann, 1936)
- ***C. (Flexa)*** Kulijev, 1977
- ***C. (Klapperiches)*** Mahunka, 1979
- ***C. (Phyllocarabodes)*** Balogh *et* Mahunka, 1969
(=***Antillobodes*** Mahunka, 1985)
(=***Pentabodes*** P. Balogh, 1984)
- ***Cavaecarabodes*** Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
- ***Cavernocarabodes*** Mahunka, 1974
- ***Ceylobodes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
- ***Chistyakovella*** Ermilov, Aoki *et* Anichkin, 2013
- ***Congocepheus*** Balogh, 1958
- ***C. (Tanzaniacepheus)*** Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2017
(=***Fernandezbodes*** Subías, 2018)
- ***Costacarabodes*** Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018
- ***Cubabodes*** Balogh *et* Mahunka, 1974
- ***Gibbicepheus*** Balogh, 1958
- ***G. (Diplobodes)*** Aoki, 1958
(=***Mauribodes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
- ***G. (Gibbibodes)*** Mahunka, 1986
- ***G. (Kalloia)*** Mahunka, 1985
- ***G. (Neocarabodes)*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Gymnobodes*** Balogh, 1965
- ***Hardybodes*** Balogh, 1970
(=***Carabodella*** Mahunka, 1986)
- ***Machadocepheus*** Balogh, 1958
- ***M. (Sagittabodes)*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
(=***Zimbabweae*** Fernández, Theron *et* Leiva, 2016)
- ***Malgasodes*** Mahunka, 2000
- ***Meriocepheus*** Aoki, 1973
- ***Odontocepheus*** Berlese, 1913
- ***O. (Indotocepheus)*** Mondal *et* Kundu, 1999
- ***Pasocepheus*** Aoki, 1976
(=***Opisthocepheus*** Aoki, 1976)
- ***P. (Guineobodes)*** Mahunka, 1987
- ***Pseudocarabodes*** Mahunka, 1991
(=***Bakobodes*** Mahunka, 1996)
(=***Yemenobodes*** Mahunka, 2000)
- ***Rugocepheus*** Mahunka, 2009
- ***Singabodes*** Mahunka, 1998
- ***Spathulocepheus*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Tansocepheus*** Mahunka, 1983
- ***Tectocarabodes*** Mahunka, 1988
- ***Trichocarabodes*** Balogh, 1961
- ***Tuberocepheus*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***T. (Mangabebodes)*** Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014
- ***Yoshiobodes*** Mahunka, 1986
- ***Y. (Berndobodes)*** Mahunka, 1986
- ***Y. (Dongnaibodes)*** Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2014

Nippobodidae Aoki, 1959
- ***Leobodes*** Aoki, 1965
- ***Nippobodes*** Aoki, 1959

Tectocepheoidea Grandjean, 1954
Tectocepheidae Grandjean, 1954
- ***Tectocepheus*** Berlese, 1896
- ***Tegeozetes*** Berlese, 1913

Tegeocranellidae P. Balogh, 1987
- ***Tegeocranellus*** Berlese, 1913

Charassobatoidea Grandjean, 1958
Charassobatidae Grandjean, 1958
- ***Charassobates*** Grandjean, 1929

Nosybeidae Mahunka, 1993
- ***Lamellocepheus*** Balogh, 1961
(=***Nosybea*** Mahunka, 1993)
(=***Tessacarus*** Grandjean, 1962)
- ***Topalia*** Balogh *et* Csiszár, 1963

Microtegeidae Balogh, 1972
- ***Microtegeus*** Berlese, 1916
- ***Suctotegeus*** Mahunka, 1987

Hydrozetoidea Grandjean, 1954
Hydrozetidae Grandjean, 1954
- ***Hydrozetes*** Berlese, 1902
(=***Argentinobates*** Fernández, 1984)
(=***Heloribates*** Grandjean, 1966)
(=***Ojaithrus*** Habeeb, 1982)

Ameronothroidea Vitzthum, 1943
Ameronothridae Vitzthum, 1943
- ***Alaskozetes*** Hammer, 1955
- ***Ameronothrus*** Berlese, 1896
(=***Hygroribates*** Jacot, 1934)
- ***Aquanothrus*** Engelbrecht, 1975
- ***Capillibates*** Hammer, 1966
- ***Chudalupia*** Wallwork, 1981
- ***Halozetes*** Berlese, 1916

(=***Anarea*** Dalenius, 1958)
(=***Pertorgunia*** Dalenius, 1958)
- ***Paraquanothrus*** Norton *et* Franklin, 2018
- ***Podacarus*** Grandjean, 1954
- ***Pseudantarcticola*** Balogh, 1970

Selenoribatidae Schuster, 1963
- ***Arotrobates*** Luxton, 1992
- ***Carinozetes*** Pfingstl *et* Schuster, 2012
- ***Indopacifica*** Pfingstl, Shimano *et* Lienhard, 2018
- ***Psednobates*** Luxton, 1992
- ***Schusteria*** Grandjean, 1968
- ***Selenoribates*** Strenzke, 1961
- ***Thalassozetes*** Schuster, 1963
(=***Rhizophobates*** Karasawa *et* Aoki, 2005)
- ***Thasecazetes*** Pfingstl, Baumann, Lienhard *et* Schatz, 2017

Fortuyniidae Hammen, 1963
- ***Alismobates*** Luxton, 1992
- ***Circellobates*** Luxton, 1992
- ***Fortuynia*** Hammen, 1960
- ***Litoribates*** Pfingstl *et* Schatz, 2017

Cymbaeremaeoidea Sellnick, 1928

Adhaesozetidae Hammer, 1973
- ***Adhaesozetes*** Hammer, 1966

Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928
- ***Bulleremaeus*** Hammer, 1966
- ***Cymbaeremaeus*** Berlese, 1896
- ***Glanderemaeus*** Balogh *et* Csiszár, 1963
- ***Scapheremaeus*** Berlese, 1910
- ***Sculpteremaeus*** Behan-Pelletier *et* Ermilov, 2020
- ***Seteremaeus*** Hammer, 1971
- ***Spineremaeus*** Colloff, 2011

Ametroproctidae Subías, 2004
- ***Ametroproctus*** Higgins *et* Woolley, 1968
- ***A. (Coropoculia)*** Aoki *et* Fujikawa, 1972
- ***Scapuleremaeus*** Behan-Pelletier, 1989

Eremellidae Balogh, 1961
- ***Archeremella*** Balogh *et* Mahunka, 1974
- ***Archeremella (Multieremella)*** Subías, 2020
- ***Eremella*** Berlese, 1913
(=***Proteremella*** Balogh, 1959)
- ***Eremella (Licnocepheus)*** Woolley, 1969
(=***Afreremella*** Mahunka, 1974)
(=***Triteremella*** Kunst, 1971)

Hipoorden PORONOTICAE Grandjean, 1954

Licneremaeoidea Grandjean, 1954

Dendroeremaeidae Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2005
- ***Dendroeremaeus*** Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2005

Micreremidae Grandjean, 1954
- ***Fenichelia*** Balogh, 1970
(=***Porofenichelia*** Mahunka, 1985)
- ***Mexiceremus*** Balogh *et* P. Balogh, 1998
- ***Micreremus*** Berlese, 1908
- ***Phylleremus*** Behan-Pelletier *et* Walter, 2007
- ***Phylloribatula*** Balogh *et* Mahunka, 1978
(=***Balazsella*** Mahunka, 1983)

Lamellareidae Balogh, 1972
- ***Cultroribella*** Mahunka, 1985
- ***Lamellarea*** Kok, 1968
- ***Microlamellarea*** Coetzee, 1987
- ***Tenuelamellarea*** Subías *et* Iturrondobeitia, 1978

Licneremaeidae Grandjean, 1954
- ***Huilicheremaeus*** Fernández, Marcangeli *et* Eguaras, 1997
- ***Licneremaeus*** Paoli, 1908

Scutoverticidae Grandjean, 1954
- ***Arthrovertex*** Balogh, 1970
(=***Argentinovertex*** Fernández *et* Cleva, 2002)
- ***Ethiovertex*** Mahunka, 1982
- ***E. (Biethiovertex)*** Subías, 2020
- ***Exochocepheus*** Woolley *et* Higgins, 1968
(=***Latovertex*** Mahunka, 1987)
- ***Hypovertex*** Krivolutsky, 1969
- ***Lamellovertex*** Bernini, 1976
- ***Provertex*** Mihelčič, 1959
- ***P. (Shtanchaeviella)*** Subías, 2020
- ***Scutovertex*** Michael, 1879
(=***Neoscutovertex*** Mihelčič, 1957)
- ***Scutoverticosus*** Kok, 1968

Passalozetidae Grandjean, 1954
- ***Bipassalozetes*** Mihelčič, 1957
(=***Salpasozetes*** Mahunka, 1977)
- ***B. (Passalobates)*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
- ***Passalomonia*** Mahunka, 1987
- ***Passalozetes*** Grandjean, 1932

Phenopelopoidea Petrunkevitch, 1955

Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955
- ***Eupelops*** Ewing, 1917
(=***Allopelops*** Hammer, 1952)
(=***Celaeno*** Koch, 1835)
(=***Globonothrus*** Tseng, 1982)
(=***Pelops*** Koch, 1835 *nom. praeoc.*)
(=***Phenopelops*** Petrunkevitch, 1955)
(=***Tectopelops*** Jacot, 1929)
- ***Nesopelops*** Hammer, 1973
- ***Peloptulus*** Berlese, 1908
- ***P. (Sacculoptulus)*** Subías, 2017
- ***Propelops*** Jacot, 1937
(=***Hammeria*** Sellnick, 1944)

Unduloribatoidea Kunst, 1971

Unduloribatidae Kunst, 1971
- ***Scutoribates*** Sellnick, 1918
(=***Koreoribates*** Choi, 1994)
(=***Kunstella*** Krivolutsky, 1974)
- ***Unduloribates*** Balogh, 1943
- ***Valbehanella*** Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012

Eremaeozetidae Piffl, 1972
- ***Eremaeozetes*** Berlese, 1913
- ***Idiozetes*** Aoki, 1976
- ***Mahunkaia*** Schatz, 2002
- ***Retrozetes*** Colloff, 2012
- ***Rogerzetes*** Fernández, Theron *et* Cleva, 2011
- ***Seteremaeozetes*** P. Balogh, 1988

Microzetoidea Grandjean, 1936

Microzetidae Grandjean, 1936
- ***Acanthozetes*** Balogh, 1958
- ***Acaroceras*** Grandjean, 1936
- ***A. (Malgoceras)*** Mahunka, 1993
- ***A. (Trichacaroceras)*** Mahunka, 1991
- ***Afrozetes*** Engelbrecht, 1972
- ***Amiracarus*** Miko, 2013
- ***Anakingia*** Hammer, 1961
- ***Arenozetes*** Krivolutsky, 1971
- ***Baloghoizetes*** Mahunka, 2003
- ***Berlesezetes*** Mahunka, 1980
- ***Brazilozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Calozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Caucasiozetes*** Shtanchaeva, 1984
- ***Cavernozetes*** Mahunka, 1984
- ***Christovizetes*** Krivolutsky, 1975
- ***Comorozetes*** Mahunka, 1994
- ***Cosmozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***C. (Magoebazetes)*** Engelbrecht, 1972
- ***Cuspitegula*** Hammer, 1966
- ***Dinozetes*** Balogh, 1962
- ***Fusozetes*** Balogh, 1972
- ***Hauserozetes*** Mahunka, 1980
- ***Hymenozetes*** Balogh, 1964
- ***Kalyptrazetes*** Balogh, 1972
(=***Allozetes*** Higgins, 1965 *nom. praeoc.*)
- ***Kaszabozetes*** Mahunka, 1988
(=***Sinozetes*** Mahunka, 2000)
- ***Licnozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***L. (Undulozetes)*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Microzetes*** Berlese, 1913
(=***Nellacaroides*** Mahunka, 1998)
(=***Nellacarus*** Grandjean, 1936)
(=***Teraja*** Mahunka, 1995)

- ***M. (Megazetes)*** Balogh, 1959
- ***Mirabilozetes*** Mahunka, 1977
- ***Miracarus*** Kunst, 1959
- ***Mystacozetes*** Balogh, 1962
- ***Mysterozetes*** Hammer, 1961
- ***Orthozetes*** Balogh, 1962
- ***Oxyzetes*** Balogh, 1958
- ***Papuazetes*** Balogh, 1968
- ***Phylacozetes*** Grandjean, 1936
- ***Physozetes*** Mahunka, 2008
- ***Plumozetes*** Balogh, 1972
- ***Protozetes*** Balogh, 1962
- ***Rhabdozetes*** Hammer, 1962
- ***Rhopalozetes*** Balogh, 1964
  (=***Austrozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969)
- ***Rugozetes*** Balogh, 1960
- ***Schalleria*** Balogh, 1962
- ***Schalleriella*** Engelbrecht, 1972
  (=***Mahunkaceras*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
  (=***Megazetes*** Mahunka, 1993 *nom. praeoc.*)
- ***Schizozetes*** Balogh, 1962
- ***Sturmozetes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
  (=***Gymnozetes*** P. Balogh, 1984 *nom. praeoc.*)
- ***Stylozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Szentivanyella*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Trichozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1980
- ***Vermacarus*** Balogh *et* Mahunka, 1980

Achipterioidea Thor, 1929

Achipteriidae Thor, 1929

- ***Achipteria*** Berlese, 1885
- ***A. (Izuachipteria)*** Balogh *et* Mahunka, 1979
  (=***Hokkachipteria*** Balogh *et* Mahunka, 1979)
- ***Anachipteria*** Grandjean, 1932
- ***A. (Hoffmanacarus)*** Mahunka, 1995
- ***A. (Weigmanniella)*** Subías, 2010
- ***Austrachipteria*** Balogh *et* Mahunka, 1966
  (=***Parahypozetes*** Hammer, 1967)
- ***Campachipteria*** Aoki, 1995
- ***C. (Triachipteria)*** Subías, 2017
- ***Cerachipteria*** Grandjean, 1935
  (=***Zygachipteria*** Mihelčič, 1956)
- ***Cubachipteria*** Balogh *et* Mahunka, 1979
- ***Dentachipteria*** Nevin, 1974
- ***Parachipteria*** Hammen, 1952
  (=***Pseudachipteria*** Travé, 1960)
- ***Separachipteria*** Subías, 2019

Tegoribatidae Grandjean, 1954

- ***Lemurobates*** Mahunka, 1997
- ***Neophysobates*** Luxton, 1987
  (=***Paraphysobates*** Luxton, 1985 *nom. praeoc.*)
  (=***Pseudophysobates*** Fujikawa, 1991)
- ***Paraphysobates*** Mahunka, 1985
  (=***Monophysobates*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
- ***Physobates*** Hammer, 1962
- ***Plakoribates*** Popp, 1960
- ***Protectoribates*** Behan-Pelletier, 2017
- ***Pseudotectoribates*** Subías, 1977
- ***Scutozetes*** Hammer, 1952
  (=***Neolepidozetes*** Hammer, 1977)
- ***Tectoribates*** Berlese, 1910
  (=***Anoribatella*** Kunst, 1962)
- ***Tegoribates*** Ewing, 1917
  (=***Lepidoribates*** Sellnick, 1920)
- ***Williamszetes*** Hammer, 1961
  (=***Williamsia*** Hammer, 1958 *nom. praeoc.*)

Epactozetidae Grandjean, 1930

- ***Epactozetes*** Grandjean, 1930
- ***Truncozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969

Oribatelloidea Jacot, 1925

Oribatellidae Jacot, 1925

- ***Cuspidozetes*** Hammer, 1962
- ***Ferolocella*** Grabowski, 1971
  (=***Gendzella*** Kulijev, 1977)
- ***Joelia*** Oudemans, 1906
  (=***Coggiella*** Berlese, 1916)
- ***Lamellobates*** Hammer, 1958
- ***L. (Paralamellobates)*** Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1968
- ***Novoribatella*** Engelbrecht, 1986
- ***Ophidiotrichus*** Grandjean, 1953
- ***Oribatella*** Banks, 1895
- ***O. (Bioribatella)*** Subías, 2017
- ***O. (Fberninia)*** Özdikmen, 2008
  (=***Berniniella*** Özdikmen, 2008 *nom. praeoc.*)
  (=***Cavernella*** Bernini, 1975 *nom. praeoc.*)
- ***O. (Fenestrobates)*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***O. (Monoribatella)*** Subías, 2017
- ***O. (Multoribatella)*** Subías, 2004
- ***O. (Sacculoribatella)*** Shtanchaeva *et* Subías, 2012
- ***Palmitalia*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
- ***Prionoribatella*** Aoki, 1975
- ***Sagittazetes*** Balogh *et* P. Balogh, 1983
- ***Siciliotrichus*** Bernini, 1973

Ceratokalummidae Balogh, 1970

- ***Achipterina*** Berlese, 1916
  (=***Ceratokalumma*** Balogh, 1970)
- ***Arcozetes*** Hammer, 1958
- ***Cultrobates*** Willmann, 1930
- ***Genavensia*** Mahunka, 1983
- ***Guaranozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1981
  (=***Belemacarus*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997)

Ceratozetoidea Jacot, 1925

Limnozetidae Thor, 1937

- ***Antarcticola*** Wallwork, 1967
  (=***Petrozetes*** Sitnikova, 1968)
- ***Limnozetella*** Willmann, 1932
  (=***Austroceratobates*** Mahunka, 1985)
- ***Limnozetes*** Hull, 1916
  (=***Vietobates*** Mahunka, 1987)

Ceratozetidae Jacot, 1925

- ***Adoribatella*** Woolley, 1967
- ***Allozetes*** Berlese, 1913
- ***Ceratozetella*** Shaldybina, 1966
  (=***Ceratozetoides*** Shaldybina, 1966)
  (=***Ceresella*** Pavlichenko, 1993)
- ***C. (Cyrtozetes)*** Behan-Pelletier, 1985
- ***Ceratozetes*** Berlese, 1908
- ***C. (Mixozetes)*** Balogh *et* P. Balogh, 1990
- ***Dentizetes*** Hammer, 1952
- ***Edwardzetes*** Berlese, 1913
- ***E. (Gamerozetes)*** Balogh *et* P. Balogh, 1990
- ***Euzetes*** Berlese, 1908
- ***Farchacarus*** Wallwork, 1967
  (=***Africacarus*** Wallwork, 1965 *nom. praeoc.*)
- ***Furcobates*** Sellnick, 1959
- ***F. (Parafurcobates)*** Hammer, 1967
- ***F. (Pseudogeminozetes)*** Tseng, 1984
- ***Fuscozetes*** Sellnick, 1928
- ***Geminozetes*** Balogh *et* Csiszár, 1963
- ***G. (Naiazetes)*** Behan-Pelletier, 1996
  (=***Cyranozetes*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2003)
  (=***Selvazetes*** Behan-Pelletier, 1998)
- ***Ghilarovizetes*** Shaldybina, 1969
  (=***Koreozetes*** Aoki, 1974)
- ***Granizetes*** Hammer, 1961
- ***Heterozetes*** Willmann, 1917
- ***Hispanozetes*** Subías *et* Shtanchaeva, 2012
- ***Jugatala*** Ewing, 1913
- ***Lepidozetes*** Berlese, 1910
  (=***Onazetes*** Bugrov, 1991)
- ***Lobozetes*** Hammer, 1958
- ***Macrogena*** Wallwork, 1966
  (=***Lophozetes*** P. Balogh, 1985)
  (=***Paralobozetes*** Tseng, 1984)
- ***M. (Safrobates)*** Mahunka, 1989
- ***Magellozetes*** Hammer, 1962
- ***Melanozetes*** Hull, 1916
  (=***Alphypochthonius*** Schweizer, 1956)
  (=***Sculptozetes*** Mahunka, 1984)
- ***Neogymnobates*** Ewing, 1917

(=***Boreozetes*** Hammer, 1955)
- ***Onychobates*** Hammer, 1967
- ***Oromurcia*** Thor, 1930
- ***Patagonozetes*** Balogh *et* P. Balogh, 1990
- ***Pentazetes*** Balogh *et* P. Balogh, 1983
- ***P. (Porallozetes)*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
- ***Punctizetes*** Hammer, 1971
- ***Sacculozetes*** Behan-Pelletier *et* Rjabinin, 1991
- ***Scotiazetes*** Wallwork, 1966
- ***S. (Guatemalozetes)*** Mahunka, 1980
- ***Sphaerozetes*** Berlese, 1885
(=***Incudozetes*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
(=***Porozetes*** Hammer, 1962)
(=***Sphaerozetella*** Jacot, 1929)
- ***Trichoribates*** Berlese, 1910
(?=***Claviceps*** Canestrini *et* Fanzago, 1877 *gen. inq.*)
(?=***Murcia*** Koch, 1835 *gen. inq.*)
- ***T. (Laminizetes)*** Behan-Pelletier, 1986
- ***T. (Latilamellobates)*** Shaldybina, 1971
(=***Trichoribatella*** Mahunka, 1983)
(=***Vicinebates*** Pavlichenko, 1991)
- ***T. (Sacculoribates)*** Subías, 2021
- ***T. (Viracochiella)*** Hammer, 1961
(=***Leebates*** Balogh *et* Mahunka, 1996)
- ***Tutorozetes*** Hammer, 1967
- ***Umbellozetes*** Krivolutsky, 1969
- ***Zetomimus*** Hull, 1916
(=***Hamobates*** Hammer, 1962)
- ***Z. (Protozetomimus)*** Pérez-Íñigo, 1990

Chamobatidae Thor, 1937
- ***Ceratobates*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Chamobates*** Hull, 1916
- ***C. (Xiphobates)*** Pavlichenko, 1993
- ***Globozetes*** Sellnick, 1928
- ***Hypozetes*** Balogh, 1959
- ***Iugoribates*** Sellnick, 1944
- ***Ocesobates*** Aoki, 1965
(=***Chamozetes*** Sellnick, 1974)
(=***Danobates*** Gjelstrup, 1978)
- ***Pedunculozetes*** Hammer, 1962

Maudheimiidae Balogh *et* P. Balogh, 1984
- ***Crassoribatula*** Hammer, 1967
- ***Maudheimia*** Dalenius, 1958
- ***Multimaudheimia*** Subías, 2004
- ***Zealandozetes*** Ermilov, Minor *et* Behan-Pelletier, 2015

Humerobatidae Grandjean, 1971
- ***Africoribates*** Evans, 1953
- ***Afroleius*** Mahunka, 1984
- ***Antarctozetes*** Balogh, 1961
(=***Anellozetes*** Hammer, 1962)
(=***Kilimabates*** Mahunka, 1984)
- ***Diapterobates*** Grandjean, 1936
- ***Humerobates*** Sellnick, 1928
(=***Baloghobates*** Hammer, 1967)
(=***Banksinus*** Jacot, 1938)
(=***Cordylobates*** Luxton, 1995)
(=***Jeannelia*** Dalenius, 1958)
(=***Trihumerozetes*** Sellnick, 1959)
- ***Nuhivabates*** Niemi *et* Behan-Pelletier, 2004
- ***Ramsayellus*** Spain *et* Luxton, 1970
(=***Ulugurozetes*** Mahunka, 1984)
(=***Zealandobates*** Hammer, 1967 *nom. praeoc.*)
- ***Svalbardia*** Thor, 1930

Punctoribatidae Thor, 1937
- ***Allomycobates*** Aoki, 1976
- ***Cryptobothria*** Wallwork, 1963
- ***Ellipsozetes*** Bernini, 1980
- ***Feiderzetes*** Subías, 1977
(=***Allozetes*** Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1971 *nom. praeoc.*)
- ***Minunthozetes*** Hull, 1916
(=***Jurabates*** Jacot, 1929)
- ***M. (Inigozetes)*** Subías, 2000
- ***Mycobates*** Hull, 1916
- ***M. (Calyptozetes)*** Thor, 1930
(=***Permycobates*** Strenzke, 1954)
- ***Mycozetes*** Spain, 1968
- ***Neomycobates*** Wallwork, 1963
- ***Pelopsis*** Hall, 1911
(=***Ewingozetes*** Hammer, 1952)
(=***Parapelops*** Jacot, 1938)
- ***Punctoribates*** Berlese, 1908
- ***P. (Minguezetes)*** Subías, Kahwash *et* Ruiz, 1990
- ***Semipunctoribates*** Mahunka, 1987
- ***Zachvatkinibates*** Shaldybina, 1973
(=***Eupunctoribates*** Hammer, 1977)
- ***Z. (Alpizetes)*** Mahunka, 2001
(=***Schweizerzetes*** Mahunka, 2001)

Zetomotrichoidea Grandjean, 1934

Zetomotrichidae Grandjean, 1934
- ***Anoplozetes*** Lee *et* Pajak, 1987
- ***Demisalto*** Coetzee, 1993
- ***D. (Saltatrichus)*** Coetzee, 1993
- ***Floritrichus*** Coetzee, 2003
- ***Ghilarovus*** Krivolutsky, 1966
(=***Desertozetes*** Khanbekyan, 1990)
- ***Mabulatrichus*** Coetzee, 1993
(=***Hungaromotrichus*** Mahunka, 1993)
- ***Mikizetes*** Hammer, 1958
- ***M. (Oglasacarus)*** Bernini, 1979
- ***Pallidacarus*** Krivolutsky, 1975
- ***Rohria*** Balogh *et* Mahunka, 1977
- ***Turkmenitrichus*** Krivolutsky *et* Karppinen, 2006
- ***Zetomotrichus*** Grandjean, 1934
- ***Z. (Keralotrichus)*** Mahunka, 1985

Oripodoidea Jacot, 1925

Drymobatidae Balogh *et* P. Balogh, 1984
- ***Drymobates*** Grandjean, 1930
- ***Drymobatoides*** Jacot, 1936
(=***Pelokylla*** Adolph *et* Haq, 1982)
(=***Seychellozetes*** Mahunka, 1984)
- ***D. (Rykella)*** Balogh, 1962

Mochlozetidae Grandjean, 1960
- ***Dynatozetes*** Grandjean, 1960
- ***Gephyrazetes*** Hirauchi, 1999
- ***G. (Oligogephyrazetes)*** Subías, 2019
- ***Mahunkazetes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
- ***Mochlobates*** Norton, 1984
- ***Mochloribatula*** Mahunka, 1979
- ***Mochlozetes*** Grandjean, 1930
- ***Nesiotizetes*** Jacot, 1934
- ***Podoribates*** Berlese, 1908
(=***Cardioribates*** Jacot, 1934)
(=***Falsolobozetes*** Tseng, 1984)
(=***Sphaerobates*** Sellnick, 1928)
- ***Unguizetes*** Sellnick, 1925
(=***Terrazetes*** Jacot, 1929)
- ***U. (Calugarella)*** Balogh *et* P. Balogh, 1992
- ***Uracrobates*** Balogh *et* Mahunka, 1967
(=***Urobates*** Hammer, 1973)
- ***U. (Parauracrobates)*** Ermilov *et* Martens, 2015

Oribatulidae Thor, 1929
- ***Capilloppia*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Gerloubia*** Coetzer, 1968
- ***G. (Baobabula)*** Mahunka, 1975
- ***G. (Monophauloppia)*** P. Balogh, 1988
(=***Fuerteventuria*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996)
- ***Grandjeania*** Balogh, 1963
(=***Gradjeanella*** Balogh, 1961 *nom. praeoc.*)
- ***Jornadia*** Wallwork *et* Weems, 1984
(=***Woolleybates*** Balogh *et* P. Balogh, 1984)
- ***Lucoppia*** Berlese, 1908
(=***Romanobates*** Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1970)
- ***Lunoribatula*** Mahunka, 1982
- ***Megatrichobates*** Grobler, 2000
- ***Neolucoppia*** Tseng, 1984
- ***Oribatula*** Berlese, 1896
(=***Ceroribatula*** Lee *et* Birchby, 1989)
- ***O. (Zygoribatula)*** Berlese, 1916
(=***Fovoribatula*** Lee *et* Birchby, 1991)
(=***Neoribatula*** Ewing, 1917)

(=***Rekharibatula*** Bose, Mathur, Jain *et* Dogra, 1996)
(=***Zetobelba*** Hull, 1916)
- ***Ovobates*** Mahunka, 1994
- ***Paraphauloppia*** Hammer, 1967
- ***P. (Ermilovia)*** Subías, 2017
- ***Phauloppia*** Berlese, 1908
(=***Calvoppìa*** Jacot, 1934)
(=***Eporibatula*** Sellnick, 1928)
(=***Imaparatoppia*** Jacot, 1934)
(?=***Oribata*** Latreille, 1802 *gen. inq.*)
(=***Paraliodes*** Hall, 1911)
(=***Trichoribatula*** Balogh, 1961)
- ***Phauloppiella*** Subías, 1977
- ***P. (Ausoribula)*** Lee, 1992
- ***Sellnickia*** Oudemans, 1927
- ***Spinoppia*** Higgins *et* Woolley, 1966
- ***Subphauloppia*** Hammer, 1967
- ***S. (Diphauloppia)*** Balogh *et* P. Balogh, 1984

Nesozetidae Balogh *et* P. Balogh, 1984

- ***Nesozetes*** Hammer, 1971

Pseudoppiidae Mahunka, 1975

- ***Behanpseudoppia*** Subías, 2017
- ***Pontiobates*** Luxton, 1989
- ***Pseudoppia*** Pérez-Íñigo, 1966
(=***Micropirnodus*** Weigmann, 2009)
(=***Symphauloppia*** Balogh, 1972)
- ***Senoribula*** Mahunka, 1975

Caloppiidae Balogh, 1960

- ***Brassiella*** Balogh, 1970
- ***Luissubiasia*** Ermilov, 2016
- ***Neotrichozetes*** Travé, 1961
- ***Reticuloppia*** Balogh *et* Mahunka, 1966
(=***Decoribatula*** Lee *et* Birchby, 1989)
- ***Stelechobates*** Grandjean, 1965
- ***Zetorchella*** Berlese, 1916
(=***Caloppia*** Balogh, 1958)
(=***Chaunoproctellus*** Mahunka, 1992)
(=***Chaunoproctus*** Pearce, 1906 *nom. praeoc.*)
(=***Pabulozetes*** Tseng, 1982)

Hemileiidae Balogh *et* P. Balogh, 1984

- ***Constrictobates*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Dometorina*** Grandjean, 1951
(=***Cryptozetes*** Hammer, 1962)
(=***Floribates*** Norton *et* Kethley, 1989)
- ***D. (Siculobata)*** Grandjean, 1953
- ***D. (Vesiculobates)*** Hammer, 1979
- ***Exoribatula*** Jacot, 1936
(=***Nesoribatula*** Aoki, 1964)
- ***E. (Multoribates)*** Hammer, 1961
(=***Setulobates*** Mahunka, 1984)
- ***Hemileius*** Berlese, 1916
- ***H. (Monoschelobates)*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***H. (Simkinia)*** Krivolutsky, 1966
(=***Tenuileius*** Lee, 1989)
(=***Turcibates*** Ayyildiz *et* Luxton, 1989)
- ***H. (Tuberemaeus)*** Sellnick, 1930
(=***Anisochthodes*** Newell, 1957)
- ***H. (Urubambates)*** Hammer, 1961
- ***Heteroleius*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Mucrobates*** Balogh *et* Mahunka, 1979
- ***Nasozetes*** Sellnick, 1930
(=***Kinabaluella*** Mahunka, 1996)
- ***Paraleius*** Travé, 1960
- ***P. (Metaleius)*** Travé, 1960
- ***P. (Wallworkiella)*** Hammer, 1979
- ***Plumobates*** Balogh *et* Mahunka, 1966
- ***Zeascheloribates*** Luxton, 1982

Liebstadiidae Balogh *et* P. Balogh, 1984

- ***Angullozetes*** Hammer, 1967
- ***Areozetes*** Hammer, 1961
- ***Cordiozetes*** Mahunka, 1983
(=***Mixoribatula*** Mahunka, 1987)
- ***Haloribatula*** Schuster, 1957
- ***Liebstadia*** Oudemans, 1906
(=***Irinobates*** Krivolutsky *et* Christov, 1970)
(=***Rajskibates*** Balogh *et* P. Balogh, 1984)
- ***L. (Lagenobates)*** Weigmann *et* Miko, 2002
(=***Pseudoprotoribates*** Weigmann *et* Monson, 2004)
- ***Poroscheloribates*** Arillo, Gil-Martín *et* Subías, 1994
- ***Reductobates*** Balogh *et* Mahunka, 1966
(=***Ingella*** Hammer, 1967)
- ***Totobates*** Hammer, 1961
(=***Maculobates*** Hammer, 1962)
(=***Subulobates*** Hammer, 1972)

Symbioribatidae Aoki, 1966

- ***Piffliella*** Hammer, 1979
- ***Separatoribates*** Matsushima, Y.-N. Nakamura *et* Nakamura, 2009
- ***Symbioribates*** Aoki, 1966

Scheloribatidae Grandjean, 1933

- ***Annobonzetes*** Pérez-Íñigo, 1983
- ***Coronibatula*** Mahunka, 1988
- ***Cosmobates*** Balogh, 1959
- ***Ecuadoribates*** Ermilov *et* Kalúz, 2012
- ***Euscheloribates*** Kunst, 1958
(=**Ambrobates** Mahunka, 2009)
(=***Corynobates*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
(=***Tribates*** Mahunka, 1978)
- ***E. (Trischeloribates)*** Hammer, 1971
(=***Berndibula*** Mahunka, 2000)
(=***Nanobates*** Balogh *et* P. Balogh, 1984)
- ***Fijibates*** Hammer, 1971
- ***Fissurobates*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Hammerabates*** Balogh, 1970
(=***Otaheitea*** Hammer, 1972)
(=***Yoronoribates*** Aoki, 1987)
- ***H. (Philoribates)*** Corpuz-Raros, 1980
- ***Muliercula*** Coetzer, 1968
- ***Nannerlia*** Coetzer, 1968
- ***Pachygena*** Hammer, 1972
- ***Planobates*** Hammer, 1973
- ***Rhabdoribates*** Aoki, 1967
- ***Samoabates*** Hammer, 1973
- ***Scheloribates*** Berlese, 1908
(=***Andeszetes*** Hammer, 1961)
(=***Megascheloribates*** Lee *et* Pajak, 1990)
(=***Neoscheloribates*** Hammer, 1973)
(=***Paraschelobates*** Jacot, 1934)
(=***Protoschelobates*** Jacot, 1934)
(=***Semischeloribates*** Hammer, 1973)
(=***Storkania*** Jacot, 1929)
- ***S. (Bischeloribates)*** Mahunka, 1988
- ***S. (Grandjeanobates)*** Hammer, 1967
(=***Aellenobates*** Mahunka, 1978)
- ***S. (Makischeloribates)*** Corpuz-Raros, 1980
- ***S. (Oxyscheloribates)*** Balogh *et* P. Balogh, 1990
- ***S. (Perscheloribates)*** Hammer, 1973
(=***Ischeloribates*** Corpuz-Raros, 1980)
(=***Scheloribatella*** Mahunka, 1984)
- ***Scheloribatoides*** Mahunka, 1988
- ***Similobates*** Mahunka, 1982
- ***Striatobates*** Hammer, 1973
- ***Topobates*** Grandjean, 1958
(=***Berndia*** Mahunka, 1988)
(=***Flagellobates*** Mahunka, 1978)
(=***Setobates*** Balogh, 1961)

Oripodidae Jacot, 1925

- ***Anoripoda*** Sellnick, 1959
- ***Benoibates*** Balogh, 1958
(=***Exoripoda*** Woolley, 1961)
(=***Haploripoda*** Balogh *et* Mahunka, 1967)
(=***Reductoripoda*** Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996)
- ***Birobates*** Balogh, 1970
- ***Brachyoripoda*** Balogh, 1970
- ***Campbellobates*** Wallwork, 1964
- ***Cosmopirnodus*** Balogh, 1970
- ***Cryptoribatula*** Jacot, 1934
(=***Euaella*** Hammer, 1973)
- ***Gymnobates*** Banks, 1902
- ***Gymnobatoides*** Woolley, 1966
- ***Monstroripoda*** Mahunka, 2006
- ***Oripoda*** Banks, 1904

- ***Parapirnodus*** Balogh *et* Mahunka, 1968
- ***Pirnodus*** Grandjean, 1956
- ***Protoripoda*** Balogh, 1970
(?=***Frischia*** Oudemans, 1915 *gen. inq.*)
- ***P. (Baloghates)*** Özdikmen, 2008
(=***Calobates*** Balogh, 1961 *nom. praeoc.*)
- ***Pseudopirnodus*** Baranek, 1985
- ***Pteroripoda*** Balogh *et* Mahunka, 1974
- ***Scriptoripoda*** P. Balogh, 1985
- ***Subpirnodus*** Mahunka, 1988
- ***Truncopes*** Grandjean, 1956
(=***Huarpescopes*** Fernández, Monetti *et* Martínez, 1995)

Protoribatidae Balogh *et* P. Balogh, 1984

- ***Cribrozetes*** Balogh, 1970
- ***Perxylobates*** Hammer, 1972
- ***P. (Neoperxylobates)*** Subías, 2020
- ***P. (Tetraperxylobates)*** Subías, 2021
- ***Polillozetes*** Corpuz-Raros, 2009
- ***Protoribates*** Berlese, 1908
(=***Alloribates*** Banks, 1947)
(=***Octodurozetes*** Mahunka, 1993)
(=***Styloribates*** Jacot, 1934)
(=***Xylobates*** Jacot, 1929)
- ***P. (Biunguis)*** Subías, 2018
- ***P. (Lignobates)*** Mahunka, 2006
- ***P. (Triaunguis)*** Kulijev, 1978
(=***Brasilobates*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
(=***Glaberoribates*** Tseng, 1984)
- ***Setoxylobates*** Balogh *et* Mahunka, 1967
- ***S. (Plenoxylobates)*** Hammer, 1979
- ***S. (Polyxylobates)*** Hammer, 1973
- ***Sicaxylobates*** Luxton, 1985
- ***Transoribates*** Pérez-Íñigo, 1992
(=***Edaphoribates*** Nakamura *et* Nakai, 2009)
- ***Trixylobates*** Balogh *et* Mahunka, 1978
- ***Tuxenia*** Hammer, 1958
- ***Vilhenabates*** Balogh, 1963
- ***V. (Phalacrozetes)*** Aoki, 1965

Haplozetidae Grandjean, 1936

- ***Acutozetes*** Balogh, 1970
- ***Baloghia*** Mahunka, 1994
- ***Baloghiella*** Bulanova-Zachvatkina, 1972
- ***Berlesiella*** Hammer, 1979
(=***Comororibula*** Mahunka, 1994)
- ***Borneozetes*** Mahunka, 1997
- ***Cantharozetes*** Hammer, 1961
- ***Conozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Indoribates*** Jacot, 1929
(=***Bolkiah*** Mahunka, 1997)
(=***Nixozetes*** Mahunka, 1977)
(=***Sundazetes*** Hammer, 1979)
- ***I. (Bihaplozetes)*** Subías, 2020
- ***I. (Haplozetes)*** Willmann, 1935
(=***Minasbates*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996)
(=***Mixobates*** Gil *et* Subías, 1993 *nom. praeoc.*)
(=***Philippizetes*** Corpuz-Raros, 1979)
(=***Propeschelobates*** Jacot, 1936)
(=***Triungulozetes*** Subías, 2001)
- ***I. (Mancoribates)*** Hammer, 1961
- ***I. (Neoindoribates)*** Subías, 2020
- ***Lauritzenia*** Hammer, 1958
- ***L. (Bilauritzenia)*** Subías, 2020
- ***L. (Incabates)*** Hammer, 1961
(=***Canaribates*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994)
- ***L. (Magnobates)*** Hammer, 1967
(=***Gymnozetes*** Călugăr *et* Vasiliu, 1983)
- ***Magyaria*** Balogh, 1963
- ***M. (Bimagyaria)*** Subías, 2020
- ***M. (Pentamagyaria)*** Subías, 2020
- ***Mahnertozetes*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
- ***Nasobates*** Woolley, 1966
- ***Paraxylobates*** Balogh *et* Mahunka, 1969
- ***Peloribates*** Berlese, 1908
(=***Capillozetes*** Balogh, 1943)
(=***Euryparazetes*** Radford, 1950)
(=***Indobates*** Pandit *et* Bhattacharya, 1999)
(=***Parazetes*** Willmann, 1930 *nom. praeoc.*)
(=***Setincabates*** Lee, 1993)
- ***P. (Aokibates)*** Mahunka, 1988
- ***P. (Peloribatodes)*** Mahunka, 2011
- ***P. (Tentaculozetes)*** Balogh, 1970
- ***Pilobatella*** Balogh *et* Mahunka, 1967
- ***P. (Tripilobatella)*** Subías, 2017
- ***Pilobates*** Balogh, 1960
- ***P. (Italobates)*** Mahunka, 1994
- ***Rostrozetella*** Mahunka, 2006
- ***Rostrozetes*** Sellnick, 1925
(=***Carabozetes*** Mihelčič, 1957)
(=***Zaherizetes*** Yousef *et* Nasr, 1976)
- ***Trachyoribates*** Berlese, 1908

Tubulozetidae P. Balogh, 1989

- ***Tubulozetes*** P. Balogh, 1989

Parakalummidae Grandjean, 1936

- ***Neoribates*** Berlese, 1914
(=***Protokalumma*** Jacot, 1929)
- ***N. (Parakalumma)*** Jacot, 1929
- ***N. (Perezinigokalumma)*** Subías, 2004
- ***N. (Pseudoneoribates)*** Ermilov ***et*** Corpuz-Raros, 2015
- ***Sandenia*** Oudemans, 1917
- ***S. (Porokalumma)*** Wallwork, 1966
(=***Neokalumma*** Tseng, 1984)

Galumnoidea Jacot, 1925

Galumnidae Jacot, 1925

- ***Africogalumna*** Starý, 2005
- ***Allogalumna*** Grandjean, 1936
(=***Ctenogalumna*** Balogh, 1961)
- ***A. (Acrogalumna)*** Grandjean, 1956
(=***Xenogalumna*** Balogh, 1961)
- ***Carinogalumna*** Engelbrecht, 1973
(=***Paracarinogalumna*** Mahunka, 1998)
(=***Pseudogalumna*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994)
- ***Centroribates*** Berlese, 1914
- ***Cryptogalumna*** Grandjean, 1957
- ***Dicatozetes*** Grandjean, 1956
- ***Dimidiogalumna*** Engelbrecht, 1972
- ***Flagellozetes*** Balogh, 1970
- ***F. (Cosmogalumna)*** Aoki, 1988
(=***Variogalumna*** Mahunka, 1995)
- ***Galumna*** Heyden, 1826
(=***Holokalumma*** Jacot, 1929)
(=***Holozetes*** Jacot, 1929)
(=***Kinezogalumna*** Aoki *et* Hu, 1993)
(=***Zetes*** Koch, 1835)
- ***G. (Angulogalumna)*** Grishina, 1981
(=***Cuspidogalumna*** Starý, 2005)
- ***G. (Atypicogalumna)*** Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015
- ***G. (Erogalumna)*** Grandjean, 1966
- ***G. (Indogalumna)*** Balakrishnan, 1985
- ***G. (Kabylogalumna)*** Bernini, 1984
- ***G. (Rostrogalumna)*** Engelbrecht, 1973
- ***Globogalumna*** Balogh *et* P. Balogh, 1990
- ***Heterogalumna*** Balogh, 1960
- ***Kunstogalumna*** Starý, 2005
- ***Leptogalumna*** Balogh, 1960
- ***L. (Aegyptogalumna)*** Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif *et* El-Deeb, 1985
- ***Neoctenogalumna*** Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
- ***N. (Paractenogalumna)*** Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
- ***Neogalumna*** Hammer, 1973
- ***Notogalumna*** Sellnick, 1959
- ***Orthogalumna*** Balogh, 1961
(=***Mirogalumna*** Mahunka, 1993)
- ***Pergalumna*** Grandjean, 1936
(?=***Neorizetes*** Jacot, 1933 *gen. inq.*)
- ***P. (Bigalumna)*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
- ***Pilizetes*** Sellnick, 1937
- ***P. (Neopilizetes)*** Balogh *et* P. Balogh, 1990
(?=***Kratzensteinia*** Oudemans, 1919 *gen. inq.*)

- ***P. (Pseudopilizetes)*** Ermilov, 2017
- ***Pilogalumna*** Grandjean, 1956
  (=***Disparagalumna*** Hammer, 1973)
- ***Psammogalumna*** Balogh, 1943
- ***Sacculogalumna*** Engelbrecht, 1973
- ***Setogalumna*** P. Balogh, 1985
- ***Sphaerogalumna*** Balogh, 1961
- ***Stictozetes*** Berlese, 1916
  (=***Strabogalumna*** Mahunka, 1995)
  (=***Trachygalumna*** Balogh, 1960)
- ***Taeniogalumna*** Balogh, 1962
  (=***Didymonycha*** Mahunka, 1984 *nom. praeoc.*)
- ***Trichogalumna*** Balogh, 1960
- ***T. (Sarawakiella)*** Mahunka, 1996
- ***T. (Tanzanycha)*** Koçak *et* Kemal, 2008
- ***Vaghia*** Oudemans, 1919

Galumnellidae Balogh, 1960

- ***Galumnella*** Berlese, 1916
- ***G. (Bigalumnella)*** Mahunka, 1994
- ***Galumnopsis*** Grandjean, 1931
- ***G. (Porogalumnella)*** Balogh, 1968
- ***Iberogalumnella*** Arillo *et* Subías, 1993
- ***Monogalumnella*** Mahunka, 1986
- ***M. (Trichogalumnella)*** Mahunka, 1992
- ***Trypogalumnella*** Mahunka, 1995

LISTADO SISTEMÁTICO DE ESPECIES

Orden **ORIBATIDA** Dugès, 1834

Suborden PALAEOSOMATA Grandjean, 1969

Acaronychoidea Grandjean, 1932

Acaronychidae Grandjean, 1932 (5 gen. y 23 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Acaronychus Grandjean, 1932 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Acaronychus traegardhi* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y subtropical (Holártica meridional).
- *Acaronychus grandjeani* Lange, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Acaronychus proximus* Schubart, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Acaronychus traegardhi* Grandjean, 1932
  DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Mediterránea occidental, Paleártica oriental meridional y U.S.A. meridional), China suroriental e I. Galápagos.

Archeonothrus Trägårdh, 1906 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Archeonothrus natalensis* Trägårdh, 1906
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Archeonothrus natalensis* Trägårdh, 1906
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Loftacarus Lee, 1980 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Loftacarus siefi* Lee, 1981
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica) y Oriental.
- *Loftacarus longicaudatus* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Stomacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Loftacarus siefi* Lee, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.

Stomacarus Grandjean, 1952 (10 spp.)
(=***Amuracarus*** Lange, 1975)
(=***Andacarus*** Grandjean, 1958)
ESPECIE TIPO: *Stomacarus tristani* Grandjean, 1952
DISTRIBUCIÓN: Austral, Neotropical, Australianooriental y Paleártica meridional.
- *Stomacarus abresi* Lee, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Stomacarus campbellensis* (Wallwork, 1966) (*Andacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Stomacarus ciliosus* Luxton, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Stomacarus leei* Mahunka, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania y Vietnam.
- *Stomacarus ligamentifer* (Hammer, 1967) (*Andacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Stomacarus macfarlani* Grandjean, 1957
  DISTRIBUCIÓN: Austral (Argentina y Antártica: I. Kerguelen).
- *Stomacarus setiger* R. Martínez *et* Casanueva, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Stomacarus tristani* Grandjean, 1952
  DISTRIBUCIÓN: Subantártica (Isla de Gough [Tristán de Acuña]) y Crimea.
- *Stomacarus voskresenskii* (Lange, 1975) (*Amuracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Stomacarus watsoni* (Travé, 1964) (*Andacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).

Zachvatkinella Lange, 1954 (7 spp.)
(=***Himalacarus*** Sheals, 1965)
ESPECIE TIPO: *Zachvatkinella belbiformis* Lange, 1954
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Zachvatkinella baicalica* Lange, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Zachvatkinella belbiformis* Lange, 1954
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Zachvatkinella caucasica* Lange, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Zachvatkinella chimalae* (Sheals, 1965) (*Himalacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.

- *Zachvatkinella doryura* Lange, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Zachvatkinella longipilus* (Jacot, 1938) (*Acaronychus traegardhi l.*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Zachvatkinella nipponica* Aoki, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Palaeacaroidea Grandjean, 1932

Palaeacaridae Grandjean, 1932 (2 gen., 6 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Palaeacaroides Lange, 1972 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Palaeacaroides pacificus* Lange, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Palaeacaroides pacificus* Lange, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y China suroriental.

Palaeacarus Trägårdh, 1932 (5 spp. y 1 ssp.)
(=***Traegardhacarus*** Zachvatkin, 1945)
ESPECIE TIPO: *Palaeacarus hystricinus* Trägårdh, 1932
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Palaeacarus caucasicus* Lange, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso e Islas del Este de Rusia asiática).
- *Palaeacarus hystricinus* Trägårdh, 1932
  DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
  - *Palaeacarus hystricinus hystricinus* Trägårdh, 1932
    (=*Palaeacarus appalachicus* Jacot, 1938)
    DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur) y China suroriental.
  - *Palaeacarus hystricinus japonicus* Aoki, 1980
    DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Palaeacarus kamenskii* (Zachvatkin, 1945) (*Traegardhacarus*)
  (=*Palaeacarus hystricinus vaesterbottensis* Grandjean, 1954)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (Norte de Europa y Crimea) y Paleártica oriental.
- *Palaeacarus lapshovi* (Zachvatkin, 1945) (*Traegardhacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Palaeacarus orientalis* Bulanova-Zachvatkina, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Sur de Rusia europea, Este de Paleártica oriental).

Ctenacaridae Grandjean, 1954 (4 gen. y 11 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Beklemishevia Zachvatkin, 1945 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Beklemishevia galeodula* Zachvatkin, 1945
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y Holártica meridional.
- *Beklemishevia africana* (Mahunka, 1974) (*Ctenacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Beklemishevia barbata* (Schubart, 1968) (*Ctenacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Beklemishevia demeteri* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Beklemishevia galeodula* Zachvatkin, 1945
  DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Mediterránea oriental, Asia centrooccidental y U.S.A.: Califormia).
- *Beklemishevia hispaniola* Pérez-Íñigo, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Beklemishevia iranica* Akrami *et* Behmanesh, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Beklemishevia zachvatkini* Bulanova-Zachvatkina, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea.

Ctenacarus Grandjean, 1939 (2 spp.)
(=***Grandjeanacarus*** Zachvatkin, 1945)
ESPECIE TIPO: *Palaeacarus araneola* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Ctenacarus araneola* (Grandjean, 1932) (*Palaeacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Ctenacarus foliisetus* Bulanova-Zachvatkina, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Ucrania.

Gilarovella Lange, 1974 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Gilarovella demetrii* Lange, 1974
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Gilarovella demetrii* Lange, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Paleártica meridional y U.S.A.: Nuevo Méjico).

Neoctenacarus Moritz, 1974 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Neoctenacarus hastilis* Moritz, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Neoctenacarus hastilis* Moritz, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).

Adelphacaridae Grandjean, 1954 (2 gen., 3 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

Adelphacarus Grandjean, 1952 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Adelphacarus sellnicki* Grandjean, 1952
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Adelphacarus reticulatus* Lotfollahi, 2017
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Adelphacarus sellnicki* Grandjean, 1952
DISTRIBUCIÓN: Europea y Neotropical (Brasil y Argentina).

Aphelacarus Grandjean, 1932 (1 sp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Parhypochthonius acarinus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
Aphelacarus acarinus (Berlese, 1910) (*Parhypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- *Aphelacarus acarinus acarinus* (Berlese, 1910)
(=*Aphelacarus rossicus* Zachvatkin, 1945)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: menos frecuente en el Norte, Etiópica y Neotropical).
- *Aphelacarus acarinus sahariensis* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Sahara occidental.

Suborden PARHYPOSOMATA Balogh *et* Mahunka, 1979

Parhypochthonioidea Grandjean, 1932

Parhypochthoniidae Grandjean, 1932 (1 gen. y 4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Parhypochthonius Berlese, 1904 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Parhypochthonius aphidinus* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Parhypochthonius africanus* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Parhypochthonius aphidinus* Berlese, 1904
(=*Parhypochthonius aphidinus germanicus* Willmann, 1931)
(=*Parhypochthonius aphidinus octofilamentis* Jacot, 1938)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente) y pantropical (excepto Etiópica).
- *Parhypochthonius asiaticus* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Parhypochthonius pilosus* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).

Gehypochthoniidae Strenzke, 1963 (1 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

Gehypochthonius Jacot, 1936 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Gehypochthonius rhadamanthus* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Gehypochthonius frondifer* Aoki, 1975
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Gehypochthonius gracilis* Pankov, 2002
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática y Este de Canadá.
- *Gehypochthonius marianoi* Martínez *et* Bernava, 2000
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Gehypochthonius rhadamanthus* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica y tropical (Oriental, Australia y Panamá).
- *Gehypochthonius strenzkei* Lee, 1982 *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Gehypochthonius urticinus* (Berlese, 1910) (*Parhypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: U.S.A. (Florida) y Chile, y Canadá.
- *Gehypochthonius xarifae* Strenzke, 1963
DISTRIBUCIÓN: Oriental (I. Maldivas y Borneo).

Elliptochthoniidae Norton, 1975 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.

Elliptochthonius Norton, 1975 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Elliptochthonius profundus* Norton, 1975
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Elliptochthonius profundus* Norton, 1975

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Califormia).

Suborden ENARTHRONOTA Grandjean, 1947

Brachychthonioidea Thor, 1934

Brachychthoniidae Thor, 1934 (11 gen., 1 subgen., 163 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Brachychthonius Berlese, 1910 (15 spp.)
(=***Brachychochthonius*** Jacot, 1938)
ESPECIE TIPO: (*Hypochthonius brevis* Michael *sensu* Berlese, 1910) =*Brachychthonius berlesei* Willmann, 1928
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Australiana).

- *Brachychthonius africanus* Balogh, 1958 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Brachychthonius amicabilis* Gil-Martín *et* Subías, 1997
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Brachychthonius berlesei* Willmann, 1928
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).
- *Brachychthonius bimaculatus* Willmann, 1936
  (=*Brachychthonius helveticus* Schweizer, 1956)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Canadá).
- *Brachychthonius hauserorum* (Mahunka, 1979) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Grecia y Túnez) e Irán.
- *Brachychthonius hirtus* Moritz, 1976
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional, Irán y Mongolia).
- *Brachychthonius impressus* Moritz, 1976
  (=*Brachychochthonius subcricoides* Balogh *et* Mahunka, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Brachychthonius jugatus* (Jacot, 1938) (*Brachychochthonius*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Brachychthonius laevis* (Jacot, 1938) (*Brachychochthonius*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ténesi).
- *Brachychthonius lineatus* (Mahunka, 1982) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Brachychthonius pacificus* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Brachychthonius parahirtus* Subías *et* Gil, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Brachychthonius pius* Moritz, 1976
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Canadá).
- *Brachychthonius psammophylus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Brachychthonius pseudoimmaculatus* Subías *et* Gil, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Eobrachychthonius Jacot, 1936 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Eobrachychthonius sexnotatus* Jacot, 1936) =*Brachychthonius latior* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Neotropical, Oriental y Antártica).

- *Eobrachychthonius aegyptiacus* Kandeel, El-Naggar *et* El-Kawas , 2007
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Eobrachychthonius borealis* Forsslund, 1942
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Eobrachychthonius iranicus* Akrami, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Eobrachychthonius latior* (Berlese, 1910) (*Brachychthonius*)
  (=*Brachychthonius brevis glabra* Thor, 1930)
  (=*Eobrachychthonius grandis* Sellnick, 1944)
  (=*Eobrachychthonius latior strictior* Lombardini, 1962)
  (=*Brachychthonius mooseri* Hammen, 1951)
  (=*Eobrachychthonius sexnotatus* Jacot, 1936)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y U.S.A. (Florida).
- *Eobrachychthonius longisetosus* Csiszár, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Eobrachychthonius oudemansi* Hammen, 1952
  (=*Eobrachychthonius argentinensis* Hammer, 1958)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, China suroriental, Neotropical, Antártica: I. Georgia del Sur) y subantártica (I. Malvinas [I. Falkland]).
- *Eobrachychthonius planus* (Chinone, 1974) (*Brachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Borneo.
- *Eobrachychthonius sanukiensis* Fujikawa, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eobrachychthonius setus* Sergienko, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Eobrachychthonius similis* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa meridional e Irán).

Liochthonius Hammen, 1959 (74 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Brachychthonius perpusillus* Berlese, 1910) =*Hypochthonius brevis* Michael, 1888
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Liochthonius (Liochthonius) Hammen, 1959 (73 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Liochthonius (L.) africanus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Liochthonius (L.) alius* Chinone, 1978 (*L. plumosus a.*)
(=*Liochthonius plumosus* Chinone *et* Aoki, 1972, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Liochthonius (L.) alpestris* (Forsslund, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Liochthonius (L.) altimonticola* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Canadá y Nueva Zelanda.
- *Liochthonius (L.) altus* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (Argentina y Nueva Zelanda).
- *Liochthonius (L.) andinus* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Liochthonius (L.) andrewi* Evison, 1981
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Liochthonius (L.) approximatus* (Jacot, 1939) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Liochthonius (L.) asper* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Mediterránea, Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Luisiana) y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) attenuatus* (Jacot, 1938) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Liochthonius (L.) australis* Covarrubias, 1968
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Liochthonius bifurcatus* (Jacot, 1936) (*Brachychthonius*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Liochthonius (L.) brevis* (Michael, 1888) (*Hypochthonius*)
(=*Brachychthonius latus* Jacot, 1936)
(=*Brachychthonius perpusillus* Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y U.S.A. (Florida).
- *Liochthonius (L.) breviseta* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Liochthonius (L.) clavatus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur).
- *Liochthonius (L.) crassus* Chinone, 1978 (*L. alpestris c.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liochthonius curtus* Hammer, 1962 (*L. rigidisetosus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Liochthonius (L.) dilutus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Liochthonius (L.) evansi* (Forsslund, 1958) (*Brachychthonius*)
(=*Liochthonius asotthalomensis* Marshall, Reeves *et* Norton, 1987)
(=*Liochthonius forsslundi* Mahunka, 1969, *nom. praeoc.* por Hammer, 1952)
(=*Liochthonius forsslundi levis* Chinone, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Carolina del Norte) y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) fimbriatissimus* Hammer, 1962
(=*Brachychthonius fimbriatus* Hammer, 1958, *nom. praeoc.* por Jacot, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Australiana, Neotropical (América austral y Méjico) y Antártica (I. Príncipe Eduardo).
- *Liochthonius (L.) fimbriatus* (Jacot, 1936) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Liochthonius (L.) forsslundi* (Hammer, 1952) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Liochthonius (L.) furcillatus* (Willmann, 1942) (*Brachychthonius*)
(=*Brachychthonius ensifer* Strenzke, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur).
- *Liochthonius (L.) galba* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liochthonius (L.) gisini* (Schweizer, 1948) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Eurosiberiana.
- *Liochthonius (L.) horridus* (Sellnick, 1928) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Liochthonius (L.) hystricinus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
(=*Brachychthonius ocellatus* Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Chile.
- *Liochthonius (L.) idem* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Liochthonius (L.) intermedius* Chinone *et* Aoki, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) khencensis* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Liochthonius (L.) kirghisicus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Liochthonius (L.) lacunosus* Wang *et* Cui, 1992
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Liochthonius (L.) lapponicus* (Trägårdh, 1910) (*Hypochthonius brevis l.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).
- *Liochthonius (L.) latus* Mahunka, 1982
(=*Liochthonius neonominatus* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Congo).
- *Liochthonius (L.) leptaleus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional, Irán y Japón).
- *Liochthonius (L.) longipilus* (Womersley, 1945) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Australia y Argentina.
- *Liochthonius (L.) mollis* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Ecuador) y Antártica.
- *Liochthonius (L.) moritzi* Balogh *et* Mahunka, 1983
(=*Liochthonius hystricinus tuxeni* Chinone, 1974, *nom. praeoc.* por Forsslund, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Liochthonius (L.) murtazalievi* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Liochthonius (L.) muscorum* Forsslund, 1964
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Groenlandia).
- *Liochthonius (L.) mussardi* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Liochthonius (L.) neglectus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Liochthonius (L.) nodifer* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico).
- *Liochthonius (L.) nortoni* R. Martínez *et* Casanueva, 1995
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Liochthonius (L.) oceanicus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Liochthonius (L.) ohnishi* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liochthonius (L.) patagoniensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Liochthonius (L.) peduncularius* (Strenzke, 1951) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Liochthonius (L.) penicillus* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liochthonius (L.) pepitensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Liochthonius (L.) perelegans* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Liochthonius (L.) perfusorius* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Liochthonius (L.) phitosi* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Liochthonius (L.) plumosus* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centrooriental y Corea).
- *Liochthonius (L.) prior* (Jacot, 1938) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ténesi).
- *Liochthonius (L.) propinquus* Niedbała, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Liochthonius (L.) pseudohystricinus* Balogh *et* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Kuriles).
- *Liochthonius (L.) pusillus* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Japón y Rumanía).
- *Liochthonius (L.) rigidisetosus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Ecuador).
- *Liochthonius (L.) saltaensis* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Nueva Zelanda y Antártica.
- *Liochthonius (L.) sellnicki* (Thor, 1930) (*Brachychthonius*)
(?=*Brachychthonius brevis expolitus* Berlese, 1910 *ssp. inq.*)
(?=*Brachychthonius laetepictus* Berlese, 1910 *sp. inq.*)
(=*Brachychthonius nodosus* Willmann, 1952)
(=*Brachychthonius scalaris* Forsslund, 1942)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) similis* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Liochthonius (L.) simplex* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica, Groenlandia, Oriental, Australia y Sudáfrica.
- *Liochthonius (L.) strenzkei* Forsslund, 1963
DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) szemmelveiszi* Balogh *et* P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Liochthonius (L.) tanzanicus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Liochthonius (L.) tuberculatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Liochthonius (L.) tumidus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Liochthonius (L.) tumulosus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Liochthonius (L.) tuxeni* (Forsslund, 1957) (*Brachychthonius hystricinus t.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa occidental e Irán).
- *Liochthonius (L.) tyrrhenicus* Bernini, 1985
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Liochthonius (L.) unilateralis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Brasil.

Liochthonius (Afroliochthonius) Mahunka, 1995 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Liochthonius (Afroliochthonius) reductus* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Liochthonius (Afroliochthonius) reductus* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

Mixochthonius Niedbała, 1972 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachychthonius pilososetosus* Forsslund, 1942
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Mixochthonius concavus* (Chinone, 1974) (*Liochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Mixochthonius pilososetosus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
(=*Mixochthonius moritzi* Evison, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Paleártica occidental y Canadá).

Neobrachychthonius Moritz, 1976 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachychthonius marginatus* Forsslund, 1942
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Neobrachychthonius magnus* Moritz, 1976 (*N. marginatus m.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental).
- *Neobrachychthonius marginatus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
(=*Brachychthonius neosimplex* Schweizer, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur).

Neoliochthonius Lee, 1982 (3 spp.)
(=***Moritzichthonius*** Pereda *et* Iturrondobeitia, 1990)
(=***Paraliochthonius*** Moritz, 1976, *nom. praeoc.* por Beier, 1956)
ESPECIE TIPO: *Brachychthonius piluliferus* Forsslund, 1942
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Neoliochthonius globuliferus* (Strenzke, 1951) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional y Méjico.
- *Neoliochthonius occultus* (Niedbała, 1971) (*Liochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Neoliochthonius piluliferus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).

Papillochthonius Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Papillochthonius astatus* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Papillochthonius astatus* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Sahara occidental.

Poecilochthonius Balogh, 1943 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachychthonius brevis italicus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Poecilochthonius italicus* (Berlese, 1910) (*Brachychthonius brevis i.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Norte).
- *Poecilochthonius novazealandicus* (Hammer, 1966) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Poecilochthonius parallelus* (Womersley, 1945) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Australia y Nuevas Hébridas [Vanuatu].
- *Poecilochthonius spiciger* (Berlese, 1910) (*Brachychthonius brevis s.*)
(=*Brachychthonius rapoporti* Balogh *et* Mahunka, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]) y Neotropical (Argentina e I. Galápagos).

Sellnickochthonius Krivolutsky, 1964 (46 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Brachychthonius zelawaiensis* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Sellnickochthonius americanus* (MacQuitty, 1986) (*Brachychochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).

- *Sellnickochthonius anonymus* Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1991
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Sellnickochthonius aokii* (Chinone, 1974) (*Brachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Sellnickochthonius borealis* (Krivolutsky, 1965) (*Brachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa oriental.
- *Sellnickochthonius chinonei* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Sellnickochthonius comoroensis* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Sellnickochthonius cricoides* (Weis-Fogh, 1948) (*Brachychthonius (Brachychochthonius)*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica, India y Australia.
- *Sellnickochthonius danubialis* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Sellnickochthonius dolosus* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Sellnickochthonius elisabethae* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Sellnickochthonius elsosneadensis* (Hammer, 1958) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica oriental meridional, China suroriental, Australia y Neotropical).
- *Sellnickochthonius foliatifer* (Mahunka, 1982) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Sudáfrica).
- *Sellnickochthonius foliatus* (Hammer, 1958) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Nueva Zelanda.
- *Sellnickochthonius formosus* (Cooreman, 1947) (*Eobrachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Sellnickochthonius fuentesi* Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Sellnickochthonius furcatus* (Weis-Fogh, 1948) (*Brachychthonius (Brachychochthonius)*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática) y Canadá.
- *Sellnickochthonius gracilis* (Chinone, 1974) (*Brachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Japón e Irán) y Oriental (China suroriental y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Sellnickochthonius griseus* (Hammer, 1958) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Sellnickochthonius guanophilus* (Mahunka, 1979) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Sellnickochthonius hanyensis* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Sellnickochthonius heterotrichus* (Balogh, 1963) (*Brachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Sellnickochthonius honestus* (Moritz, 1976) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Sellnickochthonius ilyinae* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Sellnickochthonius immaculatus* (Forsslund, 1942) (*Brachychochthonius*)
  (=*Brachychochthonius arcticus* Hammer, 1952)
  (?=*Brachychochthonius berlesei erosus* Jacot, 1938 *ssp. inq.*)
  (=*Brachychthonius gygeri* Bader, 1963)
  (=*Brachychthonius obscurus* Krivolutsky, 1966)
  (=*Brachychthonius semiornatus* Evans, 1952)
  (=*Brachychthonius striatus* Willmann, 1956)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Neotropical.
- *Sellnickochthonius jacoti* (Evans, 1952) (*Brachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Carolina del Norte).
- *Sellnickochthonius japonicus* (Chinone, 1974) (*Brachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Sellnickochthonius lydiae* (Jacot, 1938) (*Brachychochthonius*)
  (=*Brachychthonius hammerae* Chinone *et* Aoki, 1972)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica y Japón).
- *Sellnickochthonius maroccanus* (Mahunka, 1980) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Marruecos.
- *Sellnickochthonius meridionalis* (Bernini, 1973) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Sellnickochthonius monticola* (Hammer, 1961) (*Brachychthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Sellnickochthonius miyauchii* (Chinone, 1978) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Sellnickochthonius muara* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Borneo y Ecuador.
- *Sellnickochthonius niliacus* (Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid *et* El-Deeb, 1984) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Sellnickochthonius oesziae* (Balogh *et* Mahunka, 1979) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Sellnickochthonius paraplanus* (Niedbała, 1982) (*Brachychochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Polonia.
- *Sellnickochthonius pauliani* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Brachychthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Sellnickochthonius phyllophorus* (Moritz, 1976) (*Brachychochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Sellnickochthonius plumosus* Subías *et* Gil, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
Sellnickochthonius rostratus (Jacot, 1936) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, China suroriental y Méjico.
- *Sellnickochthonius rostratus rostratus* (Jacot, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Sellnickochthonius rostratus hungaricus* (Balogh, 1943) (*Poecilochthonius h.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, China suroriental y Méjico.
- *Sellnickochthonius rotundatus* (Hammer, 1958) (*Brachychochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Sellnickochthonius similis* (Hammer, 1961) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Nueva Guinea.
- *Sellnickochthonius suecicus* (Forsslund, 1942) (*Brachychochthonius jugatus s.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica y Neártica septentrional, Australiana: Nueva Zelanda, y subantártica: I. Amsterdam).
- *Sellnickochthonius tropicus* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Ecuador).
- *Sellnickochthonius variabilis* (Mahunka, 1982) (*Brachychochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Sellnickochthonius zelawaiensis* (Sellnick, 1928) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).

Synchthonius Hammen, 1952 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Synchthonius boschmai* Hammen, 1952) =*Brachychochthonius crenulatus* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Synchthonius crenulatus* (Jacot, 1938) (*Brachychochthonius*)
(=*Synchthonius boschmai* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).
- *Synchthonius elegans* Forsslund, 1956
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).
- *Synchthonius lentus* (Chinone, 1974) (*Liochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Verachthonius Moritz, 1976 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachychthonius laticeps* Strenzke, 1951
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australiana y Neotropical).
- *Verachthonius congruus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Verachthonius diversus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Verachthonius laticeps* (Strenzke, 1951) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Este de Rusia asiática).
- *Verachthonius montanus* (Hammer, 1952) (*Eobrachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional y Argentina.
- *Verachthonius moritzi* Lee, 1982
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Verachthonius pseudolaticeps* (Subías, 1977) (*Liochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: España.

Heterochthonioidea Grandjean, 1954

Heterochthoniidae Grandjean, 1954 (3 gen. y 6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Heterochthonius Berlese, 1910 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius (Heterochthonius) gibbus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Heterochthonius byzovae* Krivolutsky, 1977
DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
- *Heterochthonius caucasicus* Krivolutsky, 1977
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Heterochthonius gibbus* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Heterochthonius monocerus* Pankov, 2002
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Neovochthonius Judson, 2009 (1 sp.)
(=***Neochthonius*** Karppinen, 1984, *nom. praeoc.* por Chamberlin, 1929)
ESPECIE TIPO: *Neochthonius latisetosus* Golosova *et* Karppinen, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Neovochthonius latisetosus* (Golosova *et* Karppinen, 1984) (*Neochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática: I. Sajalín.

Ovochthonius Rjabinin, 1977 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ovochthonius rossicus* Rjabinin, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Ovochthonius rossicus* Rjabinin, 1977
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Trichthoniidae Lee, 1982 (3 gen. y 5 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Australiana.

Gozmanyina Balogh *et* Mahunka, 1983 (3 spp.)
(=***Marshallia*** Gordeeva, 1980, *nom. praeoc.* por Zittel, 1887)
ESPECIE TIPO: *Trichthonius majestus* Marshall *et* Reeves, 1971
DISTRIBUCIÓN: Boreal y Neotropical austral.
- *Gozmanyina golosovae* (Gordeeva, 1980) (*Marshallia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Gozmanyina majestus* (Marshall *et* Reeves, 1971) (*Trichthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Gozmanyina pehuen* R. Martínez *et* Casanueva, 1996
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Nipponiella Gordeeva, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trichthonius simplex* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Nipponiella simplex* (Aoki, 1966) (*Trichthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Trichthonius Hammer, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius pulcherrimus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
- *Trichthonius pulcherrimus* (Hammer, 1958) (*Cosmochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australia.

Arborichthoniidae Balogh *et* P. Balogh, 1992 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Arborichthonius Norton, 1982 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Arborichthonius styosetosus* Norton, 1982
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Arborichthonius azarbaijaniensis* Lotfollahi *et* Movahedzade, 2016
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Arborichthonius styosetosus* Norton, 1982
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Canadá y Japón) y China suroriental.

Nanohystricidae Norton *et* Fuangarworn, 2015 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Nanohystrix Norton *et* Fuangarworn, 2015 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Nanohystrix hammerae* Norton *et* Fuangarworn, 2015
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Nanohystrix hammerae* Norton *et* Fuangarworn, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Cosmochthonioidea Grandjean, 1947

Cosmochthoniidae Grandjean, 1947 (3 gen., 2 subgen., 48 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Cosmochthonius Berlese, 1910 (36 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius lanatus* Michael, 1885
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Cosmochthonius (Cosmochthonius) Berlese, 1910 (33 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Cosmochthonius (C.) agartalensis* Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Cosmochthonius (C.) asiaticus* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y España).
- *Cosmochthonius (C.) assamensis* Talukdar *et* Chakrabarti, 1985
DISTRIBUCIÓN: India (Assam).
- *Cosmochthonius (C.) australicus* Womersley, 1945 (*C. plumatus a.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Cosmochthonius (C.) bengalensis* Chakrabarti, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1972
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Cosmochthonius (C.) bhutanensis* Chakarbarti *et* Wilson, 1981
DISTRIBUCIÓN: Bután.
- *Cosmochthonius (C.) concavus* Aoki, 1994

DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Cosmochthonius (C.) desaussurei* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Cosmochthonius (C.) foliatus* Subías, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Cosmochthonius (C.) foveolatus* Beck, 1962 (*C. lanatus f.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, China suroriental y Japón.
- *Cosmochthonius (C.) imperfectus* Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Cosmochthonius (C.) lanatus (Michael, 1885) (*Hypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).
- *Cosmochthonius (C.) lanatus lanatus* (Michael, 1885)
(=*Cosmochthonius arctosus* Pankov, 2002)
(=*Cosmochthonius domesticus* Grandjean, 1947)
(=*Cosmochthonius novus* Sergienko, 1991)
(=*Cosmochthonius wallworki* Lee, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica: frecuente, Etiópica, Oriental y Neotropical).
- *Cosmochthonius (C.) lanatus diversiseta* Sarkar *et* Subías, 1982
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Cosmochthonius (C.) lusitanicus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cosmochthonius (C.) macrosetosus* Ayyildiz *et* Luxton, 1990
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Cosmochthonius (C.) margaritatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Cosmochthonius (C.) maroccanus* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Cosmochthonius (C.) minifoveolatus* Gil, Subías *et* Candelas, 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cosmochthonius (C.) monegrensis* Pérez-Íñigo jr., 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cosmochthonius (C.) nayoroensis* Fujikawa, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cosmochthonius (C.) oralensis* Seniczak, A. Seniczak, Kaczmarek, Marquardt *et* Jangazieva, 2020
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Cosmochthonius (C.) perezinigoi* Morell, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Cosmochthonius (C.) plumatus Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical y Oriental (India: Tripura, y China suroriental), y Holártica meridional.
- *Cosmochthonius (C.) plumatus plumatus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional, Neotropical y China suroriental.
- *Cosmochthonius (C.) plumatus suramericanus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, U.S.A. (Nuevo Méjico), e India (Tripura).
- *Cosmochthonius (C.) ponticus* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental e Irán).
- *Cosmochthonius (C.) reticulatus* Grandjean, 1947
(=*Cosmochthonius trivialis* Sergienko, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental (China suroriental e India: Bengala Occidental) y Neotropical.
- *Cosmochthonius (C.) semiareolatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Madagascar.
- *Cosmochthonius (C.) semifoveolatus* Subías, 1982
DISTRIBUCIÓN: Ibérica y Argentina.
- *Cosmochthonius (C.) signatus* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cosmochthonius (C.) spinosus* Gil, Subías *et* Candelas, 1991
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Cosmochthonius (C.) sublanatus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Cosmochthonius (C.) taurus* Niemi, Gordeeva *et* Ayyildiz, 2002
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Cosmochthonius (C.) tenuisetus* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Cosmochthonius (C.) ugamaensis* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Grecia).
- *Cosmochthonius (C.) zanini* Penttinen *et* Gordeeva, 2003
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental e Irán).

Cosmochthonius (Nanochthonius) Subías *et* Gil-Martín, 1995 (2 spp.)
(=***Microchthonius*** Kahwash, Subías *et* Ruiz, 1989, *nom. praeoc.* por Hadzi, 1933)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius (Microchthonius) ruizi* Kahwash, Subías *et* Ruiz, 1989
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Cosmochthonius (Nanochthonius) juvenalis* Kamill, 1986 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Cosmochthonius (Nanochthonius) ruizi* Kahwash, Subías *et* Ruiz, 1989 (*C. (Microchthonius)*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Cosmochthonius (Nortonchthonius) Jorrín, 2014 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius (Nortonchthonius) oblongisetosus* Jorrín, 2014
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Cosmochthonius (Nortonchthonius) oblongisetosus* Jorrín, 2014
DISTRIBUCIÓN: España.

Krivolutskiella Gordeeva, 1980 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Krivolutskiella pubescens* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Krivolutskiella pennata* Gordeeva, Penttinen *et* Petrova, 2007
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Krivolutskiella pubescens* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Phyllozetes Gordeeva, 1978 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius emmae* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Phyllozetes alatus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Phyllozetes aldretei* Ojeda, García, Páez *et* Palacios-Vargas, 2020
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Phyllozetes emmae* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius*)
(=*Trichthonius heterotrichus* Sanyal *et* Bhaduri, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.
- *Phyllozetes heelei* Shereef, Hanna *et* Duweini, 1981
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Phyllozetes hypoquercus* McDaniel *et* Bolen, 1980
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Phyllozetes latifolius* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y tropical (Neotropical: Méjico, Oriental: Java, y Australiana: Komodo).
- *Phyllozetes longifolius* Balakrishnan, 1986
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Phyllozetes nilamburicus* Balakrishnan, 1986
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Phyllozetes osithchnjukovi* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Phyllozetes subiasi* Jorrín, 2014
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Phyllozetes tauricus* Gordeeva, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).

Haplochthoniidae Hammen, 1959 (2 gen., 1 subgen. y 17 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Amnemochthonius Grandjean, 1949 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Amnemochthonius taeniophorus* Grandjean, 1949
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Australiana.
- *Amnemochthonius taeniophorus* Grandjean, 1949
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Australia.

Haplochthonius Willmann, 1930 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius (Haplochthonius) simplex* Willmann, 1930
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).

Haplochthonius (Haplochthonius) Willmann, 1930 (14 spp.)
(=***Tetrochthonius*** Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).
- *Haplochthonius (H.) antarcticus* Sanyal, Basak *et* Barman, 2002
DISTRIBUCIÓN: Antártida.
- *Haplochthonius (H.) chamela* Mahunka *et* Mejía-Recamier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico e Irán.
- *Haplochthonius (H.) clavatus* (Hammer, 1958) (*Tetrochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, India y España.
- *Haplochthonius (H.) crassisetosus* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Haplochthonius (H.) diverseta* Bose, Dogra, Singh *et* Jain, 1998
DISTRIBUCIÓN: India (Haryana).
- *Haplochthonius (H.) eucalyptus* (Elbadry *et* Nasr, 1979) (*Tetrochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Haplochthonius (H.) graecus* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Haplochthonius (H.) intermedius* Chakrabarti, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1977
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Haplochthonius (H.) longisetosus* Sanyal, Basak *et* Barman, 2002
DISTRIBUCIÓN: Antártida.

- *Haplochthonius (H.) maitri* Sanyal, Basak *et* Barman, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Antártida.
- *Haplochthonius (H.) muscicola* Fujikawa, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Haplochthonius (H.) sanctaeluciae* Bernini, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Subtropical: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental) y tropical: Senegal y Neotropical (I. Galápagos y Chile).
- *Haplochthonius (H.) simplex* (Willmann, 1930) (*Cosmochthonius (H.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Etiópica, Oriental y Neotropical (Brasil y Colombia).
- *Haplochthonius (H.) stylosanthes* Corpuz-Raros *et* García, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Haplochthonius (H.) variabilis* Wallwork, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Neártica meridional.

Haplochthonius (Senilochthonius) Mahunka, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Senilochthonius baobab* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Haplochthonius (Senilochthonius) baobab* (Mahunka, 1992) (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Senegal.

Pediculochelidae Lavoipierre, 1946 (1 gen. y 8 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Holártica meridional.

Paralycus Womersley, 1944 (8 spp.)
(=***Pediculochelus*** Lavoipierre, 1946)
ESPECIE TIPO: *Alycus pyrigerus* Berlese, 1905
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Holártica meridional.
- *Paralycus chongqingensis* Fan, Li *et* Xuan, 1996
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Paralycus lavoipierrei* (Price, 1973) (*Pediculochelus*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: Este de Rusia europea y U.S.A. (California), y Australia.
- *Paralycus longior* Fan, Li *et* Xuan, 1996
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Paralycus nortoni* Xu, Zhu, Wu *et* F.-P. Zhang, 2020
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Paralycus parasiti* A.-H. Zhang *et* Li, 2001
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Paralycus parvulus* (Price, 1973) (*Pediculochelus*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Paralycus pyrigerus* (Berlese, 1905) (*Alycus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Paralycus raulti* (Lavoipierre, 1946) (*Pediculochelus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Egipto.

Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947 (2 gen. y 19 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Similochthonius Mahunka, 1985 (2 spp.)
(=***Sphaerochochthonius*** Mahunka, 1985)
ESPECIE TIPO: *Similochthonius decoratus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Similochthonius australis* (Mahunka, 1985) (*Spaerochochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Similochthonius decoratus* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Sphaerochthonius Berlese, 1910 (17 spp.)
(=***Sphaerochthoniella*** Mahunka, 1985)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius splendidus* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Sphaerochthonius bengalensis* Sanyal *et* Sengupta, 1990
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Sphaerochthonius fungifer* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Sphaerochthonius gemma* (Oudemans, 1909) (*Hypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
  (=*Sphaerochthonius elegans* Berlese, 1910 *sp. inq.*: juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Sphaerochthonius lipataensis* Corpuz-Raros *et* García, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Sphaerochthonius litoralis* Schatz, 2003
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Sphaerochthonius longisetus* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Komodo).
- *Sphaerochthonius pallidus* Muñoz-Mingarro, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Sphaerochthonius phyllophorus* Balogh *et* Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Brasil e Irán.
- *Sphaerochthonius spectabilis* Gordeeva, Niemi *et* Petrova-Nikitina, 1996
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Sphaerochthonius splendidus* (Berlese, 1904) (*Hypochthonius*)
(=*Sphaerochthonius dilutus* Sergienko, 1991)
(=*Sphaerochthonius ovatus* Sergienko, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Oriental (China suroriental y Vietnam), Australiana (Australia y Polinesia), Neotropical y Etiópica, y subtropical (Holártica meridional: frecuente).
- *Sphaerochthonius strinatii* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Sphaerochthonius suzukii* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Japón), Hawái y Méjico.
- *Sphaerochthonius transversus* Wallwork, 1960
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Ghana, India y Cuba) y Paleártica meridional.
- *Sphaerochthonius uruguayensis* Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1998
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Sphaerochthonius variesetosus* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Sphaerochthonius wallworki* Lee, 1982
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Sphaerochthonius windsori* Schatz, 2003
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Atopochthonioidea Grandjean, 1949

Atopochthoniidae Grandjean, 1949 (3 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Paleotropical y Australiana).

Atopochthonius Grandjean, 1949 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Atopochthonius artiodactylus* Grandjean, 1949
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Atopochthonius artiodactylus* Grandjean, 1949
DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
- *Atopochthonius maimaensis* Grishina, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

Phyllochthonius Travé, 1967 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Phyllochthonius aoutii* Travé, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Phyllochthonius aoutii* Travé, 1967
DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Phyllochthonius ovatosetosus* Fuangarworn, 2010
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Phyllochthonius peniculus* Fuangarworn, 2010
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Pterochthonius Berlese, 1913 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius angelus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica, y Australianooriental.
- *Pterochthonius angelus* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental: China suroriental e India (Bengala Occidetal), Méjico y Hawái.
- *Pterochthonius roynortoni* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Protoplophoroidea Ewing, 1917

Protoplophoridae Ewing, 1917 (7 gen., 2 subgen. y 30 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Arthrhoplophora Berlese, 1910 (4 spp.)
(=***Neoprototritia*** Shereef, 1978)
(=***Triplophora*** Mahunka, 1977)
ESPECIE TIPO: *Arthrhoplophora paradoxa* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Arthrhoplophora adjacentis* Fuangarworn, 2011
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Arthrhoplophora paradoxa* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Arthrhoplophora vulpes* Berlese, 1916
(=*Arthrhoplophora (Triplophora) berlesei* Mahunka, 1977)
DISTRIBUCIÓN: África oriental y Vietnam.
- *Arthrhoplophora zachvatkini* (Shereef, 1978) (*Neoprototritia*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Bursoplophora Subías *et* Pérez-Íñigo, 1978 (9 spp.)
(=***Csibiplophora*** Mahunka, 1984)

ESPECIE TIPO: *Bursoplophora iberica* Subías *et* Pérez-Íñigo, 1978
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y Paleártica meridional.
- *Bursoplophora bivaginata* (Grandjean, 1932) (*Protoplophora*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Bursoplophora ethiopica* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Bursoplophora genavensium* (Mahunka, 1984) (*Csibiplophora*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Méjico).
- *Bursoplophora iberica* Subías *et* Pérez-Íñigo, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Bursoplophora insularis* Kahwash, Subías *et* Ruiz, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Bursoplophora madagassica* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Bursoplophora meridionalis* Bernini, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
- *Bursoplophora muraiae* Mahunka *et* Mejía-Recamier, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Bursoplophora tyrrhenica* Bernini, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Cryptoplophora Grandjean, 1932 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cryptoplophora abscondita* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).
- *Cryptoplophora abscondita* Grandjean, 1932
  (=*Cryptoplophora asiatica* Gordeeva, Niemi *et* Petrova-Nikitina, 1998)
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Etiópica (Nigeria), Oriental (Java) y Neotropical, y subtropical: Paleártica meridional y Neártica (U.S.A.: Tejas).

Grandjeanoplophora Balogh *et* Mahunka, 1979 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cryptoplophora mauritanica* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Grandjeanoplophora (Grandjeanoplophora) Balogh *et* Mahunka, 1979 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Grandjeanoplophora (G.) mauritanica* (Grandjean, 1932) (*Cryptoplophora*)
  DISTRIBUCIÓN: Marruecos.

Grandjeanoplophora (Tauroplophora) Gordeeva, Niemi *et* Petrova-Nikitina, 1998 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tauroplophora aureonotata* Gordeeva, Niemi *et* Petrova-Nikitina, 1998
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Grandjeanoplophora (Tauroplophora) aureonotata* (Gordeeva, Niemi *et* Petrova-Nikitina, 1998) (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Crimea.

Hauseroplophora Mahunka, 1977 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hauseroplophora soniae* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Hauseroplophora flagellata* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hauseroplophora phitosi* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Hauseroplophora soniae* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Protoplophora Berlese, 1910 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Protoplophora palpalis* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australianooriental.
- *Protoplophora iranica* Akrami *et* Behmanesh, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Protoplophora oglasicola* Bernini, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Protoplophora palpalis* Berlese, 1910
  (=*Protoplophora grandjeani* Bernini, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Paleártica meridional y U.S.A.: California) y Australia.
- *Protoplophora takensis* Fuangarworn, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Prototritia Berlese, 1916 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Arthrhoplophora (Prototritia) armadillo* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Prototritia (Prototritia) Berlese, 1916 (6 spp.)
(=***Aedoplophora*** Grandjean, 1932)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Prototritia (P.) armadillo* (Berlese, 1916) (*Arthrhoplophora (P.)*)
  (=*Aedoplophora africana* Mahunka, 1977)

DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Prototritia (P.) glomerata* (Grandjean, 1932) (*Aedoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Filipinas.
- *Prototritia (P.) grandjeani* (Mahunka, 1977) (*Aedoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java) y Australiana (Komodo).
- *Prototritia (P.) major* (Jacot, 1933) (*Aedoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Prototritia (P.) palaciosi* Mahunka *et* Mejía-Recamier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Prototritia (P.) triangularibus* Niedbała, 2015
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Prototritia (Siciliophora) Bernini, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Prototritia (Siciliophora) sicula* Bernini, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Prototritia (Siciliophora) sicula* Bernini, 1983
DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia) y Méjico.

Hypochthonioidea Berlese, 1910

Hypochthoniidae Berlese, 1910 (4 gen., 1 subgen., 26 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Eohypochthonius Jacot, 1938 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius gracilis* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Eohypochthonius (Eohypochthonius) Jacot, 1938 (12 spp.)
(=***Afrhypochthonius*** Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Eohypochthonius (E.) africanus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Eohypochthonius (E.) asiaticus* (Berlese, 1910) (*Hypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Eohypochthonius (E.) becki* Balogh *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eohypochthonius (E.) benacensis* Schatz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Eohypochthonius (E.) berninii* Subías, 2019
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y Melanesia (I. Fiji).
- *Eohypochthonius (E.) crassisetiger* Aoki, 1959 (*E. gracilis c.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Cáucaso y Paleártica oriental (excepto Norte), Australianooriental y Cuba.
- *Eohypochthonius (E.) gracilis* (Jacot, 1936) (*Hypochthonius*)
(=*Afrhypochthonius vilhenarum* Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: frecuente, y subtropical.
- *Eohypochthonius (E.) magnus* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Minesota) y China suroriental.
- *Eohypochthonius (E.) parvus* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Eohypochthonius (E.) robustus* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Eohypochthonius (E.) salicifolius* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Borneo).
- *Eohypochthonius (E.) vermicularis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Eohypochthonius (Neoatrichosus) Fernández, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Eohypochthonius (Neoatrichosus) travei* Fernández, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eohypochthonius (Neoatrichosus) travei* Fernández, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).

Hypochthonius Koch, 1835 (5 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius rufulus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Hypochthonius elegans* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Hypochthonius luteus* Oudemans, 1917
(=*Hypochthonius luteus rectosetosus* Krivolutsky, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Noreste de Oriental y Nueva Zelanda.
- *Hypochthonius montanus* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Hypochthonius rufulus Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Oriental, I. Seychelles y Méjico).
- *Hypochthonius rufulus rufulus* Koch, 1835
(=*Hypochthonius rufulus brevisetosus* Krivolutsky, 1965)

(=*Hypochthonius pallidulus* Koch, 1835)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental, I. Seychelles y Méjico.
- *Hypochthonius rufulus carolinicus* Jacot, 1936 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Hypochthonius rufulus europaeus* Krivolutsky, 1965
DISTRIBUCIÓN: Europa oriental.
- *Hypochthonius rufulus paucipectinatus* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Hypochthonius ventricosus* (Canestrini, 1898) (*Hermannia*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Malacoangelia Berlese, 1913 (3 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Malacoangelia remigera* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Malacoangelia assamica* Talukdar *et* Chakrabarti, 1985
DISTRIBUCIÓN: India (Assam).
Malacoangelia remigera Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Malacoangelia remigera remigera* Berlese, 1913
(=*Malacoangelia remigera symmetrica* Wallwork, 1960)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Malacoangelia remigera indica* Chakrabarti, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1972
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Malacoangelia similis* Sarkar *et* Subías, 1982
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Tripura) y Ceilán [Sri Lanka].

Nothrolohmannia Balogh, 1968 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nothrolohmannia calcarata* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Nothrolohmannia baloghi* Norton, 2003
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nothrolohmannia calcarata* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nothrolomannia flagellata* Fuangarworn *et* Lekprayoon, 2012
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Nothrolohmannia samarensis* Norton *et* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Nothrolomannia thailandica* Fuangarworn *et* Lekprayoon, 2012
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Eniochthoniidae Grandjean, 1947 (1 gen. y 6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Hypochthoniella Berlese, 1910 (6 spp.)
(=***Arthrochthonius*** Ewing, 1917)
(=***Eniochthonius*** Grandjean, 1933)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius minutissimus* Berlese, 1903
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Hypochthoniella crosbyi* (Ewing, 1909) (*Hypochthonius*)
(=*Eniochthonius borealis* Jacot, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Sur).
- *Hypochthoniella fukushiraensis* Shiraishi *et* Aoki, 1994
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hypochthoniella mahunkai* (Norton *et* Behan-Pelletier, 2007) (*Eniochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Hypochthoniella minutissima* (Berlese, 1903) (*Hypochthonius*)
(=*Eniochthonius grandjeani* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Hypochthoniella paludicola* Fujikawa, 1994
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hypochthoniella sumatrana* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Malgache.

Psammochthoniidae Fuangarworn *et* Norton, 2013 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica, Neotropical y Oriental.

Psammochthonius Fuangarworn *et* Norton, 2013 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Psammochthonius kethleyi* Fuangarworn *et* Norton, 2013
DISTRIBUCIÓN: Neártica, Neotropical y Oriental.
- *Psammochthonius kethleyi* Fuangarworn *et* Norton, 2013
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misisipí), Brasil y Tailandia.

Lohmannioidea Berlese, 1916

Lohmanniidae Berlese, 1916 (22 gen., 5 subgen., 233 spp. y 9 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Annectacarus Grandjean, 1950 (18 spp.)
ESPECIE TIPO: *Annectacarus mucronatus* Grandjean, 1950
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Annectacarus africanus* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica e Indonesia (Komodo).
- *Annectacarus aokii* Jaikumar, Haq *et* Ramani, 1994
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Annectacarus eksteeni* Coetzee, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Annectacarus granditrichosus* Sengbusch, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia.
- *Annectacarus hainanensis* Hu *et* X. Wang, 1990
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Annectacarus hammerae* Shiji, Haq *et* Ramani, 2007
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Annectacarus insculptus* Wallwork, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Annectacarus krachan* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Annectacarus longisetosus* Bhattacharya, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1974
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Annectacarus mahabaeus* Corpuz-Raros, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas e India: Kerala).
- *Annectacarus mucronatus* Grandjean, 1950
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente) y “Oeste de Oriental”.
- *Annectacarus parallelus* (Berlese, 1916) (*Lohmannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Annectacarus perezinigoi* Călugăr *et* Vasiliu, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Annectacarus sejugatus* Wallwork, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Annectacarus tanzanicus* Ermilov *et* Khaustov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Annectacarus trivandricus* Haq, 1978
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Annectacarus unilateralis* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Polinesia (I. Tonga), Oriental (Java y Vietnam) e I. Galápagos.
- *Annectacarus vinalesensis* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Annectacarus wallworki* Adolph *et* Haq, 1991
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Bedoslohmannia Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Bedoslohmannia anneae* Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Bedoslohmannia anneae* Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Cryptacarus Grandjean, 1950 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cryptacarus promecus* Grandjean, 1950
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.

- *Cryptacarus dendrisetosus* Bhattacharya, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Cryptacarus grandjeani* Adolph *et* Haq, 1991
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Cryptacarus keralensis* Shiji, Haq *et* Ramani, 2007
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Cryptacarus longipilus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Cryptacarus promecus* Grandjean, 1950
  (=*Lohmannia valdemorica* Mihelčič, 1956)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental), Etiópica y Méjico.
- *Cryptacarus schauenbergi* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Indonesia: Lombok).
- *Cryptacarus tuberculatus* Csiszár, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Dendracarus Balogh, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Dendracarus pulchellus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Dendracarus pulchellus* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Haplacarus Wallwork, 1962 (11 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Haplacarus foliatus* Wallwork, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Haplacarus bhadurii* Sanyal, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Maharastra).
- *Haplacarus davisi* Xavier, Haq *et* Ramani, 2005
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
Haplacarus foliatus Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (África centrooccidental, Oriental, Norte de Neotropical y Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Haplacarus foliatus foliatus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical (África centrooccidental, Oriental, Norte de Neotropical y Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Haplacarus foliatus bengalensis* Bhattacharya, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1974
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Haplacarus javensis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam) y Norte de Neotropical.
- *Haplacarus keralensis* Haq, Mubarak *et* Ramani, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Haplacarus maharashtraensis* Sanyal, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Maharastra).
- *Haplacarus pairathi* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Haplacarus pandanus* Sengbusch, 1982
DISTRIBUCIÓN: Micronesia y Vietnam.
- *Haplacarus porosus* Haq *et* Adolph, 1995
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Haplacarus rugosus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Haplacarus xavieri* Xavier, Haq *et* Ramani, 2005
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Heptacarus Piffl, 1963 (10 spp.)
(=***Neotrichacarus*** Hammer, 1973)
(=***Pseudocryptacarus*** McDaniel, Norton *et* Bolen, 1979)
ESPECIE TIPO: *Heptacarus notoneotrichus* Piffl, 1963
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).
- *Heptacarus encantadae* Schatz, 1994
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Heptacarus graminosus* (McDaniel, Norton *et* Bolen, 1979) (*Pseudocryptacarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Heptacarus hirsutus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental (India: Kerala y Rajastán).
- *Heptacarus neotropicus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Heptacarus notoneotrichus* Piffl, 1963
DISTRIBUCIÓN: África nororiental.
- *Heptacarus ornatus* Bayoumi *et* Al-Khalifa, 1985
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Heptacarus piffli* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Sumbawa).
- *Heptacarus plumosus* (Hammer, 1973) (*Neotrichacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia (I. Samoa), y Oriental: Filipinas.
- *Heptacarus reticulatus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Komodo) e I. Seychelles.
- *Heptacarus supertrichus* Piffl, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Iraq y Túnez) e Irán, y Norte de Neotropical.

Javacarus Balogh, 1961 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Javacarus kuehnelti* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Javacarus (Javacarus) Balogh, 1961 (7 spp.)
(=***Tongacarus*** Hammer, 1973)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Javacarus (J.) foliatus* Hammer, 1972 (*J. kuehnelti f.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Noreste de India).
- *Javacarus (J.) granulatus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Java y Melanesia (I. Fiji).
- *Javacarus (J.) inexpectatus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Surinam).
- *Javacarus (J.) jocelynae* Judson, 1991
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Camerún y Costa de Marfil).
- *Javacarus (J.) kuehnelti* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental: frecuente, y Australiana: Islas del Pacífico) y Egipto.
- *Javacarus (J.) marginatus* (Hammer, 1973) (*Tongacarus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Javacarus (J.) porosus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Javacarus (Euryacarus) Woolley, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Euryacarus petalus* Woolley, 1966
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Javacarus (Euryacarus) petalus* (Woolley, 1966) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Guatemala y Brasil).
- *Javacarus (Euryacarus) pilosus* (Mahunka, 1982) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Lepidacarus Csiszár, 1961 (2 spp. y 1 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lepidacarus ornatissimus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Lepidacarus ennarpi* Haq *et* Ramani, 1997
DISTRIBUCIÓN: Sur de India.

Lepidacarus ornatissimus Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nueva Caledonia).
- *Lepidacarus ornatissimus ornatissimus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y Australiana (Nueva Caledonia).
- *Lepidacarus ornatissimus rehmabia* Haq, Mubarak *et* Ramani, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Lohmannia Michael, 1898 (31 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Michaelia paradoxa* Haller, 1884
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Lohmannia (Lohmannia) Michael, 1898 (29 spp. y 1 ssp.)
(=***Michaelia*** Haller, 1884, *nom. praeoc.* por Roemer, 1852)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Lohmannia (L.) banksi* Norton, Metz *et* Sharma, 1978
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte y Tejas) y Norte de Neotropical.
- *Lohmannia (L.) bifoliata* Willmann, 1936
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Lohmannia (L.) corallium* Nakatamari, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
- *Lohmannia (L.) coreana* Choi, 1985
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Lohmannia (L.) douhua* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Lohmannia (L.) embrionalis* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Lohmannia (L.) guzhangensis* Hu *et* X. Wang, 1990
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Lohmannia (L.) hungarorum* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Lohmannia (L.) indica* (Kardar, 1972) (*Papillacarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).

Lohmannia (L.) javana Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Oriental y Melanesia (I. Fiji).
- *Lohmannia (L.) javana javana* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Melanesia (I. Fiji) y Japón.
- *Lohmannia (L.) javana interrupta* Choi, 1985
DISTRIBUCIÓN: Corea y Oriental (Taiwán [Formosa]).

- *Lohmannia (L.) jornoti* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Lohmannia (L.) juliae* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Lohmannia (L.) lanceolata* Grandjean, 1950
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y China suroriental.
- *Lohmannia (L.) lerellana* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lohmannia (L.) maya* Iglesias *et* Palacios-Vargas, 2017
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Lohmannia (L.) paradoxa* (Haller, 1884) (*Michaelia*)
(=*Papillacarus egypticus* Elbadry *et* Nasr, 1977)
(=*Lohmannia loebli* Mahunka, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (más rara al Norte) e Irán.
- *Lohmannia (L.) pinnigera* Sengbusch, 1984
DISTRIBUCIÓN: Micronesia.
- *Lohmannia (L.) pseudoturcmenica* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Lohmannia (L.) regalis* Berlese, 1923
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Lohmannia (L.) reticulata* Sellnick, 1931 (*L. regalis r.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (Grecia y Eslovenia).
- *Lohmannia (L.) semibarbulata* Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Lohmannia (L.) serrata* Hu *et* X. Wang, 1990
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Lohmannia (L.) similis* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Lohmannia (L.) texana* (Banks, 1910) (*Hypochthonius*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Lohmannia (L.) triangulata* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Lohmannia (L.) turcmenica* Bulanova-Zachvatkina, 1960 (*L. lanceolata t.*)
  (=*Lohmannia hispaniola* Pérez-Íñigo, 1967)
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (China suroriental) y Neotropical (Argentina), y subtropical (Paleártica meridional).
- *Lohmannia (L.) unsui* Aoki, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Lohmannia (L.) vanharteni* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
- *Lohmannia (L.) vulcania* Schatz, 1993
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.

Lohmannia (Carolohmannia) Norton, Metz *et* Sharma, 1978 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lohmannia (Carolohmannia) carolensis* Norton, Metz *et* Sharma, 1978
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Oriental.

- *Lohmannia (Carolohmannia) carolensis* Norton, Metz *et* Sharma, 1978
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Sur).
- *Lohmannia (Carolohmannia) monosetosa* Ermilov *et* Anichkin, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Meristacarus Grandjean, 1934 (18 spp. y 3 sspp.)
(=***Javalohmannia*** Hammer, 1979)
ESPECIE TIPO: *Meristacarus porcula* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Meristacarus africanus Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.
- *Meristacarus africanus africanus* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Meristacarus africanus annobonensis* Pérez-Íñigo, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], y Vietnam.

- *Meristacarus biroi* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Meristacarus bochkovi* Ermilov *et* Kalúz, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Meristacarus bogorensis* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Meristacarus degradatus* Haq *et* Jaikumar, 1993
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Meristacarus douhereti* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Meristacarus gapudi* Corpuz-Raros *et* Lit, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Meristacarus heterotrichus Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Melanesia (I. Fiji).
- *Meristacarus heterotrichus heterotrichus* Csiszár, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Melanesia (I. Fiji).
- *Meristacarus heterotrichus glabrisetus* Mahunka, 1988 (*M. g.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Meristacarus longisetosus* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente en el Norte).

Meristacarus madagascarensis Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Malgache) y Oriental (Tailandia y Vietnam).
- *Meristacarus madagascarensis madagascarensis* Balogh, 1964
  DISTRIBUCIÓN: Malgache y Vietnam.
- *Meristacarus madagascarensis obscurus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Meristacarus perikopesis* Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Meristacarus porcula* Grandjean, 1934
  DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: frecuente, Etiópica: Ghana, y Oriental: Filipinas).
- *Meristacarus pubescentius* Ren, Yang, Liang *et* Xie, 2017
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Meristacarus rubescens* (Canestrini, 1897) (*Hermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea y Polinesia: Tahití) y Oriental (Java y Península Malaya).
- *Meristacarus striatus* (Hammer, 1979) (*Javalohmannia*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Meristacarus sundensis* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Meristacarus tuloyus* Corpuz-Raros, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Meristacarus wynadensis* Haq *et* Adolph, 1995
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Meristolohmannia Balogh *et* Mahunka, 1966 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Meristolohmannia meristacaroides* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Meristolohmannia abbreviata* Y. Chen, Yang *et* Xie, 2010
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Meristolohmannia chinensis* (Bulanova-Zachvatkina, 1960) (*Meristacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Meristolohmannia macaoensis* Ermilov, 2018
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Meristolohmannia meristacaroides* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Mixacarus Balogh, 1958 (24 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Mixacarus integer* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).

Mixacarus (Mixacarus) Balogh, 1958 (18 spp. y 1 ssp.)
(=***Hamacarus*** Hammer, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).
- *Mixacarus (M.) brevipes* (Banks, 1947) (*Lohmannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A. y Costa Rica.
- *Mixacarus (M.) chapmani* Wallwork, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.

Mixacarus (M.) exilis Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.
  - *Mixacarus (M.) exilis exilis* Aoki, 1970
    DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Este de Paleártica oriental, Irán y Cáucaso) y Oriental.
  - *Mixacarus (M.) exilis foveolatus* Aoki, 1987
    DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Mixacarus (M.) facundoi* Corpuz-Raros *et* García, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Mixacarus (M.) hexagonus* Fujikawa, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Mixacarus (M.) integer* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Mixacarus (M.) lawariensis* (Hammer, 1977) (*Hamacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Mixacarus (M.) murcioides* (Berlese, 1896) (*Angelia*)
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Mixacarus (M.) neotropicus* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mixacarus (M.) quadrifasciatus* Balakrishnan, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Kerala) y Ceilán [Sri Lanka].
- *Mixacarus (M.) sublestus* Tseng, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Mixacarus (M.) suoxiensis* Hu *et* X. Wang, 1990
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Mixacarus (M.) taibaiensis* Y. Chen *et* Yang, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Mixacarus (M.) tianmuensis* Li *et* L. Li, 1985
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Mixacarus (M.) turialbaiensis* Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Mixacarus (M.) vanhonggui* Mahunka, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Mixacarus (M.) vanuatuensis* Ermilov *et* Deharveng, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Nuevas Hébridas [Vanuatu].
- *Mixacarus (M.) zhuzhikovi* Bulanova-Zachvatkina, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Mixacarus (Phyllolohmannia) Balogh *et* P. Balogh, 1987 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mixacarus hamanni* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Mixacarus (Phyllolohmannia) foliifer* Golosova, 1984 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y China suroriental).
- *Mixacarus (Phyllolohmannia) hamanni* Balogh, 1961 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Mixacarus (Phyllolohmannia) luiseae* Mahunka, 2008 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Mixacarus (Phyllolohmannia) pectinatus* Ermilov *et* Kalúz, 2014
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Mixacarus (Phyllolohmannia) tenasserimensis* Fuangarworn *et* Chaisuekul, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Mixacarus (Phyllolohmannia) variatus* Fuangarworn *et* Chaisuekul, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Mixacarus (Phyllolohmannia) yinae* (Hu *et* Aoki, 1993) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Nesiacarus Csiszár, 1961 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nesiacarus reticulatus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.

- *Nesiacarus australis* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Méjico).
- *Nesiacarus completus* Hu *et* X. Wang, 1990
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nesiacarus granulatus* Hammer, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití), Japón y Norte de Neotropical.
- *Nesiacarus philippinensis* Mahunka, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Nesiacarus reticulatus* Csiszár, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Nesiacarus schusteri* Schatz, 1994
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Nesiacarus sinensis* Hu *et* X. Wang, 1988
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Ozacarus Colloff *et* Halliday, 1998 (2 spp.)
(=***Austracarus*** Balogh *et* P. Balogh, 1983, *nom. praeoc.* por Lawrence, 1949)
ESPECIE TIPO: *Austracarus reductus* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Ozacarus reductus* (Balogh *et* P. Balogh, 1983) (*Austracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Ozacarus tahitiensis* (Hammer, 1972) (*Meristacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia.

Papillacarus Kunst, 1959 (42 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lohmannia murcioides aciculata* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Papillacarus (Papillacarus) Kunst, 1959 (22 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Papillacarus (P.) aciculatus* (Berlese, 1904) (*Lohmannia murcioides a.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridonal, Vietnam y Tanzania.
- *Papillacarus (P.) aequalis* Mahunka, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
- *Papillacarus (P.) angulatus* Wallwork, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Paleártica meridional (Cáucaso e Irán), Brasil e India (Maharastra).
- *Papillacarus (P.) benenensis* Vũ, Ermilov *et* Dao, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillacarus (P.) conicus* Fujikawa, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Papillacarus (P.) echinatus* Li *et* H. Chen, 1991
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Asia centrooccidental.
- *Papillacarus (P.) elongatus* Xavier, 2007
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Papillacarus (P.) gramenicus* Bayartogtokh, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Papillacarus (P.) indistinctus* Ermilov, Anichkin *et* Wu, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).
- *Papillacarus (P.) internus* Ren, Yang, Liang *et* Xie, 2018
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Papillacarus (P.) lienhardi* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Papillacarus (P.) mammillatus* Ren, Yang, Liang *et* Xie, 2018
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Papillacarus (P.) ondriasi* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y China suroriental.
- *Papillacarus (P.) pavlovskii* (Bulanova-Zachvatkina, 1960) (*Thamnacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Papillacarus (P.) polygonatus* Ermilov *et* Anichkin, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillacarus (P.) pseudoaciculatus* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y Australia.
- *Papillacarus (P.) retinervius* Ren, Yang, Liang *et* Xie, 2018
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Papillacarus (P.) simplirostratus* Bhattacharya, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1974
  DISTRIBUCIÓN: India.
- *Papillacarus (P.) spinosus* Alzuet, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Papillacarus (P.) undirostratus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Papillacarus (P.) vitis* Elbadry *et* Nasr, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Papillacarus (Vepracarus) Aoki, 1965 (20 spp.)
ESPECIE TIPO: *Vepracarus ogawai* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Papillacarus (Vepracarus) abchasicus* Tarba, 1985 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Papillacarus (Vepracarus) acaciensis* Arun *et* Ramani, 2020
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Papillacarus (Vepracarus) akimovi* Sergienko, 1992 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centroocidental).
- *Papillacarus (Vepracarus) chamartinensis* Pérez-Íñigo, 1967 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).
- *Papillacarus (Vepracarus) cornutus* (Sarkar *et* Subías, 1984) (*V.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Tripura) y Vietnam, y Australiana: Nuevas Hébridas [Vanuatu].
- *Papillacarus (Vepracarus) cruzae* Corpuz-Raros, 1979 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y China suroriental).
- *Papillacarus (Vepracarus) gueyeae* (Pérez-Íñigo, 1989) (*V.*)
  DISTRIBUCIÓN: Senegal y Vietnam.
- *Papillacarus (Vepracarus) hexagonus* Ren, Yang, Liang *et* Xie, 2018
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Papillacarus (Vepracarus) hirsutus* (Aoki, 1961) (*Cryptacarus*)
  (=*Papillacarus arboriseta* Vũ *et* Jeleva, 1987)
  DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica, Oriental: frecuente, y Polinesia) y subtropical (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Papillacarus (Vepracarus) incompletus* (Mahunka, 1985) (*V.*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Papillacarus (Vepracarus) jinggangshanensis* (Y. Chen, Yang *et* Liang, 2010) (*V.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Papillacarus (Vepracarus) konglinensis* Y. Chen *et* Yang, 2011 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Papillacarus* (*Vepracarus*) *koreanus* (Mahunka, 1973) (*V.*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Papillacarus* (*Vepracarus*) *luteus* Ermilov, 2015 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillacarus* (*Vepracarus*) *ogawai* (Aoki, 1965) (*V.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam) e Irán.
- *Papillacarus (Vepracarus) parapolysetosus* Ermilov *et* Tolstikov, 2015 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Papillacarus (Vepracarus) polysetosus* Ermilov, Anichkin *et* Wu, 2012 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillacarus* (*Vepracarus*) *punctatus* (Hu *et* X. Wang, 1990) (*V.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental e Irán.
- *Papillacarus* (*Vepracarus*) *ramirezae* (Corpuz-Raros, 1979) (*V.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Papillacarus* (*Vepracarus*) *ramosus* Balogh, 1961 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Papillacarus* (*Vepracarus*) *whitteni* Fernández, Theron, Rollard *et* Leiva, 2015 (*P.)*
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Paulianacarus Balogh, 1961 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Paulianacarus laevis* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Paulianacarus (Paulianacarus) Balogh, 1961 (10 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Paulianacarus (P.) barlowi* Coetzee, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paulianacarus (P.) costaricensis* Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Paulianacarus (P.) groblerae* Coetzee, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paulianacarus (P.) laevis* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Paulianacarus (P.) longyanensis* Y. Chen, Liang *et* Yang, 2012
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Paulianacarus (P.) nodosus* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Paulianacarus (P.) rugosus* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Paulianacarus (P.) rugulosus* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Paulianacarus (P.) simplisetosus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Paulianacarus (P.) vietnamese* Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Paulianacarus (Millotacarus) Balogh, 1961 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Millotacarus granulatus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Paulianacarus (Millotacarus) foliatus* Mondal *et* Chakrabarti, 1983 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Paulianacarus (Millotacarus) granulatus* (Balogh, 1961) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar e India (Andhra Pradesh).
- *Paulianacarus (Millotacarus) indicus* (Sanyal, 1992) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Paulianacarus (Millotacarus) orientalis* (Mahunka, 1988) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Paulianacarus (Millotacarus) sarbias* Coetzee, 2001 (*P.*)
(=*Paulianacarus foliatus* Sarkar *et* Subías, 1984, *nom. praeoc.* por Mondal *et* Chakrabarti, 1983)
(=*Paulianacarus sarkarae* P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Reptacarus Pérez-Íñigo *et* Peña, 1995 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Reptacarus sagatus* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1995
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Reptacarus sagatus* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1995
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Strinatacarus Mahunka, 1977 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Strinatacarus aelleni* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Strinatacarus aelleni* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Strinatacarus zanzibarensis* Ermilov *et* Khaustov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Thamnacarus Grandjean, 1950 (5 spp.)
(=***Asiacarus*** Krivolutsky, 1971)
ESPECIE TIPO: *Lohmannia deserticola* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional y Etiópica).
- *Thamnacarus arnoldii* (Bashkirova, 1958) (*Trhypochthonius*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea.
- *Thamnacarus deserticola* (Grandjean, 1934) (*Lohmannia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Thamnacarus elongatus* (Krivolutsky, 1971) (*Asiacarus*)
(=*Thamnacarus moribei* Aoki, 1971)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental y Etiopía.
- *Thamnacarus longisetosus* Bulanova-Zachvatkina, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Thamnacarus smirnovi* Bulanova-Zachvatkina, 1978
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Torpacarus Grandjean, 1950 (16 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Torpacarus omittens* Grandjean, 1950
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y subtropical (Neártica meridional).
- *Torpacarus callipygus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Torpacarus cinctus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Torpacarus cylindricus* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus eidikoterai* Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Torpacarus elegans* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus foliatus* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus foveolatus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Torpacarus gramineus* McDaniel, Norton *et* Bolen, 1979
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Torpacarus izabalensis* Schatz, 1994
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Torpacarus lobatus* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus magnus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
Torpacarus omittens Grandjean, 1950

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.
- *Torpacarus omittens omittens* Grandjean, 1950
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente) y Etiópica.
- *Torpacarus omittens galapagensis* Schatz, 1994
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Torpacarus omittens paraguayensis* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Argentina).

- *Torpacarus pseudocallipygus* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus remotus* Schatz, 1994
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Torpacarus reticulatus* (Sengbusch, 1982) (*Javacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Micronesia y Méjico.
- *Torpacarus schatzi* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Ululohmannia Mahunka, 1987 (1 sp.)
(=***Austracarus*** Mahunka, 1984, *nom. praeoc.* por Lawrence, 1949)
ESPECIE TIPO: *Austracarus cristatus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Ululohmannia cristata* (Mahunka, 1984) (*Austracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).

Xenolohmannia Balogh *et* Mahunka, 1969 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Xenolohmannia discrepans* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Xenolohmannia capillata* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenolohmannia comosa* P. Balogh, 1984
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Xenolohmannia discrepans* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Mesoplophoroidea Ewing, 1917

Mesoplophoridae Ewing, 1917 (4 gen., 1 subgen. y 66 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Apoplophora Aoki, 1980 (19 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Apoplophora remota* Aoki, 1980) =*Mesoplophora pantotrema* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Apoplophora aokii* Mondal, Kundu *et* Roy, 1999
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Apoplophora cristata* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Apoplophora dentata* Liu, Chen *et* Qiao, 2009
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Apoplophora filiformis* Liu, 2019
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Apoplophora heterotricha* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental, China (Tíbet) y "Australiana".
- *Apoplophora kapiti* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental (Borneo y Australia).
- *Apoplophora malaya* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Apoplophora marcuardi* Mahunka, 1991
(=*Apoplophora triseta* Mahunka, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Apoplophora minuscula* Niedbała, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Apoplophora ornata* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Península Malaya).
- *Apoplophora pantotrema* (Berlese, 1913) (*Mesoplophora*)
(=*Mesoplophora discreta* Berlese, 1913)
(=*Mesoplophora indica* Mahunka, 1985)
(=*Apoplophora jaccoudi* Mahunka, 1991)
(=*Apoplophora lineata* Mahunka, 1987)
(=*Apoplophora ornatissima* Mahunka, 1988)
(=*Apoplophora remota* Aoki, 1980)
(=*Mesophophora rostrorugosa* Hammer, 1979)
(=*Mesoplophora striata* Mahunka, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental: frecuente, y Este de Paleártica oriental.
- *Apoplophora paraserrata* Niedbała, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Apoplophora paraspinosa* Niedbała, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).

- *Apoplophora phalerata* Niedbała, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Apoplophora sarawaki* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Apoplophora serrata* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Apoplophora solomonensis* Niedbała, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Salomón).
- *Apoplophora spinosa* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Apoplophora triquetra* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Archoplophora Hammen, 1959 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: (*Phthiracarulus laevis* Jacot, 1938) =*Phthiracarulus rostralis* Willmann, 1930
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, Neotropical y Etiópica).

- *Archoplophora rostralis* (Willmann, 1930) (*Phthiracarulus*)
  (=*Phthiracarulus laevis* Jacot, 1938)
  (=*Archoplophora villosa* Aoki, 1980)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (Neártica: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental meridional y Cáucaso), Oriental, Norte de Neotropical y Etiópica (Madagascar).

Dudichoplophora Mahunka, 1982 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Dudichoplophora reticulata* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Dudichoplophora reticulata* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Mesoplophora Berlese, 1904 (45 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mesoplophora michaeliana* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Mesoplophora (Mesoplophora) Berlese, 1904 (26 spp.)
(=***Phthiracarulus*** Berlese, 1920)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.

- *Mesoplophora (M.) africana* Balogh, 1958
  (=*Mesoplophora ifeana* Badejo, Woas *et* Beck, 2001)
  (=*Mesoplophora insularis* Pérez-Íñigo, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (frecuente) e I. Azores.
- *Mesoplophora (M.) bacilla* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mesoplophora (M.) bolivari* Călugăr, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Mesoplophora (M.) brachysetosa* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mesoplophora (M.) brasiliana* (Vitzthum, 1925) (*Phthiracarus*) *sp. inq.* (juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mesoplophora (M.) crassisetosa* Subías *et* Sakar, 1984
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Mesoplophora (M.) cubana* Călugăr *et* Vasiliu, 1977
  (=*Mesoplophora cubana pratensis* Scull, 1985)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Ecuador).
- *Mesoplophora (M.) frogneri* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Mesoplophora (M.) gaveae* Schuster, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical, Etiópica (Sudáfrica) y Oriental (Bután).
- *Mesoplophora (M.) hauseri* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mesoplophora (M.) heterotricha* Liu, 2016
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Mesoplophora (M.) ignota* Niedbała, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mesoplophora (M.) invisitata* Niedbała, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental: India (Goa).
- *Mesoplophora (M.) longiseta* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Mesoplophora (M.) longisetosa* Călugăr *et* Vasiliu, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Mesoplophora (M.) michaeliana* Berlese, 1904
  (=*Mesoplophora caucasica* Krivolutsky, 1975)
  (=*Mesoplophora graeca* Walzl, 1974)
  (=*Mesoplophora pectinata* Mahunka, 1979)
  (=*Phthiracarus (Phthiracarulus) perexiguus* Berlese, 1920)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Noreste de India.
- *Mesoplophora (M.) parabacilla* Niedbała, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Mesoplophora (M.) paragaveae* Niedbała, 2002
  DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.
- *Mesoplophora (M.) parainvisitata* Niedbała, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Mesoplophora (M.) parapulchra* Niedbała, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Mesoplophora (M.) permodica* Niedbała, 1985
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental, Neotropical (Venezuela y Costa Rica) y Oriental (Indonesia).
- *Mesoplophora (M.) pusilla* Schuster, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mesoplophora (M.) quasigaveae* Niedbała, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Mesoplophora (M.) rostrata* Mahunka, 1988 (*M. (Parplophora)*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Mesoplophora (M.) similis* Mahunka, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Mesoplophora (M.) sparsa* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Mesoplophora (M.) vesca* Niedbała *et* Corpuz-Raros, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Mesoplophora (Parplophora) Niedbała, 1985 (18 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mesoplophora pulchra* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Mesoplophora (Parplophora) abscondita* Niedbała, 1988
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (frecuente).
- *Mesoplophora (Parplophora) bacula* Niedbała, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Mesoplophora (Parplophora) brevicarinata* Niedbała, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Mesoplophora (Parplophora) elsi* Niedbała, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mesoplophora (Parplophora) flavida* Niedbała, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Noreste de China.
- *Mesoplophora (Parplophora) fusiformis* Niedbała, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Mesoplophora (Parplophora) iuvenalis* Niedbała, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mesoplophora (Parplophora) japonica* Aoki, 1970 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental, Neártica septentrional y U.S.A.: California).
- *Mesoplophora (Parplophora) leviseta* Hammer, 1979 (*M.*)
  (=*Mesoplophora gibba* Mahunka, 1988)
  DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica: Malgache, Oriental: Java, y Australiana: Islas del Pacífico).
- *Mesoplophora (Parplophora) madegassica* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Mesoplophora (Parplophora) niedbalai* Subías, 2009
  (=*Mesoplophora (Parplophora) pertenuis* Niedbała, 2006, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2001)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mesoplophora (Parplophora) paraleviseta* Mahunka, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Mesoplophora (Parplophora) pertenuis* Niedbała, 2001
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
- *Mesoplophora (Parplophora) polita* Niedbała, 1985 (*M.*)
  (=*Mesoplophora villosa* Mahunka, 1987)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo y Nueva Guinea.
- *Mesoplophora (Parplophora) pulchra* Sellnick, 1928 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Etiópica (Tanzania).
- *Mesoplophora (Parplophora) setulosa* Niedbała, 2006 (juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mesoplophora (Parplophora) subtilis* Niedbała, 1981 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).
- *Mesoplophora (Parplophora) vestigia* Liu, 2018
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Suborden MIXONOMATA Grandjean, 1969

Infraorden DICHOSOMATA Balogh *et* Mahunka, 1979

Nehypochthonioidea Norton *et* Metz, 1980

Nehypochthoniidae Norton *et* Metz, 1980 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional y tropical (excepto Etiópica).

Nehypochtonius Norton *et* Metz, 1980 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nehypochthonius porosus* Norton *et* Metz, 1980
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional y tropical (excepto Etiópica).

- *Nehypochthonius porosus* Norton *et* Metz, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A., Vietnam y Hawái.
- *Nehypochthonius yanoi* Aoki, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Perlohmannioidea Grandjean, 1954

Perlohmanniidae Grandjean, 1954 (2 gen., 1 subgen. y 11 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.

Hololohmannia Kubota *et* Aoki, 1998 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hololohmannia alaskensis* Kubota *et* Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Hololohmannia alaskensis* Kubota *et* Aoki, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- *Hololohmannia skrjabini* (Bashkirova, 1958) (*Eulohmannia*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea.

Perlohmannia Berlese, 1916 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lohmannia insignis* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.

Perlohmannia (Perlohmannia) Berlese, 1916 (6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.
- *Perlohmannia (P.) altaica* Grishina, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Perlohmannia (P.) coiffaiti* Grandjean, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Paleártica oriental) y Neártica septentrional.
- *Perlohmannia (P.) dissimilis* (Hewitt, 1908) (*Lohmannia insignis d.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Hawái.
- *Perlohmannia (P.) insignis* (Berlese, 1904) (*Lohmannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa occidental (más rara en el Norte).
- *Perlohmannia (P.) nasuta* Schuster, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Perlohmannia (P.) turcica* Ayyildiz, Subías *et* Baran, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Perlohmannia (Apolohmannia) Aoki, 1960 (3 spp.)
(=***Neolohmannia*** Bulanova-Zachvatkina, 1960)
ESPECIE TIPO: *Apolohmannia gigantea* Aoki, 1960
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Perlohmannia (Apolohmannia) gigantea* (Aoki, 1960) *(A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte).
- *Perlohmannia (Apolohmannia) heterosa* Fujikawa, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Perlohmannia (Apolohmannia) zachvatkini* (Bulanova-Zachvatkina, 1960) (*Neolohmannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Este de Rusia asiática).

Collohmanniidae Grandjean, 1958 (1 gen. y 3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Collohmannia Sellnick, 1922 (3 spp.)
(=***Phthiracaroides*** Štorkán, 1923)
ESPECIE TIPO: *Collohmannia gigantea* Sellnick, 1922
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Collohmannia asiatica* Krivolutsky *et* Christov, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Collohmannia gigantea* Sellnick, 1922
  (=*Phthiracaroides incertus* Štorkán, 1923)
  (=*Collohmannia nova* Sellnick, 1932)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centrooriental y Asia centrooccidental).
- *Collohmannia johnstoni* Norton *et* Sidorchuk, 2014
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia Occidental).

Eulohmannioidea Grandjean, 1931

Eulohmanniidae Grandjean, 1931 (1 gen., 2 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Eulohmannia Berlese, 1910 (2 spp. y 1 ssp.)
(=***Arthronothrus*** Trägårdh, 1910)
ESPECIE TIPO: *Lohmannia (Eulohmannia) ribagai* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Eulohmannia antonii* (Lombardini, 1962) (*Gehypochthonius*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Italia.

Eulohmannia ribagai (Berlese, 1910) (*Lohmannia (E.)*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Eulohmannia ribagai ribagai* (Berlese, 1910)
(=*Arthronothrus biunguiculatus* Trägårdh, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y China suroriental.
- *Eulohmannia ribagai bifurcata* Fujikawa, 2014
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Epilohmannioidea Oudemans, 1923

Epilohmanniidae Oudemans, 1923 (2 gen., 2 subgen., 55 spp. y 8 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Epilohmannia Berlese, 1910 (45 spp. y 8 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Lohmannia cylindrica* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Epilohmannia (Epilohmannia) Berlese, 1910 (32 spp.)
(=***Lesseria*** Oudemans, 1917)
(=***Sinolohmannia*** Balogh *et* Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Epilohmannia (E.) amygdaliformis* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Epilohmannia (E.) barbatula* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Epilohmannia (E.) cultrata* Woolley, 1966
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

Epilohmannia (E.) cylindrica (Berlese, 1904) (*Lohmannia*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Paleártica: menos frecuente en el Norte, Neártica, Etiópica: Chad y Yemen, Oriental, Australiana: Australia y Hawái, y Neotropical).
- *Epilohmannia (E.) cylindrica cylindrica* (Berlese, 1904)
(=*Phthiracarus szanisloi* Oudemans, 1915)
(=*Epilohmannia verrucosa* Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Paleártica: menos frecuente en el Norte, Neártica, Etiópica: Chad, Oriental, Australiana: Hawái, y Neotropical).
- *Epilohmannia (E.) cylindrica media* Lee, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Epilohmannia (E.) cylindrica minima* Schuster, 1960 (*E. szanisloi m.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea: frecuente en Europa meridional, e Irán).
- *Epilohmannia (E.) daghestanica* Karppinen *et* Shtanchaeva, 1987
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Epilohmannia (E.) dimorpha* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental (Vietnam).
- *Epilohmannia (E.) flagellifer* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Epilohmannia (E.) flexuosa* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Epilohmannia (E.) foveolata* Fujikawa, 2008
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannia (E.) gigantea* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Epilohmannia (E.) heterotricha* Mahunka, 1966
(=*Epilohmannia (Sinolohmannia) norberti* Moreno *et* Moraza, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).
- *Epilohmannia (E.) imreorum* Bayoumi *et* Mahunka, 1976
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
- *Epilohmannia (E.) inexpectata* Schuster, 1960
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) e I. Santa Helena.
- *Epilohmannia (E.) insignipes* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Epilohmannia (E.) kulaginae* Shtanchaeva, 1993
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Epilohmannia (E.) luzonica* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Epilohmannia (E.) mahunkai* Călugăr *et* Vasiliu, 1983
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Epilohmannia (E.) minuta Berlese, 1920
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Epilohmannia (E.) minuta minuta* Berlese, 1920
(=*Epilohmannia elongata* Banks, 1947)
(=*Epilohmannia pallida* Wallwork, 1962)
(=*Epilohmannia pallida americana* Balogh *et* Mahunka, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica, Oriental: India, y Neotropical) y U.S.A. centrooriental.
- *Epilohmannia (E.) minuta aegyptica* Bayoumi *et* Mahunka, 1976 (*E. pallida a.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán) y Vietnam.
- *Epilohmannia (E.) minuta areolata* Sarkar *et* Subías, 1982 (*E. pallida a.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Epilohmannia (E.) minuta australica* Lee, 1985 (*E. pallida a.*) *ssp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Epilohmannia (E.) minuta indica* Bhattacharya *et* Banerjee, 1980 (*E. pallida i.*)
  DISTRIBUCIÓN: India.
- *Epilohmannia (E.) minuta pacifica* Aoki, 1965 (*E. pallida p.*)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y Paleártica oriental meridional.
- *Epilohmannia (E.) minuta rugosa* Sarkar *et* Subías, 1982 (*E. pallida r.*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Epilohmannia (E.) nortoni* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Epilohmannia (E.) ornata* Mahunka, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Epilohmannia (E.) praetritia* Berlese, 1916
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Epilohmannia (E.) puella* Berlese, 1916
  (=*Epilohmannia nota* McDaniel *et* Bolen, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional
- *Epilohmannia (E.) rubra* Fujikawa, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannia (E.) schusteri* Călugăr *et* Vasiliu, 1976
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Epilohmannia (E.) sculpturata* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Irán.
- *Epilohmannia (E.) serrata* Fujikawa, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannia (E.) shtanchaevae* Bayartogtokh, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Epilohmannia (E.) spathulata* Aoki, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Epilohmannia (E.) spathuloides* Bayartogtokh, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannia (E.) styriaca* Schuster, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa meridional e Irán).
- *Epilohmannia (E.) taiwanica* Tseng, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Epilohmannia (Neoepilohmannia) McDaniel *et* Bolen, 1989 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Epilohmannia neotricha* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical (Holártica meridional).

- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) crassisetosa* Ermilov *et* Anichkin, 2012 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) dolosa* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1985 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) guarani* Balogh *et* Mahunka, 1977 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) lenkoi* Balogh *et* Mahunka, 1977 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) maurii* Fernández, 1978 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) multisetosa* Hammer, 1971 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) neotricha* Wallwork, 1962 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Costa de Marfil).
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) ovalis* Berlese, 1916 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) ovata* Aoki, 1961 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Cáucaso y Paleártica oriental (excepto Norte), y Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) pilosa* Li *et* H. Chen, 1990 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) taeda* (McDaniel *et* Bolen, 1989) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) vicina* Fujikawa, 2008 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) zwarti* Hammen, 1986 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea y Nuevas Hébridas [Vanuatu]).

Epilohmannoides Jacot, 1936 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Epilohmannoides terrae* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical (Holártica meridional).

Epilohmannoides (Epilohmannoides) Jacot, 1936 (6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical (Holártica meridional).

- *Epilohmannoides (E.) esulcatus* Ohkubo, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Borneo y Taiwán [Formosa]).
- *Epilohmannoides (E.) jacoti* Norton, Metz *et* Sharma, 1978

DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Epilohmannoides (E.) kishidai* Ohkubo, 2002
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannoides (E.) setoensis* Fujikawa, 2008
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannoides (E.) terrae* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Este de U.S.A.), Panamá y China suroriental.
- *Epilohmannoides (E.) wallworki* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java y España.

Epilohmannoides (Neoepilohmannoides) Subías, 2020 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Epilohmannia xena* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Epilohmannoides (Neoepilohmannoides) rabori* (Corpuz-Raros, 1979) (*Epilohmannia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Epilohmannoides (Neoepilohmannoides) samarensis* Corpuz-Raros, 2010 (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Epilohmannoides (Neoepilohmannoides) sexparus* Corpuz-Raros, 2010 (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Epilohmannoides (Neoepilohmannoides) xena* (Mahunka, 1983) (*Epilohmannia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical, Vietnam e Irán.

Infradorden EUPTYCTIMA Grandjean, 1967

Euphthiracaroidea Jacot, 1930

Oribotritiidae Balogh, 1943 (9 gen., 4 subgen., 203 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Austrotritia Sellnick, 1959 (20 spp. y 3 sspp.)
(=***Macarotritia*** Pérez-Íñigo, 1986)
ESPECIE TIPO: *Autrotritia quadricarinata* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical.
- *Austrotritia bifurca* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Austrotritia bryani* (Jacot, 1929) (*Euphthiracarus (I.)*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Austrotritia carinata* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea y Australia).
- *Austrotritia dentata* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Austrotritia didyma* Liu, Chen *et* Qiao, 2009
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Austrotritia engelbrechti* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrotritia finlandica* Niedbała *et* Penttinen, 2006
DISTRIBUCIÓN: Finlandia.
- *Austrotritia fissurata* Liu, Chen *et* Qiao, 2009
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Austrotritia gibba* Bayoumi *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: India (Cachemira).
- *Austrotritia glabrata* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Austrotritia herenessica* (Pérez-Íñigo, 1986) (*Indotritia (Macarotritia)*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterrána occidental.
- *Austrotritia kinabaluensis* Ramsay *et* Sheals, 1969
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Austrotritia lebronneci (Jacot, 1934) (*Indotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Austrotritia lebronneci lebronneci* (Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Austrotritia lebronneci crassiori* (Jacot, 1934) (*Indotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Austrotritia lebronneci flagelloides* (Jacot, 1934) (*Indotritia*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Austrotritia lebronneci tahitiana* (Jacot, 1934) (*Indotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).

- *Austrotritia parabellingeri* Niedbała, 2013
DISTRIBUCIÓN: Zambia.
- *Austrotritia quadricarinata* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes (I. Tubuai).
- *Austrotritia ramsayi* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Austrotritia robusta* Niedbała *et* Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Austrotritia saraburiensis* Aoki, 1965 (*A. lebronneci s.*)

(=*Austrotritia ishigakiensis* Aoki, 1980)
(=*Austrotritia optabilis* Niedbała, 1991)
(=*Austrotritia shealsi* Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Australiana: Islas del Pacífico y Australia) y subtropical (Paleártica oriental meridional).
- *Austrotritia singaporensis* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Península Malalya.
- *Austrotritia unicarinata* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón y Micronesia (I. Marianas).

Indotritia Jacot, 1929 (39 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tritia krakatauensis* Sellnick, 1924
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Indotritia (Indotritia) Jacot, 1929 (35 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Indotritia (I.) africana* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) allocotos* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Indotritia (I.) bellingeri* Niedbała *et* Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Indotritia (I.) bifurcata* Pan, Xu *et* Liu, 2018
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Indotritia (I.) breviseta* (Berlese, 1923) (*Tritia berlesei b.*)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Indotritia (I.) clavata* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Indotritia (I.) consimilis* Märkel, 1964 (*I. krakatauensis c.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Indotritia (I.) cypha* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) didyma* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) eksteeni* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) fusa* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) jacoti* Niedbała, 2001
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Indotritia (I.) javensis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)
(=*Indotritia completa* Mahunka, 1987)
(=*Oribotritia mollis* Aoki, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Oriental (frecuente), Australiana (Nueva Guinea), Este de Paleártica oriental, subantártica (I. Amsterdam) y Etiópica (Madagascar).
- *Indotritia (I.) krakatauensis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)
(=*Indotritia acanthophora* Märkel, 1964)
(=*Indotritia heterotricha* Mahunka, 1984)
(=*Indotritia sellnicki* Aoki, 1965)
(=*Indotritia septentrionalis* Mahunka, 1987)
(=*Indotritia tropica* Starý, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Indotritia (I.) lakshadweepensis* Sanyal *et* Basu, 2014 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (I. Laquedivas).
- *Indotritia (I.) lanceolata* (Aoki, 1988) (*Austrotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Indotritia (I.) missouri* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centromeridional.
- *Indotritia (I.) montkoupensis* Niedbała *et* Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Indotritia (I.) nuda* Mahunka, 1988
(=*Indotritia usambarensis* Starý, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Indotritia (I.) nunomurai* Hirauchi *et* Aoki, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Indotritia (I.) paraconsimilis* Niedbała, 2012
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Indotritia (I.) partita* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) paulyi* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Indotritia (I.) phymatha* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) propinqua* Niedbała, 1991
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Indotritia (I.) retalteca* (Stoll, 1891) (*Hoplophora*) *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Indotritia (I.) retusa* Niedbała *et* Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica (Sudáfrica).
- *Indotritia (I.) spindleformis* Pan, Xu *et* Liu, 2018
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Indotritia (I.) tetradis* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Indotritia (I.) tricarinata* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Indotritia (I.) tripartita* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Indotritia (I.) tumenensis* Liu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Indotritia (I.) undulata* Bayoumi *et* Mahunka, 1979
(=*Indotritia aspera* Niedbała, 2000)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya (frecuente) y China suroriental.
- *Indotritia (I.) vestigia* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Indotritia (I.) zangherii* Mahunka *et* Paoletti, 1984
DISTRIBUCIÓN: Italia.

Indotritia (Afrotritia) Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Indotritia (Afrotritia) compacta* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Indotritia (Afrotritia) compacta* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: África central.

Indotritia (Zeaotritia) Mahunka, 1988 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Indotritia aotearoana* Ramsay, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Indotritia (Zeaotritia) aotearoana* Ramsay, 1966 (*I. a.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Indotritia (Zeaotritia) brevipilosa* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Caledonia).
- *Indotritia (Zeaotritia) brevisetosa* Niedbała *et* Colloff, 2000
(=*Indotritia breviseta* Niedbała *et* Colloff, 1997, *nom. praeoc.* por Berlese, 1923)
(=*Indotritia colloffi* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).

Maerkelotritia Hammer, 1967 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Maerkelotritia alaskensis* Hammer, 1967) =*Oribotritia kishidai* Aoki, 1958
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Maerkelotritia cryptopa* (Banks, 1904) (*Phthiracarus*)
(=*Tritia faeroensis* Sellnick, 1923)
(=*Oribotritia gibbera* Walker, 1965)
(=*Phthiracarus maximus* Ewing, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Neártica occidental (frecuente) y Eurosiberiana.
- *Maerkelotritia fusiformis* Liu, Niedbała *et* Chen, 2009
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Maerkelotritia kishidai* (Aoki, 1958) (*Oribotritia*)
(=*Maerkelotritia alaskensis* Hammer, 1967)
(=*Oribotritia sellnicki* Walker, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Neártica: frecuente en Oeste).
- *Maerkelotritia krivolutskyi* Märkel, 1968
(=*Maerkelotritia kirghizica* Niedbała, 2006)
(=*Maerkelotritia krivolutskyi mongolica* Mahunka, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

Mesotritia Forsslund, 1963 (35 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Mesotritia testacea* Forsslund, 1963) =*Phthiracarus flagelliformis* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Mesotritia (Mesotritia) Forsslund, 1963 (32 spp.)
(=***Entomotritia*** Märkel, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Mesotritia (M.) aequalis* Liu *et* Wu, 2018
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Mesotritia (M.) atractos* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Mesotritia (M.) australis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Mesotritia (M.) bicarinata* Liu *et* Chen, 2010
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Mesotritia (M.) biramula* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mesotritia (M.) brasiliensis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Mesotritia (M.) breviseta* Niedbała *et* Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Mesotritia (M.) cozumelensis* Niedbała, 2017
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Mesotritia (M.) dissimilis* Hammer, 1977 (*M. (Entomotritia)*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Mesotritia (M.) elegantula* Starý, 1992
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Argentina).
- *Mesotritia (M.) flagelliformis* (Ewing, 1909) (*Phthiracarus*)
(=*Mesotritia testacea* Forsslund, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: Norte de Europa y Este de Paleártica oriental, y Neártica: frecuente).
- *Mesotritia (M.) glabra* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional
- *Mesotritia (M.) glabrata* (Say, 1821) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
- *Mesotritia (M.) indica* Sanyal, 1988
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Mesotritia (M.) jacoti* Niedbała, 2001
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Mesotritia (M.) maerkeli* Sheals, 1965
(=*Mesotritia clara* Starý, 1992)
(=*Mesotritia flagellata* Bayoumi *et* Mahunka, 1979)
(=*Mesotritia spinosa* Aoki, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Oriental y Méjico.
- *Mesotritia (M.) minima* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Mesotritia (M.) multisetosa* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Mesotritia (M.) nitida* Hammer, 1977 (*M. (Entomotritia)*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Mesotritia (M.) nova* Starý, 1992
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Mesotritia (M.) nuda* (Berlese, 1887) (*Tritia*)
(=*Oribotritia brachythrix* Walker, 1965)
(=*Mesotritia elastica* Sergienko, 1988)
(=*Oribotritia grandjeani* Feider *et* Suciu, 1957)
(=*Mesotritia (Entomotritia) piffli* Märkel, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Neártica: frecuente), Etiópica (Sudáfrica), Norte de Neotropical y Oriental (China suroriental).
- *Mesotritia (M.) okuyamai* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Mesotritia (M.) parabicarinata* Liu *et* Wu, 2018
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Mesotritia (M.) paraflagelliformis* Niedbała, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Mesotritia (M.) procera* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Mesotritia (M.) recursa* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico y Brasil).
- *Mesotritia (M.) ruwenzorii* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: África central.
- *Mesotritia (M.) semota* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Mesotritia (M.) serrata* Liu *et* Chen, 2010
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Mesotritia (M.) similis* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: India (Cachemira), Oriental: Tailandia, y Australiana: I. Célebes [Sulawesi].
- *Mesotritia (M.) solhoeyi* Liu, Niedbała *et* Starý, 2011
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Mesotritia (M.) virginiensis* (Jacot, 1930) (*Oribotritia*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.

Mesotritia (Perutritia) Märkel, 1964 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Perutritia amazonensis* Märkel, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mesotritia (Perutritia) amazonensis* (Märkel, 1964) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mesotritia (Perutritia) asensillata* (Ojeda, 1992) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Mesotritia (Perutritia) curviseta* (Hammer, 1961) (*Oribotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Oribotritia Jacot, 1924 (95 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: (*Hoplophora decumana* Koch *sensu* Berlese, 1883) =*Phthiracarus berlesei* Michael, 1898
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Oribotritia (Oribotritia) Jacot, 1924 (94 spp. y 1 ssp.)
(=***Berndotritia*** Mahunka, 1987)
(=***Philotritia*** Mahunka, 1988)
(=***Plesiotritia*** Walker, 1965)
(=***Tritia*** Berlese, 1883, *nom. praeoc.* por Risso, 1826)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Oribotritia (O.) africana* Starý, 1993
(=*Oribotritia bicarinata* Niedbała, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (frecuente).
- *Oribotritia (O.) afromontanensis* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribotritia (O.) alajuela* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Oribotritia (O.) allocota* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oribotritia (O.) ampla* Niedbała, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Oribotritia (O.) ampliata* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Jamaica.
- *Oribotritia (O.) anceps* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nepal y Noreste de China.
- *Oribotritia (O.) angusta* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Oribotritia (O.) aokii* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
Oribotritia (O.) asiatica Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y China suroriental.
- *Oribotritia (O.) asiatica asiatica* Hammer, 1977
(=*Oribotritia koreense* Mahunka, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y China suroriental.
- *Oribotritia (O.) asiatica norikoae* Suzuoka, 1983 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribotritia (O.) attenuata* Niedbała *et* Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Oribotritia (O.) bagnalli* (Hull, 1916) (*Phthiracarus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Oribotritia (O.) baikalica* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Oribotritia (O.) banksi* (Oudemans, 1916) (*Tritia*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (frecuente).
- *Oribotritia (O.) berlesei* (Michael, 1898) (*Phthiracarus*)
(?=*Hoplophora decumana* Koch, 1835 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Norte de Oriental.
- *Oribotritia (O.) bilaminae* Liu *et* Zhang, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribotritia (O.) bipartita* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Oribotritia (O.) brevis* Niedbała *et* Colloff, 1997
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Oribotritia (O.) breviseta* Niedbała *et* Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribotritia (O.) brevisetosa* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oribotritia (O.) bulbifer* (Mahunka, 1987) (*Berndotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Oribotritia (O.) capitanea* Niedbała *et* Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Oribotritia (O.) carolinae* Jacot, 1930
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Oribotritia (O.) cherokee* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Arkansas).
- *Oribotritia (O.) chichijimensis* Aoki, 1980
(=*Oribotritia chichijimensis ryukyuensis* Nakatamari, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Oribotritia (O.) contortula* Niedbała, 1993
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Oribotritia (O.) contraria* Niedbała, 1993
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Oribotritia (O.) corporaali* (Oudemans, 1926) (*Tritia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas).
- *Oribotritia (O.) deminuta* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribotritia (O.) didyma* Niedbała *et* Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oribotritia (O.) dipterocarpensis* Niedbała, Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2006

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Oribotritia (O.) dispar* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Oribotritia (O.) duotrisetosa* Niedbała, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Oribotritia (O.) duplex* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribotritia (O.) exilis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)
(=*Oribotritia partita* Niedbała, 2003)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oribotritia (O.) fennica* Forsslund *et* Märkel, 1963
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Euroatlántica y Japón).
- *Oribotritia (O.) geminata* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Oribotritia (O.) gigas* Bayoumi *et* Mahunka, 1979
(=*Oribotritia nepalensis* Niedbała, 2000)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica oriental.
- *Oribotritia (O.) gladiola* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribotritia (O.) grossa* Niedbała, 2017
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Oribotritia (O.) hauseri* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Oribotritia (O.) hawaiiensis* (Jacot, 1929) (*Euphthiracarus (Indotritia)*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Oribotritia (O.) henicos* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Oribotritia (O.) hermanni* Grandjean, 1967
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribotritia (O.) heterotricha* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Oribotritia (O.) hunchunensis* Liu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Oribotritia (O.) incognita* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribotritia (O.) krivolutskyi* Liu, Niedbała *et* Starý, 2011
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribotritia (O.) laselve* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oribotritia (O.) lepteces* Niedbała, Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Oribotritia (O.) magna* (Ewing, 1907) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centromeridional.
- *Oribotritia (O.) mahunkai* Niedbała *et* Starý, 2013
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribotritia (O.) mangamuka* Liu *et* Zhang, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribotritia (O.) megale* (Walker, 1965) (*Plesiotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Oribotritia (O.) multisetosa* Niedbała, 2014
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Oribotritia (O.) nasalis* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Oribotritia (O.) opipara* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Oribotritia (O.) oregonensis* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Oribotritia (O.) paraajaluela* Niedbała *et* Illig, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Oribotritia (O.) paraaokii* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribotritia (O.) paracarolinae* Niedbała, 2007
DISTRIBUCIÓN: Neártica: Canadá y U.S.A. (Washington).
- *Oribotritia (O.) parachichijimensis* Niedbała *et* Penttinen, 2007
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribotritia (O.) paracontraria* Niedbała, 2017
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribotritia (O.) paracorporaali* Niedbała *et* Penttinen, 2007
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Caledonia y Australia).
- *Oribotritia (O.) paraincognita* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribotritia (O.) paraspinosa* Mahunka, 1999
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Oribotritia (O.) pecki* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribotritia (O.) perpusilla* Niedbała *et* Starý, 2016

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribotritia (O.) pulla* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Oribotritia (O.) pumila* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Ecuador).
- *Oribotritia (O.) rafalskii* Niedbała, 1997
DISTRIBUCIÓN: Argelia.
- *Oribotritia (O.) recta* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Oribotritia (O.) samoaensis* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Oribotritia (O.) schusteri* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribotritia (O.) serrata* Feider *et* Suciu, 1958
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribotritia (O.) serrula* Niedbała *et* Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica (I. del Coco).
- *Oribotritia (O.) shikoku* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribotritia (O.) solitaria* Niedbała, 1993
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Oribotritia (O.) spinosa* (Mahunka, 1988) (*Philotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (frecurente).
- *Oribotritia (O.) storkani* Feider *et* Suciu, 1957 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oribotritia (O.) striata* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribotritia (O.) submolesta* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Norte de India) y Paleártica: India (Cachemira).
- *Oribotritia (O.) succincta* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribotritia (O.) tashkentae* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Oribotritia (O.) teberdaensis* Niedbała, 2015
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribotritia (O.) teretis* Niedbała, 1993
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribotritia (O.) tiwi* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: África oriental (frecuente).
- *Oribotritia (O.) tokukoae* Aoki, 1973
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Oribotritia (O.) trisetosa* Niedbała *et* Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Oribotritia (O.) turcica* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Oribotritia (O.) varia* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Oribotritia (O.) vicina* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Oribotritia (O.) virgulata* Niedbała, 2001
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Oribotritia (Mahuntritia) Niedbała *et* Liu, 2018 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oribotritia (Berndotritia) microsetosa* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Oribotritia (Mahuntritia) microsetosa* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009 (*O. (Berndotritia)*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Paratritia Moritz, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Paratritia baloghi* Moritz, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Paratritia baloghi* Moritz, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional e Irán).

Protoribotritia Jacot, 1938 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Protoribotritia canadaris* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Etiópica y Oriental.
- *Protoribotritia aberrans* (Märkel *et* Meyer, 1959) (*Oribotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Protoribotritia africana* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Protoribotritia canadaris* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Protoribotritia ensifer* Aoki, 1969 (*P. aberrans e.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Protoribotritia oligotricha* Märkel, 1963

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental (Nepal y "China").

Sabacarus Ramsay *et* Sheals, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sabacarus corneri* Ramsay *et* Sheals, 1969
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Australianooriental, Paleártica meridional y subantártica).
- *Sabacarus corneri* Ramsay *et* Sheals, 1969
(=*Sabacarus ranokaoensis* Hammer, 1970)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Australianooriental, y subantártica (I. Amsterdam).
- *Sabacarus japonicus* Shimano *et* Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Terratritia Ramsay *et* Sheals, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Terratritia askewi* Ramsay *et* Sheals, 1969
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Terratritia askewi* Ramsay *et* Sheals, 1969
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Terratritia seconda* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Euphthiracaridae Jacot, 1930 (5 gen., 1 subgen., 164 spp. y 6 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Acrotritia Jacot, 1923 (31 spp. y 5 sspp.)
(=***Rhysotritia*** Märkel *et* Meyer, 1959)
ESPECIE TIPO: *Phthiracarus americanus* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
Acrotritia ardua (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Acrotritia ardua ardua* (Koch, 1841)
(=*Hoplophora arctata* Riley, 1874)
(=*Pseudotritia ardua antetriheterodactylum* Jacot, 1933)
(=*Phthiracarus canestrinii* Michael, 1898)
(?=*Trombidium loricatum* Rathke, 1799 *sp. inq.*)
(=*Rhysotritia pinguisetosa* Bayartogtokh, 2010)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente).
- *Acrotritia ardua americana* (Ewing, 1909) (*Phthiracarus am.*)
(=*Rhysotritia ardua affinis* Sergienko, 1989)
(=*Rhysotritia corletti* Mahunka, 2000)
(=*Rhysotritia dinota* Niedbała *et* Schatz, 1996)
(=*Rhysotritia hauseri* Mahunka, 1991)
(=*Tritia lentula hyeroglyphica* Berlese, 1916)
(=*Acrotritia munita* Niedbała, 2006)
(=*Acrotritia paraardua* Niedbała *et* Starý, 2014)
(=*Phthiracarus pectinatus* Ewing, 1917)
(=*Acrotritia sinensis triheterodactylis* Jacot, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).
- *Acrotritia ardua diaphoros* (Niedbała, 2002) (*Rhysotritia d.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.
- *Acrotritia bipartita* (Niedbała, 2000) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Acrotritia brasiliana* (Mahunka, 1983) (*Rhysotritia*)
(=*Rhysotritia sterigma* Niedbała, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Neotropical, Oriental, Etiópica (I. Reunión) y Australiana: Polinesia (Tahití) y Australia, y subantártica (I. Amsterdam).
- *Acrotritia colombiana* Liu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Acrotritia cunangra* Liu *et* Zhang, 2014
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Acrotritia curticephala* (Jacot, 1938) (*Pseudotritia ardua c.*)
(=*Rhysotritia ardua otaheitensis* Hammer, 1972)
(=*Rhysotritia clavata* Märkel, 1964)
(=*Rhysotritia clavata sextiana* Lions, 1966)
(=*Acrotritia closteros* Niedbała, 2006)
(=*Rhysotritia lucida* Niedbała, 1998)
(=*Rhysotritia riezuae* Moreno *et* Moraza, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica) (en Etiópica: Guinea Ecuatorial): frecuente.
Acrotritia dikra (Niedbała *et* Schatz, 1996) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, U.S.A. oriental y Camerún.
- *Acrotritia dikra dikra* (Niedbała *et* Schatz, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y U.S.A. oriental.
- *Acrotritia dikra furca* Niedbała *et* Starý, 2014 (*A. f.*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Acrotritia divida* (Mahunka, 1991) (*Rhysotritia*)
(=*Rhysotritia refracta* Niedbała, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (en Etiópica: Madagascar).
- *Acrotritia dixa* (Niedbała *et* Schatz, 1996) (*Rhysotritia*)

(=*Acrotritia parabrasiliana* Niedbała *et* Illig, 2007)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Acrotritia duplicata* (Grandjean, 1953) (*Pseudotritia*)
(=*Rhysotritia duplicata limbata* Märkel *et* Meyer, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente), Oriental (Vietnam y Nepal) y Neotropical (Méjico).
- *Acrotritia ejuncida* (Niedbała *et* Schatz, 1996) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acrotritia furcata* (Bayoumi *et* Mahunka, 1979) (*Rhysotritia*)
(=*Rhysotritia koreensis* Mahunka, 1997)
(=*Rhysotritia penicillata* Mahunka, 1982, *nom. praeoc.* por Pérez-Íñigo, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Este de Paleártica oriental meridional.
- *Acrotritia gracile* (Niedbała, 2000) (*Rhysotritia*)
(=*Rhysotritia bacula* Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Norte de India, China (Tíbet) y Méjico.
- *Acrotritia granulata* (Mahunka, 1999) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Acrotritia hallasanensis* (Niedbała, 2002) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Acrotritia meristos* (Niedbała, 2003) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Acrotritia neotropicalis* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1993) (*Rhysotritia ardua n.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil y Portugal.
- *Acrotritia ornata* (Niedbała, 2002) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia) y Méjico.
- *Acrotritia paradikra* Niedbała *et* Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Acrotritia paradivida* Niedbała *et* Penttinen, 2007
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Acrotritia paragranulata* Niedbała, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Acrotritia parallelos* (Niedbała, 2003) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acrotritia paraspiculifera* Niedbała, 2012
(=*Acrotritia proxima* Niedbała, 2013)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam y Australia.
- *Acrotritia penicillata* (Pérez-Íñigo, 1969) (*Rhysotritia ardua p.*)
(=*Acrotritia pirovaci* Niedbała, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Acrotritia peruensis* (Hammer, 1961) (*Oribotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente) e India.
- *Acrotritia quasidivida* Niedbała *et* Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Acrotritia reticulata* (Mahunka, 1988) (*Rhysotritia*)
(=*Rhysotritia parareticulata* Niedbała, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Canadá.
- *Acrotritia rhopalota* Niedbała *et* Illig, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Acrotritia rustica* (Niedbała, 1991) (*Rhysotritia*)
(=*Acrotritia mahunkai* Niedbała y Liu, 2018)
(=*Rhysotritia monodactyla* Niedbała, 2002)
(=*Rhysotritia simile* Mahunka, 1982, *nom. praeoc.* por Sellnick, 1923)
(=*Rhysotritia wallworki* Lee, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (en Australiana: Australia y Nueva Guinea) y Paleártica meridional (Turquía y Este de Paleártica oriental).
- *Acrotritia scotti* (Walker, 1965) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Acrotritia similis* (Sellnick, 1923) (*Tritia (Pseudotritia)*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Acrotritia sinensis* Jacot, 1923
(=*Rhysotritia aokii* Niedbała, 2000)
(=*Rhysotritia ardua jinyunia* Li *et* H. Chen, 1990)
(=*Rhysotritia clavata spiculifera* Mahunka, 1991)
(=*Rhysotritia rasile* Mahunka, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Acrotritia vestita* (Berlese, 1913) (*Hoploderma*)
(=*Rhysotritia anchiseta* Niedbała, 1998)
(=*Rhysotritia bifurcata* Niedbała, 1993)
(=*Rhysotritia comteae* Mahunka, 1983)
(=*Rhysotritia ischnos* Niedbała, 2004)
(=*Rhysotritia niedbalai* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
(=*Acrotritia tibetensis* Liu *et* Chen, 2015)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente), Paleártica oriental meridional y Canadá.

Bukitritia Mahunka, 1990 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Bukitritia timah* Mahunka, 1990
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Bukitritia timah* Mahunka, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya y Madagascar.

Euphthiracarus Ewing, 1917 (100 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Phthiracarus flavus* Ewing, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Euphthiracarus (Euphthiracarus) Ewing, 1917 (85 spp. y 2 sspp.)
(=***Brasiliotritia*** Märkel, 1964)
(?=***Hummelia*** Oudemans, 1916 *gen. inq.*)
(=***Niedbalaia*** Mahunka, 1999)
(=***Parapocsia*** Niedbała, 2014)
(=***Pseudotritia*** Willmann, 1919)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Euphthiracarus (E.) aequalis* Liu, Wu *et* Chen, 2011
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Tibet.
- *Euphthiracarus (E.) aggenitalis* Aoki, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Euphthiracarus (E.) alazon* Walker, 1965
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Euphthiracarus (E.) antipai* Feider *et* Călugăr, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Euphthiracarus (E.) arilloi* Subías, 2009
  (=*Euphthiracarus reticulatus* Niedbała, 2004, *nom. praeoc.* por Berlese, 1913)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Euphthiracarus (E.) bhutanicus* Reddy, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Bután.
- *Euphthiracarus (E.) bombuscaroensis* Niedbała *et* Illig, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Euphthiracarus (E.) brasiliensis* Märkel, 1964 (*E. (Brasiliotritia)*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (E.) breviculus* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico y Ecuador).
- *Euphthiracarus (E.) carinatus* Liu, Wu *et* Chen, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Nepal).
- *Euphthiracarus (E.) cathayanus* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Euphthiracarus (E.) cernuus* Walker, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Euphthiracarus (E.) clavatus* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Euphthiracarus (E.) comteae* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Euphthiracarus (E.) cooki* Norton, Sanders *et* Minor, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Euphthiracarus (E.) crassisetae* Jacot, 1938
  (=*Euphthiracarus polytretos* Walker, 1965)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.

Euphthiracarus (E.) cribrarius (Berlese, 1904) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Oriental.

- *Euphthiracarus (E.) cribrarius cribrarius* (Berlese, 1904)
  (=*Phthiracarus punctulatus* Berlese, 1913)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Norte de Oriental.
- *Euphthiracarus (E.) cribrarius foveolatus* Aoki, 1980 (*E. f.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Euphthiracarus (E.) depressculus* Jacot, 1924
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Euphthiracarus (E.) diatropos* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (E.) dilatatus* Liu, Wu *et* Chen, 2011
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) dlouhyorum* Mahunka, 1984 (*E. (Brasiliotritia)*)
  (=*Brasiliotritia dlouhyorum sanctipauli* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1993)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Himachal Pradesh).
- *Euphthiracarus (E.) duplex* Niedbała *et* Starý, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Euphthiracarus (E.) evexus* Niedbała, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Euphthiracarus (E.) excultus* Pérez-Íñigo, 1987
  DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Euphthiracarus (E.) flagellatus* Liu, Wu *et* Chen, 2011
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) flavus* (Ewing, 1908) (*Phthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Euphthiracarus (E.) fulvus* (Ewing, 1909) (*Phthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (menos frecuente en el Sur).

- *Euphthiracarus (E.) fusticulus* Niedbała *et* Schatz, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica (I. del Coco).
- *Euphthiracarus (E.) fusulus* Niedbała, 2001
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Oeste).
- *Euphthiracarus (E.) heterosetosus* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Panamá.
- *Euphthiracarus (E.) humeralis* Norton *et* Metz, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Euphthiracarus (E.) incredibilis* (Mahunka, 1999) (*Niedbalaia*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Euphthiracarus (E.) inglisi* Sheals, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Euphthiracarus (E.) karpellesi* (Oudemans, 1916) (*Hummelia*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Euphthiracarus (E.) klabati* Niedbała, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo) y Australiana (I. Célebes [Sulawesi]).
- *Euphthiracarus (E.) labyrinthicus* Starý, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Euphthiracarus (E.) lanceolatus* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Ecuador y Brasil).
- *Euphthiracarus (E.) longirostralis* Walker, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (Oeste de U.S.A. y Canadá).
- *Euphthiracarus (E.) longisetus* Liu, Wu *et* Chen, 2011
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) longulus* Liu, Wu *et* Chen, 2011
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) macrorostralis* Liu, Wu *et* Chen, 2012
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) medius* (Niedbała, 2014) (*Parapocsia*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Euphthiracarus (E.) medogensis* Liu, Wu *et* Chen, 2012
  DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Euphthiracarus (E.) minimus* Liu, Wu *et* Chen, 2012
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) modicus* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Honduras y Brasil).
- *Euphthiracarus (E.) monodactylus* (Willmann, 1919) (*Tritia (Pseudotritia)*)
  (=*Tritia aequipunctata* Berlese, 1923)
  (=*Euphthiracarus mixtus* Mahunka, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Irán y Neártica: excepto Sur) y Nueva Guinea.
- *Euphthiracarus (E.) monyx* Walker, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Euphthiracarus (E.) nasalis* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Euphthiracarus (E.) nasutus* Niedbała, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Euphthiracarus (E.) netron* Niedbała *et* Starý, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Euphthiracarus (E.) novosibiricus* Niedbała, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Rusia asiática meridional.
- *Euphthiracarus (E.) oblongus* Liu, Wu *et* Chen, 2012
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) ornatus* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Euphthiracarus (E.) pakistanensis* Hammer, 1977
  (=*Euphthiracarus meghalayensis* Sanyal, 1988)
  DISTRIBUCIÓN: Himalaya y Paleártica oriental meridional.
- *Euphthiracarus (E.) parabrasiliensis* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (E.) parafusulus* Niedbała, 2002
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Euphthiracarus (E.) paranetron* Niedbała *et* Starý, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Euphthiracarus (E.) paraoblongus* Liu, 2017
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) parareticulatus* Niedbała, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Euphthiracarus (E.) parasimilis* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Euphthiracarus (E.) paravesciculus* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Euphthiracarus (E.) pedanos* Niedbała, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Euphthiracarus (E.) protrusus* Liu, Wu *et* Chen, 2012
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Euphthiracarus (E.) pulchrum* Jacot, 1930 (*E. flavum p.*)
(=*Euphthiracarus pulchrum pisgahi* Jacot, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Neártica centrooriental (frecuente).
- *Euphthiracarus (E.) punctulatus* Jacot, 1930
(no *Phthiracarus punctulatus* Berlese, 1913, =*Euphthiracarus cribrarius*)
(=*Euphthiracarus jacoti* Niedbała *et* Liu, 2018)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Euphthiracarus (E.) quasitakahashii* Niedbała, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Euphthiracarus (E.) razdolnicus* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Euphthiracarus (E.) rectus* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Euphthiracarus (E.) reticulatus (Berlese, 1913) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte).
- *Euphthiracarus (E.) reticulatus reticulatus* (Berlese, 1913)
(=*Pseudotritia intermedia* Feider *et* Suciu, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Euphthiracarus (E.) reticulatus alpinus* Märkel, 1964
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Rusia asiática).

- *Euphthiracarus (E.) scuticus* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Euphthiracarus (E.) serangos* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Euphthiracarus (E.) shogranensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Himalaya y Paleártica oriental meridional.
- *Euphthiracarus (E.) sikhotealinicus* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Euphthiracarus (E.) singularis* Liu, 2017
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) spinus* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Euphthiracarus (E.) subcedrus* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Rusia asiática meridional.
- *Euphthiracarus (E.) suputincus* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Euphthiracarus (E.) takahashii* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Euphthiracarus (E.) tanythrix* Walker, 1965
(=*Euphthiracarus tanythrix sierriensis* Walker, 1965)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California y Ténesi) y Este de Canadá.
- *Euphthiracarus (E.) tesselatus* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Euphthiracarus (E.) truncatus* Liu, Wu *et* Chen, 2012
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) tumidus* Niedbała, 2003
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Euphthiracarus (E.) vesciculus* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Honduras.
- *Euphthiracarus (E.) vicinus* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Dakota del Sur).
- *Euphthiracarus (E.) vietnamicus* Starý, 1993
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Euphthiracarus (E.) virgatus* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misisipí).

Euphthiracarus (Pocsia) Mahunka, 1983 (19 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pocsia africana* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Euphthiracarus (Pocsia) africanus* (Mahunka, 1983) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) bicarinatus* (Starý, 1991) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Euphthiracarus (Pocsia) disparilis* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Euphthiracarus (Pocsia) dubius* (Niedbała *et* Schatz, 1996) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Euphthiracarus (Pocsia) heterotrichus* (Mahunka, 1988) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Euphthiracarus (Pocsia) inaequatus* Niedbała, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Euphthiracarus (Pocsia) inopinatus* (Niedbała, 1993) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Euphthiracarus (Pocsia) insolitus* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Euphthiracarus (Pocsia) insperatus* Niedbała, 2020

DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Euphthiracarus (Pocsia) kunsti* (Starý, 1988) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) microseta* (Starý, 1993) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Euphthiracarus (Pocsia) paraafricanus* Niedbała *et* Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) paradisparilis* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (Pocsia) parakunsti* Niedbała, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) sarawaki* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Sumatra).
- *Euphthiracarus (Pocsia) secundus* (Mahunka, 1983) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) sudamericanus* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (Pocsia) trentus* (Mahunka, 1983) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) uluguruensis* Niedbała *et* Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Microtritia Märkel, 1964 (22 spp.)
ESPECIE TIPO: *Phthiracarus minimus* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Microtritia bicarinata* Liu *et* Chen, 2014
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Microtritia contraria* Niedbała, 1993
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Microtritia cristata* Niedbała, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Microtritia diaphoros* Niedbała *et* Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtritia fissurata* Märkel, 1968
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Este).
- *Microtritia fusa* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Microtritia glabrata* Niedbała, 1993
(=*Microtritia novazealandiensis* Niedbała, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Microtritia hauseri* Mahunka, 1993
(=*Microtritia altissima* Mahunka, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Microtritia hawaiiensis* Niedbała, 1994
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Microtritia incisa* Märkel, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Microtritia minima* (Berlese, 1904) (*Phthiracarus*)
(=*Tritia (Pseudotritia) minuta* Willmann, 1919)
(=*Microtritia xilofila* Subías, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, Neártica oriental, Oriental, Australiana: Hawái, y Norte de Neotropical).
- *Microtritia mirifica* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Microtritia neonominata* Subías, 2004
(=*Microtritia glabrata* Starý, 1993, *nom. praeoc.* por Niedbała, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Microtritia parahauseri* Niedbała *et* Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtritia paranovazealandiensis* Niedbała, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Microtritia paratropica* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Microtritia pinarensis* Niedbała *et* Starý, 2010
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Microtritia schusteri* Märkel, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Microtritia simplex* (Jacot, 1930) (*Pseudotritia*)
(=*Rhysotritia paeneminima* Walker, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente) y Norte de Neotropical.
- *Microtritia striata* Liu *et* Zhang, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Microtritia striatissima* Mahunka, 1999
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Microtritia tropica* Märkel, 1964
(=*Microtritia ethiopica* Mahunka, 1988)

(=*Microtritia tropica dusan* Ramsay *et* Sheals, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica (Japón y "Polonia").
- *Microtritia tumida* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).

Sumatrotritia Mahunka, 1989 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sumatrotritia inusitata* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Sumatrotritia elegans* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Sumatrotritia inusitata* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra e India: Arunachal Pradesh).
- *Sumatrotritia murphyi* Mahunka, 1999
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Synichotritiidae Walker, 1965 (4 gen. y 17 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y subtropical (Holártica meridional).

Apotritia Norton *et* Lions, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Apotritia walkeri* Norton *et* Lions, 1992
DISTRIBUCIÓN: Neártica meridional.
- *Apotritia walkeri* Norton *et* Lions, 1992
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.

Sabahtritia Mahunka, 1987 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sabahtritia hauseri* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Sabahtritia dongnaiensis* Niedbała, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Sabahtritia foveolata* (Hu, X. Wang *et* Aoki, 1991) (*Synichotritia*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Sabahtritia furcata* (Hu *et* X. Wang, 1992) (*Synichotritia*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Sabahtritia hauseri* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Sabahtritia lienhardi* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Sabahtritia mirabilis* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Sabahtritia sarawak* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Sabahtritia striata* Liu *et* Chen, 2009
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Sabahtritia tianmuensis* (Hu, X. Wang *et* Aoki, 1991) (*Synichotritia*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Synichotritia Walker, 1965 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Synichotritia caroli* Walker, 1965
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional.
- *Synichotritia caroli* Walker, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Nororiental).
- *Synichotritia longipila* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centromeridional.
- *Synichotritia parvipilosa* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misisipí).
- *Synichotritia reticulata* Niedbała *et* Starý, 2010
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Synichotritia spinulosa* Walker, 1965
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Neártica (excepto nororiental) y Este de Paleártica oriental.

Temburongia Mahunka, 1990 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Temburongia patoi* Mahunka, 1990
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Temburongia patoi* Mahunka, 1990
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Temburongia similanensis* Fuangarworn *et* Lekprayoon, 2011
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Phthiracaroidea Perty, 1841

Phthiracaridae Perty, 1841 (5 gen., 16 subgen., 925 spp. y 10 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Atropacarus Ewing, 1917 (55 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Hoplophora stricula* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Atropacarus (Atropacarus) Ewing, 1917 (41 spp. y 2 sspp.)
(=***Helvetacarus*** Mahunka, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Atropacarus (A.) absimilis* (Niedbała, 1982) (*Steganacarus (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Atropacarus (A.) achmedovi* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus (A.) antrosus* Niedbała, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Atropacarus (A.) bichei* Niedbała, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Atropacarus (A.) chernovae* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus (A.) ciliosus* Niedbała, 2002
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroccidental.
- *Atropacarus (A.) clavatus* Aoki, 1980 (*A. sticulus c.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón, Tailandia y Méjico.
- *Atropacarus (A.) clavigerus* (Berlese, 1904) (*Hoploderma*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus (A.) csiszarae* (Balogh *et* Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)
  (=*Phthiracarus lutulentus* Sellnick, 1920)
  (=*Steganacarus nemorosus* Gordeeva, 1991)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional (excepto Oeste).
- *Atropacarus (A.) echinodiscus* (Mahunka, 1982) (*Steganacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Grecia e Irán).
- *Atropacarus (A.) genavensis* (Mahunka, 1993) (*Helvetacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Atropacarus (A.) griseus* (Niedbała, 1984) (*Steganacarus (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Atropacarus (A.) immundus* (Niedbała, 1983) (*Steganacarus (A.)*)
  (=*Steganacarus (Atropacarus) decipiens* Niedbała, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Atropacarus (A.) inconditus* Mahunka, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Atropacarus (A.) inculpatus* (Niedbała, 1984) (*Steganacarus (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Atropacarus (A.) kremenitsai* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus (A.) longisensillus* (Liu *et* Zhang, 2013) (*Phrathicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Atropacarus (A.) maculosus* (Niedbała, 1983) (*Steganacarus (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus (A.) mirabilis* (Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus (A.) multisetosus* Niedbała, 2002
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Atropacarus (A.) murciensis* Niedbała, 1986
  DISTRIBUCIÓN: España.

Atropacarus (A.) obesus (Niedbała, 1983) (*Steganacarus (A.)*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus (A.) obesus obesus* (Niedbała, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus (A.) obesus minimus* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y España).

- *Atropacarus (A.) ochraceus* (Niedbała, 1983) (*Steganacarus (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Atropacarus (A.) papillatus* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Marruecos y Cáucaso).
- *Atropacarus (A.) paraclavatus* Niedbała, 2002
  DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.
- *Atropacarus (A.) paraclavigerus* Niedbała *et* Starý, 2015
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Atropacarus (A.) parainsularis* Niedbała *et* Starý, 2011
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Atropacarus (A.) paraserratus* Niedbała, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Atropacarus (A.) parastriculus* Niedbała *et* Starý, 2011
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Atropacarus (A.) parvulus* (Niedbała, 1983) (*Steganacarus (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Atropacarus (A.) perversus* (Niedbała, 1983) (*Steganacarus (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Este de Rusia asiática).
- *Atropacarus (A.) phyllophorus* (Berlese, 1904) (*Hoploderma*)
  (=*Steganacarus ropalus* Feider *et* Suciu, 1957)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional y Vietnam.

- *Atropacarus (A.) platakisi* (Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus (A.) plumatus* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Atropacarus (A.) punctulatus* Moraza, 1985
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Atropacarus (A.) serratus* (Feider *et* Suciu, 1957) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
Atropacarus (A.) striculus (Koch, 1835) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, Norte de Neotropical, Australiana y Madagascar).
- *Atropacarus (A.) striculus striculus* (Koch, 1835)
(=*Steganacarus diaphanus* Jacot, 1930)
(=*Steganacarus senex* Aoki, 1958)
(=*Steganacarus trichosus* Mahunka, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Oriental, Norte de Neotropical, Australiana y Madagascar).
- *Atropacarus (A.) striculus insularis* (Weigmann, 1976) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Atropacarus (A.) substrictus* (Niedbała, 1983) (*Steganacarus (A.)*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus (A.) terrapene* (Jacot, 1937) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Atropacarus (A.) wandae* (Niedbała, 1981) (*Steganacarus*)
(=*Steganacarus navarrensis* Moraza, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Atropacarus (A.) yarovenkoi* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Atropacarus (Rafacarus) Niedbała, 1981 (14 spp.)
(=***Neosteganacarus*** Balogh *et* Mahunka, 1992)
(=***Nortonacarus*** Balogh *et* Mahunka, 1992)
ESPECIE TIPO: *Rafacarus rafalskii* Niedbała, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australiana.
- *Atropacarus (Rafacarus) angulatus* (Balogh *et* Mahunka, 1992) (*Neosteganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) aspergillus* Niedbała, 2004 (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) fecundus* Niedbała, 2004 (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) hikurangi* (Liu *et* Zhang, 2013) (*Phrathicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Atropacarus (Rafacarus) niedbalai* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) niedbalai* Liu *et* Zhang, 2013 (*A.*)
(*nom. praeoc.* por Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Atropacarus (Rafacarus) paradoxus* Niedbała, 2004 (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) pararafalskii* Niedbała, 2004 (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) phasganus* Niedbała, 2004 (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) rafalskii* (Niedbała, 1981) (*R.*)
(=*Neosteganacarus cataracta* Balogh *et* Mahunka, 1992)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) relictus* (Balogh *et* Mahunka, 1992) (*Neosteganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) sculptilis* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) tumidus* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Atropacarus (Rafacarus) valerieae* (Balogh *et* Mahunka, 1992) (*Nortonacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Hoplophorella Berlese, 1923 (206 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hoploderma cucullatum* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Hoplophorella (Hoplophorella) Berlese, 1923 (122 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Hoplophorella (H.) alius* (Niedbała, 2019) (*Arphthicarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 2018)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) amus* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costra Rica.
- *Hoplophorella (H.) andrei* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
(=*Hoplophorella lienhardi* Mahunka, 1987)

(=*Atropacarus (Hoplophorella) nigeriensis* Badejo, Woas *et* Beck, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y Macaronésica.
- *Hoplophorella (H.) angolensis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Hoplophorella (H.) anosculpturata* (Mahunka, 1987) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hoplophorella (H.) armata* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) baloghi* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) berninii* (Niedbała, 1991) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) brachys* (Niedbała, 2004) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) brasiliensis* (Niedbała, 1988) (*Austrophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) brevipilis* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental y Cáucaso.
- *Hoplophorella (H.) buffaloensis* (Niedbała, 2006) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) calotropica* (Haq *et* Xavier, 2005) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophorella (H.) catalauca* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: La Española (R. Dominicana).
- *Hoplophorella (H.) caverna* (Niedbała, 2012) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Hoplophorella (H.) chaliyamensis* (Haq *et* Xavier, 2005) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophorella (H.) clavata* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costra Rica.
- *Hoplophorella (H.) clavifer* Mahunka *et* Mahuka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hoplophorella (H.) claviger* (Niedbała, 1993) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Hoplophorella (H.) collaris* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Hoplophorella (H.) contigua* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) crenula* (Haq *et* Xavier, 2005) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophorella (H.) crinata* (Niedbała, 2006) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophorella (H.) cucullata* (Ewing, 1909) (*Hoploderma*)
(=*Hoplophorella cucullata cuculloides* Jacot, 1933)
(=*Hoploderma licnophorum* Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente), subtropical (frecuente) y Canadá.
- *Hoplophorella (H.) curtisetosa* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) dandenongensis* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) diamphidios* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) diaphoros* (Niedbała, 2000) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) diatropos* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (H.) digna* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (H.) dissimilis* (Niedbała, 1998) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Hoplophorella (H.) distincta* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (H.) diversisetosa* Subías, 2010
(=*Notophthiracarus buffaloensis* Niedbała, 2006, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) dubia* (Niedbała, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) engelbrechti* (Niedbała, 2006) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophorella (H.) ensifera* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Hoplophorella (H.) evergladus* (Niedbała, 2001) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Hoplophorella (H.) exacuta* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Hoplophorella (H.) finitima* (Niedbała, 2002) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Hoplophorella (H.) foaensis* (Niedbała *et* Penttinen, 2007) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophorella (H.) fonseciai* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980) (*Steganacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) frondeus* (Niedbała, 2003) (*Atropacarus (H.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) furcata* (Niedbała *et* Corpuz-Raros, 1998) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hoplophorella (H.) fusula* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Brasil).
- *Hoplophorella (H.) gibba* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (H.) grandjeani* Niedbała, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) gyros* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Guyana [Guayana Británica].
- *Hoplophorella (H.) hamata* (Ewing, 1909) (*Hoploderma*)
  (=*Hoplophorella cochlearia* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1993)
  (=*Hoplophorella cucullata curassensis* Willmann, 1936)
  (=*Hoplophorella cucullata floridae* Jacot, 1933)
  (=*Phthiracarus (Hoplophorella) cucullatus obsoletior* Berlese, 1923)
  (=*Hoplophorella cuneiseta* Mahunka, 1988)
  (=*Hoplophorella glauca* Hammer, 1972)
  (=*Hoplophorella ligulifera* Mahunka, 1987)
  (=*Hoplophorella pallens* Niedbała, 1983)
  (=*Hoplophorella schauenbergi* Mahunka, 1978)
  (=*Hoplophorella spatulata* Parry, 1980)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Hoplophorella (H.) hamidi* (Mahunka, 1987) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hoplophorella (H.) heteropilosa* (Niedbała, 2003) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Hoplophorella (H.) heterosetosa* (Niedbała, 2003) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) inaequa* (Niedbała, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (H.) indica* (Bayoumi *et* Mahunka, 1979) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Bután.
- *Hoplophorella (H.) inelegans* (Niedbała, 1986) (*Hoplophthiracarus*)
  (=*Hoplophthiracarus atypicus* Mahunka, 1988)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica (Malgache).
- *Hoplophorella (H.) inepta* (Niedbała, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica: India (Cachemira), y Melanesia (I. Salomón).
- *Hoplophorella (H.) inflata* (Liu *et* Chen, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophorella (H.) insolens* Niedbała, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Hoplophorella (H.) iubata* (Niedbała, 2003) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) janosbaloghi* (Subías, 2010) (*Notophthiracarus*)
  (=*Notophthiracarus baloghi* Niedbała, 2004, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) korupensis* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (H.) kulczynskii* Niedbała, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) kyphos* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Hoplophorella (H.) lacunosa* (Niedbała, 2008) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Hoplophorella (H.) lanceoseta* (Balogh *et* Mahunka, 1981) (*Steganacarus*)
  (=*Hoplophorella neglecta* Niedbała, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) lanceosetoides* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) leei* (Niedbała, 1987) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) mahunkai* (Niedbała *et* Starý, 2013) (*Atropacarus (H.)*)
  (=*Atropacarus (Hoplophorella) othneios* Niedbała *et* Starý, 2014)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (H.) mayottei* (Niedbała, 2001) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Hoplophorella (H.) miranda* (Niedbała, 1988) (*Calyptophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophorella (H.) miranda* (Niedbała, 1988) (*Austrophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) neonominata* Subías, 2004
(=*Protophthiracarus cavernosus* Niedbała, 2002, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Arizona).
- *Hoplophorella (H.) notata* (Niedbała, 2001) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Gabón.
- *Hoplophorella (H.) oblonga* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Madagascar).
- *Hoplophorella (H.) ocula* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) oidematos* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) onkos* (Niedbała, 2017) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) otwayensis* (Niedbała, 2017) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) pachetos* (Niedbała, 2008) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophorella (H.) paraensis* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) paratripartita* (Niedbała, 2015) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) pardinus* (Berlese, 1916) (*Hoploderma*)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Hoplophorella (H.) perisi* Subías *et* Sarkar, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Hoplophorella (H.) permirus* (Niedbała, 1991) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) pervalida* (Niedbała, 2003) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) pervicax* (Niedbała, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Hoplophorella (H.) phymatos* (Niedbała, 2004) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) pinarensis* (Niedbała, 2009) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) praeoccupata* Subías, 2004 (*H. (Kakophthiracarus)*)
(=*Atropacarus (Hoplophorella) tuberosus* Niedbała *et* Schatz, 1996, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) preptos* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (H.) procera* (Niedbała, 2001) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (H.) prodorsocristata* Subías, 2010
(=*Arphthicarus frondeus* Niedbała, 2004, *nom. praeoc.* por Niedbala, 2003)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) prominens* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Angola).
- *Hoplophorella (H.) rangiroaensis* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Hoplophorella (H.) remigera* (Berlese, 1923) (*Phthiracarus (Trachyhoplophora)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Hoplophorella (H.) repetita* Subías, 2004
(=*Protophthiracarus reductus* Niedbała, 1991, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) reticulata* (Haq *et* Xavier, 2005) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophorella (H.) ruseki* (Niedbała, 2009) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) sabahna* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophorella (H.) sacyae* (Mahunka, 1983) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) sarawaki* (Niedbała, 2000) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Sumatra).
- *Hoplophorella (H.) schatzi* (Niedbała, 1989) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Hoplophorella (H.) singularis* Sellnick, 1959
(=*Hoplophthiracarus marianus* Aoki, 1994)
(=*Hoplophorella queenslandica* Balogh *et* Mahunka, 1978)
(=*Hoplophthiracarus regalis* Mahunka, 1978)
(=*Hoplophorella sundarbanensis* Sanyal *et* Bhaduri, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y "Polonia".

- *Hoplophorella (H.) sororia* (Niedbała, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) stilifera* (Hammer, 1961) (*Steganacarus*)
  (=*Hoplophorella benoiti* Mahunka, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Hoplophorella (H.) stricta* (Niedbała, 2017) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Hoplophorella (H.) subciliata* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) subita* Niedbała, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hoplophorella (H.) subsellata* Balogh *et* Mahunka, 1977
  (=*Steganacarus galeatus* Balogh *et* Mahunka, 1978)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) szeptyckii* (Niedbała, 2009) (*Atropacarus (H.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) texana* (Niedbała, 2002) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Hoplophorella (H.) tripartita* (Niedbała *et* Schatz, 1996) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Belice.
- *Hoplophorella (H.) trisulca* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) turianiensis* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) unqus* (Niedbała, 1991) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophorella (H.) varablancus* (Niedbała, 2006) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Hoplophorella (H.) varia* (Niedbała *et* Schatz, 1996) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) varians* Jacot, 1933
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) venusta* Niedbała, 1983
  DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Hoplophorella (H.) vitrina* (Berlese, 1913) (*Hoploderma*)
  (=*Hoplophorella africana* Wallwork, 1967)
  (=*Hoplophorella raychaudhurii* Subías *et* Sarkar, 1984)
  (=*Hoplophorella scapellata* Aoki, 1965)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Hoplophorella (H.) zeukta* (Niedbała, 2003) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Hoplophorella (Kakophthiracarus) Mahunka, 1992 (20 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Hoplophorella tuberosa* Mahunka, 1988) =*Steganacarus tuberculosissimus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) aethes* (Niedbała, 2009) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) balazsi* Mahunka, 1983 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) brevipilosa* (Niedbała, 2004) (*Atropacarus (H.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) brevisetosa* (Niedbała, 2006) (*Atropacarus (H.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) clavatosensillus* (Subías, 2010) (*Notophthiracarus*)
  (=*Arphthicarus baloghi* Niedbała, 2004, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) cuculla* (Niedbała, 2012) (*Steganacarus (Rhacaplacarus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) ephippiger* (Balogh *et* Mahunka, 1978) (*Steganacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) jacoti* (Niedbała, 1987) (*Steganacarus (Rhacaplacarus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Guinea).
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) lemuria* Mahunka, 1993 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) manipurensis* Misra, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1983 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) minima* (Liu *et* Chen, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
  DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) minisetosa* Mahunka, 1978 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica oriental (Malgache y Malawi).
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) multirugosa* (Mahunka, 1978) (*Steganacarus*)
  (=*Steganacarus cornutus* Mahunka, 1978)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) mwali* (Mahunka, 1994) (*K.*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) paralemuria* (Niedbała *et* Starý, 2016) (*Atropacarus (H.)*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) parastenos* (Niedbała *et* Starý, 2016) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) paratuberculosissimus* (Niedbała, 2019) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) pustulata* Mahunka, 1993 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) rafalskii* (Niedbała, 1997) (*Notophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) spiniger* Aoki, 1980 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) spinus* (Niedbała, 2014) (*Steganacarus (Rhacaplacarus)*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) stenos* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) tuberculosissima* (Mahunka, 1978) (*Steganacarus*)
(=*Hoplophorella horrida* Mahunka, 1984)
(=*Hoplophorella meszarosi* Mahunka, 1988)
(=*Hoplophorella tuberosa* Mahunka, 1988)
(=*Hoplophorella verrucosa* Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Hoplophorella (Mantigueracarus) Balogh *et* Mahunka, 1992 (12 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mantigueracarus baggioi* Balogh *et* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) aduncata* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) baggioi* (Balogh *et* Mahunka, 1992) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) brasiliensis* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) evexa* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) fusticula* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) gladia* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) incredibilis* (Niedbała, 1982) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) multipilosa* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) perezinigoi* (Balogh *et* Mahunka, 1992) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) quaternaria* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) sedecima* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Bolivia).
- *Hoplophorella (Mantigueracarus) stenodes* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).

Hoplophorella (Rhacaplacarus) Niedbała, 1986 (56 spp.)
(=***Plonaphacarus*** Niedbała, 1986)
ESPECIE TIPO: *Hoplophorella amoena* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) alius* (Niedbała, 2018) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) ambigua* (Niedbała, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) amoena* Niedbała, 1983 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) breviseta* (Mahunka, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) diaphoros* (Niedbała, 2000) (*Steganacarus (R.)*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 2000)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) dikros* (Niedbała, 2000) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) discrepus* (Niedbała, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) diutissimus* (Niedbała, 2018) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) ecphyla* (Niedbała, 2001) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: África orientral.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) eximia* (Niedbała, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
(=*Steganacarus politus* Mahunka, 1983)

DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) frater* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) granulata* (Banks, 1902) (*Hoploderma*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) hamula* (Niedbała, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) hulli* (Niedbała, 1987) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) inflata* (Niedbała, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: África central.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) kaluzi* (Niedbała, 2013) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) kaszabi* (P. Balogh, 1988) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) kumboensis* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) laetabilis* Niedbała, 1988 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) laterospinosa* (Mahunka, 1993) (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) longipilosa* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) longisetosa* (Niedbała, 2019) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) longqiensis* (Liu, 2015) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) machadoi* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (frecuente).
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) mallacoolaensis* (Niedbała, 2006) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) martensi* (Niedbała, 2014) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) mekistos* (Niedbała, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) montigena* (Niedbała, 1981) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) ngongi* (Niedbała, 2001) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) olszanowskii* (Niedbała, 2020) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) optiva* (Niedbała, 1994) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) ortizi* (Pérez-Íñigo, 1970) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) pakistanensis* (Hammer, 1977) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya y Vietnam.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) parafrater* (Niedbała, 2012) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) pervigens* Niedbała, 1988 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) pseudosomalica* (Mahunka, 2010) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) pugionis* (Niedbała, 2018) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) punctata* (Mondal *et* Kundu, 1988) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) rafalskii* (Niedbała, 1997) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (India: Bengala Occidental, y Borneo).
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) reticularis* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) reticulata* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Hoplophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Haq *et* Xavier, 2005)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) rybalovi* (Niedbała, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) sculptilis* (Niedbała, 1988) (*Hoplophthiracarus*)
(=*Hoplophthiracarus magnus* Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) semiaciculata* (Mahunka, 2008) (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Península Malaya).
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) sidorchukae* (Niedbała, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) somalica* (Berlese, 1923) (*Phthiracarus (Trachyhoplophora)*)
(=*Plonaphacarus persimilis* Niedbała, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Somalia y Madagascar).

- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) spina* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) spinata* (Niedbała, 2001) (*Steganacarus (R.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) spinifera* (Mahunka, 1993) (*R.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) styphelos* (Niedbała, 2001) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) succincta* (Niedbała, 2001) (*Steganacarus (R.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) szeptyckii* (Niedbała, 2009) (*Steganacarus (R.)*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 2009)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) tanzica* (Mahunka, 1993) (*Hoplophthiracarus (Plonaphacarus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) thoreaui* (Jacot, 1930) (*Steganacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente).
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) walteri* (Liu *et* Zhang, 2014) (*Steganacarus (R.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (Rhacaplacarus) zicsii* (Mahunka, 1988) (*Steganacarus (R.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Hoplophthiracarus Jacot, 1933 (419 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Hoploderma histricinum* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Hoplophthiracarus (Hoplophthiracarus) Jacot, 1933 (66 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Hoplophthiracarus (H.) aduncus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hoplophthiracarus (H.) angustatus* Niedbała, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Hoplophthiracarus (H.) baculus* (Niedbała, 2003) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (H.) bengalensis* Sanyal, 1992
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Hoplophthiracarus (H.) berlesei* (Niedbała, 1987) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (H.) bicarinatus* (Liu, Wu *et* Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 2001)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) bisulcus* Niedbała, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (H.) brevispinus* Niedbała, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Hoplophthiracarus (H.) cacainus* Niedbała, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Hoplophthiracarus (H.) cazanicus* Feider *et* Călugăr, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Rumanía e I. Canarias).
- *Hoplophthiracarus (H.) chuxiongensis* (Liu, 2020) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) clavatus* Niedbała, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hoplophthiracarus (H.) clavellatus* Niedbała *et* Corpuz-Raros, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hoplophthiracarus (H.) concavus* (Liu, Wu *et* Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) concinuus* Niedbała, 1982
  (=*Hoplophthiracarus tropicus* Mondal *et* Kundu, 1988)
  DISTRIBUCIÓN: Himalaya y China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) concolor* (Sergienko, 2000) (*Calyptophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Hoplophthiracarus (H.) cristatus* (Liu, Wu *et* Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
  (*nom. praeoc.* por Aoki, 1980)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) dispar* (Niedbała, 2000) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Hoplophthiracarus (H.) foveolatus* Aoki, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental e India (Bengala Occidental).
- *Hoplophthiracarus (H.) foveolatus* (Liu, Wu *et* Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
  (*nom. praeoc.* por Aoki, 1980)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Hoplophthiracarus (H.) fujianensis* Liu, 2015
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) grossmani* Jacot, 1933 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

- *Hoplophthiracarus (H.) hainanensis* (Liu, Wu *et* Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) hamatus* (Hammer, 1973) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia, Japón, Malgache (I. Reunión) y Vietnam.
- *Hoplophthiracarus (H.) heterosetosus* (Niedbała, 2008) (*Plonaphacarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophthiracarus (H.) heterotrichosus* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Hoplophthiracarus (H.) histricinus* (Berlese, 1908) (*Hoploderma*)
(=*Phthiracarus (Trachyhoplophora) histricinus nitidior* Berlese, 1923)
(=*Phthiracarus pavidus minus* Krivolutsky, 1966)
(=*Hoplophthiracarus robustior* Jacot, 1933)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Norte) y norte de Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (H.) illinoisensis* (Ewing, 1909) (*Hoploderma*)
(=*Hoplophthiracarus paludis* Jacot, 1938)
(=*Hoplophthiracarus vanderhammeni* Niedbała, 1991)
(=*Hoploderma pavidum* Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental (Filipinas y China suroriental) y Norte de Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (H.) inoueae* Aoki, 1994
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hoplophthiracarus (H.) insignitus* (Niedbała, 1989) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hoplophthiracarus (H.) insularis* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hoplophthiracarus (H.) ishikawai* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) jianchuanensis* Liu, 2020
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) kawanoi* Aoki, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hoplophthiracarus (H.) kugohi* Aoki, 1959
(=*Hoplophthiracarus africanus* Mahunka, 1984)
(=*Hoplophthiracarus minor* Mahunka, 1991)
(=*Hoplophthiracarus rimosus* Mahunka, 1985)
(=*Hoplophthiracarus siamensis* Aoki, 1965)
(=*Hoplophthiracarus wittmeri* Bayoumi *et* Mahunka, 1979)
(=*Hoplophthiracarus (Plonaphacarus) yoshii* Mahunka, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y Paleártica meridional.
- *Hoplophthiracarus (H.) lamingtoni* Liu *et* Zhang, 2014
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (H.) lanceolatus* (Liu, Wu *et* Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) leonilae* (Niedbała, 2017) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hoplophthiracarus (H.) loebli* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Kerala) y Australiana: I. Célebes [Sulawesi].
- *Hoplophthiracarus (H.) longicarinatus* (Niedbała, 2008) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophthiracarus (H.) maritimus* (Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1996) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Hoplophthiracarus (H.) mielcareki* Niedbała, 2008
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophthiracarus (H.) mutabilis* Niedbała *et* Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Hoplophthiracarus (H.) myanmarus* (Niedbała, 2018) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Myanmar [Birmania].
- *Hoplophthiracarus (H.) nasalis* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Hoplophthiracarus (H.) nepalensis* Sheals, 1965
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Hoplophthiracarus (H.) paraconcinuus* Niedbała, 2020
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Hoplophthiracarus (H.) parafoveolatus* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Hoplophthiracarus (H.) paramachadoi* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophthiracarus (H.) paravicinus* (Niedbała, 2017) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (H.) penicillatus* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (H.) projectus* (Liu *et* Wu, 2019) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) protrusus* (Liu, Wu *et* Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).

- *Hoplophthiracarus (H.) proximus* Niedbała, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana, Oriental: Península Malaya, y Neotropical: Venezuela).
- *Hoplophthiracarus (H.) rafalskii* Niedbała, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophthiracarus (H.) rectus* (Niedbała, 2019) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophthiracarus (H.) repetitus* Subías, 2004
  (=*Hoplophthiracarus indicus* Sanyal, 1990, *nom. praeoc.* por Bayoumi *et* Mahunka, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophthiracarus (H.) rotundus* (Liu, Wu *et* Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) scrupeus* (Niedbała, 1989) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y China suroriental).
- *Hoplophthiracarus (H.) similis* Niedbała, 2000
  (*nom. praeoc.* por Balogh *et* P. Balogh, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica: India (Cachemira).
- *Hoplophthiracarus (H.) spiniformis* (Liu *et* Wu, 2019) (*Plonaphacarus*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (H.) stigmosus* Niedbała, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Borneo).
- *Hoplophthiracarus (H.) toolangiensis* (Niedbała, 2006) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (H.) trojani* (Niedbała, 2009) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (H.) vicinus* (Niedbała, 2012) (*Plonaphacarus*)
  (no *Hoplophthiracarus vicinus* Niedbała, 1984, =*Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) cretensis vicinus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (H.) vinalesensis* Niedbała, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) Balogh *et* Mahunka, 1978 (24 spp.)
(=***Antarctoplophora*** Mahunka, 1980)
(=***Fuegoplophora*** Mahunka, 1980)
ESPECIE TIPO: *Austrophthiracarus radiatus* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.

- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) aculeatus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*A.*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 1988)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) aenus* (Niedbała, 2000) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) australianicus* (Subías, 2010) (*Phthiracarus (Neophthiracarus)*)
  (=*Plonaphacarus feideri* Niedbała, 1987, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Csiszár, 1963)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) baloghi* (Niedbała, 1987) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania) y Méjico.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) curtatus* (Niedbała, 2004) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) darwini* (Mahunka, 1980) (*Antarctoplophora*)
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) excellens* (Niedbała, 1982) (*Neophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) foveoreticulatus* (Mahunka, 1980) (*Fuegoplophora*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) glennieensis* (Niedbała, 2006) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) gongylos* (Niedbała, 2004) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Chile).
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) incrassatus* (Niedbała, 1984) (*Neophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) karioi* (Liu *et* Zhang, 2014) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) largus* (Niedbała, 2000) (*A.*)
  (=*Phthiracarus (Neophthiracarus) repetitus* Subías, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) minisetosus* (Niedbała, 2004) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) multisetosus* (Balogh *et* P. Balogh, 1983) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) nimius* (Niedbała, 2009) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) paraminisetosus* (Niedbała *et* Illig, 2007) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) phaleratus* (Niedbała, 1982) (*Neophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) quasiminisetosus* (Niedbała *et* Illig, 2007) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) radiatus* (Balogh *et* Mahunka, 1978) (*A.*)
  (=*Austrophthiracarus similis* Balogh *et* P. Balogh, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: Australia y Costa Rica.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) rotundus* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) scopolii* (Niedbała, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) sellnicki* (Niedbała, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
  (=*Phthiracarus (Neophthiracarus) obsessus* Subías, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) willmanni* (Niedbała, 1987) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).

Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) Mahunka, 1985 (16 spp.)
(=***Neokakophthiracarus*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
ESPECIE TIPO: *Besuchetacarus orientalis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) abacus* (Niedbała, 2008) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) angustus* (Niedbała, 2012) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) bicarinatus* (Niedbała, 2001) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) biputeus* (Liu *et* Zhang, 2014) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) colombianus* (Liu *et* Oconnor, 2015) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) enigmaticus* (Mahunka, 1996) (*Kakophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) hauseri* (Mahunka, 1995) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) lienhardi* (Mahunka, 1996) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) orientalis* (Mahunka, 1985) (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) planus* (Mahunka, 1985) (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: India meridional.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) primus* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*Atropacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) protrusus* (Liu *et* Chen, 2013) (*Notophthiracarus*)
  (*nom. praeoc.* por Liu, Wu *et* Chen, 2011)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) quadrus* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) tamaki* (Liu *et* Zhang, 2014) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) tricarinatus* (Niedbała, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) tripartitus* (Niedbała, 1989) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) Aoki, 1980 (17 spp. y 2 sspp.)
(=***Hauserophthiracarus*** Mahunka, 1982)
(=***Phrathicarus*** Niedbała, 1994)
ESPECIE TIPO: *Calyptophthiracarus mitratus* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) bruneiensis* (Subías, 2010) (*Notophthiracarus (C.)*)
  (=*Hoplophthiracarus (Plonaphacarus) aculeatus* Mahunka, 1995, *nom. praeoc.* por Niedbała, 1988)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) bacilliformis* (Liu, 2020) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) candidulus* Niedbała, 1983 (*H.*)
  (=*Hoplophthiracarus meridionalis* Sergienko, 1992)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) comatus* (Niedbała, 2000) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) costai* Macfarlane *et* Sheals, 1965 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Israel y España) e India.

Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) cretensis Mahunka, 1979 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional e India (Maharastra).

- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) cretensis cretensis* Mahunka, 1979
  (=*Calyptophthiracarus cretensis inopinatus* Mahunka, 1991)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional e India (Maharastra).
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) cretensis vicinus* Niedbała, 1984 (*H. v.*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) filiformis* (Liu *et* Chen, 2014) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) gomerensis* (Niedbała, 2008) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) grandjeani* (Niedbała, 1987) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Melanesia: I. Fiji).
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) heterotrichus* Mahunka, 1979 (*H.*)
(=*Calyptophthiracarus canariensis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) inflatus* (Niedbała, 1994) (*Phrathicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) longisetosus* (Liu *et* Chen, 2014) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) mitratus* (Aoki, 1980) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) nitidus* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) oenipontanus* (Mahunka, 1982) (*Hauserophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) olivaceus* (Jacot, 1929) (*Phthiracarus*)
(=*Phthiracarus erinaceum* Jacot, 1930)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente).
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) filiformis* (Liu *et* Chen, 2014) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) sidorchukae* Liu *et* Zhang, 2019 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) taranaki* (Liu *et* Zhang, 2018) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) Ramsay, 1966 (200 spp. y 1 ssp.)
(=***Arphthicarus*** Niedbała, 1994)
ESPECIE TIPO: *Phthiracarus maculatus* Trägårdh, 1931
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y subantártica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) abstemius* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) aculeatus* (Niedbała, 1988) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) agulhasensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) alienus* (Niedbała, 1989) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) alienus* (Niedbała, 2017) (*Arphthicarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) allocotos* (Niedbała, 2003) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) anceps* (Niedbała, 2004) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) andamanensis* (Niedbała, 2011) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Islas Andaman).
Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) aokii Mahunka, 1983 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
  - *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) aokii aokii* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
  - *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) aokii malagasensis* (Mahunka, 2010) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) aquilus* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) araios* (Niedbała, 2001) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) ater* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) aulicis* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) australis* (Ramsay, 1966) (*N.*)
(=*Notophthiracarus caliginosus* Niedbała, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) austroafricanus* (Mahunka, 1984) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) baculus* (Liu, Wu *et* Chen, 2014) (*Arphthicarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 2003)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) bah* (Liu *et* Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) bentoni* (Niedbała, 1998) (*N.*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Pitcairn).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) bloszyki* (Niedbała, 2012) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) bonangensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) brachistos* (Niedbała, 2004) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) bulbosus* (Niedbała, 2006) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) bulbus* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) calugarae* (Niedbała, 1987) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) capevidalensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) capillatus* (Niedbała, 1989) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) carinatus* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) caudatus* (Balogh *et* Mahunka, 1977) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) caulis* (Niedbała, 2017) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) coetzeeae* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) comparativus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) consimilis* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) conspicuus* (Niedbała, 1989) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) contortulus* (Niedbała, 1992) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) contrarius* Niedbała, 1984 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Iraq.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) cordylus* (Niedbała, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) curiosus* (Niedbała, 1998) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) dactyloscopicus* Mahunka, 1978 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) dewalteri* (Liu *et* Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) diaphorillus* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) dikroos* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) dispersus* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) dugdalei* (Liu *et* Zhang, 2013) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) echinus* (Balogh, 1964) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) ecphylus* (Niedbała *et* Illig, 2007) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) elizabethiensis* (Niedbała, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) endroedyyoungai* (Mahunka, 1984) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) eparmatos* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) ethiopicus* (Niedbała, 2008) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) evexus* (Niedbała, 2000) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) extraordinarius* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) fatidicus* Niedbała, 1982 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea y Australia).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) fecundus* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda) y subantártica (Isla de Gough [Tristán de Acuña]).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) feideri* (Balogh *et* Ciszár, 1963) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) flagellatus* (Niedbała, 2004) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) flagellatus* (Liu *et* Oconnor, 2014) (*Austrophthiracarus*)

(*nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) flagrus* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) flexiloquus* (Niedbała, 1989) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) fornicarius* (Niedbała, 1982) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) fulvus* Niedbała, 1985 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) fusiformis* (Liu *et* Chen, 2013) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) fusticulus* (Niedbała, 2000) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) glennieensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) globifer* (Hammer, 1962) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) gongylos* (Niedbała, 2006) (*N.*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) grossus* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) hallidayi* (Niedbała, 2012) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) hammeni* (Niedbała, 1987) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) ignobilis* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) improvisus* (Niedbała, 1982) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) inauditus* (Niedbała, 1982) (*Phthiracarus)*
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Bolivia).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) incomparabilis* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) indiligens* Niedbała, 1984 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Malawi.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) indubitatus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) inenarrabilis* Niedbała, 1982 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: India (Cachemira).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) inusitatus* (Mahunka, 2010) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) latebrosus* Niedbała, 1982 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) latior* Niedbała, 1982 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Australiana (Hawái y Nueva Caledonia), India (Himalaya), Este de Rusia asiática y Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) lineatus* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) lineolatus* (Mahunka, 1993) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) lionsi* (Niedbała, 1987) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) liratus* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) longisetus* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) longus* (Niedbała, 2017) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) maculatus* (Trägårdh, 1931) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) mahunkai* (Niedbała, 1987) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) mahunkai* (Niedbała *et* Starý, 2013) (*Protophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) marginatus* Mahunka, 1984 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) mastigos* (Niedbała, 2004) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) matatatipu* (Liu *et* Zhang, 2013) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) maurus* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) medius* (Niedbała *et* Starý, 2016) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) mekistos* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) meristos* (Niedbała, 2004) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) michaeli* (Niedbała, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) minorae* (Niedbała, 2016) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) minusculus* (Niedbała, 2004) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Bolivia) y subantártica (Isla de Gough [Tristán de Acuña]).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) modicus* (Niedbała, 2000) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) motomuka* (Liu *et* Zhang, 2014) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) nicoleti* (Niedbała, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) niedbalai* (Subías, 2009) (*N.*)
  (=*Notophthiracarus procerus* Niedbała, 2006, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2001)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) nigerrimus* (Berlese, 1920) (*Phthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) ogmos* (Niedbała, 2004) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) olszanowskii* (Liu, 2020) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) otagoensis* (Niedbała, 2016) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pandanensis* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) papillosus* (Parry, 1979) (*Phthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paraallocotos* (Niedbała, 2006) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parabah* (Liu, 2016) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paracapillatus* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paracuriosus* (Niedbała, 1998) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paraendroedyyoungai* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paraflagellatus* (Niedbała, 2004) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parafusticulus* (Niedbała, 2006) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parapauliani* (Niedbała *et* Starý, 2016) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pararavidus* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parareductus* (Mahunka, 1992) (*N.*)
  (=*Hoplophorella reducta* Mahunka, 1988, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1986)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pararidiculus* (Niedbała, 2003) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parasaucius* (Niedbała, 2003) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paraschizocomus* (Niedbała, 2016) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parasentus* (Niedbała, 2000) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parasomalicus* (Niedbała, 2001) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parasummersi* (Niedbała, 2001) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paratinctus* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paratubulus* (Niedbała, 1991) (*Phthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parausitatus* (Niedbała, 2012) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) paravariolosus* (Niedbała, 1994) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) parilloi* (Niedbała, 2001) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pauliani* (Balogh, 1964) (*Hoplophorella*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pearcei* (Subías, 2010) (*N.*) *sp. inq.*
  (=*Hoploderma claviger* Pearce, 1906, *nom. praeoc.* por Berlese, 1904)
  DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pedanos* (Niedbała, 2003) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pedanos* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 2003)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical: La Española (R. Dominicana) y Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) perezinigoi* (Niedbała, 1987) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) perti* (Niedbała, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) phoxos* (Niedbała *et* Starý, 2016) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) plegados* (Niedbała, 2004) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) prolixus* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: La Española (R. Dominicana).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pseudotuberculatus* (Mahunka, 2008) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pullus* (Niedbała, 1989) (*Calyptophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) pumilus* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) quasisimilis* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) quasisomalicus* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) quasiuluguruensis* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) queenslandensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) quietus* (Niedbała, 1989) (*N.*)
  (=*Notophthiracarus gressitti* Balogh y Mahunka, 1997)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) rabus* (Niedbała, 2004) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) rafalskii* (Niedbała, 1997) (*Arphthicarus*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 1997)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) ramsayi* (Niedbała, 1987) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) rapax* (Berlese, 1916) (*Hoploderma*)
  DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) ravidus* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) remotus* (Niedbała, 1989) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) repostus* (Niedbała, 1989) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) rhachis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) rimi* (Liu *et* Zhang, 2014) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) rotoitiensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) salebrosus* (Niedbała, 2017) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sassafrasensis* (Niedbała, 2017) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) saucius* (Niedbała, 1988) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) schizocoma* (Hammer, 1962) (*Steganacarus*)
  (=*Notophthiracarus niger* Mahunka, 1980)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) schusteri* (Niedbała, 1987) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) scuticus* (Niedbała, 2006) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sensifus* (Liu *et* Zhang, 2015) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sentus* (Niedbała, 1989) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Sumatra).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) serratus* (Niedbała, 2006) (*N.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) shealsi* Lee, 1981 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sicilicoma* (Hammer, 1962) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sigifurcatus* (Liu *et* Zhang, 2015) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) similis* (Niedbała, 2001) (*N.*)
(*nom. praeoc.* por Balogh *et* P. Balogh, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) simplex* (Niedbała, 2017) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sinuosus* (Niedbała, 1982) (*Phthiracarus*)
(=*Notophthiracarus alpinus* Balogh *et* Mahunka, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) solitarius* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) solomonensis* (Niedbała, 1998) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Salomón).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sordidus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) spiniformis* (Liu, Wu *et* Chen, 2014) (*Arphthicarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) spinus* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) spurcus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) striolatus* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia y Ecuador).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sulcatus* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Panamá.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) sumatranus* (Niedbała, 2000) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) summersi* (Niedbała, 2001) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) szeptyckii* (Niedbała, 2009) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) tinctus* (Niedbała, 2000) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) tohivea* (Niedbała, 1998) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia, y Oriental: Taiwán [Formosa].
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) trapezoides* (Fuangarworn *et* Lekprayoon, 2011) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) trichosus* Mahunka, 1988 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) trivestigius* (Niedbała, 2012) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) tsitsikamaensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) tuberculatus* (Niedbała *et* Corpuz-Raros, 1998) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) tuberculus* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) uluguruensis* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) uncinatus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) uncinulus* (Niedbała, 2000) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) usitatus* (Niedbała, 1989) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania) y Vietnam.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) variolosus* (Berlese, 1888) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) venezolanus* (Subías, 2010) (*N.*)
(=*Arphthicarus ogmos* Niedbała, 2004, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) vernonensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) veteratorius* Niedbała, 1988 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) waitere* (Liu *et* Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) whirinaki* (Liu *et* Zhang, 2018) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) zebra* (Balogh, 1964) (*Hoplophorella*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) zululandensis* (Niedbała, 2006) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Hoplophthiracarus (Phthirarica) Mahunka, 1982 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Phthirarica ridicula* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana).
- *Hoplophthiracarus (Phthirarica) filaris* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Hoplophthiracarus (Phthirarica) retrorsus* (Niedbała, 2003) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costra Rica.
- *Hoplophthiracarus (Phthirarica) ridiculus* (Mahunka, 1982) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical (frecuente).
- *Hoplophthiracarus (Phthirarica) tawhai* (Liu *et* Zhang, 2013) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Phthirarica) traegardhi* (Niedbała, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) Balogh, 1972 (47 spp.)
(=***Notophthiracarus*** Balogh *et* Mahunka, 1967, *nom. praeoc.* por Ramsay, 1966)
(=***Sturmacarus*** P. Balogh, 1984)
ESPECIE TIPO: *Notophthiracarus chilensis* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Australianooriental, Neotropical, Antártica y Paleártica meridional).
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) admirabilis* (Niedbała, 1982) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) andinus* (P. Balogh, 1984) (*Phthirarica*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) aokii* (Niedbała, 1987) (*Austrophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) cajanumaensis* (Niedbała *et* Illig, 2007) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) chatham* (Liu *et* Zhang, 2015) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) chilensis* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) clandestinus* (Niedbała, 2003) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) cronadun* (Liu *et* Zhang, 2013) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) daimonios* (Niedbała, 2000) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) diazae* (Ojeda, 1985) (*P.*)
(=*Calyptophthiracarus cucundus* Niedbała, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) dilucidus* (Niedbała, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) donnabuangensis* (Niedbała, 2017) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) elconsuleoensis* (Niedbała *et* Illig, 2007) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) equisetosus* (Mahunka, 1980) (*Neoprotophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) espeletiae* (P. Balogh, 1984) (*Sturmacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) facetus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) golondrinasensis* (Niedbała *et* Illig, 2007) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) hiore* (Liu *et* Zhang, 2014) (*N.*) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) impolitus* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) kirikiri* (Liu *et* Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) konwerskii* (Niedbała, 2012) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) lunatus* (Niedbała, 2017) (*Austrophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) matuku* (Liu *et* Zhang, 2014) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) mutabilis* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Niedbała *et* Schatz, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) neochilensis* (Subías, 2010) (*Notophthiracarus (P.)*)

(=*Austrophthiracarus heteropilosus* Niedbała, 2004, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2003)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) neonominatus* (Liu *et* Wu, 2016) (*Austrophthiracarus*)
(=*Austrophthiracarus parapulchellus* Niedbała, 2016, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2006)
(=*Phthiracarus (Neophthiracarus) reiteratus* Subías, 2017)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) neotrichus* (Wallwork, 1966) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) nexilis* (Niedbała, 2003) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) niedbalai* (Liu *et* Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
(=*Austrophthiracarus longisetosus* Niedbała *et* Starý, 2015, *nom. praeoc.* por Liu *et* Chen, 2014)
(=*Austrophthiracarus longisetus* Niedbała *et* Starý, 2015, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2000)
(*nom. praeoc.* por Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996, y Subías, 2009)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) notoporosus* (Liu *et* Zhang, 2014) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) obtusus* (Niedbała, 2016) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) paraandinus* (Subías, 2018) (*Notophthiracarus (P.)*)
(=*Austrophthiracarus baloghi* Niedbała, 2004, *nom. praeoc.* por Niedbała, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) paracronadun* (Liu *et* Wu, 2016) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) paralamingtoni* (Niedbała, 2017) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) paralargus* (Niedbała *et* Penttinen, 2007) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) paralongisetosus* (Liu, 2020) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) parapulchellus* (Niedbała, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) perpropinqus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) pulchellus* (Niedbała, 1993) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) strigosus* (Niedbała, 1984) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) valdiviaensis* (Niedbała, 2008) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) ventosus* (Hammer, 1961) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) y Oriental (India: Bengala Occidental).
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) vestigius* (Liu *et* Wu, 2016) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) villosus* (Niedbała, 1982) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) wallworki* (Balogh *et* P. Balogh, 1983) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) warburtonensis* (Niedbała, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) weldboroughensis* (Niedbała, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

Hoplophthiracarus (Steganacarellus) Mahunka, 1986 (44 spp.)
ESPECIE TIPO: *Steganacarellus reductus* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) aethes* (Niedbała, Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2006) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) anakolos* (Niedbała, 2006) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) atratus* (Niedbała, 2000) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) brachys* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) cavernosus* (Mahunka, 1987) (*Hoplophorella*)
(no *Hoplophthiracarus cavernosus* Wallwork, 1977, = *Phthiracarus (Archiphthiracarus) cavernosus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) cristatus* (Aoki, 1980) *(Hoplophorella)*
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) cristatus* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
(*nom. praeoc.* por Aoki, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) deminutus* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) dilatatus* (Niedbała, 2004) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) distinctus* (Niedbała, 1989) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) frondeus* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) hammerae* (Niedbała, 1987) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) heterosetosus* (Niedbała, 1998) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Salomón).
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) heterotrichus* (Mahunka, 1984) (*Hoplophorella*)
  (*nom. praeoc.* por Mahunka, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) insolens* (Niedbała, 2000) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) knysnaensis* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) korannabergensis* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) lewisensis* (Niedbała, 2012) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) lunatus* (Niedbała, 2004) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) minimus* (Liu *et* Zhang, 2015) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) minutus* (Liu *et* Zhang, 2016) (*Phthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) mirus* (Niedbała, 2000) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) multituberculatus* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Steganacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) natalensis* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) novazelandicus* (Subías, 2010) (*Notophthiracarus (S.)*)
  (=*Arphthicarus heterotrichus* Niedbała, 2000, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) obsessus* (Subías, 2004) (*Notophthiracarus*)
  (=*Notophthiracarus admirabilis* Niedbała *et* Colloff, 1997, *nom. praeoc.* por Niedbała, 1982)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) obturatus* (Niedbała, 2009) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophthiracarus* (*Steganacarellus*) *paraparvulus* (Niedbała, 2000) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) paraunicarinatus* (Niedbała *et* Penttinen, 2007) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophthiracarus* (*Steganacarellus*) *parvulus* (Niedbała, 1998) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) perlucundus* (Niedbała, 2000) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Caledonia).
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) perparvus* (Niedbała, 1989) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) phyllodes* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) reductus* (Mahunka, 1986) (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) robertsi* (Sheals, 1965) (*Phthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Cáucaso.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) samarensis* (Niedbała, Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2006) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) sidorchukae* (Niedbała, 2019) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) spathulatus* (Niedbała, 2019) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) spiniformis* (Niedbała, 2004) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) stenotus* (Niedbała *et* Corpuz-Raros, 1998) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas y Nueva Guinea.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) tenuiseta* (Balogh *et* P. Balogh, 1986) (*Steganacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) trojani* (Niedbała, 2009) (*Notophthiracarus*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 2009)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) unicarinatus* (Niedbała, 2000) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus (Steganacarellus) whakau* (Liu *et* Zhang, 2013) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Phthiracarus Perty, 1841 (186 spp. y 1ssp.)

ESPECIE TIPO: (*Phthiracarus contractilis* Perty, 1841 *sensu* Jacot, 1930) =*Hoplophora laevigata* Koch, 1844
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Phthiracarus (Phthiracarus) Perty, 1841 (49 spp. y 1ssp.)
(=***Ginglymacarus*** Ewing, 1917)
(=***Hoploderma*** Michael, 1898)
(=***Hoplophora*** Koch, 1835, *nom. praeoc.* por Germar, 1833)
(=***Peridromotritia*** Jacot, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Phthiracarus (P.) abstemius* Niedbała, 1989
DISTRIBUCIÓN: Vietnam y "China".
- *Phthiracarus (P.) affinis* (Hull, 1914) (*Hoploderma*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Phthiracarus (P.) benoiti* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
Phthiracarus (P.) boresetosus Jacot, 1930
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Neotropical y Oriental (Himalaya).
- *Phthiracarus (P.) boresetosus boresetosus* Jacot, 1930
(=*Phthiracarus dudichi* Mahunka, 1982)
(=*Phthiracarus kaszabi* Mahunka, 1981)
(=*Phthiracarus minimarginatus* Woolley, 1954)
(=*Phthiracarus tenuis* Hammer, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Neártica), Neotropical y Oriental (Himalaya).
- *Phthiracarus (P.) boresetosus propinquus* Niedbała, 1983 (*P. p.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Rusia asiática meridional).
- *Phthiracarus (P.) brevicarinatus* Xu, Pan *et* Liu, 2018
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Phthiracarus (P.) cadizi* Niedbała, 1986
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Phthiracarus (P.) clavifer* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Phthiracarus (P.) clemens* Aoki, 1963
(=*Phthiracarus clemens kyushuensis* Aoki, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica oriental (excepto Norte) y Cáucaso, y Norte de Oriental.
- *Phthiracarus (P.) compressus* Jacot, 1930
(=*Phthiracarus commutabilis* Niedbała, 1983)
(=*Phthiracarus occultus* Niedbała, 1981)
(=*Phthiracarus pallidus* Feider *et* Suciu, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Oriental.
- *Phthiracarus (P.) crinitus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Phthiracarus (P.) curtulus* Berlese, 1923
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Phthiracarus (P.) dubinini* Feider *et* Suciu, 1958
(=*Phthiracarus danubianus* Feider *et* Călugăr, 1970)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Phthiracarus (P.) ferrugineus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
(=*Hoploderma italica* Oudemans, 1900)
(=*Phthiracarus juvenalis* Parry, 1979)
(=*Phthiracarus membranifer* Parry, 1979)
(=*Phthiracarus paraligneus* Iturrondobeitia *et* Saloña, 1989)
(=*Phthiracarus sellnicki* Feider *et* Suciu, 1957)
(=*Hoplophora testudinea* Koch, 1841 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Míchigan) y Ceilán [Sri Lanka].
- *Phthiracarus (P.) globosus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
(=*Phthiracarus rotundus* Ewing, 1908)
(=*Hoplophora sphaerula* Banks, 1895)
(=*Phthiracarus subglobosus* Berlese, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Norte de Neotropical y Borneo.
- *Phthiracarus (P.) heteropilosus* (Niedbała, 2004) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Ecuador).
- *Phthiracarus (P.) incredibilis* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Phthiracarus (P.) inexpectatus* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Phthiracarus (P.) insularis* Jacot, 1934
(=*Phthiracarus perlucidus* Niedbała, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Phthiracarus (P.) irreprehensus* Niedbała, 1988
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Phthiracarus (P.) jacoti* Feider *et* Suciu, 1958
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (más rara al Norte).
- *Phthiracarus (P.) japonicus* Aoki, 1958
(=*Phthiracarus ewingi* Niedbala, 1994)
(=*Phthiracarus miyamaensis* Fujikawa, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica oriental meridional y Neártica (frecuente), y Norte de Oriental.

- *Phthiracarus (P.) koumantanosi* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Phthiracarus (P.) laevigatus* (Koch, 1844) (*Hoplophora*)
(=*Phthiracarus besuchetianus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2003)
(?=*Phthiracarus contractilis* Perty, 1841 *sp. inq.*)
(?=*Oribata dasypus* Dugès, 1834 *sp. inq.*)
(=*Hoplophora maxima* Haupt, 1882)
(=*Hoplophora nitens* Nicolet, 1855)
(=*Phthiracarus roubali* Berlese, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte), Perú y Etiópica (I. Santa Helena e I. Reunión).
- *Phthiracarus (P.) lautus* Niedbała, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Phthiracarus (P.) leliehoekensis* Niedbała, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (P.) lentulus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
(=*Phthiracarus angolensis* Mahunka, 1985)
(=*Phthiracarus conformis* Sergienko, 1987)
(=*Phthiracarus incertus* Niedbała, 1983)
(=*Phthiracarus rotundus* Berlese, 1923, *nom. praeoc.* por Ewing, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Neártica), Etiópica (Angola y Madagascar) y China suroriental.
- *Phthiracarus (P.) longulus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
(=*Phthiracarus apiculatus* Jacot, 1939)
(=*Hoploderma boreale* Trägårdh, 1910)
(=*Phthiracarus crenophilus* Willmann, 1951)
(=*Phthiracarus flexisetosus* Parry, 1979)
(=*Phthiracarus hortobagyensis* Mahunka, 1982)
(=*Phthiracarus malagensis* Niedbała, 1986)
(=*Phthiracarus montium* Jacot, 1937)
(=*Phthiracarus mundus* Niedbała, 1983)
(=*Phthiracarus prior* Jacot, 1933)
(=*Phthiracarus setosellus* Jacot, 1929)
(=*Phthiracarus tardus* Forsslund, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Uruguay.
- *Phthiracarus (P.) machadoi* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Phthiracarus (P.) nitidus* Niedbała, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Canadá y U.S.A.: Utah).
- *Phthiracarus (P.) paralongulus* Niedbała *et* Starý, 2010
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Chequia y Noreste de China).
- *Phthiracarus (P.) persimplex* Mahunka, 1982
(=*Phthiracarus (Archiphthiracarus) shirakamiensis* Fujikawa, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Phthiracarus (P.) phoxos* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y "Polonia".
- *Phthiracarus (P.) plenus* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phthiracarus (P.) ponticus* Krivolutsky, 1975 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Phthiracarus (P.) pudicus* Berlese, 1923
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (P.) pusillus* Niedbała, 2001
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroriental.
- *Phthiracarus (P.) reductus* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phthiracarus (P.) sarahae* Jacot, 1930
(=*Phthiracarus validus* Niedbała, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente).
- *Phthiracarus (P.) serrulatus* Parry, 1979
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Phthiracarus (P.) sichuanensis* Liu, 2014
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Phthiracarus (P.) similis* Niedbała, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Suroeste de Paleártica oriental y Mediterránea oriental).
- *Phthiracarus (P.) spadix* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Phthiracarus (P.) stenotus* Niedbała, 2002
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Phthiracarus (P.) subdolus* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Phthiracarus (P.) swiftae* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phthiracarus (P.) tristis* Mahunka *et* Paoletti, 1984
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Phthiracarus (P.) undatus* Oudemans, 1915 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Francia.

- *Phthiracarus (P.) zicmani* Balogh *et* Mahunka, 1983
(=*Phthiracarus feideri* Balogh *et* Mahunka, 1979, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Csiszár, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Europea.

Phthiracarus (Archiphthiracarus) Balogh *et* Mahunka, 1979 (100 spp.)
(=***Archiphthiracarella*** Mahunka, 1996)
(=***Microphthiracarus*** Mahunka, 1982)
(=***Paraphthiracarus*** Aoki, 1980)
ESPECIE TIPO: (*Archiphthiracarus variabilis* Balogh *et* Mahunka, 1979) =*Phthiracarus peristomaticus* Willmann, 1951
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) acuminatus* (Liu, 2017) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) aegypticus* (Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid *et* El-Deeb, 1984) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) aethes* Niedbała, 2004 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) aitu* (Liu *et* Zhang, 2015) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) aliquantus* Niedbała, 1988 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental (frecuente) y Kentucky.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) andasibensis* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) anonymus* Grandjean, 1933 (*P.*)
(=*Phthiracarus anonymus amicus* Jacot, 1938)
(=*Archiphthiracarus hauseri* Mahunka, 1988)
(=*Archiphthiracarus pocsi* Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) atlanticus* (Pérez-Íñigo, 1987) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) australis* (Aoki, 1980) (*Paraphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) baloghi* Feider *et* Suciu, 1957 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) banksi* Niedbała, 1987 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) bicarinatus* Niedbała, 2008 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) blythedalensis* Niedbała, 2006 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) bryobius* Jacot, 1930 (*P. setosellum b.*)
(=*Phthiracarus clavatus* Parry, 1979)
(=*Phthiracarus crinitosimilis* Willmann, 1939)
(=*Archiphthiracarus gobiensis* Mahunka, 1981)
(=*Archiphthiracarus hungaricus* Balogh *et* Mahunka, 1979)
(=*Phthiracarus lanatus* Feider *et* Suciu, 1957)
(=*Phthiracarus opacus* Niedbała, 1986)
(=*Archiphthiracarus pilosus* Sergienko, 1987)
(?=*Hoplophora straminea* Koch, 1841 *sp. inq.*)
(=*Archiphthiracarus tzanoudakisi* Mahunka, 1979)
(=*Phthiracarus wallworki* Niedbała, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, I. Santa Helena, Nepal y Neotropical (Costa Rica y Bolivia).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) bulbiferus* (Mahunka, 1996) (*Archiphthiracarella*)
(=*Microphthiracarus baloghi* Mahunka, 1982, *nom. praeoc.* por Feider *et* Suciu, 1957)
(=*Archiphthiracarella baloghorum* Mahunka, 1997)
(=*Phthiracarus insularis* Balogh, 1964, *nom. praeoc.* por Jacot, 1935)
(=*Phthiracarus minor* Niedbała, 2001)
(=*Phthiracarus (Archiphthiracarus) neonominatus* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Madagascar y Etiopía).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) catalaucus* Niedbała, 2004 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Jamaica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) cavernosus* (Wallwork, 1977) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) closteros* Niedbała, 2004 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) cognatus* Niedbała, 1988 (*P.*)
(=*Phthiracarus rafalskii* Niedbała, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Sureste): frecuente.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) comatus* Niedbała, 1983 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) crassus* Niedbała, 1983 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) crispus* Hammer, 1972 (*P.*)
(=*Archiphthiracarus schauenbergi* Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico y Nueva Caledonia), Oriental y Etiópica (Malgache y Sudáfrica).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) cristatus* Xu, Pan *et* Liu, 2018 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) curiosus* Niedbała, 1998 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) densus* Niedbała, 2006 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) dissonus* Niedbała, 1983 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Este de Rusia asiática).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) dominiaki* Niedbała, 1984 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) duplex* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2010 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) endroedyi* (Mahunka, 1984) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) eupalineus* Mahunka, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) falciformis* Morell *et* Subías, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) filiformis* (Liu *et* Oconnor, 2014) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) flagellatus* Wallwork, 1977 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) flexipilus* Călugăr *et* Vasiliu, 1981 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) forsslundi* (Niedbała, 1987) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) fraternus* Niedbała, 1998 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) fujianensis* Liu, 2014 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) furvus* Niedbała, 1983 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica merdional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) gibber* (Aoki, 1980) (*Paraphthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) globus* Parry, 1979 (*P.*)
  (=*Phthiracarus mediocris* Niedbała, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) granpiedraensis* (Niedbała, 2009) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) hillcrestensis* Niedbała, 2006 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) humilis* (Niedbała, 2004) (*Arphthicarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Jamaica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) imbecillis* (Mahunka, 1989) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) inacessus* Niedbała, 1998 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico y Australia).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) inornatus* Niedbała, 1984 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) invenustus* Niedbała, 2000 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) kokae* Niedbała, 2006 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) largus* Niedbała, 1984 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Cáucaso, Asia central rusa e I. Sajalín).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) ligneus* Willmann, 1931 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y "Neártica").
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) liparus* Niedbała, 1984 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) lividus* (Niedbała, 2000) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) luridus* (Ewing, 1909) (*Hoploderma*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) mediocris* (Niedbała, 2017) (*Hoplophthiracarus*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) micidus* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) mindanaoensis* Niedbała, Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2006 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) modestus* Niedbała, 1988 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Sureste).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) montanus* Pérez-Íñigo, 1969 (*P.*)
  (=*Phthiracarus assimilis* Niedbała, 1983)
  (=*Phthiracarus murphyi* Harding, 1976)
  (=*Phthiracarus rectisetosus* Parry, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Suroeste de Paleártica oriental).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) niahensis* (Niedbała, 2008) (*Hoplophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) obliquus* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) obscurus* Niedbała, 1986 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australia.
- *Phthiracarus (Archiphthtiracarus) ochthus* Niedbała, 2001 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) ornatus* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pachys* Niedbała, 2015 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pandus* Niedbała, 2004 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Jamaica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parabaloghi* Niedbała, 1983 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Uganda y Camerún).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parabonangensis* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parabotrichus* Feider *et* Suciu, 1957 (*P.*)
(=*Phthiracarus paralaevigatus* Niedbała *et* Starý, 2010)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental centromeridional y Norte de Oriental.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paracrispus* Niedbała *et* Starý, 2016 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paraglobosus* Niedbała, 1982 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: India (Cachemira).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paramindanaoensis* Niedbała, 2018 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parapocsi* Niedbała, 2001 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paratryssos* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parmatus* (Nakatamari, 1985) (*Paraphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paucus* Niedbała, 1991 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Australianooriental *et* Sudáfrica, y subtropical (Este de Paleártica oriental).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pellucidus* Ramsay, 1966 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) peristomaticus* Willmann, 1951 (*P.*)
(=*Archiphthiracarus hammeni* Balogh *et* Mahunka, 1979)
(=*Archiphthiracarus variabilis* Balogh *et* Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) persimilis* Niedbała, 1998 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pertenuis* Niedbała, 2006 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) piger* (Scopoli, 1763) (*Acarus*)
(=*Hoplophora lucida* Koch, 1841)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y "Neártica").
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pondoklowii* Niedbała, 2004 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Myanmar [Birmania]).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) puylaerti* (Niedbała, 2001) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Madagascar).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pygmaeus* Balogh, 1958 (*P.*)
(=*Archiphthiracarus foveolatus* Mahunka, 1988)
(=*Archiphthiracarus minutissimus* Balogh *et* Mahunka, 1980)
(=*Phthiracarus passimpunctatus* P. Balogh, 1988)
(=*Phthiracarus serrula* Balogh *et* Mahunka, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) ranomafanensis* Niedbała *et* Starý, 2016 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sangumburiensis* (Niedbała, 2002) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sanvicensis* Subías *et* Gil-Martín, 1990 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) schusteri* Niedbała, 2008 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Turquía y Portugal).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) scitus* Niedbała, 1983 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) subiasi* Niedbała, 1986 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sudafricanus* Subías, 2010
(=*Phthiracarus humilis* Niedbała, 2006, *nom. praeoc.* por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sudamericanus* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1993) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) thaiensis* Mahunka, 2008 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) thorntonensis* (Niedbała *et* Penttinen, 2007) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) torosus* Willmann, 1939 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) totus* Niedbała, 2003 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Costa Rica y Brasil) y Cáucaso.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) tryssos* (Niedbała, 2004) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) tubulus* Hammer, 1972 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Polinesia) y Oriental (Vietnam).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) turgidus* (Niedbała, 1991) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) weigmanni* (Niedbała, 1987) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) yunnanensis* Liu, 2014 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Phthiracarus (Metaphthiracarus) Aoki, 1980 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Metaphthiracarus bacillatus* Aoki, 1980) =*Hoplophora setosa* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) bicarinatus* (Niedbała *et* Starý, 2014) (*Austrophthiracarus*)
  (*nom. praeoc.* por Niedbała, 2008)
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) brevisetae* Jacot, 1930 (*P.*)
  (=*Phthiracarus restrictus* Jacot, 1937)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente) y Norte de Neotropical.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) conspersus* (Niedbała, 2006) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) inusitatus* (Niedbała, 1983) (*Hoplophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) jumbongiensis* (Niedbała, 2002) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) kamillae* (Niedbała, 1987) (*Notophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) paraclosteros* Niedbała, 2004 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) parainusitatus* (Niedbała *et* Starý, 2011) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) rabacalensis* (Niedbała, 2013) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madeira.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) setanus* Jacot, 1939 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Noroeste) y Neotropical (Chile y Panamá).
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) setosus* (Banks, 1895) (*Hoplophora*)
  (=*Metaphthiracarus bacillatus* Aoki, 1980)
  (=*Phthiracarus falcatus* Hammer, 1977)
  (=*Archiphthiracarus filiferus* Mahunka, 1982)
  (=*Phthiracarus (Archiphthiracarus) hirsutus* Fujikawa, 2003)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica: frecuente, y Paleártica oriental meridional), U.S.A. (Florida) y Nepal.

Phthiracarus (Neophthiracarus) Balogh *et* Csiszár, 1963 (22 spp.)
(=***Neoprotophthiracarus*** Mahunka, 1980)
ESPECIE TIPO: *Neophthiracarus insignis* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana y Neotropical) y subtropical.

- *Phthiracarus (Neophthiracarus) allocotos* Niedbała *et* Starý, 2015 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) amboroensis* (Niedbała *et* Starý, 2015) (*Protophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) aureus* (Niedbała, 2000) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) comosus* (Aoki, 1980) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) difficilis* (Niedbała, 2014) (*Plonaphacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) egregius* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) furcatus* (Kramer, 1898) (*Hoplophora*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) hallidayi* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) helluonis* (Niedbała, 1982) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) hirtus* (P. Balogh, 1984) (*Sturmacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia y Chile).
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) insignis* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) kochi* (Niedbała, 1987) (*Calyptophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) lamingtoni* (Niedbała, 2000) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) octosetosus* Niedbała, 2004 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) opiparus* Niedbała, 2004 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) parapilosus* (Niedbała, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) parashiptoni* Niedbała, 2004 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) pilosus* (Niedbała *et* Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) portentosus* (Niedbała, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Austrophthiracarus dissonus* Niedbała *et* Colloff, 1997, *nom. praeoc.* por Niedbała, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) probus* Niedbała *et* Colloff, 1997 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) shiptoni* (Sheals *et* Macfarlane, 1966) (*N.*)
(=*Neoprotophthiracarus flagellatus* Mahunka, 1980)
(=*Phthiracarus mahunkai* Niedbała, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Steganacarus Ewing, 1917 (52 spp. y 4 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Hoplophora anomala* Berlese, 1883
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Steganacarus (Steganacarus) Ewing, 1917 (30 spp. y 3 sspp.)
(=***Niedbalacarus*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
(=***Trachyhoplophora*** Berlese, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Steganacarus (S.) applicatus* (Sellnick, 1920) (*Phthiracarus*)
(=*Phthiracarus berlesei* Oudemans, 1915, *nom. praeoc.* por Michael, 1898)
(?=*Hoplophora quadriseriata* Haupt, 1882 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Steganacarus (S.) caelestis* Niedbała, 1984
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Steganacarus (S.) carlosi* Niedbała, 1984
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Steganacarus (S.) carusoi* Bernini *et* Avanzati, 1989
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Steganacarus (S.) controversus* (Niedbała, 2000) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Steganacarus (S.) crassisetosus* Willmann, 1939 (*S. applicatus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
- *Steganacarus (S.) craterifer* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Steganacarus (S.) diatropos* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (S.) ewingi* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Steganacarus (S.) folious* (Niedbała, 2003) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Steganacarus (S.) guanarteme* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Steganacarus (S.) herculeanus* Willmann, 1953
(=*Steganacarus longisetosus* Moraza, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
Steganacarus (S.) hirsutus Pérez-Íñigo, 1974
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
  - *Steganacarus (S.) hirsutus hirsutus* Pérez-Íñigo, 1974
  (=*Steganacarus perezinigoi* Balogh *et* Mahunka, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
  - *Steganacarus (S.) hirsutus azorensis* Pérez-Íñigo, 1992
  DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Steganacarus (S.) inaestimabilis* Niedbała, 1984
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Steganacarus (S.) incomptus* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Steganacarus (S.) insulanus* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Steganacarus (S.) inurbanus* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Uganda y Kenia).
Steganacarus (S.) magnus (Nicolet, 1855) (*Hoplophora*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.) e I. Santa Helena.
- *Steganacarus (S.) magnus magnus* (Nicolet, 1855) (*Hoplophora*)
(=*Phthiracarus magnus oblongus* Oudemans, 1915)
(=*Phthiracarus magnus rotundus* Oudemans, 1915, *nom. praeoc.* por Ewing, 1908)
(=*Phthiracarus magnus transitans* Oudemans, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Irán y U.S.A.) e I. Santa Helena.
- *Steganacarus (S.) magnus anomalus* (Berlese, 1883) (*Hoplophora a.*)
(=*Steganacarus karamani* Tarman, 1962)
(=*Phthiracarus magnus anomaloides* Oudemans, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este).
- *Steganacarus (S.) manganellii* Avanzati, Baratti *et* Bernini, 1994
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Steganacarus (S.) michaeli* Bernini *et* Avanzati, 1987
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Steganacarus (S.) pergratus* (Niedbała, 1998) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Steganacarus (S.) similis* Willmann, 1939
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
- *Steganacarus (S.) simonettae* Bernini *et* Avanzati, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Steganacarus (S.) sol* Balogh, 1958
(=*Hoplophthiracarus peracutus* Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
Steganacarus (S.) spinosus (Sellnick, 1920) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europea e Irán, y Oriental: India (Megalaya).
- *Steganacarus (S.) spinosus spinosus* (Sellnick, 1920)
(=*Steganacarus barborae* Mahunka *et* Miko, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europea e Irán, y Oriental: India (Megalaya).
- *Steganacarus (S.) spinosus personatus* Niedbała, 1983 (*S. p.*)
(=*Steganacarus punctulatus* Sergienko, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Steganacarus (S.) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Steganacarus (S.) vernaculus* Niedbała, 1982
(=*Steganacarus antennatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2003)
(=*Steganacarus donatoi* Avanzati, Baratti *et* Bernini, 1994)
(=*Steganacarus schweizeri* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2003)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Steganacarus (S.) vestitus* Niedbała, 1983
(=*Steganacarus complicatus* Mahunka, 1993)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Steganacarus wallworki* (Mahunka, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Steganacarus (S.) werneri* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.

Steganacarus (Pluristeganacarus) Subías, 2019 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Steganacarus absidatus* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Steganacarus (Pluristeganacarus) absidatus* Niedbała, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Bolivia).

Steganacarus (Tropacarus) Ewing, 1917 (21 spp. y 1 ssp.)
(=***Calhoplophora*** Berlese, 1923)
ESPECIE TIPO: *Hoplophora carinata* Koch, 1841
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y tropical (excepto Australianooriental).
- *Steganacarus (Tropacarus) adelaidae* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Steganacarus (Tropacarus) balcanicus* Berninni *et* Avanzati, 1989
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Steganacarus (Tropacarus) balearicus* Pérez-Íñigo, 1969 (*S.*)
(=*Steganacarus macrosculpturatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Steganacarus (Tropacarus) bicarinatus* (Jeleva, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Steganacarus (Tropacarus) boulfekhari* Niedbała, 1986 (*S.*)
(=*Steganacarus (Tropacarus) maghrebinus* Bernini, S. Bernini *et* Avanzati, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Steganacarus (Tropacarus) brevipilus* (Berlese, 1923) (*Phthiracarus (Trachyhoplophora)*)
(=*Hoploderma brevipilus perfecta* Sellnick, 1931)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (excepto Norte) e Irán.
- *Steganacarus (Tropacarus) callainii* Bernini, S. Bernini *et* Avanzati, 1989
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
Steganacarus (Tropacarus) carinatus (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Méjico.
-*Steganacarus (Tropacarus) carinatus carinatus* (Koch, 1841)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Méjico.
- *Steganacarus (Tropacarus) carinatus pulcherrimus* (Berlese, 1887) (*Hoplophora p.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Steganacarus (Tropacarus) coniunctus* Niedbała, 1983 (*S.*)
(=*Steganacarus danae* Mahunka *et* Miko, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Este de Paleártica oriental).
- *Steganacarus (Tropacarus) desmeti* Niedbała, 1988 (*S.*)
(=*Steganacarus (Tropacarus) altitudinis* Bernini, S. Bernini *et* Avanzati, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Steganacarus (Tropacarus) doumandji* Niedbała, 1986 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Steganacarus (Tropacarus) excavatus* (Niedbała, 1981) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Steganacarus (Tropacarus) flagellatissimus* Mahunka, 1979 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Steganacarus (Tropacarus) grandjeani* Mahunka, 1977 (*S.*)
(=*Steganacarus sacculiferus* Parry, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Israel.
- *Steganacarus (Tropacarus) incognitus* Niedbała, 1984 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Steganacarus (Tropacarus) khaustovi* Niedbała, 2019 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Steganacarus (Tropacarus) lasithiensis* Mahunka, 1979 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Steganacarus (Tropacarus) lucidus* Sergienko, 1994 (*S.*)
(=*Steganacarus (Tropacarus) malatestai* Avanzati, Baratti *et* Bernini, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Steganacarus (Tropacarus) patruelis* Niedbała, 1983 (*S.*)
(=*Steganacarus lazitanicus* Mahunka *et* Miko, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Steganacarus (Tropacarus) pseudocarinatus* Bernini *et* Avanzati, 1989
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Steganacarus (Tropacarus) travei* Lions, 1968 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Suborden HOLOSOMATA Grandjean, 1960

Crotonioidea Thorell, 1876

Trhypochthoniidae Willmann, 1931 (7 gen., 58 spp. y 14 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Afronothrus Wallwork, 1961 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Afronothrus incisivus* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Afronothrus arboreus* Ramani *et* Haq, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Afronothrus incisivus* Wallwork, 1961
(=*Afronothrus incisivus maheensis* Mahunka, 1978)
(=*Afronothrus incisivus neotropicus* Balogh *et* Mahunka, 1974)
(=*Afronothrus incisivus paraguayensis* Mahunka, 1984)
(=*Afronothrus sulcatus* Hammer, 1972)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Allonothrus Hammen, 1953 (18 spp. y 2 sspp.)
(=***Parallonothrus*** Badejo, Woas *et* Beck, 2002)
(=***Pseudonothrus*** Balogh, 1958)
ESPECIE TIPO: *Allonothrus schuilingi* Hammen, 1953
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Allonothrus brasiliensis* (Badejo, Woas *et* Beck, 2002) (*Parallonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Allonothrus dhananjayi* Sarkar, 1991
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Allonothrus foveolatus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Allonothrus giganticus* Haq, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Allonothrus henroi* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Allonothrus hirtus* (Balogh, 1958) (*Pseudonothrus*)
(=*Allonothrus ghanensis* Wallwork, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Allonothrus indicus* Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1968
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Allonothrus longinoi* Szywilewska *et* Olszanowski, 2006
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Allonothrus monensis* Ghosh *et* Bhaduri, 1979
DISTRIBUCIÓN: India (Nagaland).
- *Allonothrus monodactylus* Wallwork, 1960
DISTRIBUCIÓN: África occidental, Oriental y Venezuela.
- *Allonothrus neotropicus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente).
- *Allonothrus nigeriensis* (Badejo, Woas *et* Beck, 2002) (*Parallonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Allonothrus pararusseolus* Subías *et* Sarkar, 1982
DISTRIBUCIÓN: India.
- *Allonothrus pyriformis* (Berlese, 1913) (*Angelia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Tailandia).

Allonothrus russeolus Wallwork, 1960
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Allonothrus russeolus russeolus* Wallwork, 1960
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica: Ghana, Oriental y Norte de Neotropical) y Japón.
- *Allonothrus russeolus reticulatus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico y Nueva Caledonia) y Oriental (Java).

Allonothrus schuilingi Hammen, 1953
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Australiana (frecuente), I. Seychelles, Venezuela y Oriental (China: Hong-Kong, y Filipinas), y Este de Paleártica oriental.
- *Allonothrus schuilingi schuilingi* Hammen, 1953
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Australiana (frecuente), Venezuela y Oriental (China: Hong-Kong, y Filipinas), y Este de Paleártica oriental.
- *Allonothrus schuilingi seychelli* Olszanowski *et* Bochniak, 2015
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Allonothrus sinicus* Wang *et* Norton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Allonothrus tuxtlasensis* Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Archegozetes Grandjean, 1931 (1 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Epilohmannia magna* Sellnick, 1925
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Archegozetes magnus (Sellnick, 1925) (*Epilohmannia*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Archegozetes magnus magnus* (Sellnick, 1925)
(=*Archegozetes magnus mediosetosus* Mahunka, 1978)
(=*Archegozetes tuberculatus* Sarkar, 1985)
(=*Archegozetes veracruzensis* Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (Oriental: frecuente, Australiana, Etiópica y Neotropical: Méjico y Brasil).
- *Archegozetes magnus longisetosus* Aoki, 1965 (*A. l.*)
(=*Archegozetes chamelensis* Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997)
(=*Archegozetes magnus indicus* Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica): frecuente en Oriental y Neotropical.

Mainothrus Choi, 1996 (4 spp.)
(=***Altrhypochthonius*** Weigmann, 1997)
ESPECIE TIPO: *Mainothrus aquaticus* Choi, 1996
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Mainothrus aquaticus* Choi, 1996
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Mainothrus badius* (Berlese, 1905) (*Trhypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Mainothrus breviclava* (Hammer, 1958) (*Trhypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mainothrus transaltaicus* Bayartogtokh *et* Yondon, 2019
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Mucronothrus Trägårdh, 1931 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Mucronothrus rostratus* Trägårdh, 1931) =*Malaconothrus nasalis* Willmann, 1929
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australiana y Neotropical).
- *Mucronothrus braziliensis* Ermilov, Tolstikov, Senna *et* Pešić, 2014
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mucronothrus nasalis* (Willmann, 1929) (*Malaconothrus*)
(=*Mucronothrus rostratus* Trägårdh, 1931)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Boreoalpina: frecuente, Australiana y Neotropical).
- *Mucronothrus willmanni* Norton, Behan-Pelletier *et* Wang, 1996
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.

Trhypochthoniellus Willmann, 1928 (11 spp. y 3 sspp.)
(=***Hydronothrus*** Aoki, 1964)
ESPECIE TIPO: (*Trhypochthonius (Trhypochthoniellus) setosus* Willmann, 1928) =*Trhypochthonius longisetus* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Trhypochthoniellus ashoroensis* Fujikawa, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Trhypochthoniellus brevisetus* Kuriki, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trhypochthoniellus chilensis* Ermilov *et* Weigmann, 2015
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral (Chile).
- *Trhypochthoniellus churincensis* Ojeda, 2020
DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Trhypochthoniellus longisetus (Berlese, 1904) (*Trhypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica, Etiópica, Australiana, Neotropical y Oriental: Vietnam).
- *Trhypochthoniellus longisetus longisetus* (Berlese, 1904)
(=*Hydronothrus aquariorum* Fain *et* Lambrechts, 1987)
(=*Nothrus crassus* Warburton *et* Pearce, 1905)
(=*Hydronothrus crispus* Aoki, 1964)
(=*Camisia excavata* Willmann, 1919)
(=*Hydronothrus puniceus* Habeeb, 1981)
(=*Trhypochthonius trichosus* Schweizer, 1922)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica, Etiópica: I. Santa Helena y Sudáfrica, Australiana, Neotropical y Oriental: Vietnam).
- *Trhypochthoniellus longisetus brasilensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988 (*T. setosus b.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Trhypochthoniellus longisetus canadensis* Hammer, 1952 (*T. setosus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Trhypochthoniellus longisetus setosus* (Willmann, 1928) (*Trhypochthonius (Trhypochthoniellus)*)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina y Madagascar.
- *Trhypochthoniellus malaconothroiformis* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Theron, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Trhypochthoniellus porticus* Fujikawa, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón y Filipinas.
- *Trhypochthoniellus qianensis* Z.-Y. Hu *et* Jin, 2010
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Trhypochthoniellus ramosus* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Trhypochthoniellus reticulatus* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Trhypochthoniellus taisetsuensis* Kuriki, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Trhypochthonius Berlese, 1904 (19 spp. y 8 sspp.)
(=***Albonothrus*** Tseng, 1982)
(=***Trilohmannia*** Willmann, 1923)
(=***Tumidalvus*** Ewing, 1908)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius tectorum* Berlese, 1896
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Trhypochthonius africanus* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Trhypochthonius altaicus* Bayartogtokh, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Trhypochthonius cladonicolus* (Willmann, 1919) (*Camisia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (menos frecuente en el Sur) y Canadá.
- *Trhypochthonius conspectus* Sergienko, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Trhypochthonius hammerae* Schweizer, 1956 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Trhypochthonius japonicus* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Paleártica centromeridional y U.S.A.: Luisiana) y Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Trhypochthonius javanus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Java y Japón.
- *Trhypochthonius longipes* (Warburton, 1912) (*Nothrus tectorum l.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Trhypochthonius montanus* Hammen, 1956
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Trhypochthonius multisulcatus* (Tseng, 1982) (*Albonothrus*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Trhypochthonius nigricans* Willmann, 1928
(=*Trhypochthonius sphagnicola* Weigmann, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Sur y Neártica septentrional).
- *Trhypochthonius ruttneri* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Trhypochthonius sclerotrichus* (Willmann, 1923) (*Trilohmannia cladonicola s.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Trhypochthonius semovitusi* Szywilewska, 2004
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Trhypochthonius setantis* Golosova, 1983
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Paleártica oriental meridional.

Trhypochthonius silvestris Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A., Europa central y Este de Paleártica oriental.

- *Trhypochthonius silvestris silvestris* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (menos frecuente en el Norte) y "Paleártica".
- *Trhypochthonius silvestris europaeus* Weigmann *et* Raspotnig, 2009
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Trhypochthonius silvestris misumaiensis* Fujikawa, 2000 (*T. m.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trhypochthonius silvestris septentrionalis* Fujikawa, 1995 (*T. s.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896) (*Hypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental, Etiopía y Neotropical.
- *Trhypochthonius tectorum tectorum* (Berlese, 1896)
(=*Trhypochthonius monodactylus* Mihelčič, 1957)
(=*Tumidalvus mutsalpina* Kishida, 1931)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental, Etiopía y Neotropical.
- *Trhypochthonius tectorum americanus* (Ewing, 1908) (*Tumidalvus a.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Trhypochthonius tectorum congregator* Grandjean, 1940
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Trhypochthonius tectorum fujinitaensis* Fujikawa, 2000 (*T. f.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trhypochthonius tectorum spinosus* Kulijev, 1968
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Trhypochthonius tectorum stercus* Fujikawa, 2000 (*T. s.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón e India (Arunachal Pradesh).

- *Trhypochthonius tepoztecus* Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Trhypochthonius triangulum* Nakamura, Y.- N. Nakamura *et* Fujikawa, 2013
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Malaconothridae Berlese, 1916 (2 gen., 2 subgen., 178 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Malaconothrus Berlese, 1904 (86 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Nothrus monodactylus* Michael, 1888
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Malaconothrus (Malaconothrus) Berlese, 1904 (33 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Malaconothrus (M.) angulatus* Hammer, 1958
(=*Malaconothrus hammerae* Colloff *et* Cameron, 2013)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Malaconothrus (M.) ashizuriensis* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Malaconothrus (M.) aureopunctatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia), Brasil y Etiopía.
- *Malaconothrus (M.) calcehtokensis* Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Malaconothrus (M.) chajulensis* Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Malaconothrus (M.) conicus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Malaconothrus (M.) dipankari* Saha *et* Sanyal, 1996
DISTRIBUCIÓN: Norte de India.
- *Malaconothrus (M.) dispela* Colloff, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Malaconothrus (M.) dorsofoveolatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu] y Nueva Caledonia).
- *Malaconothrus (M.) globiger* Trägårdh, 1910 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Suecia.
- *Malaconothrus (M.) gundungurra* Colloff *et* Cameron, 2013
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malaconothrus (M.) hexasetosus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Indonesia).
- *Malaconothrus (M.) japonicus* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Malaconothrus (M.) laetus* Sergienko *et* Melamud, 1993
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Malaconothrus (M.) liklik* Colloff, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Malaconothrus (M.) machadoi* Balogh *et* Mahunka, 1969 *sp. inq.*
(=*Malaconothrus praeoccupatus* Subías, 2004)
(=*Malaconothrus punctulatus* Balogh, 1958, *nom. praeoc.* por Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Camerún).
- *Malaconothrus (M.) macrofoveolatus* Ermilov, Kalúz *et* Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Malaconothrus (M.) margaritae* Fujikawa, 2005

DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Malaconothrus (M.) marginatus* Yamamoto, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Japón.
- *Malaconothrus (M.) minimus* Yamamoto *et* Coetzee, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Malaconothrus (M.) minutus* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Malaconothrus (M.) monodactylus* (Michael, 1888) (*Nothrus*)
(=*Lohmannia (Malaconothrus) egregia* Berlese, 1904)
(=*Malaconothrus gracilis* Hammen, 1952)
(=*Malaconothrus mollisetosus* Hammer, 1952)
(=*Malaconothrus pulcher* Mihelčič, 1957)
(=*Malaconothrus punctulatus* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Neotropical.
- *Malaconothrus (M.) neonominatus* Subías, 2004
(=*Malaconothrus pulcher* Hammer, 1961, *nom. praeoc.* por Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Malaconothrus (M.) pilosellus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Malaconothrus (M.) processus* Hammen, 1952
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Malaconothrus (M.) pseudolamellatus* Willmann, 1931
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Tripura).
- *Malaconothrus (M.) purvisi* Luxton, 1987
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Malaconothrus (M.) pygmaeus* Aoki, 1969
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (excepto Norte) y Canadá, y Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Malaconothrus (M.) ramadani* Ramadan, Ismail *et* Mustafa, 2018 *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Malaconothrus (M.) scutatus* Luxton, 1987
(=*Malaconothrus luxtoni* Colloff *et* Cameron, 2013)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Malaconothrus (M.) setoumi* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Malaconothrus (M.) silvaticus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Malaconothrus (M.) transversus* Ramadan, Ismail *et* Mustafa, 2018 *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Malaconothrus (M.) yinae* Yamamoto, Aoki, Wang *et* Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Malaconothrus (Trimalaconothrus) Berlese, 1916 (52 spp. y 1 ssp.)
(=***Zeanothrus*** Hammer, 1966)
ESPECIE TIPO: *Malaconothrus (Trimalaconothrus) indusiatus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) africanus* (Balogh, 1958) (*T.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) almagrensis* (Iglesias, Palacios-Vargas *et* Mahunka, 2001) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) azumaensis* (Yamamoto, Kuriki *et* Aoki, 1993) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) brevisetiger* (Yamamoto *et* Aoki, 1998) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) crinitus* Berlese, 1908 (*M.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Misuri.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) crispus* (Hammer, 1962) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile y Nueva Zelanda.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) darwini* Colloff *et* Cameron, 2013 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) eichhornicus* (Iglesias, Palacios-Vargas *et* Mahunka, 2001) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) elegans* (Hammer, 1966) (*Zeanothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) flagelliformis* (Wallwork, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
Malaconothrus (Trimalaconothrus) foveolatus (Willmann, 1931) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional y Oriental (Indonesia).
  - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) foveolatus foveolatus* (Willmann, 1931)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (Europa: menos frecuente en el Sur, Paquistán y Neártica septentrional).
  - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) foveolatus sundaicus* (Willmann, 1931) (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) granulatus* (Tseng, 1982) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) hakonensis* (Yamamoto, 1977) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) indusiatus* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) iteratus* (Subías, 2004) (*T.*)
(=*Trimalaconothrus longirostris* Hammer, 1966, *nom. praeoc.* por Willmann, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Orissa).
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) joonsooi* (Choi, 1986) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) jowettae* Colloff *et* Cameron, 2013 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) kimberleyi* (Colloff, 2013) (*Tyrphonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) knuellei* Colloff *et* Cameron, 2013 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) longirostris* (Willmann, 1929) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) longisetosus* (Yamamoto *et* Aoki, 2000) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) maniculatus* (Fain *et* Lambrechts, 1987) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central y Japón.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) mirabilis* (Sergienko *et* Melamud, 1993) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) montanus* (Hammer, 1958) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) multipilosus* (Balogh *et* P. Balogh, 2002) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) murmurensis* (Colloff, 2013) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) nipponicus* (Yamamoto *et* Aoki, 1971) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) nodosus* (Yamamoto, 1997) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) obsessus* (Subías, 2004) (*T.*)
(=*Trimalaconothrus albulus* Tseng, 1982, *nom. praeoc.* por Hammer, 1972)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) opisthoseta* (Hammer, 1966) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) oppositus* (P. Balogh, 1997) (*T.*)
(=*Trimalaconothrus oppositus* Balogh *et* P. Balogh, 2002, *nom. praeoc.* por P. Balogh, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) oxyrhinus* (Hammer, 1962) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile y Nueva Zelanda.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) pallidus* (Wallwork, 1977) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) paraweigmanni* Ermilov, 2016 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) planus* (Balogh, 1958) (*T.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) platyrhinus* (Hammer, 1962) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Nueva Zelanda e India.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) prahuensis* (Hammer, 1979) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) punctus* (Yamamoto *et* Coetzee, 2004) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) repetitus* (Subías, 2004) (*T.*)
(=*Trimalaconothrus reticulatus* Yamamoto, 1977, *nom. praeoc.* por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) reticulatus* (Balogh, 1958) (*T.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) sacculus* (Hammer, 1966) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) seniczaki* (Colloff, 2013) (*Tyrphonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) similis* (Balogh, 1958) (*T.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) soror* (Balogh, 1958) (*T.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) talaitae* Colloff *et* Cameron, 2013 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) tardus* (Michael, 1888) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte), Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá), Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) tidbinbilla* (Colloff, 2013) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) tonkini* (Luxton, 1982) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) tripurensis* (Sarkar, 1983) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) vietsi* (Willmann, 1925) (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Euroatlántica y Cáucaso).
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) yachidairaensis* (Yamamoto, Kuriki *et* Aoki, 1993) (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) weigmanni* Colloff, 2013 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Tyrphonothrus Knülle, 1957 (94 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: (*Malaconothrus novus* Sellnick, 1921) =*Malaconothrus maior* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Tyrphonothrus (Tyrphonothrus) Knülle, 1957 (47 spp. y 3 sspp.)
(=***Fossonothrus*** Hammer, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Tyrphonothrus (T.) albulus* (Hammer, 1972) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Vietnam.
- *Tyrphonothrus (T.) altissimus* (Piffl, 1971) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.

Tyrphonothrus (T.) angulatus (Willmann, 1931) (*Trimalaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Euroatlántica, Japón y U.S.A.: Nueva York).

- *Tyrphonothrus (T.) angulatus angulatus* (Willmann, 1931)
  (=*Trimalaconothrus kurikii* Yamamoto, 1997)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Euroatlántica, Japón y U.S.A.: Nueva York).
- *Tyrphonothrus (T.) angulatus grandis* (Hammen, 1952) (*Trimalaconothrus g.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: Holanda, y Japón).

- *Tyrphonothrus (T.) angustirostrum* (Hammer, 1966) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Tyrphonothrus (T.) aquatilis* (Fain, Lambrechts *et* Wauthy, 1990) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Bélgica.
- *Tyrphonothrus (T.) auburnensis* (Habeeb, 1973) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva York.
- *Tyrphonothrus (T.) australis* (Hammer, 1958) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Tyrphonothrus (T.) barbatus* (Yamamoto, 1977) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (T.) barrancensis* (Hammer, 1961) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Tyrphonothrus (T.) binodulus* (Yamamoto *et* Coetzee, 2004) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Tyrphonothrus (T.) blancus* (Hammer, 1961) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Tyrphonothrus (T.) buresi* (Kunst, 1959) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Tyrphonothrus (T.) cajamarcensis* (Hammer, 1961) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú y Norte de India.
- *Tyrphonothrus (T.) canopeus* (Iglesias, Palacios-Vargas *et* Mahunka, 2001) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Tyrphonothrus (T.) crassipes* (Ramadan, Ismail *et* Mustafa, 2017) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Tyrphonothrus (T.) crassisetosus (Willmann, 1932) (*Trimalaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Australiana y Etiópica (Zambia).

- *Tyrphonothrus (T.) crassisetosus crassisetosus* (Willmann, 1932)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Tyrphonothrus (T.) crassisetosus fijiensis* (Hammer, 1971) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico y Nueva Caledonia) y Etiópica (Zambia).

- *Tyrphonothrus (T.) duoaculeus* (Yamamoto *et* Coetzee, 2004) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Malgache: I. Comores).

Tyrphonothrus (T.) glaber (Michael, 1888) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.) y Java.

- *Tyrphonothrus (T.) glaber glaber* (Michael, 1888)
  (=*Nothrus simplex* Banks, 1895)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.).
- *Tyrphonothrus (T.) glaber javensis* (Willmann, 1932) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Tyrphonothrus (T.) gnammaensis* Colloff *et* Cameron, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tyrphonothrus (T.) gringai* Colloff *et* Cameron, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tyrphonothrus (T.) heterotrichus* (Wallwork, 1973) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Tyrphonothrus (T.) humeratus* (P. Balogh, 1997) (*Trimalaconothrus*)
  (=*Trimalaconothrus humeratus* Balogh *et* P. Balogh, 2002, *nom. praeoc.* por P. Balogh, 1997)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Tyrphonothrus (T.) itatiaiae* (P. Balogh, 1997) (*Trimalaconothrus*)
  (=*Trimalaconothrus itatiaiae* Balogh *et* P. Balogh, 2002, *nom. praeoc.* por P. Balogh, 1997)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Tyrphonothrus (T.) kanaka* Colloff, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Tyrphonothrus (T.) latus* (Hammer, 1962) (*Fossonothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Tyrphonothrus (T.) lineolatus* (Balogh *et* P. Balogh, 1986) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Vietnam.
- *Tyrphonothrus (T.) lisosetosus*(Iglesias, Palacios-Vargas *et* Mahunka, 2001) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Tyrphonothrus (T.) magnilamellatus* (Yamamoto, 1996) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (T.) magnisetosus* (Iglesias, Palacios-Vargas *et* Mahunka, 2001) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Tyrphonothrus (T.) maior* (Berlese, 1910) (*Malaconothrus*)
  (=*Trimalaconothrus intermedius* Cooreman, 1941)
  (=*Malaconothrus novus* Sellnick, 1921)
  (=*Trimalaconothrus pilipes* Willmann, 1933)
  (=*Malaconothrus sphagnicola* Trägårdh, 1910)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente en Paleártica occidental, Neotropical, Etiópica: I. Santa Helena y Sudáfrica, Australiana: Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland]).
- *Tyrphonothrus (T.) maritimus* Colloff *et* Cameron, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tyrphonothrus (T.) mongolicus* (Bayartogtokh, 2010) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Tyrphonothrus (T.) novaezealandiae* (Hammer, 1966) (*Fossonothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tyrphonothrus (T.) obesus* (Yamamoto *et* Coetzee, 2004) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Tyrphonothrus (T.) papuensis* Colloff, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Tyrphonothrus (T.) pitentzin* (Iglesias, Palacios-Vargas *et* Mahunka, 2001) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Tyrphonothrus (T.) rafalskii* (Olszanowski, 1997) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Polonia.
- *Tyrphonothrus (T.) rectus* (Yamamoto *et* Coetzee, 2004) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Tyrphonothrus (T.) saxosus* (Knülle, 1957) (*Trimalaconothrus*)
  (?=*Malaconothrus optatus* Berlese, 1908 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa meridional y Este de Rusia asiática).
- *Tyrphonothrus (T.) scimitarum* (Tarras-Wahlberg, 1985) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Tyrphonothrus (T.) sculptus* (Knülle, 1957) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Tyrphonothrus (T.) scutatus* (Mihelčič, 1959) (*Trimalaconothrus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Tyrphonothrus (T.) taylori* Colloff *et* Cameron, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tyrphonothrus (T.) undulatus* (Yamamoto, Kuriki *et* Aoki, 1993) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (T.) wallworki* (Starý *et* Block, 1995) (*Fossonothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica: I. Georgia del Sur.
- *Tyrphonothrus (T.) wuyanensis* (Yamamoto, Aoki, Wang *et* Hu, 1993) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Península Malaya).
- *Tyrphonothrus (T.) yunnanensis* (Yamamoto *et* Aoki, 1998) (*Trimalaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Tyrphonothrus (Cristonothrus) Subías, 2004 (47 spp.)
ESPECIE TIPO: *Malaconothrus pauciareolatus* Subías *et* Sarkar, 1982
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) adilatatus* (Ermilov, Anichkin *et* Tolstikov, 2014) (*Malaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) agusanensis* (Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015) (*Malaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) asiaticus* (Aoki, 1967) (*Malaconothrus robustus a.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia e India).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) assamensis* (Chakrabarti *et* Talukdar, 1979) (*Malaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) atuelanus* (Hammer, 1958) (*Malaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) beecroftensis* Colloff *et* Cameron, 2013 (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) ciliarostralis* (Ermilov *et* Starý, 2019) (*Malaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) cordisetus* (Mahunka, 1993) (*Malaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) cornutus* (Hammer, 1973) (*Malaconothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) crassilamellaris* (Ermilov *et* Starý, 2019) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) engelbrechti* (Yamamoto *et* Coetzee, 2003) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) ensifer* (Mahunka, 1982) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Congo).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) foliatus* (Aoki, 1994) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas) y Filipinas.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) geminus* (Hammer, 1972) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) y Oriental.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) gogolensis* (Colloff, 2013) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) granulosus* (Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) hauseri* (Mahunka, 1984) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica (I. Seychelles).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) humboldtensis* (Ermilov, 2016) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) indifferens* (Hammer, 1966) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (Nueva Zelanda y Etiópica: Sudáfrica y Lesoto).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) iriomotensis* (Yamamoto *et* Aoki, 1997) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) kawensis* (Miko, 2019) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Guayana francesa.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) keriensis* (Hammer, 1966) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Bali.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) kiiensis* (Yamamoto, 1996) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) kotozenus* (Fujikawa, 2005) (*Malaconothrus (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) laensis* (Colloff, 2013) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) longidorsus* (Yamamoto *et* Coetzee, 2003) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Lesoto).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) mahunkai* Subías, 2020
(=*Malaconothrus heterotrichus* Mahunka, 1992, *nom. praeoc.* por Wallwork, 1973)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Senegal y Uganda).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) neoplumosus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) pachypilus* (Hammer, 1972) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) pauciareolatus* (Subías *et* Sarkar, 1982) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) peruensis* (Hammer, 1961) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico) e India (Tripura).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) plumosus* (Willmann, 1929) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) prismaticus* (Warburton, 1912) (*Nothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) pseudoadilatatus* (Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) ramensis* (Hammer, 1966) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Paquistán).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) robustus* (Hammer, 1958) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) rohri* (P. Balogh, 1997) (*Malaconothrus*)
(=*Malaconothrus rohri* Balogh *et* P. Balogh, 2002, *nom. praeoc.* por P. Balogh, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Pequeñas Antillas).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) rostropilosus* (Saha *et* Sanyal, 1996) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) sarkarae* Subías, 2016
(=*Malaconothrus crassisetosus* Subías *et* Sarkar, 1982, *nom. praeoc.* por Willmann, 1932)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) stigmatus* (Yamamoto *et* Coetzee, 2003) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) subrasus* (Balogh, 1964) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) translamellatus* (Hammer, 1958) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Antártica (I. Georgia del Sur) y subantártica.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) valerieae* (Balogh *et* P. Balogh, 2002) (*Malaconothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) variosetosus* (Hammer, 1971) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Melanesia) y Oriental.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) vilhenarum* (Balogh, 1958) (*Malaconothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) yamamotoi* (Aoki, 1994) (*Malaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) zealandicus* (Hammer, 1966) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Nothridae Berlese, 1896 (3 gen., 98 spp. y 6 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Nothrus Koch, 1835 (85 spp. y 6 sspp.)
(=***Angelia*** Berlese, 1885)
(=***Gymnonothrus*** Ewing, 1917)
(=***Vigilomicrozetes*** Tseng, 1982)
ESPECIE TIPO: *Nothrus palustris* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica)
- *Nothrus akitaensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus anauniensis* Canestrini *et* Fanzago, 1877
(?=*Nothrus biciliatus* Koch, 1844 *sp. inq.*)
(=*Nothrus pseudoborussicus* Mahunka 1978)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente en Paleártica.
- *Nothrus angolensis* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Nothrus ashoroensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus asiaticus* Aoki *et* Ohnishi, 1974 (*N. palustris a.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y China.
- *Nothrus bacilliseta* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus basilewskyi* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Nothrus baviensis* Krivolutsky, 1998
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Nothrus becki* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Nothrus berlesei* Subías, 2016
(=*Angelia pulchella crinita* Berlese, 1916, *nom. praeoc.* por Warburton *et* Pearce, 1905)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Nothrus bilongisetosus* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
Nothrus borussicus Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Neotropical.
- *Nothrus borussicus borussicus* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Norte de Neotropical.
- *Nothrus borussicus neonominatus* Subías, 2004 *ssp. inq.*
(=*Nothrus borussicus longipilus* Mihelčič, 1959, *nom. praeoc.* por Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Nothrus brasilensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Nothrus brevirostris* (Ewing, 1910) (*Notaspis*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Orissa).
- *Nothrus coniferus* Golosova *et* Karppinen, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Nothrus corticalis* Karpelles, 1893 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Nothrus cotopaxiensis* Kuty, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus crassisetus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Nothrus dinema* Haupt, 1882 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus discifer* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú e India (Himachal Pradesh).
- *Nothrus ellipticus* Haupt, 1882 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus engelbrechti* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Nothrus espinarensis* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Nothrus ezoensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus flagellum* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Nothrus glaesarius* Kuty, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus gracilis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.
- *Nothrus guiyangensis* Z.-Y. Hu *et* Jin, 2010

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nothrus hatanoensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus hauseri* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Nothrus ifeensis* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Nothrus incavatus* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Nothrus ishikariensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus jaliscoensis* Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Nothrus lasebikani* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Nothrus leleupi* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Nothrus longipilus* (Berlese, 1910) (*Angelia anauniensis l.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Nothrus louiseae* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Nothrus lucunosus* Sergienko *et* Melamud, 1993
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Nothrus lugubris* Canestrini, 1898 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nothrus macedi* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Nothrus madagascarensis* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Nothrus magnus* Palacios-Vargas *et* Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Nothrus meakanensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón y Nepal.
- *Nothrus minimus* Koch, 1844 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus monolongisetosus* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Nothrus montanus* Krivolutsky, 1998
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Nothrus monticola* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Himalaya.
- *Nothrus mystax* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Nothrus niedbalai* Kuty *et* Olszanowski, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus oblongus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú e I. Galápagos) y Oriental (Norte de India y Vietnam).
- *Nothrus obsoletus* (Koch, 1841) (*Celaeno*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus oceanicus* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Indonesia y Vietnam).
- *Nothrus olszanowskii* Kuty, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus pallidus* Kuty, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Nothrus palustris Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental (Himalaya) e I. Santa Helena.
- *Nothrus palustris palustris* Koch, 1839
(=*Nothrus bicolor* Koch, 1844)
(=*Nothrus pallens* Koch, 1844)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental (Himalaya) e I. Santa Helena.
- *Nothrus palustris azorensis* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Nothrus palustris bipilis* Banks, 1895 (*N. b.*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- *Nothrus perezinigoi* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centooccidental, Irán y Este de U.S.A.).
- *Nothrus peruensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Sureste de U.S.A.
- *Nothrus phylliformis* Ermilov, Kalúz *et* Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Assam) y Nepal.
- *Nothrus pileiformis* Karpelles, 1884 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Pensilvania).
- *Nothrus piriformis* Kuty, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus posticus* Koch, 1839 *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Vigilomicrozetes pulchellus* Tseng, 1982, *nom. praeoc.* por Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Nothrus pratensis* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Nothrus pulchellus* (Berlese, 1910) (*Angelia*)
(=*Nothrus parvus* Sitnikova, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Europa centromeridional y Paleártica oriental) y "Canadá".
- *Nothrus pumilatus* Golosova *et* Karppinen, 1985
DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.
- *Nothrus quadripilus* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental y Méjico.
- *Nothrus reticulatus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Islas del Este de Rusia asiática y Túnez).
- *Nothrus reunionensis* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Nothrus sadoensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus senegalensis* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Senegal y Tanzania).
- *Nothrus separatum* Nakamura, Y.- N. Nakamura *et* Fujikawa, 2013
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus septatus* Golosova *et* Karppinen, 1985
DISTRIBUCIÓN: Norte de Rusia europea.
- *Nothrus seropedicalensis* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Nothrus seychellensis* Warburton, 1912
(=*Nothrus scotti* Warburton, 1912)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Nothrus shapensis* Krivolutsky, 1998
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
Nothrus silvestris Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Nepal, Nueva Zelanda y Méjico.
- *Nothrus silvestris silvestris* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Nepal, Nueva Zelanda y Méjico.
- *Nothrus silvestris bistilus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Nothrus silvestris exilior* Jacot, 1937 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Kentucky).
- *Nothrus silvicus* Jacot, 1937 (*N. truncatus s.*)
(?=*Angelia anauniensis monodactyla* Berlese, 1910)
(?=*Nothrus terminalis* Banks, 1910)
(=*Nothrus terminalis carolinae* Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: menos frecuente en el Norte.
- *Nothrus springsmythi* Sheals, 1965
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Nothrus suramericanus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Nothrus taisetsuensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
Nothrus truncatus Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Nothrus truncatus truncatus* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Nothrus truncatus robustus* Jacot, 1937 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Maine).
- *Nothrus undulatus* Hirauchi *et* Aoki, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus willmanni* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Nothrus xuejianensis* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Novonothrus Hammer, 1966 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Novonothrus flagellatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).
- *Novonothrus barringtonensis* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novonothrus coronospinosus* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novonothrus covarrubiasi* Casanueva *et* Norton, 1997
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Novonothrus flagellatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Novonothrus glabriseta* Colloff, 2011

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Novonothrus kethleyi* Casanueva *et* Norton, 1998
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Novonothrus lucasi* Olszanowski *et* Bromberek, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novonothrus nothofagii* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novonothrus papuensis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Novonothrus puyehue* Casanueva *et* Norton, 1997
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Novonothrus silvanus* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Trichonothrus Mahunka, 1986 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Trichonothrus austroafricanus* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Australiana.
- *Trichonothrus austroafricanus* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Trichonothrus hallidayi* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Crotoniidae Thorell, 1876 (5 gen., 3 subgen., 167 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Austronothrus Hammer, 1966 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Austronothrus curviseta* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Austronothrus clarki* Colloff *et* Cameron, 2009
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austronothrus curviseta* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austronothrus flagellatus* Colloff *et* Cameron, 2009
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austronothrus kinabalu* Colloff *et* Cameron, 2014
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Austronothrus rostralis* Colloff *et* Cameron, 2014
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).

Camisia Heyden, 1826 (34 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis segnis* Hermann, 1804
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Camisia (Camisia) Heyden, 1826 (29 spp. y 1 ssp.)
(=***Uronothrus*** Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Camisia (C.) abdosensilla* Olszanowski *et* Clayton, 2002
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Camisia (C.) amictus* (Sowerby, 1806) (*Acarus*) *sp. inq.*
(=*Nothrus angulatus* Koch, 1839 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas y Alemania.
- *Camisia (C.) arcuata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Camisia (C.) australis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
Camisia (C.) biurus (Koch, 1839) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
  - *Camisia (C.) biurus biurus* (Koch, 1839)
  (=*Nothrus bispinosus* Koch, 1839)
  (=*Camisia exuvialis* Grandjean, 1939)
  (=*Nothrus furcatus* Koch, 1839: juvenil)
  (=*Uronothrus kochi* Willmann, 1943)
  (=*Nothrus pigerrimus* Koch, 1844)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
  - *Camisia (C.) biurus amicus* Jacot, 1938 (*C. segnis a.*) *ssp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Camisia (C.) biverrucata* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
(?=*Acarus scaber* Linnaeus, 1758 *sp. inq.*)
(=*Camisia berlesei* Oudemans, 1900)
(=*Camisia fischeri* Oudemans, 1900)
(=*Camisia nicoleti* Oudemans, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Nepal.
- *Camisia (C.) borealis* (Thorell, 1871) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Eurosiberiana, Cáucaso, Irán, Este de Rusia asiática y Groenlandia).
- *Camisia (C.) carrolli* André, 1980
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de U.S.A.

- *Camisia (C.) dictyna* Colloff, 1993
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Camisia (C.) flagellata* (Berlese, 1888) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Camisia (C.) foveolata* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Boreal y Chile.
- *Camisia (C.) grymae* Colloff, 1993
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Camisia (C.) hamulifera* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Etiópica (Sudáfrica y Etiopía), subantártica (Isla de Gough [Tristán de Acuña]) y Taiwán [Formosa].
- *Camisia (C.) heterospinifer* Fujikawa, 1998
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Camisia (C.) horrida* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
(=*Camisia anomia* Colloff, 1993)
(=*Nothrus mutilus* Koch, 1839)
(=*Nothrus rugulosus* Banks, 1895)
(=*Nothrus runcinatus* Koch, 1839: juvenil)
(=*Nothrus sinuatus* Koch, 1839: juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Norte de Oriental, Etiópica (Etiopía) y Norte de Neotropical.
- *Camisia (C.) invenusta* (Michael, 1888) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Norte de Oriental.
- *Camisia (C.) khencensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile).
- *Camisia (C.) nortoni* Colloff, 1993
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Camisia (C.) nova* (Hammer, 1966) (*C. segnis n.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Hawái) y Neotropical (frecuente).
- *Camisia (C.) oregonae* Colloff, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Oregón, y Canadá).
- *Camisia (C.) orthogonia* Olszanowski, Szywilewska *et* Norton, 2001
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Camisia (C.) polytricha* Piffl, 1971
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Camisia (C.) segnis* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
(=*Nothrus bicarinatus* Koch, 1839)
(=*Nothrus excisus* Banks, 1895)
(=*Nothrus rostratus* Koch, 1839)
(=*Camisia segnis segnoides* André, Lebrun *et* Leroy, 1984)
(=*Nothrus ventricosus* Koch, 1839)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Oriental, Neotropical y Antártica).
- *Camisia (C.) spinifer* (Koch, 1835) (*Nothrus*)
(=*Nothrus ansatus* Haupt, 1882)
(=*Nothrus concavus* Haupt, 1882)
(=*Nothrus echinatus* Koch, 1835)
(=*Nothrus quadracanthus* Haupt, 1882)
(=*Nothrus sordidus* Koch, 1839: juvenil)
(=*Nothrus superbus* Berlese, 1910)
(=*Nothrus taurinus* Banks, 1906)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Oriental y Neotropical: Brasil y Panamá).
- *Camisia (C.) tatrica* Olszanowski, 1994
DISTRIBUCIÓN: Polonia.
- *Camisia (C.) tryphosa* Colloff, 1993
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Etiopía).
- *Camisia (C.) umbratilis* (Hull, 1915) (*Nothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Camisia (C.) valerieae* Colloff, 1993
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Camisia (C.) zangherii* Lombardini, 1962 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.

Camisia (Ensicamisia) Kunst, 1971 (5 spp.)
(=***Ivarsia*** Karppinen *et* Krivolutsky, 1987)
ESPECIE TIPO: *Nothrus lapponicus* Trägårdh, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Camisia (Ensicamisia) lapponica* (Trägårdh, 1910) (*Nothrus*)
(=*Camisia labradorica* Behan-Pelletier, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.
- *Camisia (Ensicamisia) monongahelae* Bromberek *et* Olszanowski, 2012 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia Occidental).
- *Camisia (Ensicamisia) presbytis* Colloff, 1993 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).
- *Camisia (Ensicamisia) sibirica* Karppinen *et* Krivolutsky, 1987 (*C. (Ivarsia)*)
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Camisia (Ensicamisia) solhoeyi* Colloff, 1993 (*C.*)
(=*Camisia islandica* Gjelstrup *et* Solhøy, 1994)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur) y Oriental (China suroriental y Nepal).

Crotonia Thorell, 1876 (66 spp.)
(=***Acronothrus*** Berlese, 1916)
(=***Westwoodia*** Cambridge, 1875, *nom. praeoc.* por Brullé, 1846)
ESPECIE TIPO: *Westwoodia obtecta* Cambridge, 1875
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Oriental) y austral.

- *Crotonia aculeata* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Crotonia alluaudi* (Berlese, 1916) (*Nothrus (Acronothrus)*)
  DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Crotonia alpina* Colloff *et* Perdomo, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia americana* (Berlese, 1901) (*Neoliodes*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Crotonia ardala* Luxton, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia blacki* Colloff *et* Perdomo, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia blaszaki* Szywilewska, Olszanowski *et* Norton, 2005
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Crotonia borbora* Luxton, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia brassicae* Wallwork, 1977
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Crotonia brevicornuta* (Wallwork, 1966) (*Acronothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Clampbell).
- *Crotonia brisbanensis* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia camelus* (Berlese, 1910) (*Nothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia y "Sudamérica".
- *Crotonia cameroni* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia camillae* Łochińska, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Crotonia capistrata* Luxton, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia carioca* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Crotonia caudalis* (Hammer, 1966) (*Acronothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia cervicorna* Luxton, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia chiloensis* Wallwork, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Crotonia cophinaria* (Michael, 1908) (*Nothrus*)
  (=*Acronothrus brachyrostrum* Hammer, 1966)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Argentina.
- *Crotonia cornuta* Colloff *et* Perdomo, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia cupulata* Luxton, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia daviesae* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia dicella* Colloff, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Tasmania.
- *Crotonia ecphyla* Colloff, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Crotonia eungella* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia flagellata* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Acronothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Crotonia gadubanudi* Colloff *et* Perdomo, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia gorgonia* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Lord Howe).
- *Crotonia jethurmerae* Lee, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia lanceolata* Wallwork, 1977
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Crotonia longibulbula* Luxton, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia longisetosa* Łochińska, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia lyrata* Colloff, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Crotonia macfadyeni* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Crotonia maculata* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia marlenae* Olszanowski, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Crotonia momitoi* Colloff *et* Perdomo, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia monteithi* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia norfolkensis* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Crotonia nukuhivae* (Jacot, 1934) (*Acronothrus*)
  (=*Crotonia melanesiae* Wallwork, 1977)
  (=*Acronothrus nukuhivae hivaoae* Jacot, 1934)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Crotonia obtecta* (Cambridge, 1875) (*Westwoodia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Chile.
- *Crotonia ovata* Olszanowki, 2000
  (=*Holonothrus ryszardi* Łochińska, 2008)
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Crotonia pauropelor* Colloff, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Crotonia perforata* Wallwork, 1977
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Crotonia pulchra* (Beck, 1962) (*Acronothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Crotonia pyemaireneri* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Crotonia queenslandiae* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia ramsayi* Colloff, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia raveni* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia reticulata* Luxton, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia rothschildi* (Berlese, 1916) (*Nothrus (Acronothrus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Crotonia seemani* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia sterigma* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia tasmaniana* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Crotonia tasmanica* Łochińska, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Crotonia tryjanowskii* Olszanowski, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia tuberculata* Luxton, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia unguifera* (Michael, 1908) (*Nothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia utricularia* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Crotonia valdivia* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Crotonia venetiolana* Łochińska, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Crotonia victoriae* Colloff *et* Perdomo, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia wallworki* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Crotonia weiri* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia yeatesi* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Heminothrus Berlese, 1913 (47 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Nothrus targionii* Berlese, 1885
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Heminothrus (Heminothrus) Berlese, 1913 (10 spp.)
(=***Paulonothrus*** Kunst, 1971)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Heminothrus (H.) apophysiger* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Heminothrus (H.) interlamellaris* Jacot, 1939 (*H. longisetosus i.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Heminothrus (H.) leleupi* (Balogh, 1958) (*Platynothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Heminothrus (H.) longisetosus* (Willmann, 1925) (*Nothrus (H.) paolianus l.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Norte) y Taiwán [Formosa].
- *Heminothrus (H.) minor* Aoki, 1969
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Canadá) y Oriental (China suroriental y Filipinas).
- *Heminothrus (H.) ornatissimus* (Berlese, 1910) (*Angelia*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Heminothrus (H.) oromii* Morell *et* Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Heminothrus (H.) paolianus* (Berlese, 1913) (*Nothrus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica, U.S.A.: Míchigan, y Groenlandia).
- *Heminothrus (H.) papua* (Balogh *et* P. Balogh, 1986) (*Holonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Heminothrus (H.) similis* Fujikawa, 1998
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Heminothrus (H.) targionii* (Berlese, 1885) (*Nothrus*)
(=*Nothrus (Heminothrus) princeps* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental (China suroriental y Nepal) y Panamá.

Heminothrus (Capillonothrus) Kunst, 1971 (19 spp. y 2 sspp.)
(=***Ovonothrus*** Kunst, 1971)
(=***Paracamisia*** Olszanowski *et* Norton, 2002)
ESPECIE TIPO: *Angelia thori* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical.
- *Heminothrus (Capillonothrus) biangulatus* (Hammer, 1962) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Heminothrus (Capillonothrus) bicarinatus* (Jacot, 1938) (*Platynothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.
- *Heminothrus (Capillonothrus) bistriatus* (Chakrabarti *et* Mondal, 1978) (*Sigmonothrus*)
(no *Nothrus bistriatus* Koch, 1839, = *Heminothrus (Platynothrus) peltifer*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
Heminothrus (Capillonothrus) capillatus (Berlese, 1914) (*Angelia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica, U.S.A.: California, y Groenlandia).
- *Heminothrus (Capillonothrus) capillatus capillatus* (Berlese, 1914)
(=*Platynothrus capillatus septentrionalis* Sellnick, 1944)
(=*Platynothrus maior* Willmann, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica, U.S.A.: California, y Groenlandia).
- *Heminothrus (Capillonothrus) capillatus kikonaiensis* (Fujikawa, 1982) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Heminothrus (Capillonothrus) capillatus peltiferinus* (Winkler, 1955) (*Platynothrus*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Heminothrus (Capillonothrus) castaneus* (Hammer, 1961) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Heminothrus (Capillonothrus) exaggeratus* Hammer, 1979 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Heminothrus (Capillonothrus) fluviatilis* (Hull, 1913) (*Hermannia*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Heminothrus (Capillonothrus) glaber* Mahunka, 1984 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Heminothrus (Capillonothrus) leleupi* (Balogh, 1958) (*Platynothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Heminothrus (Capillonothrus) maximus* (Trägårdh, 1901) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Heminothrus (Capillonothrus) meakanensis* (Fujikawa, 1982) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Heminothrus (Capillonothrus) microclava* Hammer, 1966 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Heminothrus (Capillonothrus) nevadensis* (Pérez-Íñigo, 1969) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (España y Corea).
- *Heminothrus (Capillonothrus) numatai* (Aoki, 1965) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Heminothrus (Capillonothrus) osornensis* (Olszanowski *et* Norton, 2002) (*Paracamisia*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Heminothrus (Capillonothrus) skottsbergi* (Trägårdh, 1931) (*Platynothrus*)
(=*Platynothrus skottsbergi expansus* Wallwork, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Austral (Neotropical, Nueva Zelanda y Antártica: I. Georgia del Sur, y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland]).
- *Heminothrus (Capillonothrus) thori* (Berlese, 1904) (*Angelia*)
(=*Nothrus crinitus* Warburton *et* Pearce, 1905)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica: menos frecuente en el Sur) y Oriental (China suroriental e India: Sikkim).
- *Heminothrus (Capillonothrus) traversus* Hammer, 1966 (*H.*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Heminothrus (Capillonothrus) yamasakii* Aoki, 1958 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica oriental meridional: frecuente, y "Este de Canadá") y China suroriental.

Heminothrus (Platynothrus) Berlese, 1913 (18 spp. y 1 ssp.)
(=***Neonothrus*** Forsslund, 1955)
(=***Sigmonothrus*** Chakrabarti *et* Kundu, 1978)
ESPECIE TIPO: *Nothrus peltifer* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Heminothrus (Platynothrus) altimontanus* (Hammer, 1958) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Heminothrus (Platynothrus) banksi* (Michael, 1898) (*Nothrus*)
(=*Nothrus furcatus* Banks, 1895, *nom. praeoc.* por Koch, 1839)
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental y China suroriental.
- *Heminothrus (Platynothrus) brevisetosus* (Lee, 1985) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Heminothrus (Platynothrus) carinatus* (Banks, 1910) (*Nothrus*) *sp. inq.*
(no *Hermannia carinata* Kramer, 1897, =*Heminothrus (Platynothrus) punctatus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Heminothrus (Platynothrus) fossatus* (Kramer, 1898) (*Nothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Heminothrus (Platynothrus) hooki* (Piffl, 1966) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Heminothrus (Platynothrus) humicola* (Forsslund, 1955) (*Neonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina e Irán.
- *Heminothrus (Platynothrus) krivolutskyi* Subías, 2016
(=*Neonothrus sibiricus* Krivolutsky, 1984, *nom. praeoc.* por Sitnikova, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Siberia.
- *Heminothrus (Platynothrus) novaezealandicus* (Balogh *et* P. Balogh, 2002) (*P.*)
(=*Platynothrus major* Hammer, 1966, *nom. praeoc.* por Willmann, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Heminothrus (Platynothrus) ovatus* (Kundu *et* Mondal, 1978) (*Sigmonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
Heminothrus (Platynothrus) peltifer (Koch, 1839) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Norte de Oriental, Australiana: Nueva Zelanda, Norte de Neotropical e I. Santa Helena).
- *Heminothrus (Platynothrus) peltifer peltifer* (Koch, 1839)
(=*Heminothrus abchasicus* Tarba, 1990)
(=*Nothrus bicristatus* Haupt, 1882)
(=*Nothrus bistriatus* Koch, 1839)
(=*Nothrus cirrosus* Canestini *et* Fanzago, 1877)
(=*Platynothrus grandjeani* Sitnikova, 1975)
(?=*Acarus infusionum* Schrank, 1803 *sp. inq.*)
(=*Nothrus palliatus* Koch, 1839)
(=*Nothrus spirofilus* Haupt, 1882)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Norte de Oriental, Australiana: Nueva Zelanda, Norte de Neotropical e I. Santa Helena).
- *Heminothrus (Platynothrus) peltifer japonensis* (Fujikawa, 1972) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Japón y Europa central).
- *Heminothrus (Platynothrus) praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Sigmonothrus quadristriatus* Chakrabarti *et* Kundu, 1978, *nom. praeoc.* por Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Heminothrus (Platynothrus) punctatus* (L. Koch, 1879) (*Nothrus*)
(=*Hermannia carinata* Kramer, 1897)
(=*Heminothrus valentianus* Hull, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.
- *Heminothrus (Platynothrus) quadristriatus* (Hammer, 1958) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina y Vietnam.
- *Heminothrus (Platynothrus) reductus* (Balogh *et* P. Balogh, 1986) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Heminothrus (Platynothrus) robustior* Berlese, 1916 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Uruguay).
- *Heminothrus (Platynothrus) sibiricus* (Sitnikova, 1975) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica oriental y Neártica) y Norte de Neotropical.
- *Heminothrus (Platynothrus) tenuiclava* (Hammer, 1966) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Holonothrus Wallwork, 1963 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Holonothrus foliatus* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Holártica y Oriental).
- *Holonothrus artus* Olszanowski, 1999
DISTRIBUCIÓN: Chile y Melanesia (I. Salomón).
- *Holonothrus concavus* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Holonothrus ecuadoriensis* Kuty, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Holonothrus foliatus* Wallwork, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).
- *Holonothrus glaesarius* Łochyńska, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Holonothrus gracilis* Olszanowski, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Holonothrus minusculus* Łochyńska, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Holonothrus mitis* Olszanowski, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Holonothrus naskreckii* Olszanowski, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Holonothrus nortoni* Olszanowski, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Holonothrus novaecaledoniae* Olszanowski, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Holonothrus pulcher* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Holonothrus robustus* Olszanowski, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Holonothrus venetiolanus* Olszanowski, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Chile).
- *Holonothrus virungensis* Norton *et* Olszanowski, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Congo.

Suborden BRACHYPYLINA Hull, 1918

Infraorden PYCNONOTICAE Grandjean, 1954

Nanhermannioidea Sellnick, 1928

Nanhermanniidae Sellnick, 1928 (7 gen., 1 subgen. y 66 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Bicyrthermannia Hammer, 1979 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Bicyrthermannia duodentata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Bicyrthermannia bicornicula* (Tseng, 1982) (*Cyrthermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Bicyrthermannia bicornuta* (Haq, 1978) (*Cyrthermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Bicyrthermannia cagayana* (Corpuz-Raros, 1979) (*Cyrthermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Bicyrthermannia duodentata* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia e India: Kerala) e Irán.
- *Bicyrthermannia ezzati* (Bayoumi *et* Mahunka, 1977) (*Cyrthermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Bicyrthermannia foliata* (Mahunka, 1985) (*Cyrthermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Bicyrthermannia nigeriana* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
  DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Bicyrthermannia quadricornuta* (Chakrabarti *et* Bhaduri, 1978) (*Cyrthermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.

Cosmohermannia Aoki *et* Yoshida, 1970 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmohermannia frondosa* Aoki *et* Yoshida, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Australianooriental.

- *Cosmohermannia frondosa* Aoki *et* Yoshida, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Cosmohermannia robusta* (Aoki, 1994) (*Nippohermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana: Micronesia (I. Marianas), y Oriental: Vietnam.

Cyrthermannia Balogh, 1958 (11 spp.)
(=***Linothrus*** Tseng, 1982)
ESPECIE TIPO: *Cyrthermannia tuberculata* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Cyrthermannia baloghorum* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Cyrthermannia bifurcata* Miko, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Guayana francesa.
- *Cyrthermannia florens* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cyrthermannia guadeloupensis* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cyrthermannia luminosa* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Filipinas).

- *Cyrthermannia nasata* (Warburton, 1912) (*Hermannia*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Cyrthermannia perinfamis* (Tseng, 1982) (*Linothrus*) *sp. inq.* (juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Cyrthermannia simplex* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cyrthermannia stellata* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Australiana: Nueva Guinea, y Oriental: Ceilán [Sri Lanka].
- *Cyrthermannia tuberculata* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún), Mediterránea oriental y Java.
- *Cyrthermannia vicinicornuta* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Brasil.

Dendrohermannia P. Balogh, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmohermannia monstruosa* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Dendrohermannia monstruosa* (Aoki, 1977) (*Cosmohermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea) y Oriental.

Masthermannia Berlese, 1913 (10 spp.)
(=***Phyllonothrus*** Sellnick, 1959)
(=***Posthermannia*** Grandjean, 1954)
ESPECIE TIPO: *Angelia mammillaris* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Masthermannia extrema* (Balogh, 1958) (*Posthermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Masthermannia grandjeani* (Balogh, 1958) (*Posthermannia*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Masthermannia hauseri* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Masthermannia hirsuta* (Hartman, 1949) (*Nanhermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, China suroriental y U.S.A. (Tejas).
- *Masthermannia mammillaris* (Berlese, 1904) (*Angelia*)
  (=*Posthermannia nematophora* Grandjean, 1954)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Masthermannia multiciliata* Nakamura, Y.- N. Nakamura *et* Fujikawa, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Masthermannia ornatissima* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Masthermannia runcifer* (Sellnick, 1959) (*Phyllonothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai].
- *Masthermannia sahariensis* Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid *et* Khalil, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Masthermannia seropedica* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Nanhermannia Berlese, 1913 (33 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nothrus nanus* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Nanhermannia (Nanhermannia) Berlese, 1913 (31 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Nanhermannia (N.) acutisetosa* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Nanhermannia (N.) angulata* Fujikawa, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Nanhermannia (N.) bifurcata* Fujikawa, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nanhermannia (N.) comitalis* Berlese, 1916
  (=*Nanhermannia ussurica* Golosova, 1969)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Noreste de U.S.A.).
- *Nanhermannia (N.) continua* Golosova *et* Karppinen, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Nanhermannia (N.) domrowi* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Nanhermannia (N.) dorsalis* (Banks, 1896) (*Carabodes*)
  (=*Nanhermannia coronata* Berlese, 1913)
  (=*Nanhermannia hiemalis* Fujikawa, 2003)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y China suroriental.
- *Nanhermannia (N.) elegantissima* Hammer, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Nanhermannia (N.) elegantula* Berlese, 1913
  (=*Nanhermannia areolata* Strenzke, 1953)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica e I. Santa Helena.
- *Nanhermannia (N.) fenneri* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Australiana: Nueva Guinea, y Oriental: Filipinas.

- *Nanhermannia (N.) forsslundi* Karppinen, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Norte de Europa y Sur de Siberia).
- *Nanhermannia (N.) gladiata* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Nanhermannia (N.) gorodkovi* Sitnikova, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Asia central rusa e I. Kuriles) e India (Bengala Occidental).
- *Nanhermannia (N.) grandjeani* Lee, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Nanhermannia (N.) himalayensis* Chakrabarti *et* Raychaudhuri, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Nanhermannia (N.) komareki* Kunst, 1956
  DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Nanhermannia (N.) laevis* Sitnikova, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (I. Sajalín e Irán).
- *Nanhermannia (N.) milloti* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Nanhermannia (N.) nana* (Nicolet, 1855) (*Nothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica: frecuente, Neotropical, Norte de Oriental, Nueva Zelanda, Etiópica: I. Santa Helena y Sudáfrica, y Antártica).
- *Nanhermannia (N.) pectinata* Strenzke, 1953
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Nanhermannia (N.) pluriseta* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Nanhermannia (N.) quadridentata* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y "Mediterránea".
- *Nanhermannia (N.) sabahensis* Fujikawa, 1990
  (=*Nanhermannia pluriseta* Mahunka, 1988, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Nanhermannia (N.) sellnicki* Forsslund, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Eurosiberiana, Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
- *Nanhermannia (N.) tenuicoma* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Nanhermannia (N.) tenuisetosa* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Nanhermannia (N.) thaiensis* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Nanhermannia (N.) tokara* Aoki, 1987 (*N. nana t.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nanhermannia (N.) transversaria* Hammer, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Nanhermannia (N.) triangula* Fujikawa, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nanhermannia (N.) verna* Fujikawa, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Nanhermannia (Nippohermannia) P. Balogh, 1985 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nanhermannia parallela* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.
- *Nanhermannia (Nippohermannia) formosana* (Tseng, 1982) (*Cyrthermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Nanhermannia (Nippohermannia) parallela* Aoki, 1961 (*Nan.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Cáucaso y Oriental.

Notohermannia P. Balogh, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Notohermannia obtusa* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
- *Notohermannia obtusa* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia y Perú.

Hermannioidea Sellnick, 1928

Hermanniidae Sellnick, 1928 (3 gen., 2 subgen. y 115 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Galapagacarus P. Balogh, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Galapagacarus schatzi* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galapagacarus schatzi* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Hermannia Nicolet, 1855 (113 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Hermannia crassipes* Nicolet, 1855) =*Nothrus gibbus* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Hermannia (Hermannia) Nicolet, 1855 (15 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Paleotropical, “Neotropical” y “Australiana”.

- *Hermannia (H.) canariensis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Hermannia canestrinii* (Tietze, 1899) (*Hypochthonius*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Hermannia (H.) clara* Sitnikova, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de Paleártica oriental.
- *Hermannia (H.) convexa* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
  (=*Hermannia grandis* Berlese, 1910)
  (=*Claviceps rugosus* L. Koch, 1879: juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental y U.S.A.: Virginia), India (Sikkim) e I. Seychelles.
- *Hermannia (H.) dentipes* Canestrini, 1898 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Hermannia (H.) doliaris* (Koch, 1839) (*Nothrus*) *sp. inq.* (juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Hermannia (H.) exilis* Canestrini, 1897 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Hermannia (H.) gibba* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
  (=*Hermannia crassipes* Nicolet, 1855)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica e I. Seychelles.
- *Hermannia (H.) hokkaidensis* Aoki *et* Ohnishi, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Canadá.
- *Hermannia (H.) jesti* Travé, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Hermannia (H.) macronycha* Trägårdh, 1907 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Hermannia (H.) neotricha* Choi, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Hermannia (H.) ovulum* (Haupt, 1882) (*Nothrus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Hermannia (H.) shimanoi* Aoki, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermannia (H.) trinebulosa* Riley, 1885 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: "U.S.A."

Hermannia (Heterohermannia) Woas, 1992 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hermannia reticulata* Thörell, 1871
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Hermannia (Heterohermannia) evidens* Pérez-Íñigo, 1992 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Hermannia (Heterohermannia) gracilis* Woas, 1978 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Hermannia (Heterohermannia) intermedia* Woas, 1980 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Hermannia (Heterohermannia) minuta* Woas, 1981 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Hermannia (Heterohermannia) nodosa* Michael, 1888 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa occidental y Groenlandia).
- *Hermannia (Heterohermannia) polystriata* Woas, 1978 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Hermannia (Heterohermannia) pseudonodosa* Woas, 1981 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Hermannia (Heterohermannia) pulchella* Willmann, 1952 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Hermannia (Heterohermannia) reticulata* Thörell, 1871 (*Herm.*)
  (=*Hermannia quadriseriata* Banks, 1898)
  DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Hermannia (Heterohermannia) scabra* (L. Koch, 1879) (*Nothrus*)
  (=*Hermannia gigantea* Sitnikova, 1975)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Hermannia (Heterohermannia) schusteri* Woas, 1980 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (excepto Oeste).
- *Hermannia (Heterohermannia) subglabra* Berlese, 1910 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa y Neártica septentrional).
- *Hermannia (Heterohermannia) woasi* Pérez-Íñigo, 1992 (*Herm.*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

Hermannia (Phyllhermannia) Berlese, 1916 (85 spp.)
(=***Lawrencoppia*** Jacot, 1936)
ESPECIE TIPO: *Hermannia phyllophora* Michael, 1908
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y subantártica.

- *Hermannia (Phyllhermannia) ababa* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) acalepha* (Colloff, 2011) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) africana* (Balogh, 1958) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hermannia (Phyllhermannia) angulata* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) areolata* (Aoki, 1970) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermannia (Phyllhermannia) bandabanda* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) becki* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hermannia (Phyllhermannia) benguetana* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) berlesei* (Mondal, 1984) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Oriental.
- *Hermannia (Phyllhermannia) bimaculata* (Hammer, 1979) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hermannia (Phyllhermannia) canlaonensis* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) clavata* Mahunka, 1985 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) colini* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) colloffi* (Luxton, 1991) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) comparabilis* Wet, 1993 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) coronata* (Mahunka, 1991) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hermannia (Phyllhermannia) craticula* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) croajingolongensis* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) curvata* (Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2009) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) dentata* Trägårdh, 1931 (*P.*)
(=*Phyllhermannia dentata glabra* Hammer, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral e Irán.
- *Hermannia (Phyllhermannia) dinghuensis* Lu *et* Wang, 1995
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hermannia (Phyllhermannia) engelbrechti* Wet, 1993 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) errinundrae* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) eusetosa* (Lee, 1985) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) exobothridialis* Wet, 1993 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) exornata* (Balogh, 1964) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hermannia (Phyllhermannia) falklandica* (P. Balogh, 1988) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland], y Chile.
- *Hermannia (Phyllhermannia) filipina* (Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2009) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) foliata* (Hammer, 1966) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermannia (Phyllhermannia) forsteri* (P. Balogh, 1985) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Hermannia (Phyllhermannia) foveolata* (Sanyal, 1990) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hermannia (Phyllhermannia) fungifer* Mahunka, 1988 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hermannia (Phyllhermannia) gigas* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) gladiata* (Aoki, 1965) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).
- *Hermannia (Phyllhermannia) goldengatensis* (Ermilov, Hugo-Coetzee, Khaustov *et* V. Khaustov, 2020) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) heterotricha* Mahunka, 1988 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hermannia (Phyllhermannia) hunti* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) javensis* (Hammer, 1979) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hermannia (Phyllhermannia) kanoi* Aoki, 1959 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Japón.
- *Hermannia (Phyllhermannia) leei* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Hermannia (Phyllhermannia) lemannae* (Colloff, 2011) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) leonilae* (Colloff, 2011) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) leytensis* (Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2009) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) longipediseta* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) longisetosa* Subías *et* Shtanchaeva, 2013
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hermannia (Phyllhermannia) louisiae* Wet, 1993 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) luxtoni* (Colloff, 2011) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) maganda* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) malindangensis* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) maruokaensis* Nakamura, Y.-N. Nakamura, Hashimoto *et* Gotoh, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermannia (Phyllhermannia) mauritii* (Jacot, 1936) (*Lawrencoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Hermannia (Phyllhermannia) modesta* (Mahunka, 1978) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Hermannia (Phyllhermannia) mollis* (Hammer, 1966) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermannia (Phyllhermannia) namadjiensis* (Colloff, 2011) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) natalensis* Wet, 1993 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) nathanaeli* Wet, 1993 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) neonominata* Subías, 2004
  (=*Phyllhermannia mauritii* Mahunka, 1978, *nom. praeoc.* por Jacot, 1936)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Hermannia (Phyllhermannia) neotropica* Woas, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hermannia (Phyllhermannia) notogastralis* Wet, 1993 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pacifica* (Hammer, 1972) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pauliani* (Balogh, 1964) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hermannia (Phyllhermannia) phylliformis* Wet, 1993 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) phyllophora* Michael, 1908 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pinicola* (Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2011) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pocsi* Mahunka, 1985 (*H.*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hermannia (Phyllhermannia) polilloensis* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pulchra* (Aoki, 1973) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Hermannia (Phyllhermannia) punctata* (Sanyal, 1990) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hermannia (Phyllhermannia) quadrirotunda* (Hammer, 1979) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Hermannia (Phyllhermannia) rubra* (Hammer, 1966) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermannia (Phyllhermannia) samarensis* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) sauli* (Colloff, 2011) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) sculpturata* Mahunka, 1983 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hermannia (Phyllhermannia) serrata* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) setiformis* Wet, 1993 (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).
- *Hermannia (Phyllhermannia) shikongensis* (Ermilov *et* Liao, 2020) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Hermannia (Phyllhermannia) similis* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Taiwán [Formosa]).
- *Hermannia (Phyllhermannia) spathulata* Mahunka, 1985 (*H.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) strigosa* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) tanjili* (Colloff, 2011) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) tenuiseta* (P. Balogh, 1988) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hermannia (Phyllhermannia) transvaalensis* Wet, 1993 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) tremicta* (Mahunka, 1978) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Hermannia (Phyllhermannia) truncata* (Wang, 1993) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hermannia (Phyllhermannia) tuberculata* (Covarrubias, 1967) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Irán.
- *Hermannia (Phyllhermannia) vermicula* (Corpuz-Raros, 2009) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Neohermannia Bayoumi *et* Mahunka, 1979 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Neohermannia trichosa* Bayoumi *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Neohermannia trichosa* Bayoumi *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Bután.

Hermannielloidea Grandjean, 1934

Hermanniellidae Grandjean, 1934 (9 gen., 62 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Akansilvanus Fujikawa, 1993 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Akansilvanus parvus* Fujikawa, 1993
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Akansilvanus parvus* Fujikawa, 1993
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Ampullobates Grandjean, 1962 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ampullobates nigriclavatus* Grandjean, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Ampullobates ecuadoriensis* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Ampullobates nigriclavatus* Grandjean, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Baloghacarus Balogh *et* Mahunka, 1981 (2 spp.)
(=***Baloghacarus*** Mahunka, 1983, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Mahunka, 1981)
ESPECIE TIPO: *Baloghacarus australis* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Baloghacarus australis* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Baloghacarus hauseri* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Bullibates Subías *et* Shtanchaeva, 2012 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Bullibates hygrophilus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Bullibates hygrophilus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.

Hermanniella Berlese, 1908 (39 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Hermannia granulata* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).
- *Hermanniella aliverdievae* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y España) y Oriental: India (Arunachal Pradesh) y Vietnam.
- *Hermanniella aristosa* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Oriental e Islas del Pacífico.
- *Hermanniella bugiamapensis* Ermilov *et* Bayartogtokh, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hermanniella clavasetosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermanniella clavigera* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri) y Cáucaso.
- *Hermanniella congoensis* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hermanniella diversisetosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Micronesia: I. Marianas).
- *Hermanniella dolosa* Grandjean, 1931

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte).
- *Hermanniella dubinini* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Paleártica oriental meridional.
- *Hermanniella dubiosa* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hermanniella gibber* Kulijev, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Hermanniella grandis* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (España, Irán y Este de Paleártica oriental).
- *Hermanniella granulata* (Nicolet, 1855) (*Hermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Noreste de U.S.A.) y Oriental.
- *Hermanniella humilis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Uganda).
- *Hermanniella incondita* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Hermanniella issanielloides* Gil-Martín *et* Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hermanniella laurisilvae* Pérez-Íñigo, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Hermanniella longisetosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermanniella madagascarensis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hermanniella mastyx* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hermanniella microsetosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermanniella multipora* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional.
- *Hermanniella oblitera* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Hermanniella occidentalis* Ewing, 1918 (*H. punctulata o.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Hermanniella orbiculata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Hermanniella picea* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
(=*Hermannia arrecta* Nicolet, 1855)
(=*Hermanniella punctulata* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y U.S.A.: Virginia) y Oriental.
- *Hermanniella reticulata* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Cáucaso).
- *Hermanniella robusta* Ewing, 1918 (*H. punctulata r.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Hermanniella septentrionalis* Berlese, 1910 (*H. punctulata s.*)
(=*Hermanniella barbata* Moraza, 1990)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: excepto Norte, Irán y U.S.A.: Oregón).
- *Hermanniella serrata* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental, Irán y Este de Rusia asiática).
- *Hermanniella similis* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Hermanniella spiniseta* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
Hermanniella subnigra (Ewing, 1909) (*Hermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Australiana.
- *Hermanniella subnigra subnigra* (Ewing, 1909)
(=*Hermanniella punctulata columbiana* Berlese, 1910)
(=*Hermanniella subnigra setacea* Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Australiana (Islas del Pacífico).
- *Hermanniella subnigra rigida* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: Ilinois.
- *Hermanniella tenuisetosa* (Choi, Bayartogtokh *et* Aoki, 2001) (*Dicastribates*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Hermanniella thani* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hermanniella todori* Mizutani, Shimano *et* Aoki, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermanniella vohimana* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hermanniella yasumai* Aoki, 1973
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermanniella zhengi* Qiao, Tang *et* Chen, 2011
DISTRIBUCIÓN: China (Noroeste y Tíbet) y Nepal.

Hermannobates Hammer, 1961 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hermannobates monstruosus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Hermannobates bifurcatus* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hermannobates cubanus* Starý, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hermannobates dilatatus* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hermannobates dillerorum* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hermannobates flagelliseta* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hermannobates hammerae* Starý, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hermannobates horridus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hermannobates intermedius* Călugăr, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Hermannobates monstruosus* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hermannobates ruseki* Starý, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hermannobates scoparius* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Issaniella Grandjean, 1962 (1 sp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Issaniella mograbin* Grandjean, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.

Issaniella mograbin Grandjean, 1962
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e I. Galápagos.
- *Issaniella mograbin mograbin* Grandjean, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e I. Galápagos.
- *Issaniella mograbin hauseri* Mahunka, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.

Mahunkobates Călugăr, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Mahunkobates singularis* Călugăr, 1989
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mahunkobates singularis* Călugăr, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

Sacculobates Grandjean, 1962 (4 spp.)
(=***Bruneiella*** Mahunka, 1997)
(=***Dicastribates*** Balogh *et* P. Balogh, 1988)
ESPECIE TIPO: *Sacculobates horologiorum* Grandjean, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).
- *Sacculobates heterotrichus* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Sacculobates horologiorum* Grandjean, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente).
- *Sacculobates indicus* Ermilov, Kalúz *et* Tolstikov, 2013
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Sacculobates sultan* (Mahunka, 1997) (*Bruneiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Plasmobatidae Grandjean, 1961 (4 gen. y 22 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.

Malgachebates Fernández, Cleva *et* Theron, 2011 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Malgachebates peyrierasi* Fernández, Cleva *et* Theron, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Malgachebates peyrierasi* Fernández, Cleva *et* Theron, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Orbiculobates Grandjean, 1961 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Plasmobates orbiculus* Grandjean, 1929
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australiana.
- *Orbiculobates acutirostrum* (Hammer, 1973) (*Plasmobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Orbiculobates orbiculus* (Grandjean, 1929) (*Plasmobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Orbiculobates transvectus* (Grandjean, 1929) (*Plasmobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Plasmobates Grandjean, 1929 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Plasmobates pagoda* Grandjean, 1929
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Plasmobates africanus* Balogh, 1958 *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Plasmobates asiaticus* Aoki, 1973
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Plasmobates carboneli* Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1998
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Plasmobates foveolatus* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Plasmobates hyalinus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Plasmobates javensis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Plasmobates machadoi* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Plasmobates minor* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Plasmobates pagoda* Grandjean, 1929
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical, India y Cáucaso.
- *Plasmobates schubarti* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1988
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Plasmobates zarae* Fernández *et* Theron, 2016
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.

Solenozetes Grandjean, 1931 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Plasmobates cribratus* Grandjean, 1929
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).
- *Solenozetes australis* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Orbiculobates*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Solenozetes carinatus* (Hammer, 1961) (*Plasmobates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).
- *Solenozetes cribratus* (Grandjean, 1929) (*Plasmobates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Solenozetes flagellatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Solenozetes flagellifer* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Solenozetes gallonae* Hunt, 1994
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Solenozetes makokouensis* Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
DISTRIBUCIÓN: Gabón.

Neoliodoidea Sellnick, 1928

Neoliodidae Sellnick, 1928 (4 gen., 52 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Neoliodes Berlese, 1888 (39 spp. y 1 ssp.)
(=***Liodes*** Heyden, 1826, *nom. praeoc.* por *Leiodes* Latreille, 1796)
(=***Udetaliodes*** Jacot, 1929)
ESPECIE TIPO: *Notaspis theleproctus* Hermann, 1804
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Neoliodes alatus* (Hammer, 1979) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Neoliodes backstroemi* Trägårdh, 1931
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Chile (I. Juán Fernández) y Méjico.
- *Neoliodes bataviensis* Sellnick, 1925
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Ceilán [Sri Lanka]), Australiana (Islas del Pacífico y Nueva Caledonia) y Japón.
- *Neoliodes canaliculatus* (Koch, 1839) (*Nothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Neoliodes capensis* Berlese, 1910 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Neoliodes concentricus* (Say, 1821) (*Oribata*)
(=*Nothrus malleolus* Karpelles, 1884)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Neoliodes cyclonotus* (Gervais, 1849) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Neoliodes elongatus* (Fernández, Marcangeli *et* Martínez, 1995) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Neoliodes eques* (Canestrini, 1897) (*Nothrus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Neoliodes floridensis* Banks, 1906 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Neoliodes funafutiensis* (Jacot, 1929) (*Udetaliodes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Melanesia: I. Ellice [Tuvalu].
- *Neoliodes globosus* (Subías *et* Gil-Martín, 1990) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
Neoliodes hawaiiensis (Jacot, 1929) (*Udetaliodes*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Neoliodes hawaiiensis hawaiiensis* (Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Neoliodes hawaiiensis aculeatisetae* (Jacot, 1934) (*Udetaliodes*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Neoliodes iheyaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoliodes ionicus* Sellnick, 1931
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e Irán.
- *Neoliodes kornhuberi* (Karpelles, 1884) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Neoliodes lamellatus* (Rainbow, 1897) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia: I. Ellice [Tuvalu].
- *Neoliodes lanceosetosus* (Wallwork, 1977) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Neoliodes lawrencei* Jacot, 1940
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Neoliodes longipes* Berlese, 1916 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Neoliodes marplatensis* (Fernández, Marcangeli *et* Martínez, 1995) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Neoliodes mauritius* (Jacot, 1936) (*Udetaliodes*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Neoliodes modestior* Berlese, 1916 (*N. squamiger m.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Neoliodes nigricans* (Hammer, 1966) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neoliodes notactis* (Gervais, 1849) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Neoliodes ocellatus* Pearce, 1906 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Neoliodes polysetosus* (Sitnikova, 1975) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Neoliodes porcellus* Berlese, 1888 (*N. theleproctus p.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Neoliodes pyramidalis* (Wallwork, 1963) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Neoliodes rugosus* Warburton, 1912
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Neoliodes segestris* (Wallwork, 1963) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Neoliodes silvestris* (Hammer, 1977) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Neoliodes sqamiger* Berlese, 1916 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Neoliodes striatus* Warburton, 1912
(=*Neoliodes femoralis* Warburton, 1912)
DISTRIBUCIÓN: Malgache y Japón.
- *Neoliodes swezeyi* (Jacot, 1929) (*Udetaliodes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Neoliodes terrestris* (Wallwork, 1963) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Etiópica, Oriental (India) y Neotropical, y Paleártica meridional (Cáucaso y Asia centrooccidental).
- *Neoliodes theleproctus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
(=*Nothrus circumvallatus* Haupt, 1882)
(=*Nothrus dimera* Haupt, 1882)
(=*Nothrus dorsatus* Canestrini *et* Fanzago, 1877)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: menos frecuente en el Norte, Oriental: Vietnam, Australiana: Nueva Guinea y Hawái, y Neotropical: Cuba).
- *Neoliodes vermiculatus* Jacot, 1924
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Neoliodes wakensis* (Jacot, 1929) (*Udetaliodes hawaiiensis w.*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Neoliodes zimmermanni* (Sellnick, 1959) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Sureste, y Japón.

Platyliodes Berlese, 1916 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nothrus doderleini* Berlese, 1883
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Platyliodes doderleini* (Berlese, 1883) (*Nothrus*)
(?=*Nothrus venosus* Grube, 1859 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Platyliodes graecus* Sellnick, 1927
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Platyliodes japonicus* Aoki, 1979
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (China suroriental y Vietnam).

- *Platyliodes longisetosus* Sitnikova, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Platyliodes macroprionus* Woolley *et* Higgins, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional y Japón.
- *Platyliodes montanus* Fujikawa, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Platyliodes scaliger* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Mediterránea).

Poroliodes Grandjean, 1934 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: (*Notaspis theleproctus* Hermann *sensu* Michael, 1888) =*Nothrus farinosus* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Poroliodes farinosus* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
  (=*Neoliodes caudatus* Berlese, 1914)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y Nepal.

Teleioliodes Grandjean, 1934 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Teleioliodes madininensis* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y Paleártica meridional.
- *Teleioliodes ghanensis* Wallwork, 1963
  DISTRIBUCIÓN: África occidental y Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Teleioliodes madininensis* Grandjean, 1934
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Teleioliodes ramosus* (Hammer, 1971) (*Liodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Japón.
- *Teleioliodes zikani* (Sellnick, 1930) (*Neoliodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente).

Plateremaeoidea Trägårdh, 1926

Plateremaeidae Trägårdh, 1926 (6 gen., 16 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Allodamaeus Banks, 1947 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Allodamaeus ewingi* Banks, 1947
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Allodamaeus coralgablensis* Paschoal, 1987
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: Florida.
- *Allodamaeus ewingi* Banks, 1947
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional y Asia centrooccidental.

Balogheremaeus Arillo *et* Subías, 2006 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Balogheremaeus chimaera* Arillo *et* Subías, 2006
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Balogheremaeus chimaera* Arillo *et* Subías, 2006
  DISTRIBUCIÓN: España.

Calipteremaeus Paschoal, 1987 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Plateremaeus yaginumai* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Calipteremaeus yaginumai* (Aoki, 1977) (*Plateremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Lopheremaeus Paschoal, 1987 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Plateremaeus mirabilis* Csiszár, 1962
DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional) y Etiópica.
- *Lopheremaeus laminipes* (Berlese, 1916) (*Plateremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Lopheremaeus mirabilis* (Csiszár, 1962) (*Plateremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Lopheremaeus tunicatus* (Balogh, 1958) (*Gymnodamaeus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Congo.

Paralopheremaeus Paschoal, 1987 (2 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Plateremaeus legendrei* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y subtropical (Paleártica meridional).
Paralopheremaeus hispanicus (Ruiz, Kahwash *et* Subías, 1990) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Paralopheremaeus hispanicus hispanicus* (Ruiz, Kahwash *et* Subías, 1990)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (España y Crimea).
- *Paralopheremaeus hispanicus arifi* Baran, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.

- *Paralopheremaeus legendrei* (Balogh, 1962) (*Plateremaeus*)
  (=*Plateremaeus elongatus* Mahunka, 1987)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Ceilán [Sri Lanka].

Plateremaeus Berlese, 1908 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Damaeus ornatissimus* Berlese, 1888
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Plateremaeus anteriosetosus* Woas, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Plateremaeus berlesei* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Plateremaeus complanatus* (Warburton, 1912) (*Damaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Plateremaeus costulatus* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Plateremaeus latus* P. Balogh, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Plateremaeus novemsetosus* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Caledonia).
- *Plateremaeus ornatissimus* (Berlese, 1888) (*Damaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Pheroliodidae Paschoal, 1987 (5 gen. y 53 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y Antártica.

Lopholiodes Paschoal, 1987 (4 spp.)
(=***Octoliodes*** Paschoal, 1987)
ESPECIE TIPO: *Lopholiodes micropunctinatum* Paschoal, 1987
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana).
- *Lopholiodes luteomarginatus* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lopholiodes micropunctinatum* Paschoal, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Lopholiodes rotoruensis* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lopholiodes tolstikovi* Ermilov, Shtanchaeva, Bayartogtokh *et* Subías, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Lyrifissiella Paschoal, 1989 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pedrocortesella latoclava* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Subtropical.
- *Lyrifissiella africana* (Pletzen, 1963) (*Pedrocortesella*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía).
- *Lyrifissiella cryptonota* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesella*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lyrifissiella latoclava* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesella*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lyrifissiella vestita* (Trägårdh, 1931) (*Plateremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Chile (I. Juán Fernández) y Méjico.

Malgacheliodes Fernández *et* Cleva, 2010 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Malgacheliodes guillaumeti* Fernández *et* Cleva, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Malgacheliodes guillaumeti* Fernández *et* Cleva, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Nooliodes Paschoal, 1989 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Plateremaeus glaber* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Nooliodes franzi* (Balogh, 1966) (*Pedrocortesia*)
  DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Nooliodes glaber* (Balogh, 1962) (*Plateremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Pheroliodes Grandjean, 1931 (42 spp.)
(=***Andesperuviella*** Paschoal, 1989)
(=***Hammeriella*** Paschoal, 1989, *nom. praeoc.* por *Hammerella* Balogh, 1983)
(=***Neonooliodes*** Hunt, 1996)
(=***Paschoalia*** Subías, 2004)
(=***Pedrocortesia*** Hammer, 1958)
ESPECIE TIPO: *Cymbaeremaeus wehnckei* Willmann, 1930
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y Antártica.
- *Pheroliodes achalensis* Baranek, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes africanus* (Balogh, 1966) (*Pedrocortesia*)
  (=*Pedrocortesella pletzenae* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Sudáfrica).
- *Pheroliodes australis* (Hammer, 1962) (*Pedrocortesia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Antártica.
- *Pheroliodes barringtonensis* Hunt, 1996

DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes carinulatus* (Berlese, 1888) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pheroliodes casabranquensis* Paschoal, 1987
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pheroliodes ceroplastes* (Hunt, 1996) (*Neonooliodes*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes complanatus* (Berlese, 1901) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Pheroliodes concavus* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes copiosus* Hunt *et* Lee, 1995
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes cordobensis* Baranek, 1986
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes delticus* Baranek, 1984
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes dentatus* (Hammer, 1961) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pheroliodes diamantei* (Fernández *et* Cleva, 1999) (*Lopholiodes*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes elegans* (Hammer, 1961) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pheroliodes grandis* (Hammer, 1961) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pheroliodes hammerae* Pérerz-Íñigo *et* Baggio, 1989
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pheroliodes inca* Fernández, Martínez *et* Eguaras, 1991
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes intermedius* (Hammer, 1961) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Pheroliodes lindsayae* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Pheroliodes longiceps* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.
- *Pheroliodes longisetus* Baranek, 1986
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes lordhowensis* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Lord Howe).
- *Pheroliodes macropunctinatum* (Paschoal, 1987) (*Lopholiodes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Pequeñas Antillas).
- *Pheroliodes minutus* Baranek, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).
- *Pheroliodes mirabilis* (Hammer, 1958) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes monteithi* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes nemoricultricis* Paschoal, 1987
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pheroliodes neuquinus* Baranek, 1986
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes pellitus* Paschoal, 1987
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pheroliodes reticulatus* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Pheroliodes roblensis* Covarrubias, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical
- *Pheroliodes robustus* Hunt *et* Lee, 1995
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Pheroliodes rotundatus* (Berlese, 1913) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pheroliodes rusticus* Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pheroliodes sicarius* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes springthorpei* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes transversus* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes uruguayensis* Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1995
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Pheroliodes vermicularis* (Balogh, 1970) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Pheroliodes vulgaris* Baranek, 1984
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes wehnckei* (Willmann, 1930) (*Cymbaeremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Licnodamaeidae Grandjean, 1954 (7 gen., 1 subgen. y 74 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Flammaeremaeus Balogh, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Flammaeremaeus gressitti* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Flammaeremaeus gressitti* Balogh, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Hexachaetoniella Paschoal, 1987 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pedrocortesella sexpilosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Holártica meridional.
- *Hexachaetoniella bunya* Hunt, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hexachaetoniella contigua* Hunt, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hexachaetoniella dispersa* (P. Balogh, 1985) (*Pedrocortesella*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Hexachaetoniella hardyi* (Balogh, 1968) (*Pedrocortesella*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Japón.
- *Hexachaetoniella japonica* (Aoki *et* Suzuki, 1970) (*Pedrocortesella*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Filipinas y Méjico.
- *Hexachaetoniella norfolkensis* Hunt, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Hexachaetoniella sculptrata* (Aoki, 1974) (*Pedrocortesia*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China.
- *Hexachaetoniella setosa* (Fujikawa, Y.-N. Nakamura, Nakamura *et* Shirosaki, 2018) (*Pedrocortesella*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hexachaetoniella sexpilosa* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesella*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hexachaetoniella stebaevae* (Grishina, 1981) (*Pedrocortesia*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Licnodamaeolus Covarrubias, 1998 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Licnodamaeolus travei* Covarrubias, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.

Licnodamaeolus (Licnodamaeolus) Covarrubias, 1998 (4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.
- *Licnodamaeolus (L.) erfenisdamensis* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Licnodamaeolus (L.) navalhillensis* (Bayartogtokh, Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2018) (*Licnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Licnodamaeolus (L.) sacculatus* (Bayartogtokh, Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2018) (*Licnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Licnodamaeolus (L.) travei* Covarrubias, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Chile.

Licnodamaeolus (Nacunansella) Fernández *et* Cleva, 1998 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nacunansella diminuta* Fernández *et* Cleva, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.
- *Licnodamaeolus (Nacunansella) asetosus* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Licnodamaeolus (Nacunansella) diminutus* (Fernández *et* Cleva, 1998) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Licnodamaeus Grandjean, 1931 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Licneremaeus undulatus* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Neotropical y Oriental.
- *Licnodamaeus baccettii* Bernini, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Licnodamaeus costula* Grandjean, 1931
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Licnodamaeus eperezinigoae* Subías, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Licnodamaeus fissuratus* (Balogh *et* Mahunka, 1965) (*Pedrocortesia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Licnodamaeus granulatus* Balogh *et* Csiszár, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Irán.
- *Licnodamaeus itsukushima* Fujikawa, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Licnodamaeus pulcherrimus* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte) y Méjico.
- *Licnodamaeus rarisetosus* (Bayartogtokh *et* Smelyansky, 2002) (*Pedrocortesella*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Licnodamaeus undulatus* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte) y Taiwán [Formosa].

Licnoliodes Grandjean, 1931 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Licnoliodes andrei* Grandjean, 1931
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Licnoliodes adminensis* Grandjean, 1933
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Licnoliodes andrei* Grandjean, 1931
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Méjico.
- *Licnoliodes apunctatus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Grecia.

Novazelandiella Paschoal, 1989 (7 spp.)
(=***Darthvaderum*** Hunt, 1996)
(=***Labiogena*** Hunt, 1996)
ESPECIE TIPO: *Pedrocortesella nigroclava* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Novazelandiella convexa* (Hunt, 1996) (*Labiogena*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novazelandiella enigma* (Hunt, 1996) (*Pedrocortesella*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Novazelandiella greensladeae* (Hunt, 1996) (*Darthvaderum*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Novazelandiella kellyi* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novazelandiella nigroclava* (Hammer, 1966) (*Pedrocrotesella*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Novazelandiella queenslandica* (P. Balogh, 1985) (*Pedrocortesella*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novazelandiella walteri* (Hunt, 1996) (*Labiogena*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Pedrocortesella Hammer, 1961 (38 spp.)
(=***Acupedicellus*** Hunt *et* Lee, 1995)
ESPECIE TIPO: *Pedrocortesella pulchra* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical.
- *Pedrocortesella anica* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella augusta* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella bannisteri* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella bithongabela* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella callitarsus* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella callosa* (Hammer, 1979) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Pedrocortesella calmorum* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella conundrum* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella cornuta* (Hunt *et* Lee, 1995) (*Acupedicellus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella cryptoreticulata* Hunt *et* Lee, 1995
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Pedrocortesella dongnaiensis* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pedrocortesella excavata* (Hammer, 1979) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Pedrocortesella fusca* (Rjabinin, 1986) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Pedrocortesella gunjina* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella gymnonota* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pedrocortesella hangayi* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella impedita* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella inaequalis* (Balogh *et* Mahunka, 1965) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Sureste de Europa (Crimea) y Paleártica oriental meridional.
- *Pedrocortesella kanangra* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Pedrocortesella leei* Hunt, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella minuta* Bayartogtokh *et* Smelyansky, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia europea.
- *Pedrocortesella monicai* Eguaras, Martínez *et* Fernández, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pedrocortesella montis* Fernández, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pedrocortesella nortoni* Hunt, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Pedrocortesella obesa* Hunt, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella parva* Pletzen, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pedrocortesella propinqua* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella pulchra* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental (Vietnam) y Este de Rusia asiática.
- *Pedrocortesella reticulata* (Rjabinin, 1986) (*Pedrocortesia*)
  (=*Pedrocortesella neonominata* Subías, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.
- *Pedrocortesella rjabinini* Golosova, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Pedrocortesella semireticulata* Hunt *et* Lee, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella stellata* (Rjabinin, 1986) (*Pedrocortesia*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Pedrocortesella subula* Hunt, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella temperata* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Pedrocortesella triangulata* Bayartogtokh, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Pedrocortesella tristius* Eguaras, Martínez *et* Fernández, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pedrocortesella truncata* Hunt, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella vietnamica* Ermilov *et* Anichkin, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Licnobelbidae Grandjean, 1965 (2 gen. y 3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.

Flabellobelba Pérez-Íñigo, 1994 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Licnobelba almeriensis* Ruiz, Kahwash *et* Subías, 1990
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Flabellobelba almeriensis* (Ruiz, Kahwash *et* Subías, 1990) (*Licnobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: España.

Licnobelba Grandjean, 1931 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Licnobelba alestensis* Grandjean, 1931) =*Licneremaeus latiflabellatus* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Licnobelba caesarea* (Berlese, 1910) (*Licneremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Méjico.
- *Licnobelba latiflabellata* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*)
  (=*Licnobelba alestensis* Grandjean, 1931)
  (=*Licnobelba montana* Mihelčič, 1957)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte) y Oeste de Paleártica oriental.

Gymnodamaeoidea Grandjean, 1954

Gymnodamaeidae Grandjean, 1954 (6 gen. y 67 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

Adrodamaeus Paschoal, 1984 (13 spp.)
(=***Heterodamaeus*** Woolley, 1957, *nom. praeoc.* por Ewing, 1917)
ESPECIE TIPO: *Damaeus magnisetosus* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.
- *Adrodamaeus decemsetiger* (Choi *et* Aoki, 1985) (*Allodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea y Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Adrodamaeus femoratus* (Koch, 1839) (*Damaeus*)
  (=*Belba dugesi* Canestrini *et* Fanzago, 1877)
  (=*Belba gibba* Canestrini *et* Fanzago, 1877)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: excepto Norte, y Paquistán).
- *Adrodamaeus haradai* (Aoki, 1984) (*Allodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Adrodamaeus hispanicus* (Grandjean, 1928) (*Gymnodamaeus*)
(=*Gymnodamaeus noster* Mihelčič, 1957)
(=*Gymnodamaeus sculptus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Adrodamaeus johanni* (Hugo, 2010) (*Arthrodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Adrodamaeus magnisetosus* (Ewing, 1909) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica nororiental.
- *Adrodamaeus mongolicus* (Bayartogtokh *et* Weigmann, 2005) (*Arthrodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Adrodamaeus musci* Paschoal, 1984
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Adrodamaeus siculus* (Berlese, 1910) (*Gymnodamaeus reticulatus s.*)
(=*Arthrodamaeus ignotus* Paschoal, 1984)
(=*Gymnodamaeus italicus* Berlese, 1916)
(=*Arthrodamaeus parvulus* Kunst, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Adrodamaeus starki* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Allodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Rusia asiática).
- *Adrodamaeus striatus* (Aoki, 1984) (*Allodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Norte de Oriental.
- *Adrodamaeus vietnamicus* (Ermilov *et* Anichkin, 2011) (*Arthrodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Adrodamaeus woonhahi* (Choi *et* Aoki, 1985) (*Allodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.

Arthrodamaeus Grandjean, 1954 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Gymnodamaeus reticulatus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Arthrodamaeus bicristatus* Subías, Arillo *et* J. Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Arthrodamaeus cereus* Subías, Arillo *et* J. Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Arthrodamaeus mediterraneus* Subías, Arillo *et* J. Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Arthrodamaeus octosetosus* Subías, Arillo *et* J. Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Arthrodamaeus reticulatus* (Berlese, 1910) (*Gymnodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Arthrodamaeus rosarius* Subías, Arillo *et* J. Subías, 1997
(?=*Arthrodamaeus reticulatus tenuis* Mihelčič, 1958 *ssp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: España.

Gymnodamaeus Kulczynski, 1902 (25 spp.)
(=***Donjohnstonella*** Walter, 2009)
(=***Heterodamaeus*** Ewing, 1917)
(=***Johnstonella*** Paschoal, 1983)
(=***Odontodamaeus*** Paschoal, 1982)
(=***Pleodamaeus*** Paschoal, 1983)
ESPECIE TIPO: *Damaeus bicostatus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (excepto Australiana).
- *Gymnodamaeus adpressus* (Aoki *et* Fujikawa, 1971) (*Allodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (Norte de India y Vietnam).
- *Gymnodamaeus barbarossa* Weigmann, 2006
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Gymnodamaeus bicostatus* (Koch, 1835) (*Damaeus*)
(=*Eremaeus asperulus* Berlese, 1882)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Tanzania.
- *Gymnodamaeus chalazionus* Woolley, 1972
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Gymnodamaeus gregarius* Paschoal, 1982 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).
- *Gymnodamaeus guilfordidei* Paschoal, 1982
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Gymnodamaeus kazakhstanicus* (Bayartogtokh *et* Smelyansky, 2002) (*Pleodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Gymnodamaeus knowltoni* Paschoal, 1982 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Gymnodamaeus leurolomasus* Woolley *et* Higgins, 1973
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A.: Colorado, y Este de Rusia asiática).
- *Gymnodamaeus notoapodematus* Paschoal, 1982 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).
- *Gymnodamaeus orbicularius* Paschoal, 1982
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Gymnodamaeus ornatus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Gymnodamaeus pearsei* Banks, 1947
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Gymnodamaeus plokosus* Woolley *et* Higgins, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Gymnodamaeus pusillus* Berlese, 1910
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Gymnodamaeus quadriseta* Ruiz, Kahwash *et* Subías, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Gymnodamaeus rossicus* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Allodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa oriental.
- *Gymnodamaeus rotundigranulatus* (Bayartogtokh, 2001) (*Pleodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Gymnodamaeus saltuensis* Paschoal, 1982 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Gymnodamaeus subalpinus* (Paschoal, 1983) (*Johnstonella*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).
- *Gymnodamaeus taedaceus* Paschoal, 1982 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Gymnodamaeus theliis* Woolley *et* Higgins, 1973
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
- *Gymnodamaeus tuberculatus* (Bayartogtokh *et* Smelyansky, 2004) (*Pleodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia europea y Méjico.
- *Gymnodamaeus umbraticus* Paschoal, 1982 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Gymnodamaeus veriornatus* Higgins, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

Jacotella Banks, 1947 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Gymnodamaeus quadricaudiculus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica y tropical (excepto Australiana).

- *Jacotella austriaca* (Willmann, 1935) (*Gymnodamaeus*)
  (=*Gymnodamaeus austriacus stepposus* Bashkirova, 1958)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- *Jacotella enoplura* Paschoal, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: Noroeste de U.S.A. y Europa meridional (Bulgaria).
- *Jacotella frondeus* (Kulijev, 1979) (*Plesiodamaeus*)
  (=*Plesiodamaeus ornatus* Mahunka, 1979, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Csiszár, 1963)
  (=*Plesiodamaeus perezinigoi* Mahunka, 1986)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Jacotella glabra* (Mihelčič, 1957) (*Plesiodamaeus*)
  (?=*Gymnodamaeus aprofundatus* Mihelčič, 1956 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional e India (Maharastra).
- *Jacotella neonominata* Subías, 2004
  (=*Plesiodamaeus ornatus* Pérez-Íñígo, 1972, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Csiszár, 1963)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Etiopía.
- *Jacotella ornata* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Allodamaeus*)
  (=*Allodamaeus tuberculatus* Aoki *et* Fujikawa, 1971)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico) e India (Himalaya).
- *Jacotella quadricaudicula* (Jacot, 1937) (*Gymnodamaeus*)
  (=*Gymnodamaeus minor* Banks, 1947)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá) y Méjico.
- *Jacotella reticulata* Ruiz, Kahwash *et* Subías, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Jacotella whartoni* Paschoal, 1983
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).

Joshuella Wallwork, 1972 (12 spp.)
(=***Nortonella*** Paschoal, 1982, *nom. praeoc.* por Rohwer, 1908)
(=***Paschoalia*** Özdikmen, 2008, *nom. praeoc.* por Subías, 2004)
(=***Roynortonella*** Walter, 2009)
ESPECIE TIPO: *Joshuella striata* Wallwork, 1972
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Joshuella agrosticula* Paschoal, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá: Alberta).
- *Joshuella bicentenaria* Paschoal, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A. y Méjico.
- *Joshuella gildersleeveae* (Hammer, 1952) (*Gymnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Joshuella helvetica* (Woas, 1992) (*Gymnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Joshuella irregularis* (Bayartogtokh *et* Schatz, 2009) (*Gymnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centroccidental.
- *Joshuella meyeri* (Bayartogtokh *et* Schatz, 2009) (*Gymnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europea (Austria y Turquía).
- *Joshuella mongolica* (Bayartogtokh *et* Aoki, 1997) (*Nortonella*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica oriental meridional y Finlandia).

- *Joshuella polygrammus* (Wen *et* Chen, 1992) (*Allodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Joshuella striata* Wallwork, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A. y Méjico.
- *Joshuella tectoria* (Wen *et* Chen, 1992) (*Allodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Joshuella transitus* (Aoki, 1984) (*Allodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Joshuella victoriae* (Paschoal, 1982) (*Gymnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Plesiodamaeus Grandjean, 1954 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Damaeus craterifer* Haller, 1884
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.

- *Plesiodamaeus craterifer* (Haller, 1884) (*Damaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Sur de Siberia).
- *Plesiodamaeus tabuencai* Fernández *et* Cleva, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Aleurodamaeidae Paschoal *et* Johnston, 1985 (2 gen. y 17 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y subtropical.

Aleurodamaeus Grandjean, 1954 (16 spp.)
(=***Trichodamaeus*** Mahunka, 1984)
ESPECIE TIPO: *Damaeus setosus* Bersese, 1883
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Etiópica y Neotropical.

- *Aleurodamaeus africanus* Mahunka, 1984 (*A. (Trichodamaeus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Aleurodamaeus angelae* Hugo-Coetzee, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Aleurodamaeus australis* Woas, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Aleurodamaeus cephalotes* (Berlese, 1916) (*Gymnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Aleurodamaeus deswardti* (Hugo, 2010) (*Gymnodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Aleurodamaeus ermilovi* (Hugo-Coetzee, 2014) (*Adrodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Aleurodamaeus hungaricus* Paschoal *et* Johnston, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Aleurodamaeus minutus* Hugo-Coetzee, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Aleurodamaeus niedbalai* Hugo-Coetzee, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Aleurodamaeus prominens* Hugo-Coetzee, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Aleurodamaeus recenfesevpi* Ermilov *et* Rybalov, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Aleurodamaeus salvadordalii* Hugo-Coetzee, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Aleurodamaeus setosus* (Berlese, 1883) (*Damaeus*)
  (=*Gymnodamaeus gibbus* Mihelčič, 1963)
  (=*Gymnodamaeus nitidus* Mihelčič, 1956)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Méjico.
- *Aleurodamaeus trichosus* (Kulijev, 1979) (*Allodamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Aleurodamaeus vicinus* Hugo-Coetzee, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Tanzania).
- *Aleurodamaeus woasi* Hugo-Coetzee, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Austrodamaeus Balogh *et* Mahunka, 1981 (1 sp.)
(=***Idiodamaeus*** Paschoal, 1984)
ESPECIE TIPO: (*Austrodamaeus rimosus* Balogh *et* Mahunka, 1981) =*Gymnodamaeus elegantulus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Austrodamaeus elegantulus* (Hammer, 1958) (*Gymnodamaeus*)
  (=*Idiodamaeus illecebrosus* Paschoal, 1984)
  (=*Austrodamaeus rimosus* Balogh *et* Mahunka, 1981)
  (=*Allodamaeus trisetosus* Balogh *et* Mahunka, 1969)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

<u>Damaeoidea</u> Berlese, 1896

Hungarobelbidae Miko *et* Travé, 1996 (3 gen., 12 spp. y 1ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Hungarobelba Balogh, 1943 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Belba visnyai* Balogh, 1938
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Hungarobelba baloghi* Bulanova-Zachvatkina, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Hungarobelba nortonroyi* Bayartogtokh *et* Ermilov, 2021
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).
- *Hungarobelba pyrenaica* Miko *et* Travé, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Hungarobelba visnyai* (Balogh, 1938) (*Belba*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Paleártica oriental).

Protodamaeus Subías, 2019 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Costeremus barbatus* Choi, 1997
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Protodamaeus barbatus* (Choi, 1997) (*Costeremus*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Protodamaeus stebaevae* (Bayartogtokh *et* Ermilov, 2015) (*Costeremus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Protodamaeus yezoensis* (Fujikawa *et* Fujita, 1985) (*Costeremus*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Tokukobelba Lamos, 2016 (5 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata compta* Kulczynski, 1902
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Tokukobelba barbata* (Fujita *et* Fujikawa, 1986) (*Belba*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tokukobelba compta* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Taiwán [Formosa].
  - *Tokukobelba compta compta* (Kulczynski, 1902)
    (=*Oribata farinosa* Trägårdh, 1902)
    (=*Belba verrucosa* Bulanova-Zachvatkina, 1962)
    DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
  - *Tokukobelba compta japonica* (Aoki, 1984) (*Belba verrucosa j.*)
    DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Tokukobelba dimidiaspina* (Xie, Yan *et* Yang, 2013) (*Parabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Tokukobelba mongolica* (Bayartogtokh, 2000) (*Belba*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Tokukobelba sellnicki* (Bulanova-Zachvatkina, 1962) (*Belba*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Ucrania y Este de Paleártica oriental).

Damaeidae Berlese, 1896 (14 gen, 15 subgen., 297 spp. y 6 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Acanthobelba Enami *et* Aoki, 1993 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Acanthobelba tortuosa* Enami *et* Aoki, 1993
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Acanthobelba heterosetosa* Choi, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Acanthobelba tortuosa* Enami *et* Aoki, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Allobelba Kunst, 1961 (25 spp.)
ESPECIE TIPO: *Allobelba aculeata* Kunst, 1961
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

Allobelba (Allobelba) Kunst, 1961 (12 spp.)
(=***Metabelbella*** Bulanova-Zachvatkina, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Allobelba (A.) aculeata* Kunst, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Allobelba (A.) clavigera* (Willmann, 1954) (*Belba*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Allobelba (A.) epidamaeiformis* (Ermilov, Shtanchaeva *et* Subías, 2012) (*Metabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Allobelba (A.) gratiosa* (Willmann, 1940) (*Belba*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Croacia.
- *Allobelba (A.) interlamellaris* (Pérez-Íñigo, 1987) (*Metabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Allobelba (A.) janae* (Pérez-Íñigo jr., 1991) (*Metabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Allobelba (A.) kosarovi* (Jeleva, 1970) (*Metabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Bulgaria.
- *Allobelba (A.) macerochaeta* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Metabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Allobelba (A.) phalangioides* (Michael, 1890) (*Damaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Allobelba (A.) soror* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Metabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa oriental central.
- *Allobelba (A.) tichonravovi* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Metabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Allobelba (A.) zachvatkini* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Metabelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.

Allobelba (Dyobelba) Norton, 1979 (5 spp.)
(=***Heterodamaeus*** Mihelčič, 1964, *nom. praeoc.* por Ewing, 1917)
(=***Mirobelba*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994)
ESPECIE TIPO: *Oribata carolinensis* Banks, 1947
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Allobelba (Dyobelba) armata* (Norton, 1979) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Allobelba (Dyobelba) carolinensis* (Banks, 1947) (*Oribata*)
  (=*Oribata diversipes* Banks, 1947)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Allobelba (Dyobelba) exilior* (Mihelčič, 1964) (*Damaeus (Heterodamaeus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Allobelba (Dyobelba) grancanariae* (Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994) (*Mirobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Allobelba (Dyobelba) verae* (Kolesnikov, 2020) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Allobelba (Parabelbella) Bulanova-Zachvatkina, 1967 (10 spp.)
(=***Akrodamaeus*** Norton, 1979)
ESPECIE TIPO: *Parabelbella crenatosetosa* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Allobelba (Parabelbella) arctica* (Miko *et* Monson, 2013) (*Kunstidamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Allobelba (Parabelbella) crenatosetosa* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Centro de Paleártica oriental.
- *Allobelba (Parabelbella) elisabethae* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Centro de Rusia europea y Paleártica oriental meridional).
- *Allobelba (Parabelbella) flagellata* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Metabelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Chile).
- *Allobelba (Parabelbella) golosovae* (Ljaschev *et* Tolstikov, 1993) (*Epidamaeus (Akrodamaeus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Allobelba (Parabelbella) inaequipes* (Banks, 1947) (*Belba*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Allobelba (Parabelbella) longiseta* (Banks, 1906) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Allobelba (Parabelbella) meridiana* (Norton, 1979) (*Epidamaeus (Akrodamaeus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Allobelba (Parabelbella) pseudoinaequipes* (Ermilov *et* Rjabinin, 2020) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Allobelba (Parabelbella) rusfareastensis* (Ermilov *et* Rjabinin, 2020) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Allobelba (Paradyobelba) Miko *et* Ermilov, 2021 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Parabelbella (Paradyobelba) elchacoensis* Miko *et* Ermilov, 2021
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Allobelba (Paradyobelba) elchacoensis* (Miko *et* Ermilov, 2021) (*Parabelbella (Parad.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Belba Heyden, 1826 (29 spp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis corynopus* Hermann, 1804
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y "Australiana".

Belba (Belba) Heyden, 1826 (28 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y "Australiana".

- *Belba (B.) aegrota* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Belba (B.) aurata* Kulijev, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Belba (B.) bulanovae* Subías, 2016
  (=*Belba minuta* Bulanova-Zachvatkina, 1962, *nom. praeoc.* por Banks, 1895)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Rumanía y Asia centrooccidental).
- *Belba (B.) clavasensilla* Norton *et* Palacios-Vargas, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Belba (B.) cornuta* Wang *et* Norton, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Belba (B.) corynopus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
  (=*Belba bulbipes* Karpelles, 1893)

(=*Damaeus sufflexus* Michael, 1885)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Belba (B.) crassisetosa* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Belba (B.) daghestanica* Bulanova-Zachvatkina, 1962
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
- *Belba (B.) dubinini* Bulanova-Zachvatkina, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centrooriental y Paleártica oriental).
- *Belba (B.) flagellata* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Belba (B.) flammeisetosa* Tolstikov, 1995
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Belba (B.) heterosetosa* Bayartogtokh, 2004
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Belba (B.) itsukiensis* Fujikawa, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Belba (B.) jacoti* Wilson, 1936
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Belba (B.) meridionalis* Bulanova-Zachvatkina, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Paleártica oriental meridional).
- *Belba (B.) minor* Mihelčič, 1953 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Belba (B.) paracorynopus* Bulanova-Zachvatkina, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa meridional y Este de Paleártica oriental).
- *Belba (B.) patelloides* (Michael, 1890) (*Notaspis*)
(=*Belba bartosi* Winkler, 1955)
(=*Belba pseudocorynopus* Märkel *et* Meyer, 1960)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Belba (B.) pectinifera* Canestrini, 1897 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Belba (B.) prasadi* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Belba (B.) pulchra* Mihelčič, 1964
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Belba (B.) rossica* Bulanova-Zachvatkina, 1962
(=*Belba piriformis* Mihelčič, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Belba (B.) sarvari* Tolstikov, 1995
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Belba (B.) sasakawai* Enami, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón y China.
- *Belba (B.) sculpta* Mihelčič, 1957
(=*Belba aberrans* Mihelčič, 1957)
(=*Belba ignota* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Belba (B.) servadeii* Lombardini, 1962 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Belba (B.) tenuisetosa* Bulanova-Zachvatkina, 1962
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Belba (B.) unicornis* Enami, 1994
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Belba (Caenobelba) Norton, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Caenobelba alleganiensis* Norton, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Belba (Caenobelba) alleganiensis* (Norton, 1980) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Belbodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1967 (17 spp.)
ESPECIE TIPO: *Belbodamaeus tuberculatus* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Belbodamaeus (Belbodamaeus) Bulanova-Zachvatkina, 1967 (3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Belbodamaeus (B.) indicus* Ermilov, Kalúz *et* Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Belbodamaeus (B.) pseudotatricus* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Centro de Rusia europea.
- *Belbodamaeus (B.) tuberculatus* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa oriental y Paleártica oriental).

Belbodamaeus (Lanibelba) Norton, 1980 (14 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lanibelba pini* Norton, 1980
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Neotropical.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) behanae* (Bayartogtokh *et* Norton, 2007) (*Dyobelba*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Belbodamaeus (Lanibelba) biclavatus* (Wang *et* Norton, 1993) (*Dyobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) crossleyi* (Bayartogtokh *et* Norton, 2007) (*Dyobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
- *Belbodamaeus (Lanibelba) dindali* (Bayartogtokh *et* Norton, 2007) (*Dyobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroriental.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) gobilliensis* Ermilov *et* Rjabinin 2020 (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) granulatus* (Bayartogtokh *et* Norton, 2007) (*Dyobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Belbodamaeus (Lanibelba) kushiroensis* (Enami *et* Aoki, 2001) (*Dyobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) marginatus* Kulijev, 1967 (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) palaciosi* (Iglesias *et* Guzmán, 2012) (*Epidamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) paucituberculatus* (Bayartogtokh, Choi *et* Aoki, 2001) (*Dyobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) pini* (Norton, 1980) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica y U.S.A. (Florida).
- *Belbodamaeus (Lanibelba) rarituberculatus* Bayartogtokh, 2004 (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) reevesi* (Norton *et* Rjabinin, 1994) (*Dyobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Belbodamaeus (Lanibelba) tectopediosus* (Jacot, 1938) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroriental.

Damaeus Koch, 1835 (155 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Damaeus auritus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Paleotropical y Neotropical.

Damaeus (Damaeus) Koch, 1835 (40 spp.)
(=***Hypodamaeus*** Bulanova-Zachvatkina, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Damaeus (D.) ainu* Enami *et* Aoki, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (D.) alpinus* (Schweizer, 1956) (*Belba*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Damaeus (D.) angustipes* (Banks, 1905) (*Oribata*)
  (=*Belba kingi* Hartenstein, 1962)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Damaeus (D.) appalachicus* Norton, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Damaeus (D.) arvernensis* Grandjean, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Oeste de Europa y Egipto).
- *Damaeus (D.) auritus* Koch, 1835
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica: frecuente.
- *Damaeus (D.) australis* (Banks, 1895) (*Belba*)
  (=*Damaeus atlanticus* Norton, 1978)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Damaeus (D.) bulbipedata* Packard, 1888 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Kentucky).
- *Damaeus (D.) bulbofemoralis* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Damaeus (D.) camtschaticus* (Kulczynski, 1926) (*Oribata*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Siberia (Kamchatka).
- *Damaeus (D.) conjungenus* (Xie, Yang *et* Huang, 2011) (*Epidamaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Damaeus (D.) cordatus* Xie *et* Yang, 2010 (*D. (Tectodamaeus)*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (D.) costanotus* Wang *et* Norton, 1989
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (D.) crispatus* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Paquistán).
- *Damaeus (D.) curtus* Haupt, 1882 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Damaeus (D.) echinopus* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Damaeus (D.) firmus* Kunst, 1958
  (=*Damaeus longipes* Mihelčič, 1957, *nom. praeoc.* por Willmann, 1940)
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Europa.
- *Damaeus (D.) flagellifer* Michael, 1890
  (=*Damaeus kulczynskii* Grandjean, 1943)
  (=*Belba pachytrichosa* Mihelčič, 1956)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Damaeus (D.) formica* (Gervais, 1849) (*Oribata*) *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Damaeus (D.) foroliviensis* Lombardini, 1962 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Damaeus (D.) gevi* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeus (D.) glycyphagoides* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Méjico.
- *Damaeus (D.) gracilipes* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Suroeste de Paleártica oriental y Groenlandia).
- *Damaeus (D.) grossmani* (Wilson, 1936) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroriental.
- *Damaeus (D.) helveticus* (Schweizer, 1956) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Damaeus (D.) longipes* (Willmann, 1940) (*Belba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Eslovenia.
- *Damaeus (D.) longiseta* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (D.) longus* (Xie *et* Yang, 2009) (*Tectodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (D.) lupus* Miko, 2016
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
- *Damaeus (D.) maximus* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Damaeus (D.) opilioides* Norton, 1978
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Damaeus (D.) ortizi* Pérez-Íñigo, 1995
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeus (D.) pseudoauritus* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Damaeus (D.) recasensi* Capilla, 1971
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Damaeus (D.) riparius* Nicolet, 1855
(=*Damaeus alienus* Hull, 1915)
(=*Belba obscura* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Damaeus (D.) selgae* Pérez-Íñigo, 1966
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeus (D.) striatus* (Enami *et* Aoki, 1988) (*Tectodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Damaeus (D.) tauricus* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Damaeus (D.) torquisetosus* (Mihelčič, 1955) (*Belba*)
(=*Damaeus ornatus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Damaeus (Adamaeus) Norton, 1977 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Damaeus onustus* Koch, 1844
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.
- *Damaeus (Adamaeus) onustus* Koch, 1844 (*D.*)
(=*Belba geniculosa* Oudemans, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente) y Etiópica: Tanzania e I. Santa Helena.

Damaeus (Epidamaeus) Bulanova-Zachvatkina, 1957 (79 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata bituberculata* Kulczynski, 1902
DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (Oriental y Neotropical).
- *Damaeus (Epidamaeus) aborigensis* (Behan-Pelletier *et* Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Damaeus (Epidamaeus) acicularis* (Xie, Yan, Wang, Ren *et* Yang, 2017) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Damaeus (Epidamaeus) affinis* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Noreste de Paleártica occidental y Centrooeste de Paleártica oriental).
- *Damaeus (Epidamaeus) aleinikovae* (Bulanova-Zachvatkina, 1964) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
- *Damaeus (Epidamaeus) alticola* (Wang *et* Cui, 1996) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Damaeus (Epidamaeus) angulatus* (Fujikawa *et* Fujita, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) angustirostratus* (Bayartogtokh, 2001) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) aokii* (Bayartogtokh, 2001) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) arcticola* (Hammer, 1952) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) bahamensis* (Ermilov *et* Smit, 2017) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Bahamas.
- *Damaeus (Epidamaeus) bakeri* (Hammer, 1952) (*Belba*)

DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) barbatulus* Choi, 2004 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Damaeus (Epidamaeus) bayartogtokhi* Subías, 2010
(=*Epidamaeus granulatus* Bayartogtokh, 2000, *nom. praeoc.* por Willmann, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia y China suroriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) berlesei* Michael, 1898 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Damaeus (Epidamaeus) bituberculatus* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Damaeus (Epidamaeus) brevisetosus* (Bayartogtokh, 2000) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) brevitibialis* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa.
- *Damaeus (Epidamaeus) canadensis* (Banks, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. oriental, y Canadá).
- *Damaeus (Epidamaeus) chukchi* (Behan-Pelletier *et* Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Siberia.
- *Damaeus (Epidamaeus) cincinnatus* (Wang *et* Norton, 1993) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Damaeus (Epidamaeus) coreanus* Aoki, 1966 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) coxalis* (Hammer, 1952) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) craigheadi* (Jacot, 1939) (*Metabelba*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Damaeus (Epidamaeus) crassisensillatus* (Bayartogtokh, 2000) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) culterisetosus* (Bayartogtokh, 2000) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) elegantis* (Wang *et* Norton, 1993) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) flagellatus* Wang, 1994 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) flagelloides* (Norton, 1979) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Damaeus (Epidamaeus) flexispinosus* (Kunst, 1961) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) flexus* (Fujikawa *et* Fujita, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) floccosus* (Behan-Pelletier *et* Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) floridus* (Wilson, 1936) (*Belba globifer f.*)
(=*Belba alachua* Wilson, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Damaeus (Epidamaeus) folium* (Fujikawa *et* Fujita, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) fortisensillus* (Enami *et* Aoki, 2001) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) fortispinosus* (Hammer, 1967) (*E.*)
(?=*Oribata traegardhi* Graversen, 1931 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) fujikawae* Subías, 2010
(=*Epidamaeus bacillum* Fujikawa *et* Fujita, 1985, *nom. praeoc.* por Kulczynski, 1926)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) gibbofemoratus* (Hammer, 1955) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- *Damaeus (Epidamaeus) gilyarovi* (Behan-Pelletier *et* Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Damaeus (Epidamaeus) globifer* Ewing, 1913 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Damaeus (Epidamaeus) groenlandicus* (Hammer, 1953) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Groenlandia y Oeste de Siberia).
- *Damaeus (Epidamaeus) hammerae* (Behan-Pelletier *et* Norton, 1983) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Damaeus (Epidamaeus) hastatus* (Hammer, 1967) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- *Damaeus (Epidamaeus) inornatus* Strenzke, 1952 (*D.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Groenlandia.
- *Damaeus (Epidamaeus) johnstoni* (Tolstikov, 1997) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Damaeus (Epidamaeus) kanbulaensis* (Xie *et* Yang, 2011) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Damaeus (Epidamaeus) karelicus* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Europa.
- *Damaeus (Epidamaeus) khustaiensis* (Bayartogtokh, 2000) (*E.*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) kodiakensis* (Hammer, 1967) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional, Este de Paleártica oriental).
- *Damaeus (Epidamaeus) koyukon* (Behan-Pelletier *et* Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) longispinosus* (Wang *et* Norton, 1993) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental y España.
- *Damaeus (Epidamaeus) longitarsalis* (Hammer, 1952) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) mackenziensis* (Hammer, 1952) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) michaeli* Ewing, 1909 (*D.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.(Ilinois).
- *Damaeus (Epidamaeus) microspinus* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) microtuberculatus* (Bayartogtokh, 2004) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) mitlsensillus* (Palacios-Vargas, 1984) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Damaeus (Epidamaeus) munkhbayari* (Bayartogtokh, Burkitbaeva *et* Enkhbayar, 2016) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) nasutus* (Behan-Pelletier *et* Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) oharensis* (Enami, 1992) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) olitor* (Jacot, 1937) (*Belba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Damaeus (Epidamaeus) paraspinosus* (Bulanova-Zachvatkina, 1975) (*E.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Siberia (Taimir).
- *Damaeus (Epidamaeus) pavlovskii* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Asia centroocidental).
- *Damaeus (Epidamaeus) pianmaensis* (Xie, Yan, Wang, Ren *et* Yang, 2017) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) pinguis* (Kulijev, 1967) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Damaeus (Epidamaeus) plumosus* (Bulanova-Zachvatkina, 1975) (*E.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental (Cáucaso, Ucrania y Oeste de Rusia).
- *Damaeus (Epidamaeus) puritanicus* (Banks, 1906) (*Oribata*)
(=*Epidamaeus grandjeani* Bulanova-Zachvatkina, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Damaeus (Epidamaeus) pyrenaicus* (Pérez-Íñigo jr., 1991) (*E.*)
(=*Epidamaeus ibericus* Moraza, Moreno *et* Saloña, 1991)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeus (Epidamaeus) robustus* (Mihelčič, 1955) (*Porobelba (Belba)*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Damaeus (Epidamaeus) saviah* (Ermilov, 2020) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Damaeus (Epidamaeus) smirnovi* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental).
- *Damaeus (Epidamaeus) subiasi* (Pérez-Íñigo, 1995) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: España.

Damaeus (Epidamaeus) tatricus (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Damaeus (Epidamaeus) tatricus tatricus* (Kulczynski, 1902)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Damaeus (Epidamaeus) tatricus diversus* (Mihelčič, 1952) (*Belba*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Damaeus (Epidamaeus) tenuisetosus* (Bayartogtokh, 2001) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) tenuissimus* (Hammer, 1967) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) tenuitibialis* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte).
- *Damaeus (Epidamaeus) trigonalis* Strenzke, 1952 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Groenlandia.
- *Damaeus (Epidamaeus) uenoi* (Aoki, 1966) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Damaeus (Epidamaeus) variabilis* (Fujikawa *et* Fujita, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Japón y Norte de China).
- *Damaeus (Epidamaeus) weigmanni* (Bayartogtokh, 2004) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Damaeus (Eudamaeus) Pérez-Íñigo, 1987 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Damaeus (Eudamaeus) pomboi* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Damaeus (Eudamaeus) pomboi* Pérez-Íñigo, 1987

DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

Damaeus (Kunstidamaeus) Miko, 2006 (16 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Belba lengersdorfi* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) diversipilis* (Willmann, 1951) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) fragilis* (Enami *et* Fujikawa, 1989) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) fraterculus* (Miko, 2010) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) granulatus* (Willmann, 1951) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) ladislavmikoi* (Ermilov *et* Rjabinin, 2020) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
Damaeus (Kunstidamaeus) lengersdorfi (Willmann, 1932) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) lengersdorfi lengersdorfi* (Willmann, 1932)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) lengersdorfi moraviae* (Willmann, 1954) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) longisetosus* (Willmann, 1953) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) mayangheensis* (Xie *et* Yang, 2011) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) nidicola* (Willmann, 1936) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlantica.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) nivalis* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Polonia y U.S.A. (Ténesi).
- *Damaeus (Kunstidamaeus) parayunnanensis* (Ermilov *et* Kalúz, 2013) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
Damaeus (Kunstidamaeus) tecticola Michael, 1888 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) tecticola tecticola* Michael, 1888
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) tecticola romaniae* Cooreman, 1951 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) tenuipes* Michael, 1885 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa occidental: I. Británicas, Oeste de Paleártica oriental, I. Kuriles y Groenlandia).
- *Damaeus (Kunstidamaeus) verrucatus* (Enami *et* Fujikawa, 1989) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Kunstidamaeus) yilanensis* (Miko *et* Ermilov, 2019) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Damaeus (Kunstidamaeus) yunnanensis* (Enami, Aoki *et* Hu, 1994) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Damaeus (Paradamaeus) Bulanova-Zachvatkina, 1957 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis clavipes* Hermann, 1804
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Damaeus (Paradamaeus) clavipes* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
(=*Damaeus concolor* Koch, 1844)
(=*Oppia glaucina* Koch, 1835: juvenil)
(=*Damaeus nodipes* Koch, 1839)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente).

Damaeus (Spatiodamaeus) Bulanova-Zachvatkina, 1957 (19 spp.)
ESPECIE TIPO: *Damaeus verticillipes* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) bacillum* (Kulczynski, 1926) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) bomeensis* (Xie, D. Huang, Yan, Huang *et* Yang, 2012) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) boreus* Bulanova-Zachvatkina, 1957
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) chopeensis* (Ermilov *et* Rjabinin, 2020) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) conjungenus* (Xie, Yan, Wang, Ren *et* Yang, 2016) (*S.*)
(*nom. praeoc.* por Xie, Yang *et* Huang, 2011)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) crassispinosus* Mihelčič, 1964 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) fageti* Bulanova-Zachvatkina, 1957
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europea y Mongolia).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) glabrisetus* (Willmann, 1930) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional (excepto Oeste).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) gladius* (Xie, Yan, Wang, Ren *et* Yang, 2016) (*S.*)

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) huanglongensis* (Xie, Yan, Wang, Ren *et* Yang, 2017) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) kamaensis* (Sellnick, 1926) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) mongolicus* (Bayatortogkh, 2000) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Mongolia y Norte de China).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) nortoni* (Bayartogtokh, 2004) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) quadrituberculatus* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (excepto Oeste).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) setiger* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental (excepto Norte).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) tritylos* (Behan-Pelletier *et* Norton, 1983) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Este de Rusia asiática).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) verticillipes* (Nicolet, 1855) (*D.*)
(=*Belba mirabilis* Karpelles, 1893)
(=*Damaeus quadrihastatus* Märkel *et* Meyer, 1960)
(=*Belba similis* Willmann, 1954)
(=*Damaeus (Spatiodamaeus) subverticillipes* Bulanova-Zachvatkina, 1957)
(?=*Damaeus torvus* Koch, 1835 *sp. inq.*: juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, y U.S.A.: Nueva Hampshire).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) yushuensis* Xie, Yan, Huang *et* Yang, 2011 (*D. (Paradamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) ziemowiti* (Ermilov *et* Rjabinin, 2020) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Dameobelba Sellnick, 1928 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata minutissima* Sellnick, 1920
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Dameobelba minutissima* (Sellnick, 1920) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).

Metabelba Grandjean, 1936 (31 spp.)
ESPECIE TIPO: *Damaeus papillipes* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

Metabelba (Metabelba) Grandjean, 1936 (15 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).
- *Metabelba (M.) benoiti* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Metabelba (M.) heteropoda* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Metabelba (M.) horrida* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Metabelba (M.) limasetosa* (Bulanova-Zachvatkina, 1962) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Metabelba (M.) obtusa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Norte de India.
- *Metabelba (M.) orientalis* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Metabelba (M.) papillipes* (Nicolet, 1855) (*Damaeus*)
(=*Metabelba cremersi* Hammen, 1952)
(=*Belba globipes* Canestrini *et* Berlese, 1884)
(=*Belba michaeli* Oudemans, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Oeste de Siberia y U.S.A.) y Etiópica (Sudáfrica).
- *Metabelba (M.) parapulverosa* Moritz, 1966
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Metabelba (M.) propexa* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Metabelba (M.) propinqua* (Sellnick, 1943) (*Damaeus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Metabelba (M.) pulverulenta* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
(=*Nothrus pollinosus* Koch, 1839)
(=*Metabelba pulverosa* Strenzke, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).
- *Metabelba (M.) rara* Bulanova-Zachvatkina, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Oeste de Siberia).
- *Metabelba (M.) rohdendorfi* Bulanova-Zachvatkina, 1965
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Metabelba (M.) singularis* Mihelčič, 1964
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Metabelba (M.) tanganyikensis* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Metabelba (Neobelba) Bulanova-Zachvatkina, 1967 (15 spp.)
(=***Pateribelba*** Mourek, Miko *et* Bernini, 2011)
ESPECIE TIPO: *Neobelba pseudopapillipes* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.
- *Metabelba (Neobelba) centurion* Miko, Mourek *et* Ermilov, 2014 (*M. (Pateribelba)*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Metabelba (Neobelba) denscanis* Mourek, Miko *et* Bernini, 2011 (*M. (Pateribelba)*)
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Metabelba (Neobelba) ericius* Kunst, 1958 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Metabelba (Neobelba) filippovae* Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Metabelba (Neobelba) flagelliseta* Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Metabelba (Neobelba) glabriseta* Mahunka, 1982 (*M.*)
(?=*Metabelba angolensis* Balogh, 1958 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Angola).
- *Metabelba (Neobelba) italica* (Sellnick, 1931) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Metabelba (Neobelba) machadoi* Pérez-Íñigo, 1986 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Metabelba (Neobelba) monilipeda* Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Metabelba (Neobelba) platynota* Grandjean, 1954 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Metabelba (Neobelba) pseudoitalica* Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)
(=*Metabelba paraitalica* Kulijev, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Metabelba (Neobelba) pseudopapillipes* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Metabelba (Neobelba) rhodopeia* Kunst, 1961 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Metabelba (Neobelba) romandiolae* (Sellnick, 1943) (*Damaeus*)
(=*Metabelba gladiator* Mihelčič, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Metabelba (Neobelba) sphagni* Strenzke, 1950 (*M.*)
(=*Metabelba lanceolata* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.

Nododamaeus Hammer, 1977 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nododamaeus monticola* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Nododamaeus (Nododamaeus) Hammer, 1977 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Nododamaeus (N.) aphelesa* (Woolley *et* Higgins, 1979) (*Dasybelba*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Nododamaeus (N.) monticola* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

Nododamaeus (Dasybelba) Woolley *et* Higgins, 1979 (2 spp.)
(=***Quatrobelba*** Norton, 1980)
ESPECIE TIPO: *Dasybelba perona* Woolley *et* Higgins, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Nododamaeus (Dasybelba) montana* (Norton, 1980) (*Quatrobelba*)
(=*Subbelba (Quatrobelba) neonominata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Nododamaeus (Dasybelba) perona* (Woolley *et* Higgins, 1979) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

Nortonbelba Bernini, 1980 (1 sp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Nortonbelba italica* Bernini, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
Nortonbelba italica Bernini, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Nortonbelba italica italica* Bernini, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Nortonbelba italica plesiomorphica* (Saloña *et* Iturrondobeitia, 1989) (*Epidamaeus p.*)
DISTRIBUCIÓN: España.

Porobelba Grandjean, 1936 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata spinosa* Sellnick, 1920
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Porobelba grandjeanica* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Porobelba spinosa* (Sellnick, 1920) (*Oribata*)

(=*Belba parvula* Mihelčič, 1955)
(=*Belba parvula* Mihelčič, 1956, *nom. praeoc.* por Mihelčič, 1955)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Porobelba weigmanni* Miko, 2008
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.

Protobelba Norton, 1979 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata californica* Banks, 1904
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.
- *Protobelba californica* (Banks, 1904) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
- *Protobelba retanai* Palacios-Vargas, Ortega *et* Iglesias, 2021
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Subbelba Bulanova-Zachvatkina, 1967 (3 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Subbelba partiocrispa* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
Subbelba elisae Pérez-Íñigo, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Subbelba elisae elisae* Pérez-Íñigo, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Subbelba elisae fuerteventurae* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
-*Subbelba elisae grancanariae* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Subbelba montana* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
(=*Belba ursina* Thor, 1930)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Euroatlántica, Cáucaso y Asia centrooccidental).
- *Subbelba partiocrispa* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa oriental y Siberia).

Tectodamaeus Aoki, 1984 (21 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tectodamaeus armatus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Oriental y "Australiana".

Tectodamaeus (Tectodamaeus) Aoki, 1984 (20 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Oriental y "Australiana".
- *Tectodamaeus (T.) armatus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.
- *Tectodamaeus (T.) bawanglingensis* (Xie, Yan, Zhou *et* Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) brevisetus* (Wang, 1994) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) cuii* (Wang *et* Lu, 1995) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) daliensis* Xie *et* Yang, 2009
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) exsertus* (Wang, 1994) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) exspinosus* (Wang *et* Norton, 1989) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) femurgibbus* (Xie, Yan, Zhou *et* Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) furcatus* (Wang *et* Lu, 1995) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) heterotrichus* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Península Malaya).
- *Tectodamaeus (T.) interlamellaris* (Willmann, 1939) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Macaronésica: Madeira, y Crimea).
- *Tectodamaeus (T.) kuankuoshuiensis* (Xie, Yan, Zhou *et* Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) macropoda* (Berlese, 1905) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Tectodamaeus (T.) obscurusgibbus* (Xie, Yan, Zhou *et* Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) spiniger* (Wang, 1994) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) subtilis* (Canestrini, 1897) (*Belba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Tectodamaeus (T.) subtilisfinem* (Xie, Yan, Zhou *et* Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) truku* Ermilov, 2021
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Tectodamaeus (T.) wulongensis* (Wang *et* Cui, 1992) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Tectodamaeus (T.) yaoi* (Wang, 1994) (*Damaeus*)

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Tectodamaeus (Tamdamaeus) Miko *et* Ermilov, 2017 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tamdamaeus staryi* Miko *et* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Tectodamaeus (Tamdamaeus) staryi* (Miko *et* Ermilov, 2017) (*Tam.*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Weigmannia Miko *et* Norton, 2010 (1 sp.)
(=***Gerdia*** Miko *et* Norton, 2010 *nom. praeoc.* por Menge, 1869)
ESPECIE TIPO: *Porobelba parki* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.
- *Weigmannia parki* (Jacot, 1937) (*Porobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica centrooriental y U.S.A. (Florida).

Polypterozetoidea Grandjean, 1959

Polypterozetidae Grandjean, 1959 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Polypterozetes Berlese, 1916 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Polypterozetes cherubin* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Polypterozetes cherubin* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Italia.

Podopterotegaeidae Piffl, 1972 (1 gen. y 4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Podopterotegaeus Aoki, 1969 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Podopterotegaeus tectus* Aoki, 1969
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Podopterotegaeus altimonticola* Piffl, 1972
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Podopterotegaeus bisetus* Pankov, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Podopterotegaeus miyamaensis* Fujikawa, 2008
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Podopterotegaeus tectus* Aoki, 1969
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica oriental: frecuente, y Neártica septentrional) y Noreste de Oriental.

Cepheusoidea Berlese, 1896

Cepheusidae Berlese, 1896 (15 gen., 87 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Cepheus Koch, 1835 (26 spp.)
(=***Pelonia*** Grube, 1859)
(=***Tegeocranus*** Nicolet, 1855)
ESPECIE TIPO: *Cepheus latus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australianooriental y "Etiópica").
- *Cepheus brachiatus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa oriental y Paleártica oriental).
- *Cepheus caucasicus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Cepheus cepheiformis* (Nicolet, 1855) (*Tegeocranus*)
(=*Cepheus michaeli* Jacot, 1928)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Carolina del Norte) y China suroriental.
- *Cepheus corae* Jacot, 1928
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente).
- *Cepheus dentatus* (Michael, 1888) (*Tegeocranus*)
(=*Cepheus grandis* Sitnikova, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (frecuente) y Este de Rusia asiática.
- *Cepheus foliosus* (Grube, 1859) (*Pelonia*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Cepheus gracilipes* (Canestrini, 1897) (*Tegeocranus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Cepheus granulosus* Mihelčič, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Cepheus heterosetosus* (Sitnikova, 1975) (*Oribatodes*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental: excepto Norte.
- *Cepheus hokkaiensis* Fujikawa, 1992
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cepheus incisus* Mihelčič, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Cepheus jindingensis* Wen *et* Sun, 1990

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Cepheus kurosawai* Aoki, 1986
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cepheus latus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Oriental (China suroriental y Nepal).
- *Cepheus lobatus* Mihelčič, 1953 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Cepheus pegazzanoae* Bernini *et* Nannelli, 1982
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Cepheus pertusus* Haupt, 1882 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Cepheus pustulatus* (Pearce, 1910) (*Tegeocranus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Cepheus ramosus* (Thor, 1912) (*Tegeocranus*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Siberia (Kamchatka).
- *Cepheus similis* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cepheus spinosus* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cepheus takasago* Aoki, 1991
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Cepheus transversalis* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Cepheus transylvanicus* Cooreman, 1951
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Cepheus tuberculosus* Strenzke, 1951
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental: excepto Norte.
- *Cepheus verrucosus* Bernini, 1971
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Compactozetes Hammer, 1966 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Compactozetes rotoruensis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Compactozetes hastatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Compactozetes niger* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Compactozetes rotoruensis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Compactozetes zeugus* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Conoppia Berlese, 1908 (2 spp.)
(=***Balzania*** Jacot, 1929)
(=***Phyllotegeus*** Berlese, 1913)
ESPECIE TIPO: (*Oppia microptera* Berlese, 1885) =*Leiosoma palmicinctum* Michael, 1880
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental y Neotropical).
- *Conoppia palmicincta* (Michael, 1880) (*Leiosoma*)
(=*Cepheus feideri* Suciu *et* Panu, 1972: juvenil)
(=*Oppia microptera* Berlese, 1885)
(=*Oribata microptera* Canestrini, 1896, *nom. praeoc.* por Berlese, 1885)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental centromeridional: frecuente, Este de Paleártica oriental y U.S.A.), Oriental: Taiwán [Formosa] e India (Sikkim), y Bolivia.
- *Conoppia setiformis* Golosova *et* Karppinen, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental.

Eupterotegaeus Berlese, 1916 (10 spp.)
(=***Diodontocepheus*** Mihelčič, 1958)
ESPECIE TIPO: *Tegeocranus ornatissimus* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Eupterotegaeus armatus* Aoki, 1969
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Eupterotegaeus dentatus* Sitnikova, 1979
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Eupterotegaeus flavus* (Ewing, 1918) (*Cepheus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Eupterotegaeus hendekensis* Susyal, Ayyildiz *et* Baran, 2018
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Eupterotegaeus nasalis* Sitnikova, 1979
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Eupterotegaeus ornatissimus* (Berlese, 1908) (*Tegeocranus*)
(?=*Cepheus pseudosculptus* Coggi, 1900 *sp. inq.*)
(=*Diodontocepheus steinboecki* Mihelčič, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica meridional, I. Sajalín y Canadá).
- *Eupterotegaeus rhamphosus* Higgins *et* Woolley, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Noroeste de U.S.A. y Canadá).

- *Eupterotegaeus rostratus* Higgins *et* Woolley, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. occidenal y Canadá).
- *Eupterotegaeus spinatus* Higgins *et* Woolley, 1963
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Eupterotegaeus xizangensis* Wang *et* Solhøy, 2001
  DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).

Hypocepheus Krivolutsky, 1971 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hypocepheus mirabilis* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Hypocepheus helveticus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Europea (Suiza y Turquía).
- *Hypocepheus krivolutskyi* Călugăr *et* Vasiliu, 1976
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Hypocepheus mirabilis* Krivolutsky, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).

Ommatocepheus Berlese, 1913 (5 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Cepheus ocellatus* Michael, 1882
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Ommatocepheus clavatus Woolley *et* Higgins, 1964
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental: Japón e I. Kuriles, y U.S.A. oriental).

- *Ommatocepheus clavatus clavatus* Woolley *et* Higgins, 1964
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Ommatocepheus clavatus japonicus* Aoki, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Ommatocepheus crassisetosus* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Ommatocepheus ocellatus* (Michael, 1882) (*Cepheus*)
  (=*Scutovertex pulcherrimus* Berlese, 1913)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental: excepto Norte, e India: Himalaya.
- *Ommatocepheus parvilamellatus* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Ommatocepheus reticulatus* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Oribatodes Banks, 1895 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribatodes mirabilis* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Oribatodes crenulatus* Csiszár, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Oribatodes mirabilis* Banks, 1895
  (=*Cepheus lamellatus* Banks, 1906)
  (=*Tegeocranus longisetus* Berlese, 1910)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Pilocepheus Pérez-Íñigo, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pilocepheus azoricus* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Pilocepheus azoricus* Pérez-Íñigo, 1992
  DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

Protocepheus Jacot, 1928 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tegeocranus hericius* Michael, 1888
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Protocepheus hericius* (Michael, 1888) (*Tegeocranus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa central.

Reticulocepheus Vasiliu *et* Călugăr, 1977 (5 spp.)
(=***Cubacepheus*** Balogh *et* Mahunka, 1979)
(=***Geocepheus*** Sitnikova, 1979)
ESPECIE TIPO: *Reticulocepheus decoui* Vasiliu *et* Călugăr, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Holártica.

- *Reticulocepheus areolatus* (Sitnikova, 1979) (*Geocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Reticulocepheus decoui* Vasiliu *et* Călugăr, 1977
  (=*Cepheus (Cubacepheus) lobatus* Balogh *et* Mahunka, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Reticulocepheus grandis* (Sitnikova, 1979) (*Geocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Reticulocepheus mirabiloides* (Jacot, 1938) (*Cepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Reticulocepheus reticulatus* (Sitnikova, 1979) (*Geocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Sadocepheus Aoki, 1965 (16 spp. y 1 ssp.)

(=***Hamotegeus*** Balogh *et* Mahunka, 1969)
ESPECIE TIPO: *Sadocepheus undulatus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Sadocepheus breviseta* (P. Balogh, 1986) (*Hamotegeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Sadocepheus dhatiwalalensis* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Sadocepheus donvictorianoensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Sadocepheus dubius* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Sadocepheus elevatus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Sadocepheus foveolatus* Luxton, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Sadocepheus franzi* (P. Balogh, 1986) (*Hamotegeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Sadocepheus granulatus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Hamotegeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Paraguay).
- *Sadocepheus longiseta* (P. Balogh, 1986) (*Hamotegeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Sadocepheus makarchevae* Sitnikova, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Sadocepheus nortonroyi* Ermilov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Sadocepheus sausai* Ermilov *et* Kalúz, 2021
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Sadocepheus serratus* (Balogh, 1970) (*Compactozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Sadocepheus subniger* (Ewing, 1917) (*Tegeocranus*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Iowa).

Sadocepheus undulatus Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Sadocepheus undulatus undulatus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Sadocepheus undulatus setiger* Fujita *et* Fujikawa, 1986
  (=*Sadocepheus tohokuensis* Fujikawa, 2003)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Sadocepheus yakuensis* Aoki, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Sphodrocepheus Woolley *et* Higgins, 1963 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sphodrocepheus tridactylus* Woolley *et* Higgins, 1963
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Sphodrocepheus anthelionus* Woolley *et* Higgins, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (Noroeste de U.S.A. y Canadá).
- *Sphodrocepheus dentatus* Fujikawa, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Sphodrocepheus mitratus* Aoki, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Sphodrocepheus tridactylus* Woolley *et* Higgins, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. occidental y Cáucaso) y Oriental (Noreste de India).
- *Sphodrocepheus tuberculatus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Nepal) y Méjico.

Tereticepheus S. Bernini *et* Bernini, 1990 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tereticepheus annamariae* S. Bernini *et* Bernini, 1990
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Tereticepheus annamariae* S. Bernini *et* Bernini, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Argelia.
- *Tereticepheus undulatus* (Willmann, 1939) (*Cepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Tikizetes Hammer, 1967 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tikizetes spinipes* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Tikizetes spinipes* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Tritegeus Berlese, 1913 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Cepheus bifidatus* Nicolet *sensu* Michael, 1880) =*Tritegeus bisulcatus* Grandjean, 1953
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Tritegeus bisulcatus* Grandjean, 1953
  (?=*Cepheus bifidatus* Nicolet, 1855 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos fecuente en el Norte).
- *Tritegeus brevisetus* Sitnikova, 1975

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
- *Tritegeus major* Golosova *et* Karppinen, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Tritegeus sculptus* S. Bernini *et* Bernini, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Cerocepheidae Mahunka, 1986 (3 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana y Neotropical).

Bornebuschia Hammer, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Bornebuschia peculiaris* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Bornebuschia binodosa* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Bornebuschia peculiaris* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Cerocepheus Trägårdh, 1931 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cerocepheus mirabilis* Trägårdh, 1931
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cerocepheus mirabilis* Trägårdh, 1931
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).
- *Cerocepheus osornoensis* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Dicrotegaeus Luxton, 1988 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dicrotegaeus mirabilis* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Dicrotegaeus incurvus* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Dicrotegaeus mariehammerae* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Dicrotegaeus mirabilis* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Eutegaeidae Balogh, 1965 (9 gen. y 32 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (excepto Holártica).

Atalotegaeus Luxton, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Eutegaeus mensarosi* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Atalotegaeus mensarosi* (Balogh *et* P. Balogh, 1983) (*Eutegaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Birotegaeus Luxton, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Eutegaeus biroi* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Birotegaeus biroi* (Balogh, 1970) (*Eutegaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Dudichella Balogh, 1970 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Dudichella membranigera* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Dudichella membranigera* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka] y Melanesia (I. Fiji).

Eutegaeus Berlese, 1916 (14 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata bostocki* Michael, 1908
DISTRIBUCIÓN: Australiana, Neotropical y Antártica.
- *Eutegaeus aysenensis* Ermilov, 2021
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Eutegaeus biovatus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Eutegaeus bostocki* (Michael, 1908) (*Oribata*)
(=*Eutegaeus curviseta* Hammer, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Antártica (I. Campbell).
- *Eutegaeus fueginus* Arcidiacono, 1993
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Eutegaeus lagrecai* Arcidiacono, 1993
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Eutegaeus membraniger* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Eutegaeus papuensis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Eutegaeus paralagrecai* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Eutegaeus parapapuaensis* Ermilov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Eutegaeus pinnatus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Eutegaeus queulatensis* Ermilov, 2021
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Eutegaeus radiatus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Eutegaeus soror* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Eutegaeus stylesi* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Neoeutegaeus Aoki, 1965 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eutegaeus silvicola* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).

- *Neoeutegaeus africanus* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Neoeutegaeus phyllophorus* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Neoeutegaeus silvicola* (Hammer, 1962) (*Eutegaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Neseutegaeus Woolley, 1965 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Neseutegaeus spinatus* Woolley, 1965
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Neseutegaeus angustus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neseutegaeus consimilis* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neseutegaeus denticulatus* P. Balogh, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Neseutegaeus distentus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neseutegaeus latus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neseutegaeus monteithi* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Neseutegaeus spinatus* Woolley, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Pareutegaeus Woolley, 1965 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eutegaeus similis* Trägårdh, 1931
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Pareutegaeus pulcher* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Eutegaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pareutegaeus similis* (Trägårdh, 1931) (*Eutegaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).

Porrhotegaeus Balogh *et* Mahunka, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Porrhotegaeus ornatus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Porrhotegaeus herminae* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Porrhotegaeus ornatus* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Pterozetes Hammer, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pterozetes novazealandicus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Pterozetes novazealandicus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Salvidae Özdikmen, 2008 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Salvus Özdikmen, 2008 (1 sp.)
(=***Brazilobates*** Koçak *et* Kemal, 2008 *nom. praeoc.* por Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
(=***Pterobates*** Balogh *et* Mahunka, 1977 *nom. praeoc.* por Bezzi, 1924)
ESPECIE TIPO: *Pterobates incertus* Balogh *et* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Salvus incertus* (Balogh *et* Mahunka, 1977) (*Pterobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Nodocepheidae Piffl, 1972 (2 gen., 7 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica).

Nemacepheus Aoki, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Nemacepheus dentatus* Aoki, 1968
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Nemacepheus dentatus* Aoki, 1968
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Kuriles).

Nodocepheus Hammer, 1958 (6 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Nodocepheus dentatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.
- *Nodocepheus baloghi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Madagascar).
- *Nodocepheus cerebralis* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego) y Cuba.

Nodocepheus dentatus Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Australiana (Nueva Zelanda), Oriental y subantártica.
- *Nodocepheus dentatus dentatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental (Vietnam y Península Malaya) y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Nodocepheus dentatus barbatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda) y subantártica (I. Amsterdam).

- *Nodocepheus hammerae* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Nodocepheus laterodentatus* Piffl, 1972
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Nodocepheus minimus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Tumerozetidae Hammer, 1966 (1 gen. y 5 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Tumerozetes Hammer, 1966 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tumerozetes bifurcatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Tumerozetes bifurcatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tumerozetes circularis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tumerozetes indistinctus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tumerozetes parallelus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tumerozetes pumilis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Gustavioidea Oudemans, 1900

Anderemaeidae Balogh, 1972 (2 gen. y 13 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y austral.

Anderemaeus Hammer, 1958 (12 spp.)
ESPECIE TIPO: *Anderemaeus monticola* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y Neotropical austral.
- *Anderemaeus australiensis* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Anderemaeus capitatus* Balogh *et* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Anderemaeus chilensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Anderemaeus dentatus* Norton *et* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Anderemaeus hammerae* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: América austral.
- *Anderemaeus hidasii* P. Balogh, 1995
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Anderemaeus magellanis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Anderemaeus mataderoensis* Norton *et* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Anderemaeus monticola* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y China suroriental.
- *Anderemaeus sidorchukae* Norton *et* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Anderemaeus sturmi* Balogh *et* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Anderemaeus tridactylus* (Trägårdh, 1907) (*Carabodes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).

Luxtoneremaeus Balogh *et* P. Balogh, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Anderemaeus forsteri* Balogh *et* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Luxtoneremaeus forsteri* (Balogh *et* P. Balogh, 1985) (*Anderemaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Astegistidae Balogh, 1961 (9 gen., 1 subgen. y 53 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Astegistes Hull, 1916 (2 spp.)
(=***Cultrozetes*** Sellnick, 1922)
ESPECIE TIPO: (*Liacarus bicornis* Warburton *et* Pearce, 1905) =*Zetes pilosus* Koch, 1841
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Astegistes hallaensis* Choi, 1998
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Astegistes pilosus* (Koch, 1841) (*Zetes*)
(=*Liacarus bicornis* Warburton *et* Pearce, 1905)
(=*Sphaerozetes comelicensis* Lombardini, 1962)
(?=*Acarus muscorum* Scopoli, 1763 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Paleártica oriental meridional.

Cultroribula Berlese, 1908 (21 spp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis juncta* Michael, 1885
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Cultroribula almagulae* Poltavskaja, 1994
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Cultroribula angulata* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cultroribula arctica* Poltavskaja, 1994
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Oeste).
- *Cultroribula argentinensis* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Ecuador).
- *Cultroribula berolina* Weigmann, 2006
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Alemania, Mongolia y Noroeste de Siberia).
- *Cultroribula bicultrata* (Berlese, 1905) (*Dameosoma*)
(=*Cultroribula falcata* Evans, 1952)
(=*Cultroribula szentivanyi* Balogh, 1943)
(=*Cultroribula trifurcata* Jacot, 1939)
(=*Cultroribula trifurcata rotundata* Krivolutsky, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Java.
- *Cultroribula bicuspidata* Mahunka, 1978
(=*Cultroribula castriensis* Mahunka, 1985)
(=*Cultroribula zicsii* Balogh *et* Mahunka, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Cultroribula brasilensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Cultroribula confinis* Berlese, 1908
(=*Cultroribula divergens* Jacot, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica oriental y Europa meridional).
- *Cultroribula diversa* Oudemans, 1915
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Cultroribula elongata* Fujikawa, 1972
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Cultroribula humerata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Cultroribula juncta* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa, Este de Rusia asiática y U.S.A. oriental).
- *Cultroribula lata* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Italia y Paleártica oriental), Oriental y Australiana (Australia y Nueva Zelanada).
- *Cultroribula laticuspis* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Cultroribula ligulata* Grishina, 1980
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Cultroribula otagoensis* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelana.
- *Cultroribula quinquesetosa* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Cultroribula shukuminensis* Nakatamari, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cultroribula tridentata* Mihelčič, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Cultroribula tropica* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Angola).

Furcoppia Balogh *et* Mahunka, 1969 (18 spp.)

ESPECIE TIPO: *Furcoppia imitans* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Furcoppia (Furcoppia) Balogh *et* Mahunka, 1969 (10 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Furcoppia (F.) americana* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Furcoppia (F.) cattienica* Ermilov *et* Anichkin, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Furcoppia (F.) cornuta* Hammer, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) e India (Bengala Occidental).
- *Furcoppia (F.) groblerae* Subías, 2010
  (=*Furcoppia dentata* Grobler, 2003, *nom. praeoc.* por Willmann, 1950)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Furcoppia (F.) horakae* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Furcoppia (F.) imitans* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Furcoppia (F.) longiseta* Grobler, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Furcoppia (F.) minuta* Grobler, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Furcoppia (F.) parva* Balogh *et* Mahunka, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Furcoppia (F.) tricornuta* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Furcoppia (Mexicoppia) Mahunka, 1983 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Furcoppia (Mexicoppia) hauseri* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Furcoppia (Mexicoppia) altaica* (Bayartogtokh, 2012) (*Cultroribula*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Furcoppia (Mexicoppia) breviclavata* (Aoki, 1984) (*Cultroribula*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Furcoppia (Mexicoppia) dentata* (Willmann, 1950) (*Cultroribula*)
  DISTRIBUCIÓN: Boreal, Mongolia y China (Tíbet).
- *Furcoppia (Mexicoppia) hauseri* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Furcoppia (Mexicoppia) microdentata* (Krivolutsky, 1962) (*Cultroribula*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Ucrania y Este de Paleártica oriental) y Méjico.
- *Furcoppia (Mexicoppia) rarisetosa* (Bayartogtokh, 2012) (*Cultroribula*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Furcoppia (Mexicoppia) taigagica* (Bayartogtokh, 2007) (*Cultroribula*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Mongolia y "Canadá").
- *Furcoppia (Mexicoppia) vtorovi* (Krivolutsky, 1971) (*Cultroribula*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica oriental meridional y Neártica).

Furcoribula Balogh, 1943 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis furcillata* Nordenskiöld, 1901
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Etiópica.
- *Furcoribula bilamellata* (Hall, 1911) (*Notaspis*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Furcoribula furcillata* (Nordenskiöld, 1901) (*Notaspis*)
  (=*Notaspis bicuspidata* Štorkán, 1925)
  (=*Eremaeus copulatus* Oudemans, 1906)
  (=*Cultroribula confinis magna* Ewing, 1917)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centrooriental, Paleártica oriental y U.S.A.: Ilinois) y Etiopía.
- *Furcoribula pacifica* Krivolutsky, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
- *Furcoribula tridentata* Wen, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Furcoribula yichunensis* Wen *et* Gao, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Lamellozetes Covarrubias, 1967 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lamellozetes pseudoareolatus* Covarrubias, 1967
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Lamellozetes chilensis* Covarrubias, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Lamellozetes pseudoareolatus* Covarrubias, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Maorizetes Hammer, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Maorizetes ferox* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Maorizetes ferox* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Bengala Occidental).

Monofurcoppia Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1995 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Furcoppia (Monofurcoppia) austroamericana* Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1995
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Monofurcoppia austroamericana* (Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1995) (*Furcoppia (M.)*)
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.

Quadroribula Balogh *et* P. Balogh, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cultroribula quadrisetosa* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Australiana.
- *Quadroribula quadrisetosa* (Balogh *et* P. Balogh, 1983) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia y Japón.

Sulcoribula Hammer, 1971 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sulcoribula laticuspidata* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Sulcoribula filipina* Corpuz-Raros *et* Lit, 2009
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Sulcoribula laticuspidata* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Multoribulidae Balogh, 1972 (2 gen. y 3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Multoribula Balogh *et* Mahunka, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Multoribula multipunctata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Multoribula multipunctata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Multoribula suramericana* Balogh *et* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Méjico).

Peloptoribula Mahunka, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Peloptoribula spinulosa* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Peloptoribula spinulosa* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Ceratoppiidae Grandjean, 1954 (16 gen., 1 subgen., 68 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Amazoppia Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Amazoppia tricuspidata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Amazoppia tricuspidata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Austroceratoppia Hammer, 1979 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Austroceratoppia dentata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica.
- *Austroceratoppia crassiseta* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Ceratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Austroceratoppia dentata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Austroceratoppia japonica* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
- *Austroceratoppia sabahna* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Austroceratoppia serapi* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Ceratoppia Berlese, 1908 (21 spp. y 2 sspp.)
(?=***Notaspis*** Hermann, 1804 *gen. inq.*)
ESPECIE TIPO: *Notaspis bipilis* Hermann, 1804
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental, Neotropical y “Australiana”.
- *Ceratoppia abchasica* Krivolutsky *et* Tarba, 1971
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ceratoppia acuminata* Golosova, 1981
(no *Murcia acuminata* Koch, 1841, =*Ceratoppia bipilis*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Norte de Oriental.
Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Norte de Oriental y Norte de Neotropical.
- *Ceratoppia bipilis bipilis* (Hermann, 1804)
(=*Murcia acuminata* Koch, 1841: juvenil)
(=*Oribata badius* Koch, 1839)

(=*Oppia cornuta* Koch, 1844)
(=*Ceratoppia herculeana* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Noreste de Oriental y Norte de Neotropical.
- *Ceratoppia bipilis curtipilis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Ceratoppia bipilis spinipes* (Banks, 1906) (*Oppia s.*)
(=*Ceratoppia bipilis brevicuspis* Jacot, 1934)
(=*Oppia candensis* Banks, 1906)
(=*Oppia montana* Banks, 1906)
DISTRIBUCIÓN: Neártica centrooriental (frecuente) y U.S.A. (Florida).
- *Ceratoppia clavisensillata* Choi, 1998
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Ceratoppia filipina* Corpuz-Raros *et* García, 2011
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Ceratoppia hungarica* (Tafner, 1905) (*Notaspis*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Ceratoppia incisa* Kaneko *et* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ceratoppia indentata* Lindo, 2011
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Ceratoppia longicuspis* Lindo, 2011
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Ceratoppia longifilis* (Canestrini, 1897) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Ceratoppia mongolica* Bayartogtokh, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ceratoppia oblectatoria* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Ceratoppia offarostrata* Lindo, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Ceratoppia quadridentata* (Haller, 1882) (*Notaspis bipilis q.*)
(=*Ceratoppia quadridentata arctica* Hammer, 1955)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional) y China suroriental.
- *Ceratoppia rara* Fujikawa, 2008
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ceratoppia retilia* Li *et* H. Chen, 1990
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Ceratoppia sexpilosa* Willmann, 1938
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa, Este de Paleártica oriental y Neártica septentrional).
- *Ceratoppia sphaerica* (L. Koch, 1879) (*Oppia*)
(=*Ceratoppia hoeli* Thor, 1930)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Ceratoppia tofinoensis* Lindo, 2011
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Ceratoppia valerieae* Lindo, 2011
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Ceratoppia violabilis* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Ceratorchestes Balogh *et* Mahunka, 1969 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratorchestes setosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Ceratorchestes (Ceratorchestes) Balogh *et* Mahunka, 1969 (4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Ceratorchestes (C.) baloghi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Ceratorchestes (C.) cornutus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Ceratorchestes (C.) processus* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Ceratorchestes (C.) setosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).

Ceratorchestes (Paraceratorchestes) Ermilov *et* Kalúz, 2012 (3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Ceratorchestes (Paraceratorchestes) globosus* Balogh *et* Mahunka, 1969 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
- *Ceratorchestes (Paraceratorchestes) melzeri* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Ceratorchestes (Paraceratorchestes) variabilis* Ermilov *et* Kalúz, 2012
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Comeremaeus Hammer, 1962 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Comeremaeus castaneus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Comeremaeus castaneus* Hammer, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Dendrozetes Aoki, 1970 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dendrozetes caudatus* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Dendrozetes caudatus* Aoki, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Dendrozetes jordani* Lindo, Clayton *et* Behan-Pelletier, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Macquarioppia Wallwork, 1964 (1 sp.)
(=***Macquariella*** Wallwork, 1963, *nom. praeoc.* por Finlay, 1927)
ESPECIE TIPO: *Macquariella striata* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Macquarioppia striata* (Wallwork, 1963) (*Macquariella*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente).

Metapyroppia Woolley, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Metapyroppia doratosa* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Oriental.
- *Metapyroppia doratosa* Woolley, 1969
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ténesi).
- *Metapyroppia gigantea* Ermilov *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.

Negroppia Vasiliu *et* Călugăr, 1977 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Negroppia cornuta* Vasiliu *et* Călugăr, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Negroppia cornuta* Vasiliu *et* Călugăr, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Notoppia Balogh *et* Mahunka, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Notoppia humerata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Notoppia humerata* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Paraceratoppia Rjabinin, 1982 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Paraceratoppia meridionalis* Rjabinin, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Paraceratoppia altera* (Fujikawa, 2016) (*Ceratoppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Paraceratoppia asiatica* (Krivolutsky, 1965) (*Pyroppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Norte de Rusia europea y Paleártica oriental).
- *Paraceratoppia meridionalis* Rjabinin, 1982
  DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.
- *Paraceratoppia quadrisetosa* (Fujita *et* Fujikawa, 1986) (*Metrioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Parapyroppia Pérez-Íñigo *et* Subías, 1979 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Parapyroppia monodactyla* Pérez-Íñigo *et* Subías, 1979) =*Oribella cornuta* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Parapyroppia cornuta* (Berlese, 1910) (*Oribella*)
  (=*Parapyroppia monodactyla* Pérez-Íñigo *et* Subías, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Parapyroppia filiformis* Hirauchi, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Parapyroppia transitoria* (Berlese, 1908) (*Protoribates*) *sp. inq.*
  (=*Notaspis lamellata* Ewing, 1909)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica: U.S.A. (Misuri) y Canadá.

Pseudoceratoppia Hammer, 1967 (8 spp.)
(=***Hauseroceratoppia*** Mahunka, 1980)
ESPECIE TIPO: *Pseudoceratoppia sexsetosa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical austral.
- *Pseudoceratoppia asetosa* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia clavasetosa* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia diversa* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia horaki* (Mahunka, 1980) (*Hauseroceratoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Pseudoceratoppia longipilis* (Moniez, 1894) (*Leiosoma*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Pseudoceratoppia mariannae* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudoceratoppia microsetosa* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia sexsetosa* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Pseudopyroppia Rjabinin, 1987 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pseudopyroppia orientalis* Rjabinin, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Pseudopyroppia orientalis* Rjabinin, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Este de Rusia asiática e Irán).
- *Pseudopyroppia rotunda* Hirauchi, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Pyroppia Hammer, 1955 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pyroppia lanceolata* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Pyroppia arctica* Krivolutsky, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Pyroppia lanceolata* Hammer, 1955
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental (Cáucaso y España), Paleártica oriental (Noreste de Rusia), y Neártica septentrional.
- *Pyroppia serrifrons* (Banks, 1923) (*Notaspis*)
  (=*Pyroppia dentata* Krivolutsky, 1974)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Alaska).
- *Pyroppia sibirica* Golosova *et* Karppinen, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Pyroppia tajikistanica* Krivolutsky *et* Christov, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Asia centrooccidental) y Méjico.
- *Pyroppia tridentifera* Wang *et* Z. Wang, 1994
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Pyroppia ulneungensis* Choi, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Corea.

Trichoppia Balogh, 1961 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Trichoppia longiseta* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Trichoppia longiseta* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Trichoppia piriformis* (Warburton, 1912) (*Liacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

Peloppiidae Balogh, 1943 (3 gen. y 11 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Oriental.

Ceratoppiella Hammer, 1977 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratoppiella lutea* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Ceratoppiella lutea* Hammer, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

Metrioppia Grandjean, 1931 (8 spp.)
(=***Peloppia*** Sellnick, 1931)
ESPECIE TIPO: *Metrioppia helvetica* Grandjean, 1931
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Oriental.
- *Metrioppia atlantica* Jacot, 1938 (*M. serrata a.*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Metrioppia helvetica* Grandjean, 1931
  (=*Ceratoppia microseta* Hammer, 1952)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional, Paleártica oriental y Neártica).
- *Metrioppia krivolutskyi* Bayartogtokh, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Metrioppia oregonensis* Woolley *et* Higgins, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Metrioppia serrata* (Sellnick, 1931) (*Peloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico y U.S.A. (Virginia).
- *Metrioppia tricuspidata* Aoki *et* Wen, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Nepal.
- *Metrioppia walbranensis* Lindo, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Metrioppia zlotini* Krivolutsky, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Paenoppia Woolley *et* Higgins, 1965 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Paenoppia forficula* Woolley *et* Higgins, 1965

DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Paenoppia forficula* Woolley *et* Higgins, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Paenoppia magnifica* (Berlese, 1908) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).

Gustaviidae Oudemans, 1900 (1 gen. y 16 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.

Gustavia Kramer, 1879 (16 spp.)
(=***Neozetes*** Berlese, 1885)
(=***Serrarius*** Michael, 1883)
ESPECIE TIPO: (*Gustavia sol* Kramer, 1879) =*Leiosoma microcephala* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.
- *Gustavia aethiopica* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Gustavia aominensis* Fujikawa, 2008
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Gustavia fusifer* (Koch, 1841) (*Oribata*)
(=*Neozetes bicornis* Berlese, 1885)
(=*Oribata globula* Koch, 1841)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Gustavia latolamellata* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Gustavia longicornis* (Berlese, 1903) (*Serrarius*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Oriental.
- *Gustavia longiseta* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Gustavia magnifica* Golosova *et* Karppinen, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Gustavia magnilamellata* (Ewing, 1909) (*Liacarus*)
(=*Serrarius connexus* Berlesle, 1916)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Gustavia maior* (Berlese, 1903) (*Serrarius*)
(=*Gustavia microcephala longirostris* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Gustavia microcephala* (Nicolet, 1855) (*Leiosoma*)
(=*Gustavia sol* Kramer, 1879)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente), Oriental y Méjico.
- *Gustavia oceanica* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental) y Oriental (India: Bengala Occidental, y Filipinas).
- *Gustavia ornata* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Gustavia parvula* (Banks, 1909) (*Liacarus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Minesota).
- *Gustavia rugosa* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Gustavia sineornata* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Gustavia transylvanica* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

Liacaridae Sellnick, 1928 (6 gen., 4 subgen., 126 spp. y 6 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

Adoristes Hull, 1916 (3 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata ovata* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Adoristes (Adoristes) Hull, 1916 (2 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Adoristes (A.) ammonoosuci* Jacot, 1938 (*A. ovatus a.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
Adoristes (A.) ovatus (Koch, 1839) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental: excepto Este, y U.S.A.: Minesota).
- *Adoristes (A.) ovatus ovatus* (Koch, 1839)
(=*Conoppia grandis* Berlese, 1908)
(=*Leiosoma pyrigerum* Berlese, 1888)
(=*Leiosoma truncatum* Canestrini *et* Fanzago, 1877)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Asia centrooccidental).
- *Adoristes (A.) ovatus extraneus* Mihelčič, 1955 (*A. e.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Adoristes (A.) ovatus poppei* (Oudemans, 1906) (*Liacarus p.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Oeste de Siberia y U.S.A.: Minesota).

Adoristes (Gordeeviella) Shtanchaeva, Subías *et* Arillo, 2010 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Adoristes (Gordeeviella) krivolutskyi* Shtanchaeva, Subías *et* Arillo, 2010
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Adoristes (Gordeeviella) krivolutskyi* Shtanchaeva, Subías *et* Arillo, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Birsteinius Krivolutsky, 1965 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Birsteinius clavatus* Krivolutsky, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Birsteinius clavatus* Krivolutsky, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
- *Birsteinius krivolutskyi* Rjabinin, 1979
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Birsteinius microchaetus* Krivolutsky, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Oeste).
- *Birsteinius mongolicus* (Mahunka, 1964) (*Liacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Rumanía y Paleártica oriental meridional).
- *Birsteinius monticolus* Wang *et* Shen, 2001
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Birsteinius neonominatus* (Subías, 2004) (*Cultroribula*)
(=*Cultroribula tridentata* Aoki, 1965, *nom. praeoc.* por Mihelčič, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Cáucaso y Sureste de Paleártica oriental (frecuente).
- *Birsteinius perlongoides* Hammer, 1977 (*B. (Cultroribula)*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Birsteinius perlongus* Krivolutsky, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Birsteinius trimucronatus* Yamamoto *et* Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Birsteinius variolosus* (Fujikawa, 1991) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Liacarus Michael, 1898 (112 spp. y 4 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata nitens* Gervais, 1844
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

Liacarus (Liacarus) Michael, 1898 (61 spp. y 3 sspp.)
(=***Leiosoma*** Nicolet, 1855, *nom. praeoc.* por Stephens, 1829)
(=***Leuroxenillus*** Woolley *et* Higgins, 1966)
(=***Stenoxenillus*** Woolley *et* Higgins, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.
- *Liacarus (L.) aequidentatus* Ewing, 1918
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Liacarus (L.) atraktus* (Woolley *et* Higgins, 1966) (*Stenoxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Liacarus (L.) bidentatus* Ewing, 1918
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Liacarus (L.) borealis* Wen, 1991
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
Liacarus (L.) brevilamellatus Mihelčič, 1955
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Liacarus (L.) brevilamellatus brevilamellatus* Mihelčič, 1955
(=*Liacarus internodentatus* Kulijev, 1962)
(=*Liacarus ovalis* Mihelčič, 1956)
(?=*Liacarus parvus* Mihelčič, 1954 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Liacarus (L.) brevilamellatus major* Mihelčič, 1955 (*L. m.*)
(=*Liacarus latus* Schweizer, 1956, *nom. praeoc.* por Ewing, 1909)
(=*Liacarus schweizeri* Forsslund, 1963)
(=*Liacarus schweizeri* Woolley, 1968, *nom. praeoc.* por Forsslund, 1963)
(=*Liacarus vastus* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Liacarus (L.) celisi* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Liacarus (L.) chroniosus* Woolley, 1968 *sp. inq.*
(=*Liacarus robustus* Mihelčič, 1954, *nom. praeoc.* por Ewing, 1918)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Liacarus (L.) cidarus* Woolley, 1968
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
- *Liacarus (L.) conjunctus* Mihelčič, 1954 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Liacarus (L.) contiguus* Aoki, 1969
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Sajalín).
Liacarus (L.) coracinus (Koch, 1841) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica (I. Santa Helena y Etiopía).
- *Liacarus (L.) coracinus coracinus* (Koch, 1841)
(=*Liacarus lencoranicus* Krivolutsky, 1967)
(=*Liacarus nitidulus* Krivolutsky, 1967)

(=*Liacarus oribatelloides* Winkler, 1956)
(=*Leiosoma similis* Nicolet, 1855)
(=*Liacarus vombi* Dalenius, 1950)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Etiópica (I. Santa Helena y Etiopía).
- *Liacarus (L.) coracinus simplex* Mihelčič, 1952 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Liacarus (L.) curvidentatus* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Liacarus (L.) detosus* Woolley, 1968
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Liacarus (L.) emeiensis* Wen, 1991
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Liacarus (L.) externus* Aoki, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (L.) flammeus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
Liacarus (L.) gammatus Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liacarus (L.) gammatus gammatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (L.) gammatus coreanus* Choi, 1994
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Liacarus (L.) gephyrus* (Woolley, 1970) (*Stonyxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: Líbano.
- *Liacarus (L.) granulatus* Willmann, 1940
DISTRIBUCIÓN: Centro de Europa meridional.
- *Liacarus (L.) incisus* (Grobler, Ozman *et* Cobanoglu, 2003) (*Stenoxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Liacarus (L.) inermis* Aoki, 1965
(=*Liacarus curtus* Djaparidze, 1990)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional) y "China".
- *Liacarus (L.) janetscheki* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Liacarus (L.) jordanai* Moraza *et* Pérez-Íñigo, 1979
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Liacarus (L.) kilchini* Choi, 1985
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Liacarus (L.) koeszegiensis* Balogh, 1943
(=*Liacarus sejunctus* Mihelčič, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Liacarus (L.) latilamellatus* Kaneko *et* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (L.) latus* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Liacarus (L.) lectronus* Higgins *et* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Liacarus (L.) leleupi* Balogh, 1958 *sp. inq.*·
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Liacarus (L.) longilamellatus* Mihelčič, 1954
(=*Liacarus laterostris* Mihelčič, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Liacarus (L.) longipilis* Shtanchaeva, Subías *et* Arillo, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y España).
- *Liacarus (L.) luscus* Hirauchi, 1998
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (L.) madeirensis* Willmann, 1939
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Liacarus (L.) marginatus* (Nicolet, 1855) (*Leiosoma*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Liacarus (L.) matshabelii* Djaparidze, 1980
(=*Liacarus regeli* Djaparidze, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Liacarus (L.) medialis* Banks, 1910 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Liacarus (L.) montanus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (L.) mucronatus* Willmann, 1939
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Mediterránea occidental y U.S.A.: Carolina del Norte).
- *Liacarus (L.) murotensis* Aoki, 1988
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (L.) nigrescens* Pearce, 1906 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Liacarus (L.) nitens* (Gervais, 1844) (*Oribata*)
(=*Liacarus robustus* Ewing, 1918)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Este de Paleártica oriental y U.S.A.).
- *Liacarus (L.) ocellatus* Aoki, 1987

DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (L.) olivaceus* (Grube, 1859) (*Leiosoma*) *sp. inq.*
(=*Pelonia tricuspidata* Grube, 1859)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Liacarus (L.) orthogonios* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
- *Liacarus (L.) ovatus* Mihelčič, 1954
(=*Liacarus mihelcici* Woolley, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Liacarus (L.) paraborealis* Rjabinin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Liacarus (L.) paratanzicus* Ermilov, Rybalov *et* Kemal, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Liacarus (L.) perezinigoi* Capilla, 1972
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Liacarus (L.) pseudocontiguus* Fujikawa, 1991
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (L.) reticulatus* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Liacarus (L.) rotundatus* Mihelčič, 1954 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Liacarus (L.) spiniger* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Liacarus (L.) subiasi* Shtanchaeva, 2008
(?=*Liacarus cartalinicus* Djaparidze, 1979 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y Mediterránea occidental).
- *Liacarus (L.) subterraneus* (Koch, 1844) (*Oribata*)
(=*Oribata globosa* Koch, 1844)
(=*Liacarus gracilis* Mihelčič, 1954)
(=*Leiosoma lativentris* Nicolet, 1855)
(?=*Acarus tremellae* Linnaeus, 1761 *sp. inq.*)
(=*Liacarus willmanni* Pschorn-Walcher, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Suroeste de Siberia y U.S.A.: Virginia).
- *Liacarus (L.) tanzicus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Liacarus (L.) trichionus* (Woolley *et* Higgins, 1966) (*Leuroxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Liacarus (L.) tubifer* Djaparidze *et* Melamud, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Liacarus (L.) unjangensis* Choi, Bayartogtokh *et* Aoki, 2001
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Liacarus (L.) vietnamensis* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Liacarus (L.) xylariae* (Schrank, 1803) (*Acarus*)
(=*Liacarus cuspidatus* Mihelčič, 1954)
(=*Oribata fusca* Koch, 1841)
(=*Liacarus sphaericus* Djaparidze, 1980)
(=*Liacarus translamellatus* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Nepal.
- *Liacarus (L.) yayeyamensis* Aoki, 1973
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Liacarus (Dorycranosus) Woolley, 1969 (36 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Liacarus abdominalis* Banks, 1906
DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (excepto Australiana).
- *Liacarus (Dorycranosus) abdominalis* Banks, 1906 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: California y Alaska).
- *Liacarus (Dorycranosus) acutidens* Aoki, 1965 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Neártica occidental) e India (Bengala Occidental).
- *Liacarus (Dorycranosus) acutus* Pschorn-Walcher, 1951 (*L.*)
(=*Liacarus claviger* Mihelčič, 1956)
(?=*Liacarus coracinus racovitzae* Trägårdh, 1912 *sp. inq.*)
(=*Liacarus ghilarovi* Bashkirova, 1958)
(=*Cultroribula grandis* Mihelčič, 1956)
(=*Liacarus infissus* Gunhold, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte) e Irán.
- *Liacarus (Dorycranosus) angustatus* (Weigmann, 1976) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Liacarus (Dorycranosus) arcticus* (Banks, 1898) (*Oppia*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Liacarus (Dorycranosus) arduus* Fujikawa, 1989 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) banksi* Subías, 2020 (*L.*)
(=*Notaspis castaneus* Banks, 1906, *nom. praeoc.* por Hermann, 1804)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
Liacarus (Dorycranosus) chiebunensis Fujita *et* Fujikawa, 1984 (*L.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) chiebunesis chiebunensis* Fujita *et* Fujikawa, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) chiebunensis akkeshi* Aoki, 2006 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) columbianus* Berlese, 1908 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental: I. Kuriles, y U.S.A.: Misuri).
- *Liacarus (Dorycranosus) coronatus* (Golosova *et* Ljaschev, 1984) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liacarus (Dorycranosus) curtipilis* Willmann, 1935 (*L. alatus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Liacarus (Dorycranosus) dickersoni* (Moraza, 1990) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Liacarus (Dorycranosus) djaparidzae* Subías, 2010
(=*Dorycranosus ovatus* Djaparidze, 1973, *nom. praeoc.* por Mihelčič, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Liacarus (Dorycranosus) floridensis* Berlese, 1908 (*L.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Liacarus (Dorycranosus) frontinalis* Banks, 1906 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).
- *Liacarus (Dorycranosus) fusiformis* Ewing, 1917 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Iowa y Utah).
- *Liacarus (Dorycranosus) grenadaensis* (Ermilov, 2016) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Liacarus (Dorycranosus) indentatus* (Aoki, 1973) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) kanekoi* Bayartogtokh *et* Aoki, 2002 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) keretinus* Nordenskiöld, 1901 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Paleártica occidental.
- *Liacarus (Dorycranosus) latiusculus* Wen, 1991 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Liacarus (Dorycranosus) lingulatus* (Golosova *et* Ljaschev, 1984) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Sur de Paleártica oriental.
- *Liacarus (Dorycranosus) musaevi* (Shtanchaeva, 2008) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Liacarus (Dorycranosus) neonominatus* Subías, 2004
(=*Dorycranosus arcticus* Grishina, 1984, *nom. praeoc.* por Banks, 1898)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Rusia asiática).
- *Liacarus (Dorycranosus) nitidus* (Banks, 1895) (*Cepheus*)
(=*Liacarus glaber* Ewing, 1909)
(=*Liacarus nitidus fissuratus* Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Liacarus (Dorycranosus) paoliensis* (Woolley, 1969) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Liacarus (Dorycranosus) parallelus* Hammer, 1967 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Islas del Este de Rusia asiática y Neártica septentrional).
- *Liacarus (Dorycranosus) polychothomus* Wen, 1991 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Nepal.
- *Liacarus (Dorycranosus) pulcher* (Sergienko *et* Djaparidze, 1981) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Liacarus (Dorycranosus) punctulatus* Mihelčič, 1956 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea y Este de Rusia asiática: I. Sajalín).
- *Liacarus (Dorycranosus) shipitsyni* Ermilov, Rybalov *et* Kemal, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Liacarus (Dorycranosus) splendens* (Coggi, 1898) (*Cepheus*)
(=*Liacarus alatus* Berlese, 1904)
(=*Liacarus diversus* Mihelčič, 1956)
(=*Xenillus ibericus* Djaparidze, 1974)
(=*Liacarus moraviacus* Willmann, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (frecuente).
- *Liacarus (Dorycranosus) tenuilamellatus* Hirauchi, 1998 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) triapicini* (Djaparidze, 1983) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Liacarus (Dorycranosus) yezoensis* Fujikawa *et* Aoki, 1970 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Kuriles).
- *Liacarus (Dorycranosus) zachvatkini* Kulijev, 1962 (*L.*)
(=*Dorycranosus ibericus* Djaparidze, 1973)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).

Liacarus (Procorynetes) Woolley, 1969 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Liacarus nigerrimus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- *Liacarus (Procorynetes) altaicus* (Krivolutsky, 1974) (*Dorycranosus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Asia central rusa y Neártica septentrional).

- *Liacarus (Procorynetes) andinus* (P. Balogh, 1984) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Liacarus (Procorynetes) breviclavatus* Aoki, 1970 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liacarus (Procorynetes) clavatus* Fujikawa *et* Aoki, 1970 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liacarus (Procorynetes) espeletiae* (P. Balogh, 1984) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Liacarus (Procorynetes) globifer* (Kramer, 1897) (*Leiosoma*)
  DISTRIBUCIÓN: Boreal (Groenlandia y Norte de Europa).
- *Liacarus (Procorynetes) huvsgulensis* Bayartogtokh, 2010 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Liacarus (Procorynetes) nigerrimus* Berlese, 1916 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: "África oriental".

Liacarus (Rhaphidosus) Woolley, 1969 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Liacarus carolinensis* Banks, 1906
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Liacarus (Rhaphidosus) acuminatus* (Woolley, 1969) (*R.*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A.: Colorado, y Norte de Rusia europea).
- *Liacarus (Rhaphidosus) alticola* (P. Balogh, 1984) (*R.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia y Costa Rica).
- *Liacarus (Rhaphidosus) bacillatus* Fujikawa *et* Aoki, 1970 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Rhaphidosus) badghysi* Krivolutsky, 1966 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Crimea y Asia centrooccidental).
- *Liacarus (Rhaphidosus) carbonarius* (Banks, 1906) (*Notaspis*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Liacarus (Rhaphidosus) carolinensis* Banks, 1906 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Liacarus (Rhaphidosus) niger* Ewing, 1909 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).

Opsioristes Woolley, 1967 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Opsioristes eurhostus* Woolley, 1967
DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Opsioristes eurhostus* Woolley, 1967
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooccidental.

Planoristes Iturrondobeitia *et* Subías, 1978 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Planoristes acuspidatus* Iturrondobeitia *et* Subías, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Planoristes acuspidatus* Iturrondobeitia *et* Subías, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.

Scarabacarus Shtanchaeva *et* Subías, 2010 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Scarabacarus longisensillus* Shtanchaeva *et* Subías, 2010
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Scarabacarus longisensillus* Shtanchaeva *et* Subías, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Xenillidae Woolley *et* Higgins, 1966 (4 gen., 1 subgen., 85 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Choixenillus Subías, 2016 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Xenillus multisetosus* Choi, 1996
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Choixenillus multisetosus* (Choi, 1996) (*Xenillus*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.

Neoxenillus Fujikawa, 2004 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Neoxenillus scopulus* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Neoxenillus heterosetiger* (Aoki, 1967) *(Xenillus)*
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Neoxenillus scopulus* Fujikawa, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Xenilloides Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Xenilloides aenigmaticus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Xenilloides aenigmaticus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Xenillus Robineau-Desvoidy, 1839 (79 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Xenillus clypeator* Robineau-Desvoidy, 1839

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Xenillus (Xenillus) Robineau-Desvoidy, 1839 (77 spp. y 2 sspp.)
(=***Banksia*** Oudemans *et* Voigts, 1905)
(=***Dinoxenillus*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
(=***Kochia*** Oudemans, 1900)
(=***Pseudocepheus*** Jacot, 1928)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Xenillus (X.) adelae* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) amazonensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) amazonicus* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) amicorum* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Xenillus (X.) anasillus* Woolley *et* Higgins, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Líbano.
- *Xenillus (X.) argentinensis* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Xenillus (X.) arilloi* Gil-Martín *et* Subías, 1997
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Xenillus (X.) athesis* Schatz, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Xenillus (X.) baggioi* P. Balogh, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) bolivianus* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Xenillus (X.) brasilianus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Xenillus (X.) brevisetosus* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Xenillus (X.) butantaniensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) capitatus* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Xenillus (X.) clavatopilus* Mihelčič, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Xenillus (X.) clypeator* Robineau-Desvoidy, 1839
  (=*Cepheus latus* Nicolet, 1855, *nom. praeoc.* por Koch, 1835)
  (=*Cepheus permixtus* André, 1925)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental meridional, y U.S.A.: Míchigan) y Méjico.
- *Xenillus (X.) columbianus* P. Balogh, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Xenillus (X.) confusus* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Xenillus (X.) davisorum* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).
- *Xenillus (X.) deformatus* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Perú.

Xenillus (X.) discrepans Grandjean, 1936 (*X. permixtus d.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea y Asia centrooccidental.

- *Xenillus (X.) discrepans discrepans* Grandjean, 1936
  (=*Xenillus baderi* Mahunka, 1996)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (más rara al Norte) y Asia centrooccidental.
- *Xenillus (X.) discrepans azorensis* Pérez-Íñigo, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Xenillus (X.) discrepans canariensis* Pérez-Íñigo, 1976
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Xenillus (X.) disjunctus* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Xenillus (X.) diversisetosus* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Méjico).
- *Xenillus (X.) ecuadorensis* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Xenillus (X.) erbanensis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) fazendae* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Brasil y Norte de Neotropical.
- *Xenillus (X.) fecundus* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Xenillus (X.) fernandoi* Morell, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Xenillus (X.) forceps* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Xenillus (X.) fusifer* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Xenillus (X.) gelasinus* Woolley *et* Higgins, 1966
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Xenillus (X.) halophilus* Weigmann, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Xenillus (X.) hammerae* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) heterotrichus* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Xenillus (X.) imitator* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) ionthadosus* Woolley *et* Higgins, 1966
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
- *Xenillus (X.) irregularis* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Xenillus (X.) itascensis* Freeman *et* Woolley, 1987
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Minesota).
- *Xenillus (X.) lamellatus* Rjabinin, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Xenillus (X.) latilamellatus* Willmann, 1939
  DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
- *Xenillus (X.) lawrencei* Balogh *et* Mahunka, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).
- *Xenillus (X.) lebanonensis* Woolley, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Líbano.
- *Xenillus (X.) longipes* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Méjico).
- *Xenillus (X.) longipilus* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) longisetosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Xenillus (X.) matskasii* Mahunka, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Xenillus (X.) moonsani* Choi *et* Aoki, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Xenillus (X.) moyae* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) mutabilis* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Xenillus (X.) neonominatus* Subías, 2004
  (=*Xenillus punctulatus* Balogh *et* P. Balogh, 1985, *nom. praeoc.* por Banks, 1895)
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Xenillus (X.) occultus* Banks, 1947
  (=*Xenillus phryxothrixus* Woolley *et* Higgins, 1966)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Xenillus (X.) ornatus* (Covarrubias, 1967) (*Liacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Xenillus (X.) paracolumbianus* Ermilov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Xenillus (X.) paramutabilis* Ermilov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Xenillus (X.) penicilliger* Csiszár, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Xenillus (X.) peruensis* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Xenillus (X.) pulvillus* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) punctulatus* (Banks, 1895) (*Cepheus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Xenillus (X.) rohri* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Xenillus (X.) salamoni* Mahunka, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Xenillus (X.) sanctipauli* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) sculptrus* Kulijev, 1963
  (=*Xenillus stepensis* Djaparidze, 1974)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Cáucaso y España) e Irán.
- *Xenillus (X.) selgae* Morell, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y Vietnam.
- *Xenillus (X.) setiger* Balogh *et* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Xenillus (X.) setosus* Grobler, Ozman *et* Cobanoglu, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Turquía e Irán).
- *Xenillus (X.) similis* Rjabinin *et* Zaitsev, 2019

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática: I. Sajalín.
- *Xenillus (X.) singularis* Golosova *et* Ljaschev, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental: Este de Rusia asiática (I. Sajalín) e Irán.
- *Xenillus (X.) subnudus* Balogh *et* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) superbus* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980) (*Dinoxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Xenillus (X.) tamdaoensis* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Xenillus (X.) tegeocranus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
(=*Cepheus vulgaris* Nicolet, 1855)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Xenillus (X.) tsendsureni* (Bayartogtokh, 1998) (*Procorynetes*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Xenillus (X.) tuberculatus* Subías *et* Arillo, 2000
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Xenillus (X.) variabilis* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Xenillus (X.) variolosus* (Berlese, 1888) (*Cepheus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) venezuelanus* Balogh *et* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Xenillus (X.) ybarrai* Morell, 1987
DISTRIBUCIÓN: España.

Xenillus (Stonyxenillus) Woolley *et* Higgins, 1966 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Stonyxenillus spilotus* Woolley *et* Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Xenillus (Stonyxenillus) akidosus* (Woolley *et* Higgins, 1966) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).
- *Xenillus (Stonyxenillus) anakolosus* (Woolley *et* Higgins, 1966) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Xenillus (Stonyxenillus) spilotus* (Woolley *et* Higgins, 1966) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Tenuialidae Jacot, 1929 (6 gen. y 16 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Ceratotenuiala Aoki *et* Maruyama, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratotenuiala echigoensis* Aoki *et* Maruyama, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Ceratotenuiala echigoensis* Aoki *et* Maruyama, 1983
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Hafenferrefia Jacot, 1939 (4 spp.)
(=***Hafenrefferiella*** Sellnick, 1952)
ESPECIE TIPO: *Galumna nitidula* Banks, 1906
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Hafenferrefia imperialis* (Berlese, 1910) (*Achipteria*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
- *Hafenferrefia lata* Golosova, 1980
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Hafenferrefia nevesi* (Sellnick, 1952) (*Hafenrefferiella*)
(=*Hafenrefferiella hyrcanica* Krivolutsky, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Nepal.
- *Hafenferrefia nitidula* (Banks, 1906) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Hafenrefferia Oudemans, 1906 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata gilvipes* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Hafenrefferia acuta* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente) y Nepal.
- *Hafenrefferia eurycuspis* Y. Zhang *et* Jin, 2016
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Hafenrefferia gilvipes* (Koch, 1839) (*Oribata*)
(=*Liacarus auritus* Nordenskiöld, 1901)
(=*Liacarus pterotus* Coggi, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Sur, y Paleártica oriental meridional).

Peltenuiala Norton, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Peltenuiala pacifica* Norton, 1983
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Peltenuiala orbiculata* (Aoki *et* Ohnishi, 1974) (*Hafenferrefia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Peltenuiala pacifica* Norton, 1983

DISTRIBUCIÓN: Noroeste de U.S.A.

Tenuiala Ewing, 1913 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tenuiala nuda* Ewing, 1913
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Tenuiala crenulata* Woolley *et* Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: Líbano.
- *Tenuiala hubeiensis* Y. Zhang *et* Jin, 2016
DISTRIBUCIÓN: China.
- *Tenuiala kurti* Woolley *et* Higgins, 1955
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooccidental.
- *Tenuiala nuda* Ewing, 1913
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. centrooccidental y Este de Paleártica oriental) y Oriental (China suroriental).

Tenuialoides Woolley *et* Higgins, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tenuialoides medialis* Woolley *et* Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Tenuialoides fusiformis* Aoki, 1969
(=*Hafenferrefia translamellata* Aoki *et* Fujikawa, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Tenuialoides medialis* Woolley *et* Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte) y Japón.

Niphocepheoidea Travé, 1959

Niphocepheidae Travé, 1959 (1 gen., 5 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Niphocepheus Balogh, 1943 (5 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Cepheus nivalis* Schweizer, 1922
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Niphocepheus aborigensis* Behan-Pelletier, 1982
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Niphocepheus guadarramicus* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Niphocepheus neotrichus* Ermilov, Kalúz *et* Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
Niphocepheus nivalis (Schweizer, 1922) (*Cepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: excepto Norte, y Japón), Taiwán [Formosa] y Méjico.
  - *Niphocepheus nivalis nivalis* (Schweizer, 1922)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Japón) y Taiwán [Formosa].
  - *Niphocepheus nivalis baloghi* Travé, 1959
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Méjico.
  - *Niphocepheus nivalis delamarei* Travé, 1959
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
  - *Niphocepheus nivalis grandjeani* Travé, 1959
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Niphocepheus travei* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Zetorchestoidea Michael, 1898

Zetorchestidae Michael, 1898 (6 gen., 24 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Belorchestes Grandjean, 1951 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Belorchestes planatus* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Belorchestes gebennicus* Grandjean, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Belorchestes planatus* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Litholestes Grandjean, 1951 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Litholestes altitudinis* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Litholestes altitudinis* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Europa central e India (Maharastra).

Microzetorchestes Balogh, 1943 (1 sp.)
(=***Diorchestes*** Grandjean, 1951)
ESPECIE TIPO: *Zetorchestes emeryi* Coggi, 1898
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Microzetorchestes emeryi* (Coggi, 1898) (*Zetorchestes*)
(=*Zetorchestes consanguineus* Oudemans, 1902)
(=*Zetorchestes italicus* Eyndhoven, 1942)

(=*Belorchestes sectus* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.

Saxicolestes Grandjean, 1951 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Saxicolestes auratus* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Saxicolestes auratus* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Saxicolestes corsicanus* Grandjean, 1956
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Saxicolestes pollinivorus* Travé, 1963
DISTRIBUCIÓN: Francia.

Strenzkea Travé, 1967 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Strenzkea depilata* Travé, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Strenzkea depilata* Travé, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.

Zetorchestes Berlese, 1888 (16 spp. y 1 ssp.)
(?=***Leptorchistis*** Canestrini *et* Berlese, 1885, *nom. praeoc.* por *Leptorchestes* Thorell, 1870)
(=***Phyllorchestes*** Mahunka, 1983)
ESPECIE TIPO: *Carabodes micronychus* Berlese, 1883
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Zetorchestes aokii* Krisper, 1987
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Nueva Guinea y Noreste de Oriental.
- *Zetorchestes equestris* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental, Paleártica (Noreste de China y Portugal) y Vietnam.
- *Zetorchestes flabrarius* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Zetorchestes grandjeani* Krisper, 1987
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
Zetorchestes micronychus (Berlese, 1883) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).
- *Zetorchestes micronychus micronychus* (Berlese, 1883)
(=*Zetorchestes falzonii* Coggi, 1898)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Este de Rusia asiática).
- *Zetorchestes micronychus unicorniculatus* Lombardini, 1961 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Zetorchestes novaguineanus* Krisper, 1987
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Zetorchestes ornatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Zambia).
- *Zetorchestes pacificus* Sellnick, 1959 (*Z. micronychus p.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai], y Java.
- *Zetorchestes phylliferus* Mahunka, 1983 (*Z. (Phyllorchestes)*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Madagascar y Tanzania) y Vietnam.
- *Zetorchestes phyllosetus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Zetorchestes reticulatus* Karppinen *et* Poltavskaja, 1990
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso e Irán.
- *Zetorchestes saltator* Oudemans, 1915
DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y Paleártica: Crimea y Corea.
- *Zetorchestes schusteri* Krisper, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, I. Canarias y Vietnam.
- *Zetorchestes transvaalensis* Coetzee, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.
- *Zetorchestes trituberculatus* Berlese, 1916 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Zetorchestes vanderhammeni* Krisper, 1987
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Eremaeoidea Oudemans, 1900

Caleremaeidae Grandjean, 1965 (7 gen., 31 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

Caleremaeus Berlese, 1910 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Damaeus monilipes* Michael, 1882
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Caleremaeus arboricolus* Norton *et* Behan-Pelletier 2020
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Caleremaeus divisus* Mihelčič, 1952 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Caleremaeus monilipes* (Michael, 1882) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente) y Méjico.

- *Caleremaeus nasutus* Norton *et* Behan-Pelletier 2020
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Alabama).
- *Caleremaeus retractus* (Banks, 1947) (*Carabodoides*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Caucaseremaeus Subías *et* Shtanchaeva, 2006 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Caucaseremaeus krivolutskyi* Shtanchaeva *et* Subías, 2006
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Caucaseremaeus krivolutskyi* Shtanchaeva *et* Subías, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Cristeremaeus Balogh *et* Csiszár, 1963 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cristeremaeus humeratus* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Paleártica meridional.
- *Cristeremaeus clavatus* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Cristeremaeus humeratus* Balogh *et* Csiszár, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjjico) e Irán.

Epieremulus Berlese, 1916 (11 spp. y 1 ssp.)
(=***Carabodoides*** Jacot, 1937)
ESPECIE TIPO: *Eremulus (Epieremulus) geometricus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).
- *Epieremulus apicalis* (Banks, 1895) (*Carabodes*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Epieremulus bidupensis* Ermilov *et* Anichkin, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Epieremulus braziliensis* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Carabodoides*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico) y Filipinas.
- *Epieremulus circulus* Yamamoto *et* Aoki, 2000
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Epieremulus frontatus* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Epieremulus geometricus* (Berlese, 1916) (*Eremulus (Epi.)*)
  (=*Carabodoides saccharomycetoides* Jacot, 1937)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.

Epieremulus granulatus (Balogh *et* Mahunka, 1979) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Epieremulus granulatus granulatus* (Balogh *et* Mahunka, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Epieremulus granulatus andicola* (P. Balogh, 1988) (*Carabodoides*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Epieremulus humeratus* (Aoki, 1987) (*Carabodoides*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epieremulus laticeps* (Balogh, 1963) (*Carabodoides*)
  DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Epieremulus longicarinatus* (Balogh *et* Mahunka, 1978) (*Carabodoides)*
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Epieremulus longiseta* (P. Balogh, 1988) (*Carabodoides*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Megeremaeus Higgins *et* Woolley, 1965 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Megeremaeus montanus* Higgins *et* Woolley, 1965
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Megeremaeus ditrichosus* Woolley *et* Higgins, 1968
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Megeremaeus expansus* Aoki *et* Fujikawa, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Megeremaeus hylaius* Behan-Pelletier, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Megeremaeus keewatin* Behan-Pelletier, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Megeremaeus kootenai* Behan-Pelletier, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Megeremaeus montanus* Higgins *et* Woolley, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (Noroeste de U.S.A. y Canadá).
- *Megeremaeus sikhotealinus* Rjabinin *et* Wu, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Megeremaeus spinosus* Aoki *et* Yamamoto, 2000
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Veloppia Hammer, 1955 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Veloppia pulchra* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Veloppia kananaskis* Norton, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Veloppia nortoni* Chen *et* Wang, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Veloppia pulchra* Hammer, 1955
  DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Este de Paleártica oriental).

Yungaseremaeus Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Yungaseremaeus longisetosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Yungaseremaeus longisetosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Aribatidae Aoki, Takaku *et* Ito, 1994 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Aribates Aoki, Takaku *et* Ito, 1994 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Aribates javensis* Aoki, Takaku *et* Ito, 1994
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Aribates javensis* Aoki, Takaku *et* Ito, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Java.

Kodiakellidae Hammer, 1967 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Kodiakella Hammer, 1967 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Kodiakella lutea* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Kodiakella dimorpha* Pérez-Íñigo *et* Subías, 1978
  (?=*Oribella magna* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Kodiakella lutea* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Eremaeidae Oudemans, 1900 (5 gen., 71 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Asperemaeus Behan-Pelletier, 1982 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Asperemaeus longipilus* Behan-Pelletier, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Asperemaeus longipilus* Behan-Pelletier, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Asperemaeus striganovae* Bayartogtokh, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Carinabella Hammer, 1977 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Carinabella pulchra* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Carinabella pulchra* Hammer, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Carinabella tuberculata* Bayoumi *et* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Norte de India.

Eremaeus Koch, 1835 (27 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Eremaeus hepaticus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Eremaeus anichkini* Ermilov *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Eremaeus appalachicus* Behan-Pelletier, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Eremaeus boreomontanus* Behan-Pelletier, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Eremaeus brevitarsus* (Ewing, 1917) (*Damaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Eremaeus californiensis* Behan-Pelletier, 1993
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Eremaeus cornutus* Lombardini, 1943 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Eremaeus gracilis* Behan-Pelletier, 1993
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Eremaeus grandis* Hammer, 1952
  DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Noreste de Rusia asiática).

Eremaeus hepaticus Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Virginia).
- *Eremaeus hepaticus hepaticus* Koch, 1835
  (=*Notaspis dentilamellatus* Štorkán, 1925)
  (=*Eremaeus hepaticus acruciata* Mihelčič, 1952)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).

- *Eremaeus hepaticus cordiformis* Grandjean, 1934 (*E. c.*)
(=*Eremaeus magnus* Mihelčič, 1957)
(=*Eremaeus setiger* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Eremaeus insertus* Grishina, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Eremaeus kananaskis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Eremaeus kevani* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Eremaeus longiseta* Djaparidze, 1990
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Eremaeus megistos* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Eremaeus monticolus* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A.
- *Eremaeus neonominatus* Subías, 2004
(=*Eremaeus borealis* Wen, 1988, *nom. praeoc.* por Strenzke, 1952)
DISTRIBUCIÓN: China.
- *Eremaeus nortoni* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Eremaeus occidentalis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Eremaeus oresbios* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A.
- *Eremaeus orientalis* Golosova, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Eremaeus plumosus* Woolley, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Oeste de U.S.A. y Canadá).
- *Eremaeus porosus* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Eremaeus salish* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Eremaeus tenuisetiger* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
- *Eremaeus translamellatus* Hammer, 1952
(=*Eremaeus oblongus borealis* Strenzke, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Brasil.
- *Eremaeus tuberosus* Gordeeva, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
- *Eremaeus walteri* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. centrooccidental y Canadá).

Eueremaeus Mihelčič, 1963 (34 spp. y 3 sspp.)
(=***Kartoeremaeus*** Higgins, 1979)
ESPECIE TIPO: *Eremaeus oblongus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Eueremaeus acostulatus* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Eueremaeus alvordensis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Eueremaeus areolatus* (Kunst, 1959) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central y Groenlandia.
- *Eueremaeus aridulus* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Eueremaeus aysineep* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A: Colorado, y Canadá).
- *Eueremaeus badzhalensis* Ermilov *et* Rjabinin, 2020
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Eueremaeus brevifer* (Mahunka, 1980) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Eueremaeus carinatus* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nevada).
- *Eueremaeus chiatous* (Higgins, 1979) (*Kartoeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Oeste de U.S.A. y Canadá).
- *Eueremaeus columbianus* (Berlese, 1916) (*Eremaeus*)
(=*Eremaeus politus* Banks, 1947)
(=*Kartoeremaeus reevesi* Higgins, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.
- *Eueremaeus crassisetosus* Bayartogtokh, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Eueremaeus danos* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Eueremaeus elongatus* (Fujikawa, 1972) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Eueremaeus foveolatus* (Hammer, 1952) (*Eremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Eueremaeus higginsi* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Eueremaeus hokkaiensis* Fujikawa, 1991
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eueremaeus intermedius* (Mihelčič, 1955) (*Eremaeus*)
(=*Eueremaeus kuehnelti* Mihelčič, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Eueremaeus laticostulatus* Bayartogtokh, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Eueremaeus lindquisti* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Eueremaeus magniporus* (Wallwork, 1972) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Eueremaeus marshalli* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Eueremaeus masinasin* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá).
- *Eueremaeus michaeli* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Eueremaeus nahani* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá).
- *Eueremaeus nemoralis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.

Eueremaeus oblongus (Koch, 1835) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
- *Eueremaeus oblongus oblongus* (Koch, 1835)
(=*Eremaeus figuratus* Winkler, 1956)
(=*Eremaeus granulatus* Mihelčič, 1955)
(=*Eremaeus ornatus* Mihelčič, 1957)
(=*Eremaeus valkanovi* Kunst, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y China suroriental.
- *Eueremaeus oblongus quadrilamellatus* (Hammer, 1952) (*Eremaeus q.*)
(=*Eremaeus fossulatus* Kunst, 1959)
(=*Eueremaeus tenuisensillatus* Bayartogtokh, 2003)
(=*Eremaeus triglavensis* Tarman, 1958)
(=*Eueremaeus valkanovi debilis* Mihelčič, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional, Paleártica occidental centromeridional y Este de Rusia asiática).
- *Eueremaeus oblongus silvestris* (Forsslund, 1956) (*Eremaeus s.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Eueremaeus osoyoosensis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Oeste de U.S.A. y Canadá).
- *Eueremaeus proximus* (Berlese, 1916) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Eueremaeus roissi* (Piffl, 1965) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Eueremaeus stiktos* (Higgins, 1962) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. occidental y Canadá).
- *Eueremaeus tetrosus* (Higgins, 1979) (*Kartoeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente en U.S.A.).
- *Eueremaeus travei* Mihelčič, 1963
(?=*Eremaeus oblongus major* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*)
(?=*Eremaeus ovalis* Mihelčič, 1955 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Eueremaeus trionus* (Higgins, 1979) (*Kartoeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá) y Noroeste de Siberia.
- *Eueremaeus woolleyi* (Higgins, 1979) (*Kartoeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
- *Eueremaeus yukonensis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Tricheremaeus Berlese, 1908 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis serrata* Michael, 1885
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Tricheremaeus abnobensis* Miko *et* Weigmann, 2006
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Tricheremaeus conspicuus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Tricheremaeus grandjeani* Bernini, 1970
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Tricheremaeus nemossensis* Grandjean, 1963
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Tricheremaeus serratus* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Tricheremaeus travei* Miko, 1993
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.

Oribellidae Kunst, 1971 (7 gen., 49 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Kaszabobates Balogh, 1972 (3 spp.)
(=***Gobiella*** Balogh *et* Mahunka, 1965, *nom. praeoc*.por Cienkowsky, 1882)
ESPECIE TIPO: *Gobiella kaszabi* Balogh *et* Mahunka, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Kaszabobates helveticus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Kaszabobates kaszabi* (Balogh *et* Mahunka, 1965) (*Gobiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Kaszabobates olbiopolitanus* Sergienko, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Oribella Berlese, 1908 (6 spp.)
(=***Infernobates*** Karppinen *et* Poltavskaja, 1990)
ESPECIE TIPO: *Notaspis pectinata* Michael, 1885
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Oribella adelaidae* Golosova *et* Karppinen, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oribella canariensis* Pérez-Íñigo, 1986
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribella citelli* (Karppinen *et* Poltavskaja, 1990) (*Infernobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribella fujikawae* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Grecia e Irán).
- *Oribella matritensis* Arillo, Bordel *et* Subías, 1988
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribella pectinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
  (=*Dameosoma crinitum* Berlese, 1916)
  (=*Oribata distincta* Karpelles, 1893)
  (=*Xenillus limburgiensis* Oudemans, 1912)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y U.S.A. (Nuevo Méjico).

Pantelozetes Grandjean, 1953 (22 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Xenillus paolii* Oudemans, 1913
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Pantelozetes (Pantelozetes) Grandjean, 1953 (6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Pantelozetes (P.) bayartogtokhi* Ermilov, Salavatulin *et* Tolstikov, 2015
  (=*Montizetes serratus* Bayartogtokh, 2003, *nom. praeoc.* por Wang *et* Cui, 1996)
  DISTRIBUCIÓN: Asia central.
- *Pantelozetes (P.) berlesei* Fujikawa, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Pantelozetes (P.) paolii* (Oudemans, 1913) (*Xenillus*)
  (=*Amazoppia caucasica* Djaparidze, 1986)
  (=*Eremulus clavatoflagellatus* Lombardini, 1962)
  (=*Oribella dentata* Mihelčič, 1963)
  (=*Oribella pannonica* Mahunka, 1968)
  (=*Oribella paolii multidentata* Evans, 1954)
  (=*Pantelozetes paolii tuxeni* Fujikawa, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Asia centrooccidental y Neártica septentrional) y Java.
- *Pantelozetes (P.) serratus* Wang *et* Cui, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Pantelozetes (P.) tianshanicus* Rakhimbajeva, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Pantelozetes (P.) unitjumenienesis* Ermilov, Salavatulin *et* Tolstikov, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.

Pantelozetes (Montizetes) Kunst, 1971 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Xenillus alpestris* Willmann, 1929
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Pantelozetes (Montizetes) abulensis* (Pérez-Íñigo, 1984) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Pantelozetes (Montizetes) alpestris* (Willmann, 1929) (*Xenillus*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).
- *Pantelozetes (Montizetes) arcticus* (Pankov, 1993) (*Gemmazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Pantelozetes (Montizetes) delamellatus* (Pérez-Íñigo jr., 1991) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Pantelozetes (Montizetes) mongolicus* (Balogh *et* Mahunka, 1965) (*Oribella*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Pantelozetes (Montizetes) rarisetosus* (Bayartogtokh, 1998) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia y Cáucaso.

- *Pantelozetes (Montizetes) tianshanensis* (Wen, 1989) (*Gemmazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Pantelozetes (Oribellopsis) Kunst, 1971 (9 spp. y 1 ssp.)
(=***Gemmazetes*** Fujikawa, 1979)
ESPECIE TIPO: *Oribella cavatica* Kunst, 1962
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Pantelozetes (Oribellopsis) cavaticus* (Kunst, 1962) (*Oribella*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: Europa centromeridional, Mongolia y Noreste de China, y Neártica septentrional) y Méjico.
- *Pantelozetes (Oribellopsis) clavatus* (Jacot, 1937) (*Oribella crosbyi c.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Kentucky).
- *Pantelozetes (Oribellopsis) clavigerus* (Mihelčič, 1958) (*Oribella*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Austria.

Pantelozetes (Oribellopsis) crosbyi (Berlese, 1908) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: Europa central y Noreste de China, y U.S.A. centrooriental).

- *Pantelozetes (Oribellopsis) crosbyi crosbyi* (Berlese, 1908)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa central y U.S.A. centrooriental).
- *Pantelozetes (Oribellopsis) crosbyi maoershanensis* (Wen, 1992) (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Pantelozetes (Oribellopsis) etruscus* (Bernini, 1980) (*Gemmazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Pantelozetes (Oribellopsis) forsslundi* (Moritz, 1965) (*Oribella*)
  DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Pantelozetes (Oribellopsis) grecus* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2010) (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Pantelozetes (Oribellopsis) kushiroensis* (Aoki, 1992) (*Gemmazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pantelozetes (Oribellopsis) tierradelfuegoensis* Ermilov, 2016 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).

Proteremaeus Piffl, 1965 (9 spp.)
(=***Sibiremaeus*** Krivolutsky, 1975)
ESPECIE TIPO: *Proteremaeus jonasi* Piffl, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Proteremaeus angarensis* (Rjabinin *et* Krivolutsky, 1975) (*Sibiremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Siberia centrooccidental.
- *Proteremaeus chadaevae* Golosova, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Proteremaeus elongatus* (Rjabinin *et* Krivolutsky, 1975) (*Sibiremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Proteremaeus jonasi* Piffl, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Proteremaeus lawariensis* Hammer, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Proteremaeus macleani* Behan-Pelletier, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Proteremaeus mongolicus* (Golosova, 1983) (*Sibiremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Proteremaeus nebaikini* Behan-Pelletier *et* Rjabinin, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Proteremaeus punctulatus* Bayartogtokh, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Amerobelboidea Grandjean, 1954

Ctenobelbidae Grandjean, 1965 (1 gen., 4 subgen. y 34 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Ctenobelba Balogh, 1943 (30 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremobelba pectinigera* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Ctenobelba (Ctenobelba) Balogh, 1943 (25 spp.)
(=***Elapheremaeus*** Grandjean, 1943)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Ctenobelba (C.) apatomorpha* Iturrondobeitia, Saloña, Andrés *et* Caballero, 1998
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ctenobelba (C.) ayyildizi* Baran, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ctenobelba (C.) brevipilosa* Mahunka, 1964
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Ctenobelba (C.) csiszarae* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Ctenobelba (C.) foliata* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Ctenobelba (C.) foveolata* Subías *et* Shtanchaeva, 2013
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ctenobelba (C.) grancanariae* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Ctenobelba (C.) heterosetosa* Murvanidze *et* Weigmann, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ctenobelba (C.) mahnerti* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Ctenobelba (C.) marcuzzii* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Ctenobelba (C.) martyanensis* Ermilov, Khaustov *et* Wu, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Ctenobelba (C.) mikaeeli* Ahaniazad, Bagheri, Akrami *et* Hugo-Coetzee, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ctenobelba (C.) parafoliata* Pérez-Íñigo jr., 1991
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ctenobelba (C.) parapulchellula* Subías *et* Shtanchaeva, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Ctenobelba (C.) pectinigera* (Berlese, 1908) (*Eremobelba*)
  (=*Amerobelba bicarinata* Berlese, 1910)
  (=*Ctenobelba fenestrata* Pérez-Íñigo jr., 1990)
  (?=*Notaspis maculosa* Warburton *et* Pearce, 1905 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional (frecuente).
- *Ctenobelba (C.) perezinigoi* Moraza, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ctenobelba (C.) pilosella* Jeleva, 1962
  (=*Ctenobelba tuberculata* Kulijev, 1966)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ctenobelba (C.) pseudomahnerti* Subías *et* Shtanchaeva, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ctenobelba (C.) pulchellula* Gil-Martín *et* Subías, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Ctenobelba (C.) serrata* Mahunka, 1964
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Ctenobelba (C.) simplex* (Willmann, 1941) (*Eremulus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Bosnia-Herzegovina.
- *Ctenobelba (C.) translamellata* Iordansky, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Ctenobelba (Aokibelba) Subías *et* Shtanchaeva, 2013 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ctenobelba longisetosa* Suzuoka *et* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

- *Ctenobelba (Aokibelba) leei* Choi, 2005 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Ctenobelba (Aokibelba) longisetosa* Suzuoka *et* Aoki, 1980 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Ctenobelba (Aokibelba) nakatamarii* Aoki, 2007 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ctenobelba (Aokibelba) rameus* (Wen *et* Zhao, 1993) (*Megeremaeus*)
  (=*Ctenobelba polysetosa* Aoki *et* Yamamoto, 2000)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Japón.
- *Ctenobelba (Aokibelba) soloduchi* Pankov, 1988 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Ctenobelba (Berndamerus) Mahunka, 1977 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Berndamerus hellenicus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Ctenobelba (Berndamerus) bicostata* (Berlese, 1910) (*Amerobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ctenobelba (Berndamerus) bugiamapensis* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Ctenobelba (Berndamerus) eremuloides* (Berlese, 1910) (*Amerobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Ctenobelba (Berndamerus) hellenica* (Mahunka, 1977) (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.

Ctenobelba (Bifurcobelba) Subías *et* Shtanchaeva, 2010 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ctenobelba (Bifurcobelba) iberica* Subías *et* Shtanchaeva, 2010
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Ctenobelba (Bifurcobelba) iberica* Subías *et* Shtanchaeva, 2010
  DISTRIBUCIÓN: España.

Ctenobelba (Caucasiobelba) Subías *et* Shtanchaeva, 2010 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ctenobelba (Caucasiobelba) reticulata* Subías *et* Shtanchaeva, 2010
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Ctenobelba (Caucasiobelba) reticulata* Subías *et* Shtanchaeva, 2010

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ctenobelba (Caucasiobelba) urhani* Baran, 2015
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Amerobelbidae Grandjean, 1954 (5 gen. y 10 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Paleotropical.

Amerobelba Berlese, 1908 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Amerobelba decedens* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Amerobelba decedens* Berlese, 1908
(=*Eremobelba maxima* Willmann, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Amerobelba saboorii* Ahaniazad *et* Akrami, 2017
DISTRIBUCIÓN: Irán.

Hellenamerus Mahunka, 1974 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Hellenamerus ionicus* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Hellenamerus ionicus* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Mongaillardia Grandjean, 1961 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mongaillardia callitoca* Grandjean, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.
- *Mongaillardia aeoliana* (Bernini, 1979) (*Amerobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Mongaillardia callitoca* Grandjean, 1961
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Mongaillardia eveana* Grandjean, 1961
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Mongaillardia grandjeani* Călugăr *et* Vasiliu, 1984
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Mongaillardia magna* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

Rastellobata Grandjean, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Amerobelba rastelligera* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Rastellobata rastelligera* (Berlese, 1908) (*Amerobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Roynortonia Ermilov, 2011 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Roynortonia vietnamica* Ermilov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Roynortonia vietnamica* Ermilov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Eremulidae Grandjean, 1965 (7 gen., 49 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Austroeremulus Mahunka, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Austroeremulus glabrus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental.
- *Austroeremulus glabrus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.

Caveremulus Mahunka, 1983 (4 spp.)
(=***Berndbella*** Mahunka, 1985)
ESPECIE TIPO: *Caveremulus cordisetus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Caveremulus cordisetus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Caveremulus foliaceus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Caveremulus salicinus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Caveremulus serratus* (Mahunka, 1985) (*Berndbella*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Eremulus Berlese, 1908 (38 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremulus flagellifer* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Eremulus adami* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Eremulus africanus* Balogh, 1958 *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eremulus antis* Poltavskaja, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Eremulus arabicus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Yemen.
- *Eremulus australis* Wen, 1988
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eremulus avenifer* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Italia y Paleártica oriental meridional), Oriental (frecuente), Polinesia (Tahití) y Etiópica.
- *Eremulus baliensis* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Eremulus berlesei* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Komodo) y Ecuador.
- *Eremulus brasiliensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Eremulus cingulatus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eremulus crispus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eremulus csuzdii* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Eremulus curviseta* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Eremulus densus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Eremulus elegans* Gordeeva, 1987
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Eremulus flagellifer* Berlese, 1908
(=*Eremulus modestus* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita: Paleártica (menos frecuente en el Norte), Neártica (U.S.A.: Washington D.C.), Etiópica (Congo y Sudáfrica), Oriental, Australiana, subantártica (I. San Pablo) y Neotropical (Cuba).
- *Eremulus foveolatus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Eremulus hastatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Eremulus heterotrichus* Chakrabarti *et* Dasgupta, 1996
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremulus indicus* Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2008
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Eremulus jyotsnai* Sarkar, 1991
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Eremulus lanceocrinus* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eremulus monstrosus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Eremulus nigrisetosus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Tripura).
- *Eremulus pectinatus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eremulus pilipinus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Tailandia) y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Eremulus punctatus* Chakrabarti *et* Dasgupta, 1996
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremulus renukae* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremulus rigidisetus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eremulus rimosus* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán (Formosa).
- *Eremulus serratus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Eremulus sigmolamellatus* Chakrabarti *et* Dasgupta, 1996
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremulus southafricanensis* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Eremulus spindleformis* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eremulus spinifer* Woolley *et* Higgins, 1963
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Eremulus spinosus* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Eremulus tenuis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Eremulus translamellatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Eremulus truncatus* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Oriental, Australiana (Islas del Pacífico) y Neotropical (I. Galápagos).
- *Eremulus tsurutomiensis* Fujikawa, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Mahunkana Koçak *et* Kemal, 2008 (3 spp.)
(=***Fenestrella*** Mahunka, 1987, *nom. praeoc.* por Osborn *et* Drake, 1916)
ESPECIE TIPO: *Fenestrella bifurcata* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental y subtropical.
- *Mahunkana bifurcata* (Mahunka, 1987) (*Fenestrella*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Mahunkana japonica* (Aoki *et* Karasawa, 2007) (*Fenestrella*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
- *Mahunkana sinica* (Zhao *et* Wen, 1994) (*Fenestrella*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental Taiwán [Formosa]).

Pseuderemulus Balogh *et* Mahunka, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pseuderemulus gladiator* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pseuderemulus gladiator* Balogh *et* Mahunka, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Reteremuloides Mahunka, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Reteremuloides bifurcatus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Reteremuloides bifurcatus* Mahunka, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Vietnam).

Reteremulus Balogh *et* Mahunka, 1966 (1 sp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Reteremulus aciculatus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
Reteremulus aciculatus Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica, Nueva Guinea y China suroriental.
- *Reteremulus aciculatus aciculatus* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Reteremulus aciculatus papuanus* Balogh, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y China suroriental.

Damaeolidae Grandjean, 1965 (5 gen. y 13 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Caudamaeolus P. Balogh, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Caudamaeolus petalus* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Caudamaeolus petalus* P. Balogh, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Costeremus Aoki, 1970 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Costeremus ornatus* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Costeremus cornutus* Wang, 1996
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Costeremus ornatus* Aoki, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Vietnam.

Damaeolus Paoli, 1908 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma asperatum* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Damaeolus asperatus* (Berlese, 1904) (*Dameosoma*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: excepto Norte, y U.S.A.: Columbia).
- *Damaeolus bregetovae* Csiszár, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Damaeolus cellulatus* Subías, Ruiz *et* Kahwash, 1990
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeolus magnus* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Damaeolus ornatissimus* Csiszár, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).

Fosseremus Grandjean, 1954 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma laciniatum* Berlese, 1905
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Fosseremus americanus* (Jacot, 1938) (*Damaeolus laciniatus a.*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Fosseremus laciniatus* (Berlese, 1905) (*Dameosoma*)
  (=*Fosseremus africanus* Balogh, 1958)

(=*Damaeolus ornatus* Mihelčič, 1956)
(=*Damaeolus pistillifer* Berlese, 1913)
(=*Fosseremus quadripertitus* Grandjean, 1965)
(=*Damaeolus saltaensis* Hammer, 1958)
(=*Fosseremus sculpturatus* Mahunka, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente.

Gressittolus Balogh, 1970 (3 spp.)
(=***Fijirella*** Hammer, 1971)
ESPECIE TIPO: *Gressittolus marginatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Australiana.
- *Gressittolus marginatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Gressittolus mollis* (Hammer, 1971) (*Fijirella*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Gressittolus ocellatus* (Mahunka, 2000) (*Damaeolus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Eremobelbidae Balogh, 1961 (1 gen. y 46 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Eremobelba Berlese, 1908 (46 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremaeus leporosus* Haller, 1884
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Eremobelba asagiriensis* Fujikawa *et* Tominaga, 2014
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eremobelba balazsi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Eremobelba bella* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eremobelba bellicosa* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eremobelba bisulcata* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eremobelba breviseta* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Eremobelba brevispathulata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Eremobelba capitata* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Nueva Guinea.
- *Eremobelba cellulosa* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Eremobelba comteae* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Eremobelba coronata* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Eremobelba curtipetata* Wen, 1996
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eremobelba editae* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Eremobelba eharai* W. Chen *et* P. Gao, 2017
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Eremobelba esposi* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Eremobelba flexuosa* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Eremobelba foliata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eremobelba geographica* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Eremobelba gracilior* Berlese, 1908
(=*Eremobelba leporosa flagellaris* Jacot, 1938)
(=*Oribata neosota* Banks, 1909)
(=*Eremobelba nervosa* Hartenstein, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica oriental y Cáucaso) y Méjico.
- *Eremobelba graciosa* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Eremobelba hamata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Eremobelba heterotricha* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Borneo).
- *Eremobelba himalayensis* Mondal *et* Kundu, 1984
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Oriental.
- *Eremobelba indica* Ghosh *et* Bhaduri, 1979
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Eremobelba japonica* Aoki, 1959

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Oriental.
- *Eremobelba jenoi* Ermilov *et* Khaustov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Eremobelba leporoides* Jacot, 1938 (*E. leporosus l.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eremobelba leporosa* (Haller, 1884) (*Eremaeus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: "Neotropical".
- *Eremobelba longisetosa* Subías, Ruiz *et* Kahwash, 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Eremobelba mahunkai* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Eremobelba miliae* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremobelba minuta* Aoki *et* Wen, 1983
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eremobelba nagaroorica* Haq, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Eremobelba obscura* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eremobelba okinawa* Aoki, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Filipinas y Taiwán [Formosa]).
- *Eremobelba ornata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Eremobelba perrugosa* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eremobelba piffli* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eremobelba porcella* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Eremobelba pulchella* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Brasil).
- *Eremobelba shillongensis* Sanyal, 1988
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Eremobelba truncata* Wen, 1996
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eremobelba tuberculata* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Eremobelba wittmeri* Bayoumi *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Norte de India y Tailandia).
- *Eremobelba yunnanensis* Aoki *et* Yamamoto, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eremobelba zicsii* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Heterobelbidae Balogh, 1961 (3 gen., 17 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Furcodamaeus Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Furcodamaeus bifurcatus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Furcodamaeus bifurcatus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Haplobelba Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Haplobelba simplex* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Haplobelba simplex* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Heterobelba Berlese, 1913 (15 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Heterobelba galerulata* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.
- *Heterobelba africana* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Heterobelba barbata* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Heterobelba crassisetosa* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Heterobelba furcata* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Antillas (La Española: R. Dominicana).
- *Heterobelba galerulata* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Heterobelba magna* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Heterobelba montana* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Heterobelba oxapampensis* Beck, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Heterobelba quezonica* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Heterobelba rostrata* Mondal *et* Kundu, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Heterobelba spinitecta* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Heterobelba spinosissima* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Heterobelba spumosa* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Heterobelba stellifera Okayama, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Heterobelba stellifera stellifera* Okayama, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Heterobelba stellifera formosana* Aoki, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de Oriental.

- *Heterobelba zikani* Sellnick, 1922 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Basilobelbidae Balogh, 1961 (2 gen., 23 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Basilobelba Balogh, 1958 (18 spp. y 1 ssp.)
(=***Hammation*** Grandjean, 1959)
ESPECIE TIPO: *Damaeus retiarius* Warburton, 1912
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Basilobelba aethiopica* Bernini, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Basilobelba africana* Wallwork, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Tanzania) y Vietnam.
- *Basilobelba atimonensis* Corpuz-Raros, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basilobelba baltazarae* Corpuz-Raros, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basilobelba barbata* Mondal *et* Kundu, 1984
  DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Basilobelba cendanai* Corpuz-Raros, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basilobelba foliata* Hammer, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Bali) y Australiana (Micronesia: Palau).
- *Basilobelba gigantea* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Basilobelba indica* Bhaduri, Chakrabarti *et* Raychaudhuri, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Basilobelba insularis* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Tropical (Sudáfrica, Micronesia: I. Marianas, y Norte de Neotropical).
- *Basilobelba maidililae* Fernández, Theron, Rollard *et* Leiva, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Basilobelba monstruosetosa* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Basilobelba pacifica* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Basilobelba papillata* Sanyal, Saha *et* Chakraborti, 2007
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Basilobelba parmata* Okayama, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).

Basilobelba retiaria (Warburton, 1912) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Japón.
- *Basilobelba retiaria retiaria* (Warburton, 1912)
  (=*Hammation sollertius* Grandjean, 1959)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Japón.
- *Basilobelba retiaria symmetrica* Wallwork, 1962 *ssp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Basilobelba spasmenosi* Fernández *et* Theron, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Basilobelba werneri* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Xiphobelba Csiszár, 1961 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Xiphobelba hamanni* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Xiphobelba barbata* Talukdar *et* Chakrabarti, 1985
  DISTRIBUCIÓN: India (Assam).
- *Xiphobelba hamanni* Csiszár, 1961

(=*Xiphobelba margosetosa* Hammer, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Xiphobelba ismalia* Haq, 1980
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Xiphobelba mindanensis* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Xiphobelba setosa* Aoki, 1968
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (Nueva Bretaña).

Ameridae Bulanova-Zachvatkina, 1957 (7 gen., 1 subgen., 21 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Amerus Berlese, 1896 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Belba troisi* Berlese, 1883
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Amerus (Amerus) Berlese, 1896 (3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Amerus (A.) cuspidatus* Avanzati, Salomone, Baratti *et* Bernini, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Amerus (A.) polonicus* Kulczynski, 1902
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Amerus (A.) troisi* (Berlese, 1883) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Amerus (Neamerus) Willmann, 1939 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Amerus (Neamerus) lundbladi* Willmann, 1939
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Amerus (Neamerus) lundbladi* Willmann, 1939
(?=*Amerus laticephalus* Berlese, 1914 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Andesamerus Hammer, 1962 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Andesamerus peculiaris* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).
- *Andesamerus novaezealandiae* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Andesamerus peculiaris* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Caenosamerus Higgins *et* Woolley, 1969 (3 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Caenosamerus litosus* Higgins *et* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: Holárica y Oriental.
- *Caenosamerus litosus* Higgins *et* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Caenosamerus shirakamiensis* Fujikawa, 2002
DISTRIBUCIÓN: Japón.
Caenosamerus spatiosus Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental: India (Arunachal Pradesh).
- *Caenosamerus spatiosus spatiosus* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental: India (Arunachal Pradesh).
- *Caenosamerus spatiosus maoershanensis* Wen, 1992
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.

Ctenamerus Balogh *et* P. Balogh, 1992 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hymenobelba flagellata* Covarrubias, 1967
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Ctenamerus flagellatus* (Covarrubias, 1967) (*Hymenobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Ctenamerus ramulosus* (Covarrubias, 1967) (*Hymenobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Haplamerus Balogh *et* P. Balogh, 1992 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hymenobelba annulus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Haplamerus annulus* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Hymenobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Haplamerus coarctatus* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Hymenobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Hymenobelba Balogh, 1962 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hymenobelba ypsilon* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical austral.
- *Hymenobelba diversisetosa* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hymenobelba domahidyi* Balogh *et* P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hymenobelba exclamationis* Mahunka, 2010
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hymenobelba flagellatissima* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hymenobelba flexisetosa* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hymenobelba ypsilon* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Madagascar e India (Bengala Occidental).

Pteramerus Balogh, 1964 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pteramerus draco* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pteramerus clypeatus* Mahunka, 2010
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pteramerus draco* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Oxyameridae Aoki, 1965 (1 gen. y 10 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).

Oxyamerus Aoki, 1965 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oxyamerus spathulatus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).
- *Oxyamerus aokii* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Oxyamerus hauserorum* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Oxyamerus himalayensis* Mondal *et* Kundu, 1999
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Oxyamerus hyalinus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Oxyamerus isabelaensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Oxyamerus latirostris* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Oxyamerus niedbalai* Ermilov *et* Kalúz, 2020
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Oxyamerus polilloensis* Corpuz-Raros *et* Lit, 2005
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Oxyamerus spathulatus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam) y Japón.
- *Oxyamerus truncatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).

Platyameridae Balogh *et* P. Balogh, 1983 (2 gen., 17 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australianooriental.

Gymnodampia Jacot, 1937 (16 spp. y 2 sspp.)
(=***Cristamerus*** Hammer, 1977)
(=***Defectamerus*** Aoki, 1984)
ESPECIE TIPO: *Amerobelba setata* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Gymnodampia acuta* Chen, Behan-Pelletier, Wang *et* Norton, 2004
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gymnodampia australis* (Aoki, 1991) (*Defectamerus crassisetiger a.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Japón.
Gymnodampia crassisetiger (Aoki, 1984) (*Defectamerus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.
  - *Gymnodampia crassisetiger crassisetiger* (Aoki, 1984) (*Defectamerus*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Nepal.
  - *Gymnodampia crassisetiger coreana* (Choi *et* Aoki, 1985) (*Defectamerus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Gymnodampia fusca* (Fujikawa, 2002) (*Defectamerus*)
(=*Defectamerus conformis* Fujikawa, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Gymnodampia insularis* (Aoki, 2006) (*Defectamerus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Gymnodampia jacoti* Chen, Norton, Behan-Pelletier *et* Wang, 2004
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Gymnodampia lindquisti* Chen, Norton, Behan-Pelletier *et* Wang, 2004
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Gymnodampia qinlingensis* Chen, Behan-Pelletier, Wang *et* Norton, 2004
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Gymnodampia setata* (Berlese, 1916) (*Amerobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Oeste).

- *Gymnodampia sichuanensis* Chen, Behan-Pelletier, Wang *et* Norton, 2004
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gymnodampia soonkii* (Choi *et* Aoki, 1985) (*Defectamerus*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Gymnodampia spinosa* (Hammer, 1977) (*Cristamerus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Gymnodampia sungohi* (Choi, 1994) (*Defectamerus*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Gymnodampia tegularum* Chen, Behan-Pelletier, Wang *et* Norton, 2004
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gymnodampia yaoi* Chen, Behan-Pelletier, Wang *et* Norton, 2004
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gymnodampia yunnanensis* (Aoki *et* Yamamoto, 2000) (*Cristamerus*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Platyamerus Balogh *et* P. Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Platyamerus peculiaris* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Platyamerus peculiaris* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Staurobatidae Grandjean, 1966 (2 gen., 2 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Staurobates Grandjean, 1966 (1 sp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Staurobates schusteri* Grandjean, 1966
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
Staurobates schusteri Grandjean, 1966
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Staurobates schusteri schusteri* Grandjean, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Staurobates schusteri cordobensis* Balogh *et* Mahunka, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Paraguay).

Stauroma Grandjean, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Stauroma cephalotum* Grandjean, 1966
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Stauroma cephalotum* Grandjean, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Spinozetidae Balogh, 1972 (4 gen. y 5 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Grypoceramerus Suzuki *et* Aoki, 1970 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Grypoceramerus acutus* Suzuki *et* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Grypoceramerus acutus* Suzuki *et* Aoki, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Iberoppia Pérez-Íñigo, 1986 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Iberoppia paradoxa* Pérez-Íñigo, 1986
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Iberoppia paradoxa* Pérez-Íñigo, 1986
  DISTRIBUCIÓN: España.

Spinozetes Piffl, 1966 (1 sp.)
(=***Mirus*** Kulijev, 1967)
ESPECIE TIPO: *Spinozetes inexpectatus* Piffl, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Spinozetes inexpectatus* Piffl, 1966
  (=*Mirus pectinatus* Kulijev, 1967)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Yambaramerus Aoki, 1996 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Yambaramerus itoi* Aoki, 1996
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Yambaramerus arcuatus* Aoki *et* Yamamoto, 2000
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Yambaramerus itoi* Aoki, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Oppioidea Sellnick, 1937

Arceremaeidae Balogh, 1972 (2 gen. y 10 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y Paleártica meridional.

Arceremaeus Hammer, 1961 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Arceremaeus incaensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Arceremaeus cubanus* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Brasil).
- *Arceremaeus incaensis* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).
- *Arceremaeus jimenezi* Călugăr *et* Vasiliu, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Tecteremaeus Hammer, 1961 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tecteremaeus cornutus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y Paleártica meridional.
- *Tecteremaeus anoporosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Tecteremaeus bogorensis* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Tecteremaeus cachoeirensis* Franklin *et* Woas, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).
- *Tecteremaeus cornutus* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Notropical (Perú y Ecuador), Filipinas y Este de Rusia asiática.
- *Tecteremaeus cristatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Tecteremaeus hauseri* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Tecteremaeus incompletus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam) y Ecuador.

Machadobelbidae Balogh, 1972 (2 gen. y 19 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Machadobelba Balogh, 1958 (18 spp.)
ESPECIE TIPO: *Machadobelba symmetrica* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Machadobelba baloghi* Mondal *et* Kundu, 1999
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Machadobelba barbata* Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2005
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Machadobelba bifurcata* Wen, 1998
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Machadobelba ceylonica* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Machadobelba descombesi* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Machadobelba dispar* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Ghana).
- *Machadobelba foliata* Hammer, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Machadobelba longiciliata* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Machadobelba neotropica* P. Balogh, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Machadobelba serrata* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Machadobelba shtanchaevae* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Machadobelba similis* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Machadobelba simplex* Csiszár, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Machadobelba spathulifer* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Machadobelba symmetrica* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica, India (Tripura) y Méjico.
- *Machadobelba tanzica* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Machadobelba tuberculata* Csiszár, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Machadobelba ugandaensis* Ermilov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.

Ramogneta Karppinen, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ramogneta lamottei* Karppinen, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Ramogneta lamottei* Karppinen, 1966
  DISTRIBUCIÓN: África occidental.

Rioppiidae Balogh *et* Mahunka, 1977 (1 gen y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Rioppia Balogh *et* Mahunka, 1977 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rioppia nodulifera* Balogh *et* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rioppia comteae* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Rioppia nodulifera* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Decoroppiidae Mahunka, 2009 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Decoroppia Mahunka, 2009 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Decoroppia prodigiosa* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Decoroppia prodigiosa* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Yemen.

Autognetidae Grandjean, 1960 (6 gen., 2 subgen. y 35 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y subtropical austral (excepto Etiópica).

Austrogneta Balogh *et* Csiszár, 1963 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Austrogneta multipilosa* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).
- *Austrogneta multipilosa* Balogh *et* Csiszár, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda) y Argentina.
- *Austrogneta quadridentata* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Autogneta Hull, 1916 (24 spp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis longilamellata* Michael, 1885
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Autogneta (Autogneta) Hull, 1916 (11 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Autogneta (A.) amica* Jacot, 1938 (*A. longilamellata a.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Autogneta (A.) aokii* Behan-Pelletier, 2015
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A.(California).
- *Autogneta (A.) flaheyi* Behan-Pelletier, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Autogneta (A) hamata* Ota, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Autogneta (A.) japonica* Fujikawa, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Autogneta (A.) kaisilai* Karppinen, 1967
  DISTRIBUCIÓN: I. Spitsberg (Svalvard).
- *Autogneta (A.) longilamellata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional).
- *Autogneta (A.) masahitoi* Aoki, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Autogneta (A.) parva* Forsslund, 1947
  (=*Autogneta rugosa* Mihelčič, 1956)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Autogneta (A.) penicillum* Grandjean, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Autogneta (A.) schusteri* Behan-Pelletier, 2015
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A.(California).

Autogneta (Conchogneta) Grandjean, 1963 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Autogneta dalecarlica* Forsslund, 1947) =*Dameosoma willmanni* Dyrdowska, 1929
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Autogneta (Conchogneta) flumengalei* Jacot, 1939 (*A. longilamellata f.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Autogneta (Conchogneta) glabrisensillata* (Bayartogtokh, 2012) (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Autogneta (Conchogneta) herzegowinensis* (Willmann, 1941) (*Oppia willmanni h.*)
  DISTRIBUCIÓN: Bosnia-Herzegovina.
- *Autogneta (Conchogneta) intermedia* (Mihelčič, 1952) (*Oppia longilamellata i.*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Autogneta (Conchogneta) inundata* Winkler, 1957 (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Autogneta (Conchogneta) iranica* (Akarmi, 2008) (*C.*)

DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Autogneta (Conchogneta) traegardhi* Forsslund, 1947 (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Canadá).
- *Autogneta (Conchogneta) vasiliorum* (Mahunka, 2006) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Autogneta (Conchogneta) weigmanni* (Mahunka, 2007) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Autogneta (Conchogneta) willmanni* (Dyrdowska, 1929) (*Dameosoma*)
(=*Autogneta dalecarlica* Forsslund, 1947)
(=*Oppia talischica* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Autogneta (Rhaphigneta) Grandjean, 1960 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rhaphigneta numidiana* Grandjean, 1960
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Autogneta (Rhaphigneta) akramii* Subías, 2018
(=*Autogneta (Rhaphigneta) iranica* Akrami, Mortazavi *et* Hajizadeh, 2010, *nom. praeoc.* por Akrami, 2008)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Autogneta (Rhaphigneta) flagellata* (Mahunka, 1977) (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Autogneta (Rhaphigneta) numidiana* (Grandjean, 1960) (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).

Cosmogneta Grandjean, 1960 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmogneta impedita* Grandjean, 1960
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Cosmogneta cassolai* Bernini, Baratti *et* Avanzati, 1991
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Cosmogneta impedita* Grandjean, 1960
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa y Méjico.
- *Cosmogneta kargi* Grandjean, 1963
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Cosmogneta ozkani* Toluk, Ayyildiz *et* Subías, 2007
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Eremobodes Jacot, 1937 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Eremobodes pectinatus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Eremobodes pectinatus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Parautogneta Golosova, 1974 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Parautogneta silvatica* Golosova, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Parautogneta changbaiensis* Wen *et* Gao, 2000
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Parautogneta golosovae* Rjabinin, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Parautogneta silvatica* Golosova, 1974
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Triautogneta Fujikawa, 2009 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Triautogneta higoensis* Fujikawa, 2009
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Triautogneta higoensis* Fujikawa, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Thyrisomidae Grandjean, 1954 (1 gen., 18 spp. y 5 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

Banksinoma Oudemans, 1930 (18 spp. y 5 sspp.)
(=***Thyrisoma*** Grandjean, 1953)
ESPECIE TIPO: (*Notaspis lanceolata* Michael *sensu* Oudemans, 1930) =*Banksinoma lanceolata oudemansi* Fujikawa, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Banksinoma akhtyamovi* Rjabinin, 1993
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática y España.
- *Banksinoma arcuata* (Hammer, 1958) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Banksinoma borealis* (Willmann, 1943) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Suecia.
- *Banksinoma cincta* Zhao *et* Wen, 1993
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Banksinoma exobothridialis* Bayartogtokh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental centromeridional.
- *Banksinoma insignis* Balogh *et* Mahunka, 1965
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Banksinoma japonica* Fujikawa, 1979
DISTRIBUCIÓN: Japón.
Banksinoma lanceolata (Michael, 1885) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Hawái.
- *Banksinoma lanceolata lanceolata* (Michael, 1885)
(?=*Notaspis castaneus* Hermann, 1804 *sp. inq.*)
(?=*Zetes flavipes* Koch, 1841 *sp. inq.*)
(=*Banksinoma lanceolata islandica* Fujikawa, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este): frecuente, Canadá y Hawái.
- *Banksinoma lanceolata bifurcata* (Jacot, 1938) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: U.S.A. (Ilinois) y Este de Rusia asiática.
- *Banksinoma lanceolata canadensis* Fujikawa, 1979
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Banksinoma lanceolata lunare* (Hull, 1914) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Banksinoma lanceolata oudemansi* Fujikawa, 1979
DISTRIBUCIÓN: Holanda.
- *Banksinoma longisetosa* Bayartogtokh *et* Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental centrooccidental.
- *Banksinoma monoceros* (Balogh *et* Mahunka, 1968) (*Oribella spinifera m.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Banksinoma orbiculata* Bayartogtokh, 2006
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Banksinoma ovata* (Wallwork, 1962) (*Thyrisoma*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Míchigan).
- *Banksinoma pretiosa* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Banksinoma setosa* Rjabinin, 1974
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Norte de Europa, Rusia asiática y Canadá).
- *Banksinoma sinica* Wen, 1990
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Banksinoma spinifera* (Hammer, 1952) (*Oribella*)
(=*Oribella spinifera fissurata* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Suroeste de U.S.A. y Canadá) y Neotropical (Bolivia y Argentina).
- *Banksinoma tamayura* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Banksinoma watanabei* Aoki, 2002
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Oppiidae Sellnick, 1937 (131 gen., 43 subgen., 1.073 spp. y 53 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

[**Antilloppiinae**] Mahunka, 1985 (2 gen. y 6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Oriental) y subtropical (Holártica meridional).

Joboppia Ruiz, Mínguez *et* Subías, 1988 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Neoppia (Joboppia) dichosa* Ruiz, Mínguez *et* Subías, 1988
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Joboppia dichosa* (Ruiz, Mínguez *et* Subías, 1988) (*Neoppia (J.)*)
DISTRIBUCIÓN: España y "U.S.A."
- *Joboppia expansum* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Neoppia Bhattacharya *et* Banerjee, 1981 (4 spp.)
(=***Antilloppia*** Mahunka, 1985)
ESPECIE TIPO: *Neoppia minuta* Bhattacharya *et* Banerjee, 1981
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Oriental) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Neoppia bayoumii* (Al-Assiuty *et* El-Deeb, 1983) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Neoppia discreta* Ruiz, Mínguez *et* Subías, 1988
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional e Irán.
- *Neoppia minuta* Bhattacharya *et* Banerjee, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Bengala Occidental) y Filipinas.
- *Neoppia schauenbergi* (Mahunka, 1985) (*Antilloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

[**Paternoppiinae**] Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 2000 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Paternoppia Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 2000 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Paternoppia andalusicabulensis* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 2000
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Paternoppia andalusicabulensis* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 2000
DISTRIBUCIÓN: España.

[**Lanceoppiinae**] Balogh, 1983 (18 gen., 6 subgen. y 142 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y boreal).

Acutoppia Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Operculoppia crassiseta* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
- *Acutoppia crassiseta* (Hammer, 1968) (*Operculoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Argentina.
- *Acutoppia jelevae* (Hammer, 1968) (*Operculoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Basiloppia Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia hexatricha* Balogh *et* Mahunka, 1975
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Basiloppia hexatricha* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Chavinia Hammer, 1961 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Chavinia paradoxa* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Paleártica meridional.
- *Chavinia paradoxa* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).
- *Chavinia similis* P. Balogh, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Colombia e Irán.

Cycloppia Balogh, 1983 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Lanceoppia simplex* Suzuki, 1973) =*Oppia restata* Aoki, 1963
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.
- *Cycloppia asetosa* Ermilov *et* Kalúz, 2013
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Cycloppia granulata* Ohkubo, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Vietnam y Taiwán [Formosa]).
- *Cycloppia latisternum* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Cycloppia restata* (Aoki, 1963) (*Oppia*)
  (=*Lanceoppia simplex* Suzuki, 1973)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).
- *Cycloppia spindleformis* Ermilov *et* Kalúz, 2013
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Cycloppia szentirmayi* (Balogh, 1970) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Drepanoppia Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia falxa* Kok,, 1967
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Drepanoppia falxa* (Kok, 1967) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Drepanoppia koki* Mahunka, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Geminoppia Balogh *et* P. Balogh, 1983 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Geminoppia papineaui* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).
- *Geminoppia ansifera* (Mahunka, 1985) (*Tectoppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Geminoppia papineaui* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Geminoppia velata* (Franklin *et* Woas, 1992) (*Globoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Globoppia Hammer, 1962 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Globoppia intermedia* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.
- *Globoppia brinoni* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Globoppia cochlearia* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
  DISTRIBUCIÓN: América austral.
- *Globoppia curtipes* (Trägårdh, 1907) (*Damaeus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Globoppia curviclavata* (Mahunka, 1985) (*Pletzenoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Globoppia gibba* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Globoppia globifera* (Mahunka, 1989) (*Membranoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Globoppia hamiltoni* (Mahunka, 1988) (*Pletzenoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Globoppia heterotricha* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Globoppia intermedia* Hammer, 1962
  (=*Globoppia intermedia longiseta* Wallwork, 1970)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico), Antártica (frecuente) y subantártica.
- *Globoppia latifasciata* (Willmann, 1932) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Globoppia maior* Hammer, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Globoppia minor* Hammer, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Globoppia nidicola* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Globoppia simplex* (Warburton, 1912) (*Notaspis*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Globoppia vernoncrookensis* Hugo-Coetzee, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Laminoppia Hammer, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Laminoppia blocki* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Laminoppia blocki* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Lanceoppia Hammer, 1962 (65 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lanceoppia hexapili* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, austral y "Paleártica".

Lanceoppia (Lanceoppia) Hammer, 1962 (30 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.

- *Lanceoppia (L.) adjuncta* Mahunka, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (L.) bertheti* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) csiszarae* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) elegantula* Starý *et* Block, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
- *Lanceoppia (L.) haarlovi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) hexapili* Hammer, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Lanceoppia (L.) jacoti* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) knuellei* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) kovacsi* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Lanceoppia (L.) lancearia* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lanceoppia (L.) madagascarensis* Mahunka, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lanceoppia (L.) maerkeli* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) microlancearia* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lanceoppia (L.) microtricha* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lanceoppia (L.) microtrichoides* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lanceoppia (L.) operta* Ermilov *et* Minor, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) piffli* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) poppi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Sudáfrica.
- *Lanceoppia (L.) ramsayi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) rigidiseta* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) schweizeri* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) scytheae* Hugo-Coetzee, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lanceoppia (L.) seydi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Lanceoppia (L.) strenzkei* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) thamdrupi* (Hammer, 1968) (*Hamoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) tortile* Mahunka, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (L.) translucens* (Mahunka, 1985) (*Pletzenoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.
- *Lanceoppia (L.) vanderhammeni* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) willmanni* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (L.) woodringi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Lanceoppia (Baioppia) Luxton, 1985 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lanceoppia moritzi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Oriental) y Paleártica.

- *Lanceoppia (Baioppia) luxtoni* Hammer, 1968 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Argentina.
- *Lanceoppia (Baioppia) menkei* Hammer, 1968 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Baioppia) moritzi* Hammer, 1968 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Argentina.
- *Lanceoppia (Baioppia) rugosa* Ermilov *et* Starý, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lanceoppia (Baioppia) talacrensis* Monson, 2000
  DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Lanceoppia (Baioppia) trapezoides* Ermilov *et* Minor, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Lanceoppia (Bicristoppia) Subías, 1989 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia bicristata* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral.

- *Lanceoppia (Bicristoppia) archicostulata* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).
- *Lanceoppia (Bicristoppia) bicristata* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) binodosa* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) capensis* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) cucheana* Mahunka, 1994 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) feideri* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) kalalao* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Lanceoppia (Convergoppia) Balogh, 1983 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Oppia pletzenae* Hammer, 1968, *nom. praeoc.* por Kok, 1967) =*Lanceoppia (Convergoppia) neonominata* Subías, 2004
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Lanceoppia (Convergoppia) australis* (Balogh, 1982) (*Teratoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lanceoppia (Convergoppia) ewingi* Hammer, 1968 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Convergoppia) neonominata* Subías, 2004
  (=*Oppia pletzenae* Hammer, 1968, *nom. praeoc.* por Kok, 1967)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Convergoppia) schusteri* Hammer, 1968 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Convergoppia) sellnicki* Hammer, 1968 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Lanceoppia (Hamoppia) Hammer, 1968 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hamoppia lionsi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Lanceoppia (Hamoppia) lionsi* (Hammer, 1968) (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Hamoppia) soosi* (Balogh, 1982) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lanceoppia (Hamoppia) turki* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Lanceoppia (Lancelalmoppia) Subías, 1989 (14 spp.)

(=***Radamoppia*** Mahunka, 1994)
ESPECIE TIPO: *Oppia perezinigoi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) banksi* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) becki* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) berlesei* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) consimilis* Mahunka, 1989 (*Lanceop.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) gressitti* (Wallwork, 1964) (*Globoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) nodosa* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral e India (Bengala Occidental).
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) perezinigoi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) pertineata* Mahunka, 1989 (*Lanceop.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) rattura* (Mahunka, 1985) (*Pletzenoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) ravenala* (Mahunka, 1994) (*Radamoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) tasmanica* Mahunka, 1989 (*Lanceop.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) thori* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) vaneki* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) zicsica* (Mahunka, 1988) (*Pletzenoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Loboppia Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia covarrubiasi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
- *Loboppia covarrubiasi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Argentina.

Membranoppia Hammer, 1968 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Membranoppia krivolutskyi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y austral (excepto Etiópica).

Membranoppia (Membranoppia) Hammer, 1968 (9 spp.)
(=***Nesoppia*** Luxton, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y subtropical austral (excepto Etiópica).
- *Membranoppia (M.) argentinensis* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Oppia*)
  (=*Oppia patagonica* Mahunka, 1980)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Membranoppia (M.) breviclava* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Membranoppia (M.) krivolutskyi* Hammer, 1968
  (=*Membranoppia karppineni* Hammer, 1968)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Membranoppia (M.) pseudocorrugata* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Tierra del Fuego y Méjico).
- *Membranoppia (M.) sitnikovae* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Membranoppia (M.) truncata* (Hammer, 1961) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Membranoppia (M.) tuxeni* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda, India (Tripura) y Argentina.
- *Membranoppia (M.) ventrolaminata* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Membranoppia (M.) wallworki* (Mahunka, 1980) (*Globoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).

Membranoppia (Pravoppia) Luxton, 1985 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia disjuncta* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Membranoppia (Pravoppia) campbellensis* (Wallwork, 1964) (*Globoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Membranoppia (Pravoppia) disjuncta* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Membranoppia (Pravoppia) loxolineata* (Wallwork, 1965) (*Oppia*)
  (=*Oppia loxolineata longipilosa* Covarrubias, 1968)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente).

- *Membranoppia (Pravoppia) scotiae* (Wallwork, 1970) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).

Operculoppia Hammer, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Operculoppia kunsti* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Operculoppia kunsti* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Otoppia Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia midas* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Otoppia midas* (Balogh, 1964) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Polyoppia Hammer, 1968 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Polyoppia baloghi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana y Neotropical).
- *Polyoppia baloghi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Polyoppia magna* (Sellnick, 1924) (*Dameosoma*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Processoppia Balogh, 1983 (3 spp.)
(=***Rhaphoppia*** Balogh, 1983)
ESPECIE TIPO: *Oppia oudemansi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Processoppia mihelcicana* (Ohkubo, 2003) (*Rhaphoppia*)
  (=*Oppia mihelcici* Hammer, 1968, *nom. praeoc.* por Pérez-Íñigo, 1965)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Processoppia oudemansi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Processoppia sphagnicola* (Balogh *et* P. Balogh, 1986) (*Rhaphoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Pustuloppia Mahunka, 1994 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pustuloppia madagassica* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pustuloppia madagassica* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Setoppia Balogh, 1983 (20 spp.)
(=***Tectoppiella*** Mahunka, 1984)
ESPECIE TIPO: *Oppia toeroeki* Balogh, 1982
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y austral.
- *Setoppia angustopili* (Hammer, 1962) (*Lanceoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Setoppia antennata* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Setoppia bornemisszai* (Balogh, 1982) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Setoppia clavimera* (Mahunka, 1985) (*Tectoppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Setoppia compressa* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Setoppia fortis* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Setoppia izinyosa* Hugo-Coetzee, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Setoppia karinae* (Mahunka, 1974) (*Tectoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Zimbabue [Rodesia] y Sudáfrica).
- *Setoppia longisetosa* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Setoppia mahunkai* (Hammer, 1968) (*Lanceoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Setoppia paraquattuor* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Setoppia parrillarensis* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Setoppia quattuor* (Kok, 1967) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Setoppia strinovichi* (Balogh, 1972) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Setoppia szaboi* (Mahunka, 1988) (*Antennoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Setoppia toeroeki* (Balogh, 1982) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Setoppia toxotes* (Balogh, 1982) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Setoppia tuberosa* (Mahunka, 1984) (*Tectoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Setoppia vanga* (Mahunka, 1994) (*Radamoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Setoppia verrucosa* (Mahunka, 1985) (*Tectoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Trematoppia Balogh, 1964 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trematoppia cristipes* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Trematoppia cristipes* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Méjico.

[**Nosybelbinae**] Mahunka, 1994 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Nosybelba Mahunka, 1994 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nosybelba oppiana* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Nosybelba oppiana* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Nosybelba spinipes* (Balogh, 1964) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

[**Oppiinae**] Sellnick, 1937 (24 gén., 4 subgen., 174 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Aeroppia Hammer, 1961 (16 spp.)
(=***Paraeroppia*** Sanyal, 2009)
ESPECIE TIPO: *Aeroppia peruensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y Holártica.
- *Aeroppia abdita* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Aeroppia adjacens* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas e I. Galápagos) e Irán.
- *Aeroppia asymmetrica* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Aeroppia clavata* Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: Guyana [Guayana Británica].
- *Aeroppia floridana* (Banks, 1896) (*Belba*) *sp. inq.*
(=*Oribata consimilis* Banks, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Aeroppia friedrichi* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Aeroppia hammerae* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Venezuela).
- *Aeroppia indiana* (Sanyal, 2009) (*A. (Paraeroppia)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Aeroppia insularis* Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antillas (La Española: R. Dominicana).
- *Aeroppia longisensilla* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Aeroppia magnipilosa* (Ewing, 1909) (*Damaeus*)
(=*Aeroppia columbiana* Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Sur).
- *Aeroppia mariehammerae* Subías *et al.*, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Panamá).
- *Aeroppia nasalis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).
- *Aeroppia peruensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Aeroppia sculpturata* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas e Irán.
- *Aeroppia vacua* (Berlese, 1888) (*Belba concolor v.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Aethioppia Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia bacilligera* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Aethioppia bacilligera* (Balogh, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Aethioppia oligochaeta* (Mahunka, 1984) (*Xenoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Afroppia Koçak *et* Kemal, 2008 (1 sp.)
(=***Xenoppia*** Mahunka, 1982, *nom. praeoc.* por Townsend, 1912)
ESPECIE TIPO: *Xenoppia brevipila* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Afroppia brevipila* (Mahunka, 1982) (*Xenoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

Amerioppia Hammer, 1961 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Amerioppia rudentigera* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Amerioppia meruensis* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Amerioppia rudentigera* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.

Coetzeella Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2107 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Coetzeella navalensis* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2107
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Coetzeella navalensis* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2107
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Erioppia Balogh, 1983 (3 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Multioppia problematica* Balogh, 1966
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Australiana).
- *Erioppia corpuzrarosae* Ermilov *et* Starý, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Erioppia malalatinae* (Mahunka, 2009) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
Erioppia problematica (Balogh, 1966) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental y Polinesia (I. Samoa).
- *Erioppia problematica problematica* (Balogh, 1966)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Erioppia problematica pacifica* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

Exanthoppia Balogh *et* P. Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Exanthoppia ornatissima* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
- *Exanthoppia ornatissima* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Hawái y Méjico.

Fusuloppia Balogh, 1983 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Oppia simplex* Balogh, 1964, *nom. praeoc.* por Jacot, 1938) =*Fusuloppia neonominata* Subías, 2004
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Fusuloppia fusuligera* (Balogh, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Fusuloppia neonominata* Subías, 2004
(=*Oppia simplex* Balogh, 1964, *nom. praeoc.* por Jacot, 1938)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Fusuloppia variosetosa* Mahunka, 2010
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Goyoppia Balogh, 1983 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia sexpilosa* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.
- *Goyoppia longissima* (Wen, 1987) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Goyoppia sagami* (Aoki, 1984) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Goyoppia sexpilosa* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Heteroppia Balogh, 1970 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Heteroppia globigera* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Etiópica y subtropical (Paleártica meridional).

Heteroppia (Heteroppia) Balogh, 1970 (3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y subtropical (Paleártica meridional).
- *Heteroppia (H.) globigera* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Heteroppia (H.) orthodactyla* (Willmann, 1932) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Heteroppia (H.) setigera* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Heteroppia (Tanzoppia) Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tanzoppia triseta* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Heteroppia (Tanzoppia) triseta* (Mahunka, 1988) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Laroppia Subías, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia petiolata* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: Atlántico Sur.
- *Laroppia petiolata* (Wallwork, 1977) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

Lasiobelba Aoki, 1959 (38 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lasiobelba remota* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Lasiobelba (Lasiobelba) Aoki, 1959 (21 spp.)
(=***Cilioppia*** Balogh, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Lasiobelba (L.) arabica* Mahunka, 2000
(=*Oppia yodai africana* Kok, 1967, *nom. praeoc.* por Evans, 1953)
(=*Lasiobelba neonominata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán), Etiópica y Hawái.
- *Lasiobelba (L.) arcidiaconoae* (Bernini, 1973) (*Oppia*)
(=*Oppia bayoumii* Shereef *et* Zaher, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e India (Tripura).
- *Lasiobelba (L.) camerunica* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Lasiobelba (L.) daamsae* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Lasiobelba (L.) decui* (Vasiliu *et* Ivan, 1995) (*Cilioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Lasiobelba (L.) gibbosa* (Mahunka, 1985) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Lasiobelba (L.) hesperidiana* (Pérez-Íñigo, 1986) (*Cilioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Lasiobelba (L.) insulata* Ohkubo, 2001
DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Lasiobelba (L.) kuehnelti* (Csiszár, 1961) (*Oppia*)
(=*Cilioppia pori* Vasiliu *et* Ivan, 1995)
(=*Oppia yodai* Aoki, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (frecuente), Australiana y Etiópica, y Paleártica meridional: Mediterránea oriental e Irán.
- *Lasiobelba (L.) lemuria* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lasiobelba (L.) longisensilla* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Lasiobelba (L.) pontica* Vasiliu *et* Ivan, 2011
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Lasiobelba (L.) remota* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.
- *Lasiobelba (L.) rubida* (Wallwork, 1977) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Lasiobelba (L.) sakhalinensis* Rjabinin *et* Zaitsev, 2019
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática: I. Sajalín.
- *Lasiobelba (L.) sculpta* Wang, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Lasiobelba (L.) subuligera* (Berlese, 1916) (*Dameosoma denticulatum s.*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Lasiobelba (L.) suchetae* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Lasiobelba (L.) tsaoshanensis* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Lasiobelba (L.) vietnamica* Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Lasiobelba (L.) yunnanensis* Wen, 1999
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Lasiobelba (Antennoppia) Mahunka, 1983 (17 spp.)
(=***Daedaloppia*** Balogh, 1983)
ESPECIE TIPO: *Antennoppia minor* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical (Paleártica meridional) y Neártica.
- *Lasiobelba (Antennoppia) abchasica* (Golosova *et* Tarba, 1974) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Lasiobelba (Antennoppia) capilligera* (Berlese, 1916) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.

- *Lasiobelba (Antennoppia) chistyakovi* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Lasiobelba (Antennoppia) granulata* (Mahunka, 1986) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Lasiobelba (Antennoppia) heterosa* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Etiopía) y Paleártica meridional (Irán).
- *Lasiobelba (Antennoppia) insignis* Balogh, 1970 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Lasiobelba (Antennoppia) izquierdoae* Arillo, Gil-Martín *et* Subías, 1994 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Lasiobelba (Antennoppia) major* (Mahunka, 1983) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Lasiobelba (Antennoppia) minor* (Mahunka, 1983) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Lasiobelba (Antennoppia) nepalica* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Lasiobelba (Antennoppia) parachistyakovi* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Lasiobelba (Antennoppia) quadriseta* Subías, 1989 (*L.*)
  (=*Lasiobelba icaria* Mahunka, 2001)
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Lasiobelba (Antennoppia) rigida* (Ewing, 1909) (*Damaeus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Lasiobelba (Antennoppia) subnitida* (Sellnick, 1924) (*Dameosoma*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Lasiobelba (Antennoppia) trichoseta* (Mahunka, 1983) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Lasiobelba (Antennoppia) ultraciliata* (Jacot, 1934) (*Dameosoma*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Lasiobelba (Antennoppia) yoshii* (Mahunka, 1987) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Lemuroppia Mahunka, 1994 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Lemuroppia helleri* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Lemuroppia helleri* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Neoamerioppia Subías, 1989 (44 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Amerioppia decemsetosa* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y subantártica.

Neoamerioppia (Neoamerioppia) Subías, 1989 (37 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y subantártica.

- *Neoamerioppia (N.) aelleni* (Mahunka, 1982) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Neoamerioppia (N.) africana* (Kok, 1967) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).
- *Neoamerioppia (N.) asiatica* (Hammer, 1977) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Neoamerioppia (N.) chavinensis* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú e India (Bengala Occidental).
- *Neoamerioppia (N.) chilensis* (Hammer, 1962) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Neoamerioppia (N.) cocuyana* (P. Balogh, 1984) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Vietnam.
- *Neoamerioppia (N.) csabai* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Costa de Marfil).
- *Neoamerioppia (N.) decemsetosa* (Hammer, 1973) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Neoamerioppia (N.) deficiens* (Balogh, 1959) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Neoamerioppia (N.) extrusa* (Mahunka, 1983) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Neoamerioppia (N.) flagellata* (Hammer, 1975) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sahara.
- *Neoamerioppia (N.) flagelliapex* Ohkubo *et* Aoki, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Neoamerioppia (N.) foveolata* (Mahunka, 1984) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Neoamerioppia (N.) hamidi* (Al-Assiuty *et* El-Deeb, 1983) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Neoamerioppia (N.) hexapilis* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Neoamerioppia (N.) hortensis* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.

- *Neoamerioppia (N.) interrogata* (Mahunka, 1976) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China: Hong-Kong, y Filipinas).
- *Neoamerioppia (N.) lanceolata* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Neoamerioppia (N.) longiclava (Hammer, 1962) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Guinea).
- *Neoamerioppia (N.) longiclava longiclava* (Hammer, 1962)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Nueva Zelanda.
- *Neoamerioppia (N.) longiclava microseta* (Balogh *et* P. Balogh, 1986) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Neoamerioppia (N.) longicoma* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Neoamerioppia (N.) minima* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Neoamerioppia (N.) nagyi* (Mahunka, 1969) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Neoamerioppia (N.) notata* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
- *Neoamerioppia (N.) papuana* (Balogh *et* P. Balogh, 1986) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Neoamerioppia (N.) paripilis* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Neoamerioppia (N.) pectigera* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile).
- *Neoamerioppia (N.) phoretica* (Franklin *et* Woas, 1992) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).
- *Neoamerioppia (N.) polygonata* (Mahunka, 1982) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Sudáfrica).
- *Neoamerioppia (N.) rotunda* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Chile).
- *Neoamerioppia (N.) similis* (Covarrubias, 1967) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Neoamerioppia (N.) sturmi* (P. Balogh, 1984) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Neoamerioppia (N.) trichosa* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
- *Neoamerioppia (N.) trichosoides* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Neoamerioppia (N.) ventrosquamosa* (Hammer, 1979) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia), Australiana (Micronesia: I. Marianas) y Japón.
- *Neoamerioppia (N.) vicina* (Hammer, 1971) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Java.
- *Neoamerioppia (N.) vietnamica* (Mahunka, 1988) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Neoamerioppia (N.) woolleyi* (Hammer, 1968) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Neoamerioppia (Ameriglobopppia) Subías, 1989 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Amerioppia espeletiarum* P. Balogh, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Etiópica) y "Paleártica".
- *Neoamerioppia (Ameriglobopppia) badensis* (Woas, 1986) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Neoamerioppia (Ameriglobopppia) centraliamericana* (Mahunka, 1983) (*Globoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Neoamerioppia (Ameriglobopppia) costulifera* Mahunka, 1997 (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Neoamerioppia (Ameriglobopppia) espeletiarum* (P. Balogh, 1984) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Neoamerioppia (Ameriglobopppia) extrema* (Mahunka, 1985) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas e I. Galápagos).
- *Neoamerioppia (Ameriglobopppia) salvadoriensis* (Woas, 1986) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Neoamerioppia (Ameriglobopppia) senecionis* (P. Balogh, 1984) (*Amerioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia e I. Galápagos).

Niloppia Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia sticta* Popp, 1960
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Niloppia (Niloppia) Balogh, 1983 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Niloppia sticta* (Popp, 1960) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Niloppia (Hanoiella) Ermilov *et* Starý, 2018 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Niloppia (Hanoiella) transversa* Ermilov *et* Starý, 2018

DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Niloppia (Hanoiella) transversa* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Oligoppia Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Amerioppia octocoma* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Oligoppia octocoma* (Hammer, 1973) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

Oppia Koch, 1835 (20 spp. y 1 ssp.)
(=***Dameosoma*** Berlese, 1892)
ESPECIE TIPO: *Oppia nitens* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).
- *Oppia capense* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y "Alemania".
- *Oppia cephalota* (Hall, 1911) (*Damaeus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Connecticut).
- *Oppia coloradensis* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Oppia denticulata* (Canestrini *et* R. Canestrini, 1882) (*Belba*)
(=*Oppia cyclosoma* Mihelčič, 1955)
(=*Oppia willmanni* Oudemans, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Irán y Sur de Siberia) y Neártica (U.S.A.: Nueva York), y Neotropical: Antillas (La Española: R. Dominicana) y Ecuador.
- *Oppia elegans* (Trägårdh, 1931) (*Dameosoma*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).
- *Oppia elongata* Jacot, 1938 *sp. inq.*
(=*Oppia parviaures* Jacot, 1939)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Oppia ewingi* (Berlese, 1916) (*Dameosoma denticulatum e.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Oppia huangshanensis* Wen *et* Chen, 1991
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Oppia hungarica* Karpelles, 1893 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Oppia incisirostra* Woas, 1986
DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Oppia leleupi* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Oppia neonominata* Subías, 2004
(=*Oppia concolor tridentata* Pérez-Íñigo, 1976, *nom. praeoc.* por Forsslund, 1942)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
Oppia nitens Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Asia centrooccidental y Neártica oriental) y Antártica.
- *Oppia nitens nitens* Koch, 1835
(=*Oppia grandis* Mihelčič, 1955)
(=*Belba minuta* Banks, 1895)
(=*Dameosoma myrmecophilum* Sellnick, 1928)
(=*Oribata perolata* Banks, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Asia centrooccidental y Neártica oriental).
- *Oppia nitens brachytrichina* Dalenius, 1958 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Crozet).
- *Oppia orientalis* Sanyal *et* Bhaduri, 1989
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Oppia quadrisetosa* (Kramer, 1898) (*Notaspis*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Oppia samadi* Kardar, 1977 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).
- *Oppia seminuda* Scull, Jeleva *et* Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Oppia speciosa* Golosova, 1981
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Rusia asiática.
- *Oppia vitrea* (Tseng, 1982) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Paroppia Hammer, 1968 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Paroppia lebruni* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Paroppia breviseta* (Balogh, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Paroppia flagellata* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Paroppia hawaiiensis* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Paroppia lebruni* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Andhra Pradesh).
- *Paroppia neethlingi* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paroppia patagonica* Kun, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Pluritrichoppia Subías *et* Arillo, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pluritrichoppia insolita* Subías *et* Arillo, 1989
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Pluritrichoppia insolita* Subías *et* Arillo, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Pseudomultioppia Subías, 2018 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Multioppia jandiae* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Pseudomultioppia jandiae* (Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996) (*Multioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Quinquoppia Tseng, 1982 (2 spp.)
(=***Damaeoppia*** Ohkubo, 1995)
ESPECIE TIPO: *Quinquoppia nobilis* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.
- *Quinquoppia formosana* (Ohkubo, 1995) (*Damaeoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Japón.
- *Quinquoppia nobilis* Tseng, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Sphagnoppia Balogh *et* P. Balogh, 1986 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sphagnoppia biflagellata* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana) y subtropical (Neártica meridional).
- *Sphagnoppia biflagellata* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Sphagnoppia durhamensis* (Metz *et* Sharma, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Taiwanoppia Tseng, 1982 (16 spp.)
ESPECIE TIPO: *Taiwanoppia subtropica* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Taiwanoppia (Taiwanoppia) Tseng, 1982 (10 spp.)
(=***Vietoppia*** Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Neotropical.
- *Taiwanoppia (T.) flagellifera* (Wang, 1993) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Taiwanoppia (T.) fujianensis* (Wang, 1993) (*Vietoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Taiwanoppia (T.) hungarorum* (Mahunka, 1988) (*Vietoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam y Méjico.
- *Taiwanoppia (T.) insitiva* (Mahunka, 2008) (*Vietoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Península Malaya).
- *Taiwanoppia (T.) nepalica* Ermilov *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Taiwanoppia (T.) papillaris* Tseng, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Taiwanoppia (T.) paraflagellifera* Ermilov *et* Kalúz, 2013
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Taiwanoppia (T.) paranepalica* Ermilov *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Taiwanoppia (T.) pauciseta* (Hammer, 1971) (*Globoppia (Aeroppia)*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Filipinas.
- *Taiwanoppia (T.) subtropica* Tseng, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Taiwanoppia (Paragloboppia) Subías, 1989 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia diversiseta* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y subtropical.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) calva* (Warburton, 1912) (*Notaspis clavipectinata c.*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) diversiseta* (Mahunka, 1985) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) mercedesae* (Arillo *et* Subías, 1997) (*Vietoppia (P.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) pacifica* (Ohkubo *et* Aoki, 1995) (*Vietoppia (P.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) senegalensis* (Mahunka, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) trichotos* (Balogh *et* Mahunka, 1977) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Tectoppia Wallwork, 1961 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tectoppia nigricans* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Tectoppia costulata* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Tectoppia longisetosa* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Tectoppia nigricans* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: África occidental y Ecuador.

[**Multioppiinae**] Balogh, 1983 (19 gen., 10 subgen., 200 spp. y 9 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Anomaloppia Subías, 1978 (12 spp.)
ESPECIE TIPO: *Anomaloppia canariensis* Subías, 1978
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, tropical (excepto Oriental) y subantártica.
- *Anomaloppia alborzi* Akrami, Keshavarz *et* Saboori, 2015
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Anomaloppia arcuata* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Anomaloppia babeldaobensis* Bayartogtokh *et* Shimano, 2020
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (Palau).
- *Anomaloppia canariensis* Subías, 1978
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Anomaloppia chitinofincta* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia central rusa).
- *Anomaloppia differens* Mahunka *et* Topercer, 1983
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Anomaloppia dispariseta* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral, subantártica: I. Malvinas [I. Falkland], e Irán.
- *Anomaloppia madeirensis* Arillo *et* Subías, 1990
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
- *Anomaloppia manifera* (Hammer, 1955) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Alaska).
- *Anomaloppia mazandaranica* Akrami *et* Subías, 2007
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Anomaloppia ozkani* Ayyildiz, 1989
(=*Anomaloppia iranica* Bayartogtokh *et* Akrami, 2000)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Anomaloppia peregovitsi* (Mahunka, 1986) (*Insculptoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Condyloppia Balogh, 1983 (2 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia condylifer* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Condyloppia condylifer* (Hammer, 1979) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
Condyloppia pilosella (Balogh, 1959) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
  - *Condyloppia pilosella pilosella* (Balogh, 1959)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Etiopía).
  - *Condyloppia pilosella longiseta* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Chad.

Cryptoppia Csiszár, 1961 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cryptoppia elongata* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Cryptoppia brevisetiger* Wen, Aoki *et* Wang, 1984
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Cryptoppia elongata* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Cryptoppia mahunkai* (Wang *et* Li, 1997) (*Pulchroppia*)
(=*Pulchroppia elegans* Mahunka, 1988, *nom. praeoc.* por Hammer, 1979)
(=*Pulchroppia mahunkarum* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).

Cubaoppia Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia fusisetosa* Balogh *et* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cubaoppia fusisetosa* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Graptoppia Balogh, 1983 (21 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: (*Dameosoma foveolatum* Paoli *sensu* Bernini, 1973) =*Graptoppia paraanalis* Subías *et* Rodríguez, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana), subtropical y austral.

Graptoppia (Graptoppia) Balogh, 1983 (11 spp. y 1 ssp.)
(=***Frondoppia*** Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.
- *Graptoppia (G.) alzueti* Martínez *et* Palacios-Vargas, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Graptoppia (G.) arenaria* Ohkubo, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Graptoppia (G.) exigua* (Mahunka, 1983) (*Frondoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil y Norte de Neotropical.
- *Graptoppia (G.) jyotikanae* Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2006
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Graptoppia (G.) neonominata* Subías, 2004
  (=*Oppia parva* Kok, 1967, *nom. praeoc.* por Lombardini, 1952)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Congo) y Paleártica meridional (Europa meridional e Irán).
- *Graptoppia (G.) nukusia* (Shtanchaeva, 1984) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Graptoppia (G.) paraanalis* Subías *et* Rodríguez, 1985
  (=*Stenoppia italica quinquepilosa* Morell, 1987)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Graptoppia (G.) paradoxa* Ivan *et* Vasiliu, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Graptoppia (G.) pentagona* (Alzuet, 1981) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Graptoppia (G.) sundensis (Hammer, 1979) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.
- *Graptoppia (G.) sundensis sundensis* (Hammer, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Graptoppia (G.) sundensis acuta* Ayyildiz, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.

- *Graptoppia (G.) tanaitica* Karppinen *et* Poltavskaja, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Graptoppia (Apograptoppia) Subías *et* Rodríguez, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma foveolatum* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Graptoppia (Apograptoppia) foveolata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
  (=*Graptoppia (Apograptoppia) paolii* Ohkubo, 1993)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica meridional: Mediterránea e Irán, y Canadá).

Graptoppia (Stenoppia) Balogh, 1983 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Oppia heterotricha* Bernini, 1969) =*Oppia italica* Bernini, 1973
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.
- *Graptoppia (Stenoppia) africana* Mahunka, 1987 (*G.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Graptoppia (Stenoppia) angusta* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Graptoppia (Stenoppia) crista* Ohkubo, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Graptoppia (Stenoppia) italica* (Bernini, 1973) (*Oppia*)
  (=*Oppia heterotricha* Bernini, 1969, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Mahunka, 1969)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y Vietnam.
- *Graptoppia (Stenoppia) luisi* Ermilov *et* Frolov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Graptoppia (Stenoppia) magallanesensis* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Graptoppia (Stenoppia) multicorrugata* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Graptoppia (Stenoppia) quathlambae* (Kok, 1967) (*Brachioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Graptoppia (Stenoppia) royi* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

Helioppia Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia sol* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Helioppia sol* (Balogh, 1959) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.

Intermedioppia Subías *et* Rodríguez, 1987 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia alvarezi* Pérez-Íñigo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Intermedioppia alvarezi* (Pérez-Íñigo, 1982) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].

Javieroppia Mínguez *et* Subías, 1986 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Javieroppia cervus* Mínguez *et* Subías, 1986
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Australiana.
- *Javieroppia cervus* Mínguez *et* Subías, 1986
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán) y Australia.

Multioppia Hammer, 1961 (49 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Multioppia radiata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Multioppia (Multioppia) Hammer, 1961 (28 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Multioppia (M.) australis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Multioppia (M.) biciliata* Akrami *et* Bastan, 2015
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Multioppia (M.) callatisiana* Vasiliu *et* Ivan, 2009
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Multioppia (M.) chilensis* Ermilov *et* Pešić, 2011
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Multioppia (M.) engelmanni* (Călugăr *et* Vasiliu, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Multioppia (M.) furugelma* Rjabinin, 1987
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Multioppia (M.) gapsaensis* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Multioppia (M.) ghiljarovi* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Rusia asiática).
- *Multioppia (M.) gilmartinoi* Subías *et* Arillo, 1996
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Multioppia (M.) glabra* (Mihelčič, 1955) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Oeste de Siberia).
- *Multioppia (M.) indica* Haq, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Multioppia (M.) integra* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Multioppia (M.) neglecta* Pérez-Íñigo, 1969
(=*Multioppia excisa* Moritz, 1971)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: excepto Este, y U.S.A.: Nuevo Méjico) y Hawái.
- *Multioppia (M.) orghidani* Vasiliu *et* Ivan, 2009
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Multioppia (M.) pakistanensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Multioppia (M.) pauciramosa* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Multioppia (M.) perfecta* Mahunka *et* Topercer, 1983
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Multioppia (M.) pseudoglabra* Ermilov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Multioppia (M.) pulchra* Littlewood *et* Wallwork, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Multioppia (M.) radiata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Noreste de India e Irán.
- *Multioppia (M.) rangifera* Ivan *et* Vasiliu, 1999
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Multioppia (M.) shinanoensis* Fujita, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Multioppia (M.) simplitricha* Sanyal *et* Bhaduri, 1989
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Multioppia (M.) stellifera* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú, India e Irán.
- *Multioppia (M.) tamdao* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Multioppia (M.) tenue* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Multioppia (M.) turcica* Toluk, Ayyildiz *et* Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Multioppia (M.) xinjiangensis* L. Wang, Zheng, X. Wang, X. Zhang *et* Wen, 1990
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Multioppia (Furculoppia) Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia furcata* Kunst, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Multioppia (Furculoppia) furcata* (Kunst, 1958) (*Oppia*)

(=*Oppia bulgarica* Mahunka, 1987)
(=*Oppia ramulifera* Kunst, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Multioppia (Hammeroppia) Vasiliu *et* Ivan, 2009 (16 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Multioppia wilsoni* Aoki, 1964
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Multioppia (Hammeroppia) bacilliseta* Ohkubo, 1996 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Multioppia (Hammeroppia) canariensis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Multioppia (Hammeroppia) crassuta* Fujikawa, 2003 (*Multiop.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Multioppia (Hammeroppia) formosana* Tseng, 1982 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Multioppia (Hammeroppia) gracilis* Hammer, 1972 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Polinesia (Tahití), Norte de Oriental y Brasil, y Japón.
- *Multioppia (Hammeroppia) insolita* Ivan *et* Vasiliu, 1999 (*M.*)
(no *Oppia insolita* Mihelčič, 1956, ?=*Multioppia (Hammeroppia) wilsoni laniseta*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Multioppia (Hammeroppia) insulana* Pérez-Íñigo, 1982 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], Hawái y Paleártica meridional (Macaronésica: Madeira, e Irán).
- *Multioppia (Hammeroppia) insularis* Mahunka, 1985 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Multioppia (Hammeroppia) longisetosa* Mahunka, 1986 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Multioppia (Hammeroppia) moritzi* Mahunka *et* Topercer, 1983 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Multioppia (Hammeroppia) similis* Mahunka, 1982 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Multioppia (Hammeroppia) spinifera* Mahunka, 1982 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Multioppia (Hammeroppia) translamellaris* Balogh *et* P. Balogh, 1986 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Multioppia (Hammeroppia) trembleyi* Mahunka, 1977 (*M.*)
(=*Multioppia calcarata* Mahunka, 1992)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
Multioppia (Hammeroppia) wilsoni Aoki, 1964 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Multioppia (Hammeroppia) wilsoni wilsoni* Aoki, 1964
(?=*Oppia carolinae* Jacot, 1938 *sp. inq.*)
(?=*Oppia carolinae barbatis* Jacot, 1938 *ssp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).
- *Multioppia (Hammeroppia) wilsoni hungarica* Mahunka, 1983 (*M. laniseta h.*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Multioppia (Hammeroppia) wilsoni laniseta* Moritz, 1966 (*M. l.*)
(?=*Oppia caporiacci* Valle, 1955 *sp. inq.*)
(?=*Dameosoma clavipectinatum lamellatum* Thamdrup, 1932 *ssp. inq.*, *nom. praeoc.* por Halbert, 1923)
(?=*Oppia insolita* Mihelčič, 1956 *sp. inq.*)
(?=*Oppia sexmaculata* Dalenius, 1950 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente), Paleártica oriental (excepto Este), "U.S.A." y Neotropical (Venezuela y Cuba).
- *Multioppia (Hammeroppia) yamatogracilis* Fujikawa, 2003 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Multioppia (Multilanceoppia) Subías, 1989 (4 spp. y 1ssp.)
ESPECIE TIPO: *Multioppia ramulifera carpatica* Schalk, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
Multioppia (Multilanceoppia) brevipectinata Suzuki, 1976 (*Multiop.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
- *Multioppia (Multilanceoppia) brevipectinata brevipectinata* Suzuki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
- *Multioppia (Multilanceoppia) brevipectinata lenis* Fujita *et* Fujikawa, 1986 (*Multiop.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Multioppia (Multilanceoppia) carpatica* Schalk, 1966 (*Multiop. ramulifera c.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Multioppia (Multilanceoppia) himachalensis* (Kardar *et* Mattu, 1999) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Himachal Pradesh).
- *Multioppia (Multilanceoppia) pankovi* Rjabinin, 1987 (*Multiop.*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Este de Rusia asiática.

Octoppia Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Octoppia irmayi* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Octoppia irmayi* Balogh *et* Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Pararamusella Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pararamusella disjuncta* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pararamusella disjuncta* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Pseudoamerioppia Subías, 1989 (8 spp.)
(=***Minoricoppia*** Pérez-Íñigo jr., 1991)
ESPECIE TIPO: (*Oppia barrancensis paraguayensis* Balogh *et* Mahunka, 1981) =*Oppia barrancensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical (Paleártica meridional) y Neártica.
- *Pseudoamerioppia ankae* (Mahunka, 1974) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Pseudoamerioppia balearica* (Pérez-Íñigo jr., 1991) (*Minoricoppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Pseudoamerioppia barrancensis* (Hammer, 1961) (*Oppia*)
(=*Oppia barrancensis paraguayensis* Balogh *et* Mahunka, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental (Filipinas), Etiópica (Camerún) e I. Canarias.
- *Pseudoamerioppia circumciliata* (Balogh, 1959) (*Oppia deficiens c.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Camerún).
- *Pseudoamerioppia floralis* (Ohkubo, 1990) (*Ramusella*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pseudoamerioppia javensis* (Hammer, 1979) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Australiana (Hawái).
- *Pseudoamerioppia lamellata* (Wallwork, 1961) (*Oppia deficiens l.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Tanzania).
- *Pseudoamerioppia minuta* (Ewing, 1917) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.

Pulchroppiella Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia plurisetosa* Mihelčič, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Pulchroppiella littlewoodae* Subías, 1989
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Pulchroppiella plurisetosa* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Ramonoppia Morell, 1990 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ramonoppia amparoae* Morell, 1990
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Ramonoppia aequiseta* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ramonoppia amparoae* Morell, 1990
DISTRIBUCIÓN: España.

Ramusella Hammer, 1962 (86 spp. y 4 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Ramusella puertomonttensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Ramusella (Ramusella) Hammer, 1962 (27 spp. y 1 ssp.)
(=***Alcioppia*** Balogh, 1983)
(=***Amolops*** Hull, 1916, *nom. praeoc.* por Cope, 1865)
(=***Bioppia*** Mahunka *et* Paoletti, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Ramusella (R.) arcuata* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Ramusella (R.) assimiloides* Subías *et* Rodríguez, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ramusella (R.) baichengensis* (Zhao *et* Wen, 1992) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Ramusella (R.) chulumaniensis* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.
- *Ramusella (R.) clavipectinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
(=*Oppia alamellata* Kardar, 1977)
(=*Dameosoma alces* Jacot, 1934)
(=*Oppia assimilis* Mihelčič, 1956)
(=*Oppia taminae* Rjabinin, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: California, Etiópica: Malgache y Sudáfrica, Oriental, Hawái y Méjico).
- *Ramusella (R.) confusa* Arillo *et* Subías, 1990
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Macaronésica (Madeira) e Irán.
- *Ramusella (R.) cordobensis* (Balogh *et* Mahunka, 1968) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Ramusella (R.) curtipilus* Hammer, 1971 (*R. chulumaniensis c.*)
(=*Oppia nana* Woas, 1986)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana: Islas del Pacífico, Neotropical y Oriental: Bali y Taiwán [Formosa]) y Paleártica meridional (Irán).

- *Ramusella (R.) defectuosa* Subías *et* Rodríguez, 1987
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ramusella (R.) filamentosa* (Mahunka, 1985) (*Brachioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Ramusella (R.) filigera* (Mahunka, 1985) (*Brachioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Ramusella (R.) gyrata* (Mahunka *et* Paoletti, 1984) (*Bioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Italia e Irán).
- *Ramusella (R.) hainardorum* (Mahunka, 1992) (*Uroppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Ramusella (R.) hippy* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Ramusella (R.) junonis* Pérez-Íñigo, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y Neotropical.
- *Ramusella (R.) kumaensis* Fujikawa, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ramusella (R.) lyroseta* (Wallwork, 1964) (*Oppia fusiformis l.*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Camerún).
- *Ramusella (R.) paillei* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Marruecos.
- *Ramusella (R.) persica* Akrami, Behmanesh *et* Subías, 2015
  (=*Ramusella iranica* Behmanesh, Akrami y Subías, 2012, *nom. praeoc.* por Akrami *et* Subías, 2008)
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ramusella (R.) philippinensis* (Mahunka, 1982) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Ramusella (R.) pinifera* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).
- *Ramusella (R.) puertomonttensis* Hammer, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (India: Bengala Occidental, y Vietnam), Australiana (Melanesia: I. Fiji), y Neotropical (Chile y Brasil), y subtropical: Paleártica meridional.
- *Ramusella (R.) remyi* (Karppinen, 1966) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Guinea.

Ramusella (R.) sengbuschi Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.

- *Ramusella (R.) sengbuschi sengbuschi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.
- *Ramusella (R.) sengbuschi tokyoensis* (Aoki, 1974) (*Oppia t.*)
  (=*Ramusella tuberculata* Mahunka *et* Topercer, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Ramusella (R.) tasetata* Subías, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán y Etiópica (Congo y Tanzania).
- *Ramusella (R.) translamellata* Subías, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ramusella (R.) triacantha* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Ramusella (Dosangoppia) Ermilov *et* Frolov, 2019 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ramusella (Dosangoppia) bochkovi* Ermilov *et* Frolov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Ramusella (Dosangoppia) bochkovi* Ermilov *et* Frolov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea.

Ramusella (Insculptoppia) Subías, 1980 (41 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma insculptum* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Ramusella (Insculptoppia) alata* (Mahunka, 1997) (*Sphagnoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Ramusella (Insculptoppia) alejnicovae* (Krivolutsky *et* Gatilova, 1974) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Ramusella (Insculptoppia) ananthakrishni* (Sanyal *et* Bhaduri, 1989) (*Brachioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Ramusella (Insculptoppia) anuncata* Subías *et* Rodríguez, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ramusella (Insculptoppia) berninii* (Pérez-Íñigo, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ramusella (Insculptoppia) cavernalis* (Ohkubo *et* Cokendolpher, 2002) (*I.*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A.
- *Ramusella (Insculptoppia) claudelionsi* (Călugăr *et* Vasiliu, 1983) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Ramusella (Insculptoppia) corniculata* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Ramusella (Insculptoppia) crenata* (Mahunka, 1992) (*I.*)
  DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Ramusella (Insculptoppia) elliptica* (Berlese, 1908) (*Lohmannia*)

(=*Ramusella abarkouhiensis* Bayartogtokh *et* Akrami, 2000)
(=*Insculptoppia lamellata* Pérez-Íñigo jr., 1991)
DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical: Paleártica (Mediterránea: frecuente, e Irán), U.S.A. (Nuevo Méjico), Neotropical (Costa Rica) y Oriental (Vietnam).
- *Ramusella (Insculptoppia) elmela* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Ramusella (Insculptoppia) ermani* Baran, 2010 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) farsi* Akrami, Subías *et* Behmanesh, 2011
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ramusella (Insculptoppia) florisbadensis* Hugo-Coetzee, 2016
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Camerún).
- *Ramusella (Insculptoppia) furcata* (Willmann, 1928) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Ramusella (Insculptoppia) fusiformis* (Wallwork, 1961) (*Oppia soror f.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Ramusella (Insculptoppia) golosovae* (Rjabinin, 1987) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Ramusella (Insculptoppia) golbasiensis* Baran, 2010 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) insculpta* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
(=*Ramusella insularis* Rjabinin, 1987)
(=*Oppia laterostris* Mihelčič, 1953)
(=*Oppia shaldybinae* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte): frecuente, Paleártica oriental (Este de Paleártica oriental e Irán) y Vietnam.
- *Ramusella (Insculptoppia) iranica* Akrami *et* Subías, 2008
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ramusella (Insculptoppia) krivolutskyi* (Kulijev, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental, Asia centrooccidental y Noreste de China).
- *Ramusella (Insculptoppia) lata* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Ramusella (Insculptoppia) lunata* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Ramusella (Insculptoppia) luxtoni* (Ayyildiz, 1989) (*Gressittoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) merimna* (Balogh *et* Mahunka, 1977) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Ramusella (Insculptoppia) mussardi* (Mahunka, 1992) (*Graptoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Ramusella (Insculptoppia) neonominata* Subías, 2004
(=*Ramusella (Insculptoppia) corniculata* Ivan *et* Vasiliu, 1999, *nom. praeoc.* por Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Ramusella (Insculptoppia) paolii* Ivan *et* Vasiliu, 1999
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Ramusella (Insculptoppia) paraarcuata* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Ramusella (Insculptoppia) pinarbasiensis* Ayyildiz, Toluk *et* Taskiran, 2010
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) ramulifera* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ramusella (Insculptoppia) remota* (Ohkubo *et* Aoki, 1995) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Ramusella (Insculptoppia) salmani* Toluk *et* Ayyildiz, 2008
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) samiyai* Bayartogtokh *et* Yondon, 2019
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ramusella (Insculptoppia) seniczakae* Hugo-Coetzee, 2016
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Ramusella (Insculptoppia) sensiclavata* (Kardar, 1977) (*Oppia*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).
- *Ramusella (Insculptoppia) sheshanensis* (Wen, Aoki *et* Wang, 1984) (*Brachioppiella*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Ramusella (Insculptoppia) soror* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental y Cáucaso.
- *Ramusella (Insculptoppia) suciui* (Hammer, 1968) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Ramusella (Insculptoppia) terricola* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ramusella (Insculptoppia) tobiasi* Hugo-Coetzee, 2016
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Camerún).

Ramusella (Insculptoppiella) Subías *et* Rodríguez, 1986 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia alfonsii* Bernini, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Paleotropical.
- *Ramusella (Insculptoppiella) aepyornis* Mahunka, 1994 (*R.*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Ramusella (Insculptoppiella) alfonsii* (Bernini, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Ramusella (Insculptoppiella) bicillata* Ohkubo, 1996 (*R. (Insculptoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ramusella (Insculptoppiella) elongata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ramusella (Insculptoppiella) flagellaris* Ohkubo, 1996 (*R. (Insculptoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ramusella (Insculptoppiella) humicola* Wang *et* Li, 1997 (*R. (Insculptoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: China.
- *Ramusella (Insculptoppiella) pocsi* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Ramusella (Insculptoppiella) varians* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana e I. Santa Helena), Mediterránea oriental y Suroeste de Paleártica oriental.

Ramusella (Rectoppia) Subías, 1980 (10 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia mihelcici* Pérez-Íñigo, 1965
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).
- *Ramusella (Rectoppia) damavandica* Akrami *et* Subías, 2008
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ramusella (Rectoppia) eduardoi* Arillo *et* Subías, 1996
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Ramusella (Rectoppia) fasciata (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: excepto Norte, Neotropical, Somalia, India: Tripura, y subantártica: I. Amsterdam).
- *Ramusella (Rectoppia) fasciata fasciata* (Paoli, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional, Este de Paleártica oriental), "U.S.A. (Florida)", Somalia, India (Tripura) y subantártica (I. Amsterdam).
- *Ramusella (Rectoppia) fasciata sahariensis* (Hammer, 1975) (*Oppia s.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (frecuente).
- *Ramusella (Rectoppia) fasciata sudamericana* Pérez-Iñigo *et* Sarasola, 1998
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Ramusella (Rectoppia) ginchiensis* Ermilov *et* Rybalov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Ramusella (Rectoppia) incisiva* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Ramusella (Rectoppia) mihelcici* (Pérez-Íñigo, 1965) (*Oppia*)
(=*Oppia guelticola* Hammer, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Venezuela.
- *Ramusella (Rectoppia) pararadiata* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Ramusella (Rectoppia) radiata* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).
- *Ramusella (Rectoppia) rhinina* Subías *et* Mínguez, 1981
DISTRIBUCIÓN: España.

Ramusella (Rectoppia) strinatii (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ramusella (Rectoppia) strinatii strinatii* (Mahunka, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Ramusella (Rectoppia) strinatii curtiramosa* Subías *et* Rodríguez, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso).

Ramusella (Sabahoppia) Mahunka, 1987 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: (*Sabahoppia hauseri* Mahunka, 1987) =*Xenillus blattarum* Oudemans, 1911
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Ramusella (Sabahoppia) blattarum* (Oudemans, 1911) (*Xenillus*)
(=*Sabahoppia hauseri* Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Ramuselloppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ramuselloppia anomala* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Paleotropical.
- *Ramuselloppia anomala* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Ramuselloppia indistincta* Ermilov *et* Starý, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Ramuselloppia japonica* (Aoki, 1983) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ramuselloppia vietnamica* Ermilov *et* Anichkin, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Sceletoppia Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sceletoppia tana* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Sceletoppia tana* Mahuka *et* Mahuka-Papp, 2009

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Tainsculptoppia Subías *et* Shtanchaeva, 2011 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tainsculptoppia graptoppioides* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Tainsculptoppia graptoppioides* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Tainsculptoppia subiasi* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Oxyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.

Uroppia Balogh, 1983 (2 spp)
ESPECIE TIPO: *Oppia akusiensis* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Uroppia akusiensis* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana e India (Tripura).
- *Uroppia kenyaensis* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

[**Pulchroppiinae**] Balogh, 1983 (2 gen., 16 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.

Multipulchroppia Subías, 1989 (8 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Multioppia berndhauseri* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Multipulchroppia amazonica* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Multipulchroppia berndhauseri* (Mahunka, 1978) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión) y Japón.
- *Multipulchroppia graeca* (Mahunka, 1977) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Multipulchroppia gyoergyi* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Multipulchroppia pectinata* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Multioppia*)
(=*Multioppia vietnamica* Balogh, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
Multipulchroppia schauenbergi (Mahunka, 1978) (*Multioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión) y Japón.
  - *Multipulchroppia schauenbergi schauenbergi* (Mahunka, 1978)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
  - *Multipulchroppia schauenbergi punctulata* Ohkubo, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Multipulchroppia siamensis* (Suzuki, 1976) (*Multioppia*)
(=*Multioppia pectinata* Aoki, 1967, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Mahunka, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Multipulchroppia similis* (Hammer, 1979) (*Pulchroppia*)
DISTRIBUCIÓN: Java y Vietnam.

Pulchroppia Hammer, 1979 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pulchroppia elegans* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pulchroppia burckhardti* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Pulchroppia elegans* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pulchroppia granulata* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pulchroppia malapectinata* (Corpuz-Raros, 1979) (*Brachioppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Pulchroppia pendula* (Balogh, 1970) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Pulchroppia ramifera* Wang *et* Li, 1997
DISTRIBUCIÓN: China.
- *Pulchroppia roynortoni* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pulchroppia sculpturata* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

[**Arcoppiinae**] Balogh, 1983 (6 gen., 2 subgen., 82 spp. y 9 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Arcoppia Hammer, 1977 (60 spp. y 9 sspp.)
(=***Chuoppia*** Tseng, 1982)
ESPECIE TIPO: *Arcoppia brachyramosa* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Arcoppia aequivoca* Subías, 1989
(=*Arcoppia sabahensis* Mahunka, 1988, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1987)

(=*Arcoppia kalimantanensis* Ohkubo *et* Aoki, 1995)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Arcoppia arborea* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
Arcoppia arcualis (Berlese, 1913) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).
- *Arcoppia arcualis arcualis* (Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente).
- *Arcoppia arcualis curtiseta* Rodríguez *et* Subías, 1984
(=*Arcoppia arcualis novaezealandiae* Balogh *et* P. Balogh, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Arcoppia arcualis enghoffi* Rodríguez *et* Subías, 1984
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Arcoppia arcualis novaeguineae* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India (Andhra Pradesh).
- *Arcoppia bacilligera* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
Arcoppia bidentata Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Arcoppia bidentata bidentata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Arcoppia bidentata sabahensis* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Arcoppia bifilis* (Canestrini, 1898) (*Belba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia biflagellata* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Arcoppia brachyramosa* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán y Méjico.
- *Arcoppia campinaranensis* (Franklin *et* Woas, 1992) (*Oppia (A.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
Arcoppia corniculifera (Mahunka, 1978) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Arcoppia corniculifera corniculifera* (Mahunka, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Etiópica (Malgache: I. Mauricio, y Uganda), Centroamérica, Vietnam y Micronesia (Palau).
- *Arcoppia corniculifera fijiensis* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Nepal.
Arcoppia cronus (Jacot, 1934) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Arcoppia cronus cronus* (Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Arcoppia cronus papua* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia cronus winkleri* (Hammer, 1968) (*Oppia w.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Polinesia: Tahití).
- *Arcoppia cryptomeriae* (Mondal *et* Kundu, 1985) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Arcoppia curtipila* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Vietnam.
- *Arcoppia curvirostrata* Ohkubo *et* Aoki, 1995
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Arcoppia dechambrierorum* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Arcoppia dissimilis* (Berlese, 1905) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Arcoppia dissimiloides* (Sellnick, 1925) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
Arcoppia fenestralis (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Arcoppia fenestralis fenestralis* (Wallwork, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Arcoppia fenestralis orientalis* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (India nororiental y Vietnam).
- *Arcoppia fenestralis sinensis* (Mahunka, 1976) (*Oppia arcualis s.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Arcoppia flagellata* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Arcoppia goulikaoensis* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Arcoppia grucheti* (Mahunka, 1978) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Arcoppia guineana* Pérez-Íñigo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Arcoppia hammerae* Rodríguez *et* Subías, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Micronesia (Palau).

- *Arcoppia inaequirostris* Mahunka, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Arcoppia incerta* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Arcoppia indica* Sanyal, Sengupta, Saha *et* Chakraborty, 2000
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Arcoppia interrupta* Ohkubo, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Arcoppia kaindicola* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia longisetosa* Balogh, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Arcoppia luzonensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Arcoppia mahunkai* Rodríguez *et* Subías, 1984
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Arcoppia malaysiaensis* Ermilov *et* Kalúz, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Arcoppia mcadami* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India (Tripura).
- *Arcoppia meghalayensis* Sanyal, Sengupta, Saha *et* Chakraborty, 2000
  DISTRIBUCIÓN: India (Megalaya).
- *Arcoppia montana* Sanyal, Sengupta, Saha *et* Chakraborty, 2000
  DISTRIBUCIÓN: India (Himachal Pradesh).
- *Arcoppia obtusa* Mahunka, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Arcoppia palmaria* (Tseng, 1982) (*Chuoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Arcoppia perezinigoi* Rodríguez *et* Subías, 1984
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Arcoppia perisi* Rodríguez *et* Subías, 1984
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Arcoppia piffli* Mahunka, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Arcoppia porifera* (Franklin *et* Woas, 1992) (*Oppia (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Arcoppia praearcuata* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia radiata* (Wallwork, 1961) (*Oppia angolensis r.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Arcoppia rangifer* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia robusta* Mahunka, 1988
  (=*Arcoppia confusa* Subías, 1989)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Arcoppia robustia* (Berlese, 1913) (*Dameosoma arcuale r.*)
  (=*Arcoppia baloghi* Rodríguez *et* Subías, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Arcoppia rotunda* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Tripura).
- *Arcoppia rugosa* (Mahunka, 1974) (*Oppia*)
  (=*Arcoppia pergeli* Mahunka, 1982)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Arcoppia sambhui* Sanyal, Sengupta, Saha *et* Chakraborty, 2000
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Arcoppia semicostulata* (Mahunka, 1985) (*Pletzenoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Arcoppia serrulata* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Oriental (Vietnam).
- *Arcoppia tenuicoma* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
- *Arcoppia teraja* Mahunka, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Arcoppia tripartita* (Hammer, 1961) (*Oppia*)
  (=*Oppia gilva* Wallwork, 1961)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y África centrooccidental.
- *Arcoppia tripuraensis* Sanyal, Sengupta, Saha *et* Chakraborty, 2000
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Arcoppia triramosa* (Tseng, 1982) (*Chuoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Arcoppia varia* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Brasil.
- *Arcoppia viperea* (Aoki, 1959) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente), Oriental y Sudáfrica.
- *Arcoppia vittata* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Arcoppia waterhousei* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia y Oriental (Vietnam y Filipinas).

Basidoppia Mahunka, 1983 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Basidoppia basidii* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.
- *Basidoppia angolensis* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Uganda).
- *Basidoppia basidii* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Basidoppia curtispinosa* (Ohkubo, 1996) (*Arcoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Basidoppia demeteri* (Mahunka, 1982) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Madagascar).
- *Basidoppia pocsorum* Mahunka, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Basidoppia psyla* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Mimoppia Balogh, 1983 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia tenuiseta* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

Mimoppia (Mimoppia) Balogh, 1983 (1 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Mimoppia (M.) tenuiseta* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.

Mimoppia (Dysarcoppia) Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Arcoppia (Dysarcoppia) mexicana* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mimoppia (Dysarcoppia) dendropectinata* (Woas, 1986) (*Arcoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Mimoppia (Dysarcoppia) mexicana* (Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998) (*Arcoppia (D.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Porrhoppia Balogh, 1970 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Porrhoppia crux* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Porrhoppia crux* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Similoppia Mahunka, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Similoppia halterata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Similoppia (Similoppia) Mahunka, 1983 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Similoppia (S.) halterata* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Similoppia (Reductoppia) P. Balogh, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Reductoppia espeletiae* P. Balogh, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Similoppia (Reductoppia) espeletiae* (P. Balogh, 1984) (*R.*)
  DISTRIBUCIÓN: Colombia.

Wallworkoppia Subías, 1989 (10 spp.)
(=***Wallworkella*** Balogh, 1983, *nom. praeoc.* por ***Wallworkiella*** Hammer, 1979)
ESPECIE TIPO: *Oppia trimucronata* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Wallworkoppia cervifer* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
  (=*Arcoppia longiramosa* Woas, 1986)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Wallworkoppia directa* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007) (*Arcoppia (W.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Etiopía).
- *Wallworkoppia machadoi* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
  (=*Arcoppia granulata* Mahunka, 1986)
  DISTRIBUCIÓN: África centrooriental (frecuente) y Ecuador.
- *Wallworkoppia minima* (Ermilov, Rybalov *et* Hundama, 2014) (*Arcoppia (W.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Wallworkoppia parasensillus* (Mahunka, 1999) (*Arcoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Wallworkoppia secata* (Mahunka, 1999) (*Arcoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Wallworkoppia tetraciliata* Ermilov, 2018

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Wallworkoppia trimucronata* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Uganda).
- *Wallworkoppia tuberosa* (Mahunka, 1988) (*Arcoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Wallworkoppia vibrissa* (Mahunka, 1983) (*Wallworkella*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).

[**Brachioppiinae**] Subías, 1989 (10 gen., 3 subgen., 73 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y austral.

Austroppia Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Oppia magellanis* Hammer, 1962) =*Notaspis crozetensis* Richters, 1908
DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica y austral (Neotropical y Australiana).
- *Austroppia crozetensis* (Richters, 1908) (*Notaspis*)
(=*Oppia crozetensis anareensis* Dalenius, 1958)
(=*Oppia magellanis* Hammer, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica (frecuente), América austral (Tierra del Fuego) y Nueva Zelanda.
- *Austroppia petrohuensis* (Hammer, 1962) (*Brachioppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Brachioppia Hammer, 1961 (24 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachioppia cuscensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Brachioppia (Brachioppia) Hammer, 1961 (16 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Brachioppia (B.) cajamarcensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil) e India (Bengala Occidental).
- *Brachioppia (B.) cuscensis* Hammer, 1961
(=*Oppia guarani* Balogh *et* Mahunka, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente), Norte de India y Japón.
- *Brachioppia (B.) deliciosa* Hammer, 1961
(=*Oppia pseudocostulata* Balogh *et* Mahunka, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: frecuente.
- *Brachioppia (B.) euramosa* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Brachioppia (B.) excrescens* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppia (B.) glabra* Franklin *et* Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Brachioppia (B.) insolita* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Brachioppia (B.) koki* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppia (B.) louwi* Hugo-Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppia (B.) mandelai* (Hugo-Coetzee, 2014) (*Kokoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppia (B.) palmata* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppia (B.) pectinata* Kok, 1967
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Tripura).
- *Brachioppia (B.) rafalskii* (Hammer, 1968) (*Brachioppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Argentina.
- *Brachioppia (B.) triglochin* (Balogh *et* Mahunka, 1977) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Brachioppia (B.) triramosa* (Sellnick, 1924) (*Dameosoma*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Brachioppia (B.) tropicalis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).

Brachioppia (Kokoppia) Balogh, 1983 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachioppia longisetosa* Kok, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Brachioppia (Kokoppia) dendricola* (Jeleva *et* Vũ, 1987) (*Cryptoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Brachioppia (Kokoppia) dudichi* (Balogh, 1982) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Brachioppia (Kokoppia) gracilis* (Woas, 1986) (*Arcoppia*)
DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Brachioppia (Kokoppia) inclinata* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Cuba).
- *Brachioppia (Kokoppia) kaaimansensis* (Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2019) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppia (Kokoppia) lagunaensis* (Ermilov, 2019) (*K.*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Brachioppia (Kokoppia) longisetosa* Kok, 1967 (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppia (Kokoppia) murvanidzeae* (Hugo-Coetzee, 2017) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Brachioppiella Hammer, 1962 (28 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Brachioppiella periculosa* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.

Brachioppiella (Brachioppiella) Hammer, 1962 (13 spp.)
(=***Ugandoppia*** Mahunka, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Brachioppiella (B.) bifurcata* (Mahunka, 1998) (*Ugandoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Brachioppiella (B.) biseriata* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Brachioppiella (B.) boraha* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Brachioppiella (B.) dawidi* Hugo-Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppiella (B.) goblina* Hugo-Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppiella (B.) hannecarti* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Brachioppiella (B.) higginsi* (Hammer, 1968) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Brachioppiella (B.) paranasalis* Lee *et* Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Brachioppiella (B.) periculosa* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India.
- *Brachioppiella (B.) rajskii* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Brachioppiella (B.) ramosa* (Karppinen, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Guinea.
- *Brachioppiella (B.) triramosa* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Brachioppiella (B.) walkeri* (Hammer, 1968) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Brachioppiella (Gressittoppia) Balogh, 1983 (15 spp. y 1 ssp.)
(=***Jermyia*** Mahunka, 2002)
ESPECIE TIPO: *Brachioppia moresonensis* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Austral y subtropical austral.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) baderi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) corallifera* (Mahunka, 1985) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) hartensteini* (Hammer, 1968) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) incisa* Martínez *et* Palacios-Vargas, 2006
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) magna* Lee *et* Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) martinezi* Hugo-Coetzee, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) minima* Lee *et* Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) moresonensis* (Kok, 1967) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) orkneyensis* (Kok, 1967) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica: I. Orcadas del Sur (I. Orkney).
Brachioppiella (Gressittoppia) pepitensis (Hammer, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Antártica (I. Shetland del Sur).
  - *Brachioppiella (Gressittoppia) pepitensis pepitensis* (Hammer, 1962)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Antártica.
  - *Brachioppiella (Gressittoppia) pepitensis brevipectinata* (Covarrubias, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Shetland del Sur).
- *Brachioppiella (Gressittoppia) pocsi* (Mahunka, 2002) (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) pseudohigginsi* Lee *et* Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) ricknuttalli* Hugo-Coetzee, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Brachioppiella (Gressittoppia) sensilla* (Mahunka, 2002) (*Jermyia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Brachioppiella (Gressittoppia) usheri* (P. Balogh, 1988) (*Solenoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

Brassoppia Balogh, 1983 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia brassi* Balogh, 1981
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical austral.

Brassoppia (Brassoppia) Balogh, 1983 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Brassoppia (B.) brassi* (Balogh, 1982) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Brassoppia (B.) lamellata* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Brassoppia (Plaesioppia) Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Brachioppiella peullaensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Brassoppia (Plaesioppia) peullaensis* (Hammer, 1962) (*Brachioppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.

Ctenoppia Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia variopectinata* Balogh *et* Mahunka, 1975
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Ctenoppia eupectinata* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Ctenoppia variopectinata* (Balogh *et* Mahunka, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Gittella Hammer, 1961 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Gittella punctata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Gittella ecuadoriensis* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Gittella flagellata* (Mahunka, 1983) (*Pulchroppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Gittella insularis* Mahunka, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Antillas y Bolivia).
- *Gittella maxima* (Balogh *et* Mahunka, 1981) (*Multioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Gittella minor* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Gittella punctata* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Gittella variabilis* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Ecuador y Perú).

Leptoppia Mahunka, 1997 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Leptoppia procera* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Leptoppia benyovszkyi* Mahunka, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Leptoppia procera* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Pletzenoppia Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia pletzenae* Kok, 1967
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pletzenoppia aseta* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pletzenoppia pletzenae* (Kok, 1967) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Setuloppia Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia newelli* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Setuloppia newelli* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Trapezoppia Balogh *et* Mahunka, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tanzoppia longipectinata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Trapezoppia longipectinata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Trapezoppia nova* Franklin *et* Woas, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

[**Medioppiinae**] Subías *et* Mínguez, 1985 (11 gen., 3 subgen., 79 spp. y 5 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Congoppia Balogh, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia deboissezoni* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Congoppia deboissezoni* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Oppia*)
(=*Congoppia extrema* Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental y Vietnam.
- *Congoppia ramisetosa* (Sanyal *et* Bhaduri, 1989) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).

Discoppia Balogh, 1983 (5 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia limae* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.

Discoppia (Discoppia) Balogh, 1983 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Discoppia (D.) limae* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).

Discoppia (Cylindroppia) Subías *et* Rodríguez, 1986 (4 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia minus cylindrica* Pérez-Íñigo, 1965
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.
- *Discoppia (Cylindroppia) casuarina* (Abd-el-Hamid, Hussein, Bayoumi *et* Al-Assiuty, 1983) (*Oppia*)
(=*Oppia bifidus* Bayoumi *et* Al-Khalifa, 1985)
(=*Oppia sitnikovae* Shereef, 1976, *nom. praeoc.* por Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
Discoppia (Cylindroppia) cylindrica (Pérez-Íñigo, 1965) (*Oppia minus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental, Norte de Neotropical y Tanzania.
- *Discoppia (Cylindroppia) cylindrica cylindrica* (Pérez-Íñigo, 1965)
(=*Oppia agricola* Fujikawa, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y tropical: Vietnam y Panamá.
- *Discoppia (Cylindroppia) cylindrica rostroincisa* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental, Antillas (La Española: R. Dominicana) y Tanzania.
- *Discoppia (Cylindroppia) pentasetata* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Discoppia (Cylindroppia) tenuis* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Medioxyoppia Subías, 1989 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia yuwana* Aoki, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Medioxyoppia actirostrata* (Aoki, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Medioxyoppia acuta* (Aoki, 1984) (*Oxyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Medioxyoppia hamata* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Medioxyoppia mastigophora* (Golosova, 1970) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Medioxyoppia nagasatoensis* Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Medioxyoppia nagoyae* Ohkubo, 1991
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Medioxyoppia trionus* Fujikawa, 2015
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Medioxyoppia yuwana* (Aoki, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Microppia Balogh, 1983 (2 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma minus* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Microppia arcuata* Gordeeva *et* Tarba, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
Microppia minus (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Microppia minus minus* (Paoli, 1908)
(=*Oppia minus simplex* Jacot, 1938)
(=*Oppia minutissima* Sellnick, 1950)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente en Paleártica).
- *Microppia minus longisetosa* Subías *et* Rodríguez, 1988
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y Argentina.

Miroppia Hammer, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Miroppia zealandica* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Miroppia zealandica* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Multimedioppia Subías, 1991 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Multimedioppia mirena* Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Multimedioppia mirena* Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Quattoppiella Hugo-Coetzee, 2014 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppiella (Quattoppiella) goldengatensis* Hugo-Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN:Etiópica.
- *Quattoppiella goldengatensis* (Hugo-Coetzee, 2014) (*Oppiella (Q.)*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Ramuloppia Balogh, 1961 (1 sp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia ramiseta* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.
Ramuloppia ramiseta (Balogh, 1959) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Cáucaso.
- *Ramuloppia ramiseta ramiseta* (Balogh, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Etiopía) y Cáucaso.
- *Ramuloppia ramiseta atypica* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.

Rhinoppia Balogh, 1983 (46 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia nasuta* Moritz, 1965
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Oriental y Antártica).

Rhinoppia (Rhinoppia) Balogh, 1983 (40 spp. y 3 sspp.)
(=***Kunoppia*** Mahunka, 1987)
(=***Medioppia*** Subías *et* Mínguez, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Oriental y Antártica).
- *Rhinoppia (R.) alidagiensis* Toluk, 2016
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) arilloi* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) artvinensis* Toluk *et* Ayyildiz, 2008
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) bagnalli* (Hull, 1916) (*Amolops*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Rhinoppia (R.) berzosai* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) centrodentata* (Gordeeva *et* Niemi, 1990) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Rhinoppia (R.) debililamellata* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Rhinoppia (R.) eduardoi* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) elifae* Toluk, Ayyildiz *et* Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) epilata* (Miko, 2006) (*Oppiella (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Rhinoppia (R.) exobothridialis* Toluk *et* Ayyildiz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) gomozovae* (Gordeeva *et* Karppinen, 1988) (*Ctenoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Rhinoppia (R.) heterotricha* (Ivan *et* Vasiliu, 1997) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
Rhinoppia (R.) hygrophila (Mahunka, 1987) (*Kunoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Rhinoppia (R.) hygrophila hygrophila* (Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Rhinoppia (R.) hygrophila multiciliata* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Rhinoppia (R.) incognita* (Vasiliu *et* Ivan, 2011) (*Lauroppia*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Rhinoppia (R.) lamellata* (Golosova *et* Karppinen, 1985) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Rhinoppia (R.) loksai* (Schalk, 1966) (*Oppia*)
(=*Ctenoppiella oblongata* Gordeeva *et* Melamud, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Europa suroriental.
- *Rhinoppia (R.) mahunkai* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) media* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)

(=*Medioppia templadoi* Pérez-Íñigo, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (frecuente) y Perú.
- *Rhinoppia (R.) melisi* (Valle, 1949) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Rhinoppia (R.) mikoi* (Mahunka, 2007) (*Oppiella (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Rhinoppia (R.) minidentata* (Subías *et* Rodríguez, 1988) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Rhinoppia (R.) minimedia* (Arillo *et* Subías, 1990) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Rhinoppia (R.) monicae* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) nasuta* (Moritz, 1965) (*Oppia*) *nom. protect.*
(*nom. praeoc.* por *Oppia nasuta* Mihelčič, 1953 *sp. inq.*, *nom. oblit.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
Rhinoppia (R.) obsoleta (Paoli, 1908) (*Dameosoma fallax o.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente, Groenlandia y Australiana (Nueva Zelanda y Hawái).
- *Rhinoppia (R.) obsoleta obsoleta* (Paoli, 1908)
(=*Dameosoma vitrinum* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente, Groenlandia y Australiana (Nueva Zelanda y Hawái).
- *Rhinoppia (R.) obsoleta curtiramosa* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Rhinoppia (R.) ordunensis* (Iturrondobeitia *et* Saloña, 1988) (*Lauroppia*)
(=*Oppiella acutirostris* Pérez-Íñigo jr., 1990)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centrooccidental e Irán).
- *Rhinoppia (R.) parapectinata* (Rjabinin, 1987) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Rhinoppia (R.) paraundulata* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).
- *Rhinoppia (R.) parva* (Lombardini, 1952) (*Oppia*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Rhinoppia (R.) pinsapi* (Arillo *et* Subías, 1996) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) producta* (Iturrondobeitia *et* Arillo, 1997) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) samaina* (Mahunka, 2001) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Rhinoppia (R.) subpectinata* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)
(=*Dameosoma subpectinatum aberratum* Thamdrup, 1932)
(=*Oppia globosa* Mihelčič, 1956)
(=*Oppia paoliana* Cooreman, 1941)
(=*Oppia tuberculata* Bulanova-Zachvatkina, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: excepto Este de Paleártica oriental (frecuente en Paleártica occidental), y Senegal.
- *Rhinoppia (R.) tridentata* (Subías *et* Mínguez, 1985) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (Ibérica y Rumanía).
- *Rhinoppia (R.) trilobata* (Khanbekyan *et* Gordeeva, 1991) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Rhinoppia (R.) truncata* (Iturrondobeitia *et* Saloña, 1988) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) undulata* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2010) (*Lauroppia (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Rhinoppia (R.) vera* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Rhinoppia (R.) zaballosi* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Marruecos.

Rhinoppia (Paramedioppia) Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000 (7 spp.)
(=***Bipectinoppia*** Subías *et* Shtanchaeva, 2011)
ESPECIE TIPO: *Paramedioppia helvetica* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Rhinoppia (Paramedioppia) bipectinata* (Akrami *et* Subías, 2007) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Rhinoppia (Paramedioppia) emarginata* Toluk *et* Ayyildiz, 2009 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (Paramedioppia) helvetica* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Rhinoppia (Paramedioppia) outereloi* Subías *et* Shtanchaeva, 2011 (*R. (Bipectinoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Rhinoppia (Paramedioppia) plumata* (Gordeeva *et* Karppinen, 1988) (*Ctenoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Rhinoppia (Paramedioppia) tasdemiri* Toluk *et* Ayyildiz, 2008 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Rhinoppia (Paramedioppia) variopectinata* Toluk *et* Ayyildiz, 2010 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Serratoppia Subías *et* Mínguez, 1985 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia serrata* Mihelčič, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Serratoppia duffyi* (Evans, 1954) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Serratoppia guanicola* Subías *et* Arillo, 1996
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Serratoppia intermedia* Subías *et* Rodríguez, 1988
(?=*Serratoppia toletana* Muñoz-Mingarro, 1987 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Serratoppia iranica* Akrami, Subías *et* Saboori, 2009
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Serratoppia minima* Subías *et* Rodríguez, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ibérica y Costa Rica.
- *Serratoppia mitrofanovi* (Gordeeva *et* Karppinen, 1988) (*Berniniella*)
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Serratoppia serrata* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Venezuela.

Solenoppia Hammer, 1968 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Solenoppia grandjeani* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Austral (Australiana, antártica y subantártica).

Solenoppia (Solenoppia) Hammer, 1968 (3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana austral.
- *Solenoppia (S.) grandjeani* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Solenoppia (S.) taberlyi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Solenoppia (S.) travei* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Solenoppia (Campbelloppia) Luxton, 1985 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia diaphora* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica.
- *Solenoppia (Campbelloppia) diaphora* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Solenoppia (Campbelloppia) pernettyae* P. Balogh, 1988 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

[**Oppiellinae**] Seniczak, 1975 (16 gen., 6 subgen., 157 spp. y 21 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Belloppia Hammer, 1968 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Belloppia wallworki* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Austral (Australiana y Antártica) y Oriental.
- *Belloppia beemanensis* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Belloppia bella* Ermilov *et* Minor, 2018
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Belloppia evansi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Belloppia shealsi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Belloppia wallworki* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana austral.

Berniniella Balogh, 1983 (30 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia aeoliana* Bernini, 1973
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica, Oriental y Neotropical).

Berniniella (Berniniella) Balogh, 1983 (29 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica, Oriental y Neotropical).
- *Berniniella (B.) aeoliana* (Bernini, 1973) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Berniniella (B.) aequivoca* Subías, 2019 *sp. inq.*
(=*Oppia hungarica* Bayoumi, 1979, *nom. praeoc.* por Karpelles, 1893)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Berniniella (B.) berninii* Ivan *et* Vasiliu, 1997
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Berniniella (B.) bicarinata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
(=*Oppia similis* Mihelčič, 1953)
(=*Oppia triconica* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente), Madagascar y Vietnam.
- *Berniniella (B.) carinatissima* Subías, Rodríguez *et* Mínguez, 1987

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Berniniella (B.) conjuncta* (Strenzke, 1951) (*Oppia sigma c.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Berniniella (B.) extrudens* Subías, Rodríguez *et* Mínguez, 1987
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Berniniella (B.) fissurata* Ivan *et* Vasiliu, 1997
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Berniniella (B.) formosa* Gordeeva *et* Karppinen, 1988
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Berniniella (B.) grandis* Gordeeva, 1991
DISTRIBUCIÓN: Centro de Rusia europea.
- *Berniniella (B.) inornata* (Mihelčič, 1957) (*Oppia*)
(=*Oppia simplex* Mihelčič, 1956, *nom. praeoc.* por Jacot, 1938)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (frecuente).
- *Berniniella (B.) intrudens* Subías, Rodríguez *et* Mínguez, 1987
DISTRIBUCIÓN: España y Cuba.
- *Berniniella (B.) iranica* Akrami, 2012
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Berniniella (B.) jahnae* (Sellnick, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Berniniella (B.) kazakovi* Gordeeva *et* Melamud, 1991
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Berniniella (B.) latidens* Subías, Rodríguez *et* Mínguez, 1987
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Berniniella (B.) lunaris* (Evans, 1952) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Berniniella (B.) minuta* (Bulanova-Zachvatkina, 1964) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
- *Berniniella (B.) nana* Gordeeva, 1991
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Centro de Rusia europea y Asia centroocidental).
- *Berniniella (B.) parasigma* Iturrodobeitia, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Turquía).
- *Berniniella (B.) robusta* Ivan *et* Vasiliu, 1997
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Berniniella (B.) rossica* Gordeeva, 1991
DISTRIBUCIÓN: Centro de Rusia europea.

Berniniella (B.) serratirostris (Golosova, 1970) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica centromeridional y U.S.A.: Carolina del Norte).
- *Berniniella (B.) serratirostris serratirostris* (Golosova, 1970)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional, Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Carolina del Norte).
- *Berniniella (B.) serratirostris hauseri* (Mahunka, 1974) (*Oppia h.*)
(=*Berniniella coronata* Mahunka *et* Paoletti, 1984)
(=*Oppiella rafalskii* Opłotna *et* Rajski, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (excepto Norte) y Asia centrooccidental.
- *Berniniella (B.) serratirostris oscensis* Pérez-Íñigo jr., 1990 (*B. coronata o.*)
DISTRIBUCIÓN: España.

- *Berniniella (B.) setilonga* Iturrondobeitia *et* Saloña, 1988
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Berniniella (B.) sigma* (Strenzke, 1951) (*Oppia*)
(=*Berniniella sakeni* Gordeeva *et* Tarba, 1990)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Asia centrooccidental.
- *Berniniella (B.) silvatica* (Vasiliu *et* Călugăr, 1976) (*Oppia*)
(?=*Oppia azerbeidjanica* Kulijev, 1962 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Berniniella (B.) tenuis* Gordeeva *et* Melamud, 1991
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Berniniella (B.) tequila* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Berniniella (B.) tichomirovae* (Rjabinin, 1974) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN:Paleártica (Noreste de Rusia asiática y Ucrania).

Berniniella (Canaloppia) Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Berniniella (Canaloppia) borhidii* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Berniniella (Canaloppia) borhidii* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Dissorhina Hull, 1916 (13 spp. y 4 sspp.)
(=***Cosmoppia*** Balogh, 1983)
ESPECIE TIPO: (*Notaspis splendens* Koch *sensu* Michael, 1888) =*Eremaeus ornatus* Oudemans, 1900
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- *Dissorhina belgicae* (Wauthy *et* Ducarme, 2006) (*Hypogeoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Bélgica.
- *Dissorhina bulganensis* Bayartogtokh, 1999
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Dissorhina carpatica* (Gordeeva *et* Melamud, 1991) (*Cosmoppia longipilosa c.*)

DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Dissorhina cretensis* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Grecia (Creta).
- *Dissorhina longipilosa* (Kunst, 1958) (*Oppia ornata l.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Dissorhina longispina* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Dissorhina muranyii* Mahunka, 2007
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Dissorhina neotropicalis* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Dissorhina ornata (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y África oriental.
- *Dissorhina ornata ornata* (Oudemans, 1900)
(=*Oppia bolei* Tarman, 1958)
(=*Dameosoma captator* Hull, 1915)
(=*Dameosoma tricarinatum* Paoli, 1908)
(=*Dameosoma vetula* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: frecuente en Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental) y África oriental.
- *Dissorhina ornata corniculata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma tricarinatum c.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Dissorhina ornata globosa* (Paoli, 1908) (*Dameosoma tricarinatum g.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Europa meridional y U.S.A.: Florida).
- *Dissorhina ornata peloponnesiaca* (Mahunka, 1974) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Dissorhina ornata tunisica* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Túnez.

- *Dissorhina shqipetarica* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Albania.
- *Dissorhina signata* (Schwalbe, 1989) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (excepto Oeste).
- *Dissorhina tricarinatoides* (Dubinina, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Dissorhina uludagensis* Ayyildiz, Toluk *et* Taskiran, 2010
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Elaphoppia Balogh, 1983 (4 spp.)
(=***Parasynoppia*** Aoki, 1983)
ESPECIE TIPO: *Oppia quadripilosa* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Paleártica meridional.
- *Elaphoppia lapelerii* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Elaphoppia lienhardi* (Mahunka, 2001) (*Ptiloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Elaphoppia longisensillata* (Aoki, 1983) (*Parasynoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
- *Elaphoppia quadripilosa* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.

Hypogeoppia Subías, 1981 (5 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Hypogeoppia terricola* Subías, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental y Neotropical.
- *Hypogeoppia dungeri* Schwalbe, 1995
DISTRIBUCIÓN: Europea (Alemania e Italia).
- *Hypogeoppia exempta* (Mihelčič, 1958) (*Oppia*)
(?=*Oppia ornatissima* Mihelčič, 1953 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Hypogeoppia hypogea* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Hypogeoppia perezinigoi* Subías *et* Arillo, 1996
DISTRIBUCIÓN: España.

Hypogeoppia terricola Subías, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa, Java y Cuba.
- *Hypogeoppia terricola terricola* Subías, 1981
(=*Hypogeoppia festoneata* Moraza *et* Moreno, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa, Java y Cuba.
- *Hypogeoppia terricola salmanticensis* Morell, 1987 (*H. s.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Kulievia Vasiliu *et* Ivan, 1999 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia paradecipiens* Kulijev, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Kulievia paradecipiens* (Kulijev, 1967) (*Oppia*)
(=*Neotrichoppia (Confinoppia) calugarae* Mahunka, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional (excepto Oeste).

Lauroppia Subías *et* Mínguez, 1986 (30 spp. y 3 sspp.)
(=***Abchasiella*** Gordeeva *et* Tarba, 1990)
(=***Ctenoppiella*** Gordeeva *et* Karppinen, 1988)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma fallax* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Lauroppia articristata* (Aoki, 1988) (*Oppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Lauroppia baetica* Arillo *et* Subías, 1996
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Lauroppia beskidyensis* (Niemi *et* Skubala, 1993) (*Medioppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Europea (Polonia y Albania).
- *Lauroppia breviseta* Vasiliu *et* Ivan, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Lauroppia brevisimile* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Lauroppia commutata* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
- *Lauroppia compositocarinata* (Mihelčič, 1958) (*Oppia*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Lauroppia decempectinata* (Fujikawa, 1986) (*Mahunkella*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Lauroppia dentata* (Golosova *et* Karppinen, 1985) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Lauroppia denticulata* (Grishina, 1980) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Lauroppia distincta* (Vasiliu *et* Călugăr, 1981) (*Oppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Lauroppia doris* (E. Pérez-Iñigo, 1978) (*Oppia*)
  (=*Lauroppia obscura* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Lauroppia editae* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2002) (*Oppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.

Lauroppia falcata (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Lauroppia falcata falcata* (Paoli, 1908)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica e Irán.
- *Lauroppia falcata marginedentata* (Strenzke, 1951) (*Oppia*)
  (=*Hypogeoppia quadrituberculata* Mahunka, 1987)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa central e Irán).

- *Lauroppia fallax* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
  (=*Oppia aligarhiensis* Kardar, 1977)
  (=*Oppiella dubia* Hammer, 1962)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente en Paleártica occidental, India: Uttar Pradesh, Nueva Zelanda y Chile).
- *Lauroppia feideri* Vasiliu *et* Ivan, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Lauroppia getica* (Vasiliu *et* Călugăr, 1981) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Lauroppia gordeevae* Subías, 2020
  (=*Abchasiella dentata* Gordeeva *et* Tarba, 1990, *nom. praeoc.* por Golosova *et* Karppinen, 1985)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Lauroppia iranica* Akrami *et* Subías, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Irán y Rumanía).
- *Lauroppia lebedevi* (Rjabinin, 1975) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Lauroppia maritima (Willmann, 1929) (*Dameosoma falcatum m.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).

- *Lauroppia maritima maritima* (Willmann, 1929)
  (=*Oppia fissurata* Hammer, 1952)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Sur, y Neártica septentrional).
- *Lauroppia maritima acuminata* (Strenzke, 1951) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europea, Mongolia y Neártica septentrional).
- *Lauroppia maritima carinthiaca* (Mihelčič, 1963) (*Oppia*) *ssp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Lauroppia motasi* Vasiliu *et* Ivan, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Lauroppia notabilis* (Golosova *et* Karppinen, 1983) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Lauroppia orientalis* (Wen *et* Bu, 1988) (*Belloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Lauroppia persiangulfia* Akrami *et* Subías, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Lauroppia similifallax* Subías *et* Mínguez, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Lauroppia tenuipectinata* Subías *et* Rodríguez, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.

- *Lauroppia trapezoida* (Grishina, 1981) (*Oppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sur de Rusia europea y Paleártica oriental meridional).
- *Lauroppia tridentata* (Forsslund, 1942) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Euroatlántica y Cáucaso).
- *Lauroppia zachvatkini* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
  (=*Oppia bulanovae* Kulijev, 1962)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Liacaroppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppiella doryphoros* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.

- *Liacaroppia doryphoros* (Balogh *et* P. Balogh, 1983) (*Oppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Hawái y Méjico.

Moritzoppia Subías *et* Rodríguez, 1988 (28 spp. y 6 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia keilbachi* Moritz, 1969
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical, "Australiana" y subtropical.

Moritzoppia (Moritzoppia) Subías *et* Rodríguez, 1988 (27 spp. y 6 sspp.)
(=***Dentoppia*** Gordeeva, 2001)
(=***Drukoppia*** Gordeeva, 2001)
(=***Moritziella*** Balogh, 1983, *nom. praeoc.* por Börner, 1908)
(=***Tetroppia*** Gordeeva, 1999)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y subtropical.

- *Moritzoppia (M.) acuta* Toluk *et* Ayyildiz, 2010
  DISTRIBICIÓN: Turquía.
- *Moritzoppia (M.) cryptisetosa* (Bayartogtokh, 2010) (*Oppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Moritzoppia (M.) cuneocostulata* Bayartogtokh, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Moritzoppia (M.) dentifera* (Bayartogtokh *et* Gordeeva, 2001) (*Tetroppia (Dentoppia)*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Moritzoppia (M.) diversicostulata* Bayartogtokh, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Moritzoppia (M.) escotata (Subías *et* Rodríguez, 1986) (*Moritziella*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.

- *Moritzoppia (M.) escotata escotata* (Subías *et* Rodríguez, 1986)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Moritzoppia (M.) escotata sharipovi* Niemi *et* Skubala, 1993 (*M. s.*)
  DISTRIBUCIÓN: Polonia.

- *Moritzoppia (M.) guanicola* Vasiliu *et* Ivan, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Moritzoppia (M.) hamata* (Pearce, 1906) (*Notaspis*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Moritzoppia (M.) incisa* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000
  (=*Moritzoppia problematica* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2002)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Moritzoppia (M.) jamalica* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de Siberia.
- *Moritzoppia (M.) keilbachi* (Moritz, 1969) (*Oppia*)
  (=*Moritziella uherkovichi* Mahunka, 1985)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Etiopía y Neotropical.
- *Moritzoppia (M.) longilamellata* (Subías *et* Rodríguez, 1986) (*Moritziella*)
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Moritzoppia (M.) longohisterosoma* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Moritzoppia (M.) metulifera* (Bayartogtokh *et* Gordeeva, 2001) (*Tetroppia (Dentoppia)*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Moritzoppia (M.) minuta* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Moritzoppia (M.) montana* (Gordeeva *et* Bayartogtokh, 2001) (*Tetroppia (Drukoppia)*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Moritzoppia (M.) myrmophila (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.

- *Moritzoppia (M.) myrmophila myrmophila* (Gordeeva *et* Grishina, 1991)
  DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
- *Moritzoppia (M.) myrmophila altaica* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.

- *Moritzoppia (M.) nana* (Gordeeva *et* Bayartogtokh, 2001) (*Tetroppia (Drukoppia)*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Moritzoppia (M.) nikolskii* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de Siberia.
- *Moritzoppia (M.) nitens* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de Siberia.
- *Moritzoppia (M.) pinea* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Moritzoppia (M.) praestans* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
- *Moritzoppia (M.) punctata* (Mihelčič, 1958) (*Oppia*)
(?=*Oppia clavata* Mihelčič, 1953 *sp. inq.*)
(?=*Oppia nasuta* Mihelčič, 1953 *sp. inq., nom. oblit.*)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Moritzoppia (M.) sitnikovae* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Moritzoppia (M.) turcica* Toluk *et* Ayyildiz, 2010
DISTRIBICIÓN: Turquía.

Moritzoppia (M.) unicarinata (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Neotropical.
- *Moritzoppia (M.) unicarinata unicarinata* (Paoli, 1908)
(=*Oppia fixa* Mihelčič, 1956)
(=*Dameosoma formosum* Hull, 1914)
(=*Dameosoma minus lamellata* Halbert, 1923)
(=*Moritziella similis* Gordeeva *et* Grishina, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Norte de Neotropical.
- *Moritzoppia (M.) unicarinata clavigera* (Hammer, 1952) (*Oppia c.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.
- *Moritzoppia (M.) unicarinata cristata* (Subías *et* Rodríguez, 1986) (*Moritziella*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Moritzoppia (M.) unicarinata unicarinatoides* (Subías *et* Rodríguez, 1986) (*Moritziella*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Moritzoppia (M.) unicarinata yozgatensis* Toluk, Ayyildiz *et* Subías, 2007
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

- *Moritzoppia (M.) volcanensis* (Hammer, 1962) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Moritzoppia (Pentoppia) Subías, 2020 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia splendens* Koch, 1841
DISTRIBUCIÓN: Holártica y "Australiana".
- *Moritzoppia (Pentoppia) splendens* (Koch, 1841) (*Oppia*)
(=*Oppia lignivora* Jacot, 1939)
(=*Moritzoppia oreia* Colloff *et* Seyd, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y "Australiana".

Neostrinatina Mahunka, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Neostrinatina mixoppia* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Neostrinatina mixoppia* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

Neotrichoppia Subías *et* Iturrondobeitia, 1980 (10 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Neotrichoppia pseudoconfinis* Subías *et* Iturrondobeitia, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Neotrichoppia (Neotrichoppia) Subías *et* Iturrondobeitia, 1980 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Neotrichoppia (N.) pseudoconfinis* Subías *et* Iturrondobeitia, 1980
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Neotrichoppia (Ancestroppia) Subías *et* Rodríguez, 1986 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Neotrichoppia (Ancestroppia) berninii* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Neotrichoppia (Ancestroppia) berninii* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Neotrichoppia (Confinoppia) Subías *et* Rodríguez, 1986 (8 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma confine* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Neotrichoppia (Confinoppia) adanata* Iturrondobeitia *et* Saloña, 1988
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Neotrichoppia (Confinoppia) beresi* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Neotrichoppia (Confinoppia) brevicostulata* (Bayartogtokh, 2010) (*Berniniella (Hypogeoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Neotrichoppia (Confinoppia) confinis (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Neotrichoppia (Confinoppia) confinis confinis* (Paoli, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Neotrichoppia (Confinoppia) confinis tenuiseta* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Neotrichoppia (Confinoppia) gibber* (Mahunka, 1982) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Neotrichoppia (Confinoppia) hauseri* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000) (*Lauroppia*)

DISTRIBUCIÓN: Europa central y Cáucaso.
- *Neotrichoppia (Confinoppia) variabilis* Iturrondobeitia *et* Subías, 1981
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Neotrichoppia (Confinoppia) zushi* (Aoki, 1984) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Oppiella Jacot, 1937 (13 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: (*Dameosoma corrugatum* Berlese, 1904) =*Eremaeus novus* Oudemans, 1902
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Oppiella (Oppiella) Jacot, 1937 (5 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Oppiella (O.) baburini* Rjabinin, 1979
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Oppiella (O.) besucheti* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Oppiella (O.) neonominata* Subías, 2004
(=*Oppiella distincta* Rjabinin, 1989, *nom. praeoc.* por Vasiliu *et* Călugăr, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
Oppiella (O.) nova (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Oppiella (O.) nova nova* (Oudemans, 1902)
(=*Oppia neerlandica adauriculata* Mihelčič, 1953)
(=*Oppiella aegyptiaca* Elbadry *et* Nasr, 1974)
(=*Oppiella chistyakovi* Rjabinin, 1975)
(=*Dameosoma corrugatum* Berlese, 1904)
(=*Oppiella corrugata apicalis* Jacot, 1937)
(=*Dameosoma corrugatum intralamellatum* Thamdrup, 1932)
(=*Oppiella corrugata squarrosa* Jacot, 1937)
(=*Dameosoma krygeri* Trägårdh, 1931)
(=*Oppia neerlandica sumatrensis* Willmann, 1932)
(=*Oppiella orientata* Rjabinin, 1975)
(=*Oppia rossica* Bulanova-Zachvatkina, 1964)
(=*Notaspis sculptilis* Warburton *et* Pearce, 1905)
(=*Oppia washburni* Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente).
- *Oppiella (O.) nova mazandaranica* Akrami *et* Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Oppiella (O.) nova palustris* Laskova, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sureste de Europa e Irán).
- *Oppiella (O.) nova propinqua* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000 (*O. p.*)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Oppiella (O.) nova uliginosa* (Willmann, 1919) (*Dameosoma u.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Oppiella (O.) primorica* (Golosova, 1969) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centrooriental y Paleártica oriental meridional).

Oppiella (Moritzoppiella) Gordeeva, 2000 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Moritziella microdentata* Gordeeva *et* Grishina, 1991
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Oppiella (Moritzoppiella) microdentata* (Gordeeva *et* Grishina, 1991) (*Moritziella*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Oppiella (Moritzoppiella) neerlandica* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus longilamellatus n.*)
(=*Oppia carniolica* Tarman, 1958)
(=*Dameosoma translamellatum* Willmann, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Oppiella (Moritzoppiella) subfallax* (Mahunka, 1998) (*Moritzoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Oppiella (Perspicuoppia) Pérez-Íñigo, 1971 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia perspicua* Mihelčič, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Oppiella (Perspicuoppia) minidentata* (Subías, 1977) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Oppiella (Perspicuoppia) ozkani* Baran, Ayyildiz *et* Kence, 2012
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Oppiella (Perspicuoppia) perspicua* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Méjico.
- *Oppiella (Perspicuoppia) rara* Ivan *et* Vasiliu, 1997
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oppiella (Perspicuoppia) turcica* Toluk *et* Ayyildiz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Pseudobrachioppiella Tseng, 1982 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pseudobrachioppiella ramosa* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Pseudobrachioppiella ramosa* Tseng, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Ptiloppia Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppiella bulanovae* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Ptiloppia bulanovae* (Hammer, 1968) (*Oppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Tripiloppia Hammer, 1968 (10 spp.)
(=***Autoppia*** Golosova *et* Karppinen, 1983)
ESPECIE TIPO: *Tripiloppia aokii* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Paleártica oriental.
- *Tripiloppia algicola* (Golosova *et* Karppinen, 1983) (*Autoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática: I. Sajalín.
- *Tripiloppia alpina* Ermilov *et* Minor, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia aokii* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia dalenii* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia forsslundi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia frigida* Ermilov *et* Minor, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia parafrigida* Ermilov *et* Minor, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia subiasi* Balogh, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tripiloppia tarraswahlbergi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia traegardhi* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Tuberoppia Golosova, 1974 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Tuberoppia rotundata* Golosova, 1974) =*Oppia rotundata* Golosova, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Tuberoppia paradoxa* Golosova, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Tuberoppia rotundata* (Golosova, 1970) (*Oppia*)
  (=*Tuberoppia rotundata* Golosova, 1974)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

[**Oxyoppiinae**] Subías, 1989 (14 gen., 8 subgen., 88 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Acroppia Balogh, 1983 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Stachyoppia processigera* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Acroppia amazonica* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Stachyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acroppia antillensis* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Acroppia curvispina* (Mahunka, 1983) (*Stachyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acroppia monstruosa* (Mahunka, 1989) (*Stachyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Acroppia processigera* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Stachyoppia*)
  (=*Acroppia papua* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Etiópica (Congo), Oriental, Australiana (Nueva Guinea) y Neotropical (Méjico).
- *Acroppia translamellata* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Stachyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Acroppia zsuzsankae* (Mahunka, 2002) (*Oxyoppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Baloghoppia Mahunka, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Baloghoppia dentata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Baloghoppia dentata* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Baloghoppia inornata* Franklin *et* Woas, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Foraminoppia Subías *et* Arillo, 1998 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Foraminoppia iturrondobeitiai* Subías *et* Arillo, 1998
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Foraminoppia iturrondobeitiai* Subías *et* Arillo, 1998
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Foraminoppia salonae* Subías *et* Arillo, 1998
  DISTRIBUCIÓN: España.

Fossoppia Mahunka, 1994 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Fossoppia calcarata* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Fossoppia (Fossoppia) Mahunka, 1994 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Fossoppia (F.) calcarata* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Fossoppia (Multifossoppia) Subías, 2017 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Fossoppia pirata* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Fossoppia (Multifossoppia) pirata* Mahunka, 1994 (*F.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Foveolatoppia Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Foveolatoppia foveolata* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Foveolatoppia foveolata* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Lineoppia Balogh *et* P. Balogh, 1983 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lineoppia frouini* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Lineoppia frouini* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Lineoppia mastax* (Balogh *et* Mahunka, 1977) (*Oxyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Lineoppia microseta* Ermilov *et* Anichkin, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Lineoppia tuberosa* (Mahunka, 2009) (*Oxyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Mahunkella Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oppiella transitoria* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mahunkella transitoria* (Balogh *et* Mahunka, 1978) (*Oppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).

Oxybrachioppia Subías, 1989 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachioppiella ctenifera barbata* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Oxybrachioppia barbata* (Choi, 1986) (*Brachioppiella ctenifera b.*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea y Vietnam.
- *Oxybrachioppia ctenifera* (Golosova, 1970) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa centromeridional (excepto Oeste) y Este de Paleártica oriental.
- *Oxybrachioppia glabriseta* Wang *et* Shen, 1999
  DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).

Oxyoppia Balogh *et* Mahunka, 1969 (37 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia spinosa* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y boreal).

Oxyoppia (Oxyoppia) Balogh *et* Mahunka, 1969 (4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Neotropical, Oriental, Etiópica y Paleártica meridional).
- *Oxyoppia (O.) clavata* Aoki, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Japón (frecuente) y Vietnam.
- *Oxyoppia (O.) complicata* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Oxyoppia (O.) polita* P. Balogh, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia y Méjico).
- *Oxyoppia (O.) spinosa* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  (=*Oxyoppia espozi* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Oxyoppia (Aciculoppia) Subías *et* Rodríguez, 1986 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oxyoppia genavensium* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oxyoppia (Aciculoppia) genavensium* Mahunka, 1982 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico y Chile).

Oxyoppia (Dzarogneta) Kulijev, 1978 (14 spp.)
(=***Fineoppia*** Khanbekyan *et* Gordeeva, 1991)
(=***Pectinoppia*** Subías *et* Rodríguez, 1986)
ESPECIE TIPO: *Oppia dubia* Kulijev, 1966
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Oxyoppia (Dzarogneta) baranae* Toluk *et* Ayyildiz, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) cristata* Hammer, 1977 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) dubia* (Kulijev, 1966) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) ilicaensis* Baran *et* Ayyildiz, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) intermedia* Subías *et* Rodríguez, 1986 (*O. (Pectinoppia)*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Ibérica e Irán).
- *Oxyoppia (Dzarogneta) iranensis* Akrami *et* Subías, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) khosrovica* (Khanbekyan *et* Gordeeva, 1991) (*Fineoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) latisternalis* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) pluripectinata* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Oxyoppia (Dzarogneta) pustulata* Mahunka, 1997 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) sadbinia* (Shtanchaeva, 1984) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) taurus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997 (*O. (Oxyoppiella)*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) uncinata* Wen, 1993 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) yepesensis* Muñoz-Mingarro, 1987 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).

Oxyoppia (Oxyoppiella) Subías *et* Rodríguez, 1986 (16 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oppiella polynesia* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y boreal).
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) antillensis* Mahunka, 1998 (*Oxyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) baliensis* (Hammer, 1982) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) bituberculata* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).
  - *Oxyoppia (Oxyoppiella) bituberculata bituberculata* (Balogh, 1958)
    DISTRIBUCIÓN: Etiópica y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).
  - *Oxyoppia (Oxyoppiella) bituberculata cognata* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
    DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) crassata* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) cubana* Balogh *et* Mahunka, 1980 (*Oxyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) minuscula* Hugo-Coetzee, Lotfollahi, Abbasi-Kalo *et* Movahedzade, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) mustaciata* Kun, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) nasalis* (Evans, 1953) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) palauensis* Bayartogtokh *et* Shimano, 2020 (*Oxyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia (Palau).
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) pilosa* Balogh *et* Mahunka, 1981 (*Oxyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) polynesia* (Hammer, 1972) (*Oppiella*)
  (=*Oxyoppia spiculifera* Mahunka, 1985)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Australiana (Polinesia: Tahití), Oriental, Neotropical y Etiópica (Sudáfrica).
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) quadrifoveolata* (Bayoumi, Al-Assiuty, Abd-el-Hamid *et* El-Shereef, 1983) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) saskai* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) scalifera* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Perú) y Filipinas.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) struthio* Mahunka, 1983 (*Oxyoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) suramericana* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente), India y Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Oxyoppia (Oxyoppiella) vtorovi* (Rjabinin, 1987) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Oxymystroppia Subías *et* Shtanchaeva, 2011 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oxymystroppia phylloseta* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Oxymystroppia phylloseta* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Marruecos.

Oxyoppioides Subías *et* Mínguez, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma decipiens* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Oxyoppioides decipiens* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica occidental: excepto Norte, y Sur de Siberia).

Sacculoppia Balogh *et* Mahunka, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sacculoppia singularis* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Sacculoppia singularis* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Separatoppia Mahunka, 1983 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia africana* Evans, 1953
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental.
- *Separatoppia acutipes* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Separatoppia africana* (Evans, 1953) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Separatoppia concava* Ermilov *et* Rybalov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Separatoppia gracilis* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Separatoppia horvathae* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Separatoppia indica* Ermilov *et* Pešić, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Andhra Pradesh).
- *Separatoppia robusta* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Subiasella Balogh, 1983 (19 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia exigua* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australianooriental y Neotropical).

Subiasella (Subiasella) Balogh, 1983 (3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.
- *Subiasella (S.) exigua* (Hammer, 1971) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana e I. Galápagos.
- *Subiasella (S.) extrema* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Subiasella (S.) segmella* (Golosova, 1970) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).

Subiasella (Dividoppia) Mahunka, 1987 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Dividoppia aperta* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Subiasella (Dividoppia) aperta* (Mahunka, 1987) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa suroriental.

Subiasella (Lalmoppia) Subías *et* Rodríguez, 1986 (12 spp.)
(=***Cassioppia*** Poltavskaja, 1994)
(=***Pararectoppia*** Mahunka, 1987)
ESPECIE TIPO: (*Oppia ventronodosa* Hammer, 1962) =*Oppia maculata* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Subiasella (Lalmoppia) boninensis* Ohkubo, 1996
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Subiasella (Lalmoppia) europaea* (Mahunka, 1982) (*Oxyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Subiasella (Lalmoppia) gracilis* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: Bulgaria, y U.S.A.: Misuri).
- *Subiasella (Lalmoppia) incurva* (Aoki, 1983) (*Oxyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Subiasella (Lalmoppia) khaolak* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Subiasella (Lalmoppia) krivolutskyi* (Poltavskaja, 1994) (*Cassioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
- *Subiasella (Lalmoppia) maculata* (Hammer, 1952) (*Oppia*)
(=*Oppia ventronodosa* Hammer, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica occidental, Paleártica oriental y Neártica septentrional), Nepal y Neotropical (Chile y Brasil).
- *Subiasella (Lalmoppia) quadrimaculata* (Evans, 1952) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Paleártica oriental meridional).
- *Subiasella (Lalmoppia) septentrionalis* (Fujikawa, 2003) (*Microppia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Subiasella (Lalmoppia) simplissima* (Jacot, 1938) (*Oppia minus s.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: Ilinois.
- *Subiasella (Lalmoppia) subiasi* (Mahunka, 1987) (*Pararectoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Subiasella (Lalmoppia) zeyensis* (Rjabinin, 1975) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Subiasella (Lucioppia) Mahunka, 1985 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lucioppia hauseri* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana).
- *Subiasella (Lucioppia) hauseri* (Mahunka, 1985) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Chile).
- *Subiasella (Lucioppia) swiftae* Subías *et* Arillo, 2003
DISTRIBUCIÓN: Hawái.

Subiasella (Paralalmoppia) Subías *et* Shtanchaeva, 2012 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Subiasella (Paralalmoppia) barbulata* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Subiasella (Paralalmoppia) barbulata* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.

[**Mystroppiinae**] Balogh, 1983 (7 gen., 2 subgen., 53 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Cheloppia Hammer, 1971 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cheloppia hyalina* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana y Neotropical).
- *Cheloppia americana* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Cheloppia hyalina* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Corynoppia Balogh, 1983 (8 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Stachyoppia kosarovi* Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
Corynoppia andulau Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo y Turquía.
- *Corynoppia andulau andulau* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Corynoppia andulau sakaryaensis* Baran *et* Gökyeşil, 2015
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Corynoppia foliata* (Mihelčič, 1957) (*Damaeolus*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Corynoppia foliatoides* Subías *et* Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Corynoppia hispanica* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
Corynoppia kosarovi (Jeleva, 1962) (*Stachyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Irán y Panamá.
- *Corynoppia kosarovi kosarovi* (Jeleva, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Irán y Panamá.
- *Corynoppia kosarovi matritensis* (Pérez-Íñigo, 1967) (*Stachyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Corynoppia maritima* Pérez-Íñigo jr., 1991 (*C. kosarovi m.*)
DISTRIBUCIÓN: España (I. Baleares).
- *Corynoppia papillisetigera* Iturrondobeitia *et* Saloña, 1998
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Corynoppia weigmanni* (Murvanidze *et* Behan-Pelletier, 2011) (*Striatoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Karenella Hammer, 1962 (12 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Karenella lobata* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Neártica.

Karenella (Karenella) Hammer, 1962 (7 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Karenella (K.) acuta* (Csiszár, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Karenella (K.) bruneiana* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Karenella (K.) lanceoseta (Balogh, 1959) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Ghana).
- *Karenella (K.) lanceoseta lanceoseta* (Balogh, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Karenella (K.) lanceoseta occidentalis* (Wallwork, 1961) (*Oppia*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Karenella (K.) lanceosetoides* (Hammer, 1971) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico), Oriental (Java y Taiwán [Formosa]) y Tanzania.
- *Karenella (K.) lobata* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Karenella (K.) pilisinopia* Fredes *et* Martínez, 2014
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Karenella (K.) turgiseta* (Mahunka, 1985) (*Corynoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Karenella (Glabroppia) Subías *et* Rodríguez, 1986 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia minutisetosa* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Karenella (Glabroppia) cohici* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún).
- *Karenella (Glabroppia) minutisetosa* (Hammer, 1982) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Bali.

Karenella (Stakarenoppia) Subías *et* Rodríguez, 1986 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Stachyoppia granulosa* Subías *et* Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Neártica.
- *Karenella (Stakarenoppia) foveolata* Mahunka, 1992 (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Karenella (Stakarenoppia) granulosa* (Subías *et* Sarkar, 1983) (*Stachyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Karenella (Stakarenoppia) stipularis* (Jacot, 1937) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Mystroppia Balogh, 1959 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mystroppia sellnicki* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Mystroppia dallaii* Bernini, 1973
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Mystroppia rethejumi* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Mystroppia sellnicki* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional e India (Tripura).

Rugoppia Mahunka, 1986 (4 spp.)
(=***Mahnertella*** Mahunka, 1997)
ESPECIE TIPO: *Rugoppia luisiae* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Rugoppia lamellicornis* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Rugoppia luisiae* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Rugoppia quadrituberculata* (Mahunka, 1997) (*Mahnertella*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Rugoppia vilagiorum* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Uganda.

Stachyoppia Balogh, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Stachyoppia muscicola* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.
- *Stachyoppia muscicola* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Etiopía) y Cáucaso.

Striatoppia Balogh, 1958 (22 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Stiatoppia machadoi* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Striatoppia asiatica* Sanyal, 2009
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Striatoppia baloghi* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Striatoppia breviclava* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Striatoppia foliosa* (Jacot, 1937) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Striatoppia hammeni* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Indonesia: Lombok).
- *Striatoppia lanceolata* Hammer, 1972

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Polinesia: Tahití), Oriental y Neotropical (I. Galápagos).
- *Striatoppia luisae* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Striatoppia machadoi* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Striatoppia madagascarensis* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.
- *Striatoppia margaritata* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Striatoppia margaritifera* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Etiopía).
- *Striatoppia milii* Sanyal *et* Basu, 2014
DISTRIBUCIÓN: India (Isla Agatti).
- *Striatoppia modesta* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Striatoppia multilineata* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Striatoppia niliaca* (Popp, 1960) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e India (Bengala Occidental).
- *Striatoppia opuntiseta* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y Japón.
- *Striatoppia papillata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Congo, Vietnam y Cuba) y subtropical (Egipto).
- *Striatoppia quadrilineata* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Striatoppia silvicola* Franklin *et* Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Striatoppia similis Subías *et* Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura) y Polinesia (Tahití).
- *Striatoppia similis similis* Subías *et* Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Striatoppia similis polynesica* Subías *et* Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).

- *Striatoppia tribuliformis* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Striatoppia tripurensis* Subías *et* Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Epimerellidae Ayyildiz *et* Luxton, 1989 (3 gen., 10 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y subtropical (Paleártica meridional).

Enisella Ayyildiz *et* Luxton, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Enisella turcica* Ayyildiz *et* Luxton, 1989
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Enisella turcica* Ayyildiz *et* Luxton, 1989
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Epimerella Kulijev, 1967 (8 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia smirnovi* Kulijev, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Epimerella ankaraensis* Baran, Ayyildiz *et* Kence, 2012
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Epimerella distenta* Ayyildiz *et* Luxton, 1989
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Epimerella luxtoni* Toluk, Ayyildiz *et* Baran, 2008
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Epimerella marasensis* Toluk *et* Ayyildiz, 2013
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Epimerella puzanovi* Gordeeva *et* Karppinen, 1988
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Epimerella rubeni* Khanbekyan *et* Gordeeva, 1991
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Epimerella smirnovi (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Epimerella smirnovi smirnovi* (Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
- *Epimerella smirnovi longisetosa* Kulijev, 1967
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Epimerella subiasi* Toluk, Ayyildiz *et* Baran, 2008
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Luxtonia Mahunka, 2001 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Luxtonia hauseri* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Luxtonia hauseri* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Lyroppiidae Balogh, 1983 (1 gen. y 6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Lyroppia Balogh, 1961 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lyroppia scutigera* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Lyroppia anareolata* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).
- *Lyroppia delicata* Wang *et* Lu, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).
- *Lyroppia dongnaiensis* Ermilov *et* Anichkin, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Lyroppia neotropica* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Lyroppia scutigera* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Etiópica (Congo y Camerún), Neotropical (Perú y Brasil) y Vietnam.
- *Lyroppia similis* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Brasil).

Granuloppiidae Balogh, 1983 (5 gen., 4 subgen. y 32 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

Enantioppia Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Enantioppia multituberculata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Enantioppia multituberculata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Gigantoppia Mahunka, 2008 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Gigantoppia magna* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Gigantoppia magna* Mahunka, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Gigantoppia zryanini* Ermilov *et* Anichkin, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Granuloppia Balogh, 1958 (11 spp.)
(=***Pocsoppia*** Mahunka, 1984)
ESPECIE TIPO: *Granuloppia congoensis* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Granuloppia conflata* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Granuloppia congoensis* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún).
- *Granuloppia extrema* (Mahunka, 1984) (*Pocsoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Granuloppia ghanensis* Wallwork, 1961 (*G. congoensis g.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Granuloppia kamerunensis* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: África occidental y Vietnam.
- *Granuloppia major* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Granuloppia neonominata* Subías, 2004
  (=*Dameosoma megacephalum* Berlese, 1905, *nom. praeoc.* por Berlese, 1901)
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Granuloppia nuda* Wallwork, 1961 (*G. major n.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Granuloppia olszanowskii* Ermilov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Granuloppia stigmata* (Hammer, 1979) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java) y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Granuloppia vietnamensis* Ermilov *et* Bayartogtokh, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Hammerella Balogh, 1983 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachioppiella gracilis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Neotropical y "Australiana") y subtropical (Paleártica meridional).

Hammerella (Hammerella) Balogh, 1983 (4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y "Australiana") y subtropical (Paleártica meridional).
- *Hammerella (H.) excisa* Ermilov *et* Kalúz, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hammerella (H.) gracilis* (Hammer, 1977) (*Brachioppiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán y Vietnam.
- *Hammerella (H.) pectinata* (Aoki, 1983) (*Senectoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (Taiwán [Formosa] y Nepal).
- *Hammerella (H.) pinnatifilis* (Canestrini, 1898) (*Belba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

***Hammerella* (*Bornemiszaella*)** P. Balogh, 1994 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Bornemiszaella fournieri* P. Balogh, 1994
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hammerella (Bornemiszaella) fournieri* (P. Balogh, 1994) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Hammerella (Bornemiszaella) ramirezi* (P. Balogh, 1994) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Hammerella (Bornemiszaella) salasi* (P. Balogh, 1994) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Hammerella (Interoppia) Mahunka, 1987 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Interoppia mirabilis* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hammerella (Interoppia) kerangas* (Mahunka, 2001) (*Senectoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hammerella (Interoppia) mirabilis* (Mahunka, 1987) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo e India: Bengala Occidental).
- *Hammerella (Interoppia) rostroreticulata* (Ohkubo, Aoki *et* Hu, 1993) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

***Hammerella* (*Parawoasella*)** Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2012 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Hammerella (Parawoasella) bayartogtokhi* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hammerella (Parawoasella) bayartogtokhi* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).

***Hammerella* (*Varioppia*)** Mahunka, 1985 (4 spp.)
(=***Woasella*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
ESPECIE TIPO: *Varioppia radiata* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hammerella (Varioppia) huanucoensis* Ermilov, 2016 (*H. (Woasella)*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hammerella (Varioppia) parasufflata* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013 (*H. (Woasella)*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hammerella (Varioppia) radiata* (Mahunka, 1985) (*V.*)
(=*Pulchroppia curarii* Franklin *et* Woas, 1992)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hammerella (Varioppia) sufflata* (Franklin *et* Woas, 1992) (*Pulchroppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).

Senectoppia Aoki, 1976 (3 spp.)
(=***Macrosoma*** Hammer, 1979)
ESPECIE TIPO: *Senectoppia rugosa* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Senectoppia complicata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
(=*Ptiloppia castagnoliae* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1995)
(=*Dameosoma corrugatum* Berlese, 1905, *nom. praeoc.* por Berlese, 1904)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Senectoppia multisulcatum* (Berlese, 1913) (*Dameosoma*)
(=*Senectoppia hammerae* Aoki, 1983)
(=*Macrosoma rugosa* Hammer, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Senectoppia rugosa* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Teratoppiidae Balogh, 1983 (3 gen., 2 subgen. y 21 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Granuloteratoppia P. Balogh, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Granuloteratoppia annulata* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Granuloteratoppia annulata* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Leoppia Pérez-Íñigo, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Leoppia longicoma* Pérez-Íñigo, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Leoppia (Leoppia) Pérez-Íñigo, 1983 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Leoppia (L.) longicoma* Pérez-Íñigo, 1983
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].

Leoppia (Brasiloppia) Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Brasiloppia flechtmanni* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Leoppia (Brasiloppia) flechtmanni* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).

Teratoppia Balogh, 1959 (18 spp.)
ESPECIE TIPO: *Teratoppia calcarata* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

Teratoppia (Teratoppia) Balogh, 1959 (10 spp.)
(=***Cretoppia*** Mahunka, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Teratoppia (T.) brasiliensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Teratoppia (T.) calcarata* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Teratoppia (T.) ciliata* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Teratoppia (T.) creta* (Mahunka, 1986) (*Cretoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Teratoppia (T.) minor* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Tanzania).
- *Teratoppia (T.) nasalis* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Camerún).
- *Teratoppia (T.) parareducta* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Teratoppia (T.) reducta* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Teratoppia (T.) translamellata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Teratoppia (T.) uspiensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).

Teratoppia (Teratoppiella) Balogh, 1983 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Teratoppia brevipectinata* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Teratoppia (Teratoppiella) ardua* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997) (*Teratoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Teratoppia (Teratoppiella) brevipectinata* Balogh *et* Mahunka, 1978 (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Teratoppia (Teratoppiella) centroamericana* Woas, 1986 (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Teratoppia (Teratoppiella) fimbriata* (Mahunka, 1983) (*Teratoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Teratoppia (Teratoppiella) pectinata* Balogh, 1961 (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Teratoppia (Teratoppiella) pluripectinata* Balogh *et* Mahunka, 1978 (*Teratoppia*)
(=*Teratoppia baloghi* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
(=*Teratoppia pectinata* Balogh *et* Mahunka, 1969, *nom. praeoc.* por Balogh, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Teratoppia (Teratoppiella) regalis* Mahunka, 1983 (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico y Brasil).
- *Teratoppia (Teratoppiella) reticulata* (Alzuet, 1981) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Sternoppiidae Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 gen. y 14 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Sternoppia Balogh *et* Mahunka, 1968 (14 spp.)
(=***Synoppia*** Balogh *et* Mahunka, 1969)
ESPECIE TIPO: *Sternoppia mirabilis* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Sternoppia boliviana* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Sternoppia brasiliensis* Franklin *et* Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).
- *Sternoppia fissurata* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Sternoppia incisa* Balogh *et* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Ecuador).
- *Sternoppia minor* Balogh *et* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Sternoppia mirabilis* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Sternoppia paraincisa* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Sternoppia paramirabilis* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Sternoppia pocsiana* Mahunka, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Sternoppia quadriseta* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Synoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Ecuador).
- *Sternoppia reticulata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Sternoppia sphaerodendron* Balogh *et* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Sternoppia striata* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Guatemala y Ecuador).
- *Sternoppia vicina* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Machuellidae Balogh, 1983 (2 gen., 6 spp. y 5 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica.

Gredosella Gil-Martín, Arillo *et* Subías, 2000 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Gredosella fraternalis* Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 2000)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Gredosella capitata* (Kulijev, 1967) (*Machuella*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Gredosella fraternalis* Gil-Martín, Arillo *et* Subías, 2000
  DISTRIBUCIÓN: España.

Machuella Hammer, 1961 (4 spp. y 5 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Machuella ventrisetosa* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica.

- *Machuella draconis* Hammer, 1961
  (=*Machuella africana* Mahunka, 1978)
  DISTRIBUCIÓN: Subtropical: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte), Etiópica y Méjico.
- *Machuella lineata* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa) y Oriental (Vietnam y Taiwán [Formosa]).
- *Machuella turcica* Baran *et* Ayyildiz, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Machuella ventrisetosa Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica.

- *Machuella ventrisetosa ventrisetosa* Hammer, 1961
  (=*Machuella hellenica* Mahunka, 1982)
  (=*Machuella hippy* Niemi *et* Gordeeva, 1991)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical (Etiopía en Etiópica) y Paleártica meridional.
- *Machuella ventrisetosa bilineata* Weigmann, 1976 (*M. b.*)
  DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Machuella ventrisetosa plicata* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Machuella ventrisetosa pyriformis* Hammer, 1968 (*M. p.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Machuella ventrisetosa robusta* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Machuella ventrisetosa zehntneri* Mahunka, 1977 (*M. z.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Malgache (I. Reunión).

Papillonotidae Balogh, 1983 (1 gen. y 4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Papillonotus Wallwork, 1961 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Papillonotus maculatus* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Papillonotus granulosus* Wallwork, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Congo).
- *Papillonotus hauseri* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Borneo y Etiópica (Congo y Uganda).
- *Papillonotus maculatus* Wallwork, 1961
  DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Papillonotus tricarinatus* Sarkar *et* Subías, 1983
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Tuparezetidae Balogh, 1972 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Tuparezetes Spain, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tuparezetes christineae* Spain, 1969
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Tuparezetes christineae* Spain, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tuparezetes philodendrus* Spain, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Quadroppiidae Balogh, 1983 (3 gen., 1 subgen. y 29 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Borhidia Balogh *et* Mahunka, 1974 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Borhidia cubana* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Borhidia andina* P. Balogh, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Borhidia cubana* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Hexoppia Balogh, 1958 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Hexoppia heterotricha* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Hexoppia heterotricha* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Ghana) e India (Mizoram).

Quadroppia Jacot, 1939 (26 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis quadricarinata* Michael, 1885
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Quadroppia (Quadroppia) Jacot, 1939 (9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Quadroppia (Q.) cristata* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Quadroppia (Q.) hammerae* Mínguez, Ruiz *et* Subías, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica centromeridional, U.S.A.: Carolina del Norte, Australiana: Nueva Zelanda y Hawái, y Costa Rica).
- *Quadroppia (Q.) illinoisensis* (Jacot, 1938) (*Oppia quadricarinata i.*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: U.S.A. (Ilinois) y Este de Rusia asiática.
- *Quadroppia (Q.) longisetosa* Mínguez, Ruiz *et* Subías, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de Paleártica occidental.
- *Quadroppia (Q.) maritalis* Lions, 1982 *(Q. quadricarinata m.*)
  DISTRIBUCIÓN: Europea (menos frecuente en el Norte).
- *Quadroppia (Q.) minima* Fujikawa, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Quadroppia (Q.) obsoleta* Mínguez, Ruiz *et* Subías, 1985 (*Q. longisetosa o.*)
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Quadroppia (Q.) quadricarinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
  (=*Quadroppia skookumchucki* Jacot, 1939)
  (=*Qudroppia quadricarinata virginalis* Lions, 1982)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), China suroriental y Etiópica (Malgache: I. Mauricio, y Tanzania).
- *Quadroppia (Q.) squarrosa* Toluk *et* Ayyildiz, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Quadroppia (Coronoquadroppia) Ohkubo, 1995 (17 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: (*Coronoquadroppia parallela* Ohkubo, 1995) =*Oppia circumita* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) abchasica* Gordeeva *et* Tarba, 1990 (*Q.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso e Ibérica).
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) circumita* (Hammer, 1961) (*Oppia*)
  (?=*Oppia quadricarinata ferrumequina* Jacot, 1938 *sp. inq.*)
  (=*Coronoquadroppia parallela* Ohkubo, 1995)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) crenata* Mahunka, 1984 (*Q.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Cáucaso.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) erzurumensis* (Baran *et* Ayyildiz, 2007) (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) expansa* (Ohkubo, 1995) (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) foveolata* Toluk *et* Ayyildiz, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) galaica* Mínguez, Ruiz *et* Subías, 1985 (*Q. pseudocircumita g.*)
  (=*Quadroppia bellula* Luxton, 1987)
  DISTRIBUCIÓN: Europa occidental y Cuba.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) guttata* (Weigmann, 2010) (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) iranica* Akrami *et* Subías, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) media* Gordeeva, 1983 (*Q.*)

(=*Quadroppia ritza* Gordeeva *et* Tarba, 1990)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli Mahunka, 1977 (*Q.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli michaeli* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli turcica* Baran, Toluk *et* Ayyildiz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) monstruosa* Hammer, 1979 (*Q.*)
(=*Quadroppia lesleyae* Monson, 2000)
(=*Quadroppia mahunkai* Mínguez, 1981)
(=*Quadroppia omodeoi* Mahunka *et* Paoletti, 1984)
(=*Quadroppia paolii* Woas, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: excepto Norte, y U.S.A.: Carolina del Norte) y Java.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) nana* Gordeeva, 1983 (*Q.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) nasalis* Gordeeva, 1983 (*Q.*)
(=*Quadroppia gumista* Gordeeva *et* Tarba, 1990)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) pseudocircumita* Mínguez, Ruiz *et* Subías, 1985 (*Q.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Oeste de Paleártica occidental y Canadá) y Perú.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) sezeki* Baran *et* Ayyildiz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) trapezoidea* (Fujikawa, 2004) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Trizetoidea Ewing, 1917

Cuneoppiidae Balogh, 1983 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).

Cuneoppia Balogh *et* Mahunka, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cuneoppia laticeps* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).
- *Cuneoppia dogmai* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Cuneoppia laticeps* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Suctobelbidae Jacot, 1938 (21 gen., 6 subgen., 341 spp. y 19 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Allosuctobelba Moritz, 1970 (18 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Suctobelba grandis* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Allosuctobelba (Allosuctobelba) Moritz, 1970 (17 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Allosuctobelba (A.) alexanderkhaustovi* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Allosuctobelba (A.) bicuspidata* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón y Méjico.
- *Allosuctobelba (A.) bidentata* Wen, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Allosuctobelba (A.) centroamericana* (Woas, 1986) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Allosuctobelba (A.) diceros* (Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: América austral.
- *Allosuctobelba (A.) gigantea* (Hammer, 1955) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Alaska.
Allosuctobelba (A.) grandis (Paoli, 1908) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Allosuctobelba (A.) grandis grandis* (Paoli, 1908)
(=*Suctobelba grandis europaea* Willmann, 1933)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Allosuctobelba (A.) grandis philippinensis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Allosuctobelba (A.) hauseri* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2001
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Allosuctobelba (A.) huangshanensis* Wen, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Allosuctobelba (A.) japonica* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Allosuctobelba (A.) malakipinae* (Corpuz-Raros, 1979) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Allosuctobelba (A.) menglunensis* Wen, 1997

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Allosuctobelba (A.) nova* (Krivolustky, 1971) (*Rhynchobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Allosuctobelba (A.) obtusa* (Jacot, 1938) (*Suctobelba grandis o.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Allosuctobelba (A.) serrata* (Chinone, 2003) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Allosuctobelba (A.) tricuspidata Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
- *Allosuctobelba (A.) tricuspidata tricuspidata* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
- *Allosuctobelba (A.) tricuspidata satsumaensis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Allosuctobelba (A.) tricuspidata tokara* Aoki, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Allosuctobelba (A.) vietnamensis* Ermilov *et* Anickin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Allosuctobelba (Helvetobelba) Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Helvetobelba dichotoma* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Allosuctobelba (Helvetobelba) dichotoma* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.

Coartobelba Mahunka, 2001 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Coartobelba pauper* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Neotropical y Paleártica meridional.
- *Coartobelba bifoveolata* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Coartobelba campestris* (Balogh *et* Mahunka, 1981) (*Suctobelba pontigera c.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Méjico).
- *Coartobelba carinata* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Coartobelba latirostrata* (Chinone, 2003) (*Novosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Coartobelba loksai* (Balogh *et* Mahunka, 1981) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Coartobelba longiclava* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Panamá).
- *Coartobelba microclava* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Coartobelba monobina* (Fujikawa, 2003) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Coartobelba monodentis* (Chinone, 2003) (*Novosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Coartobelba pauper* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Coartobelba pontigera* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Coartobelba shogranensis* (Hammer, 1977) (*Novosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Coartobelba transversalis* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Argentina).

Condylobelba Mahunka, 2001 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Condylobelba agathis* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Condylobelba agathis* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Condylobelba bruneiensis* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Condylobelba sculpturata* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Fenestrobelba Balogh, 1970 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Fenestrobelba annulata* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Fenestrobelba annulata* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Fenestrobelba nodosa* (Hammer, 1966) (*Zeasuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Fenestrobelba octo* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Fenestrobelba transitoria* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).

Interbelba Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Interbelba solifera* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Interbelba solifera* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Kuklosuctobelba Chinone, 2003 (11 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Kuklosuctobelba perbella* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y pantropical.

Kuklosuctobelba (Kuklosuctobelba) Chinone, 2003 (6 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y pantropical.
Kuklosuctobelba (K.) claviseta (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador), Hawái, Malgache (I. Mauricio) y Japón.
- *Kuklosuctobelba (K.) claviseta claviseta* (Hammer, 1961)
(=*Suctobelba claviseta mauritii* Mahunka, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador), Hawái, Malgache (I. Mauricio) y Japón.
- *Kuklosuctobelba (K.) claviseta nipponica* (Fujikawa, 1986) (*Suctobelbella*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Kuklosuctobelba (K.) finlayi* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba y Vietnam.
- *Kuklosuctobelba (K.) perbella* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Kuklosuctobelba (K.) tenuis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Kuklosuctobelba (K.) tuberculata* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Este de Paleártica oriental).
- *Kuklosuctobelba (K.) yamizoensis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Kuklosuctobelba (Niosuctobelba) Chinone, 2003 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Niosuctobelba ruga* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y Paleártica meridional.
- *Kuklosuctobelba (Niosuctobelba) asinus* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Kuklosuctobelba (Niosuctobelba) multituberculata* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Kuklosuctobelba (Niosuctobelba) plumata* (Hammer, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Kuklosuctobelba (Niosuctobelba) ruga* (Chinone, 2003) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Kuklosuctobelba (Niosuctobelba) sphagnicola* (Ermilov, 2017) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).
- *Kuklosuctobelba (Niosuctobelba) tamurai* (Chinone, 2003) (*Suctobelbella*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Neosuctobelba Balogh *et* Mahunka, 1969 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Neosuctobelba transitoria* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y Paleártica meridional.
- *Neosuctobelba bituberculata* (Ermilov *et* Anichkin, 2013) (*Suctobelbata*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neosuctobelba planeta* (Fujikawa, 2004) (*Rhynchobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neosuctobelba quatuor* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Fenestrobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Neosuctobelba transitoria* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Novosuctobelba Hammer, 1977 (27 spp.)
ESPECIE TIPO: *Novosuctobelba dentissima* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.

Novosuctobelba (Novosuctobelba) Hammer, 1977 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental y Etiópica.
- *Novosuctobelba* (*N.*) *dentissima* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán e India (Tripura).
- *Novosuctobelba (N.) horrida* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún).

Novosuctobelba (Leptosuctobelba) Chinone, 2003 (24 ssp.)
(=***Madabelba*** Mahunka, 2009)
(=***Nasobelba*** Mahunka, 2005)
ESPECIE TIPO: *Leptosuctobelba vulgaris* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) agathis* (Mahunka, 2005) (*Nasobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) andrassyi* (Balogh *et* Mahunka, 1981) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) armata* (Hammer, 1982) (*Suctobelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Bali y Vietnam).
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) baculifera* (Balogh *et* Mahunka, 1981) (*Suctobelba perdentata b.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) bercziki* (Mahunka, 2009) (*Madabelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) coronata* (Mahunka, 2005) (*Nasobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) crisposetosa* (Hammer, 1979) (*Suctobelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) dispersosetosa* (Hammer, 1979) (*Suctobelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) duplicondyla* (Mahunka, 2009) (*Suctobelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) geometrica* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) hauseri* (Mahunka, 2005) (*Nasobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) inenodabilis* (Hammer, 1979) (*Suctobelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) lauta* (Chinone, 2003) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) madegassica* (Mahunka, 2011) (*Neosuctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) margarita* (Fujikawa, 2004) (*Suctobelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) monofenestrella* (Chinone, 2003) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) nondivisa* (Hammer, 1966) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia), Oriental (India: Bengala Occidental, y Filipinas) y Etiópica (Sudáfrica).
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) perdentata* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) roigi* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) sabahensis* (Mahunka, 1988) (*Suctobelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) undosa* (Mahunka, 2005) (*Nasobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) vietnamica* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Suctobelba)*
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) vulgaris* (Chinone, 2003) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Japón y Cáucaso).
- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) xena* (Mahunka, 1978) (*Neosuctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).

Novosuctobelba (Suctobelboides) Pankov, 1997 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Suctobelbella kurilica* Golosova, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Novosuctobelba (Suctobelboides) kurilica* (Golosova, 1980) (*Suctobelbella*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.

Parasuctobelba Hammer, 1977 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Suctobelba fijiensis* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Parasuctobelba compacta* (Woas, 1986) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Parasuctobelba complexa* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: frecuente, y Oriental).
- *Parasuctobelba elegantissima* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Parasuctobelba fijiensis* (Hammer, 1971) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Méjico.
- *Parasuctobelba fragilis* (Woas, 1986) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Parasuctobelba hamifera* (Balogh, 1958) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Parasuctobelba medialis* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Parasuctobelba mirabilis* (Balogh, 1958) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Parasuctobelba monstruosa* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Parasuctobelba quinquecostata* Mahunka, 2005

DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Parasuctobelba subcomplexa* (Balogh *et* Mahunka, 1968) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (Borneo).
- *Parasuctobelba tricornuta* (Mahunka, 1989) (*Suctobelbella*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Nigeria y Camerún).
- *Parasuctobelba vohimana* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Parisuctobelba Higgins *et* Woolley, 1976 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Parisuctobelba septenia* Higgins *et* Woolley, 1976
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Parisuctobelba septenia* Higgins *et* Woolley, 1976
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

Persuctobelba Mahunka, 2000 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Persuctobelba divisa* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Persuctobelba divisa* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Persuctobelba flagellatissima* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Persuctobelba monster* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Rhynchobelba Willmann, 1953 (7 spp.)
(=***Rhinosuctobelba*** Woolley *et* Higgins, 1969)
ESPECIE TIPO: *Rhynchobelba inexpectata* Willmann, 1953
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Rhynchobelba altaica* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia central rusa y Eslovenia).
- *Rhynchobelba dicerosa* (Woolley *et* Higgins, 1969) (*Rhinosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).
- *Rhynchobelba inexpectata* Willmann, 1953
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Rhynchobelba machadoi* Pérez-Íñigo, 1976
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Rhynchobelba ornithorhyncha* (Willmann, 1953) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Rhynchobelba ozkani* Sarial *et* Baran, 2013
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhynchobelba simplex* (Fujikawa, 1972) (*Allosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Rhynchoppia Balogh, 1968 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rhynchoppia sedlaceki* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Rhynchoppia azaisi* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Rhynchoppia capillata* (Balogh, 1963) (*Suctobelbila*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Ruanda).
- *Rhynchoppia hauseri* (Mahunka, 1976) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Rhynchoppia puertoincaensis* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Rhynchoppia sedlaceki* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India (Arunachal Pradesh).
- *Rhynchoppia widagdoi* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

Serratobelba Mahunka, 1984 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Suctobelbila multidentata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Serratobelba multidentata* (Mahunka, 1983) (*Suctobelbila*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Serratobelba rugosa* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Sucteremaeus Golosova *et* Krivolutsky, 1975 (1 sp.)
(=***Kathetosuctobelba*** Chinone, 2003)
ESPECIE TIPO: *Rhinosuctobelba makarchevae* Krivolutsky *et* Golosova, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Sucteremaeus makarchevae* (Krivolutsky *et* Golosova, 1974) (*Rhinosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Suctobelba Paoli, 1908 (19 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis trigona* Michael, 1888

DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Suctobelba aliena* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europea e Irán.
- *Suctobelba altvateri* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Suctobelba atomaria* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba beringiana* Krivolutsky, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (I. Kuriles, Polonia y Turquía).
- *Suctobelba chinonei* Subías, 2016
  (=*Suctobelba simplex* Chinone, 2003, *nom. praeoc.* por Balogh, 1968)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelba consimilis* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Suctobelba cornigera* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
  (=*Suctobelba cornuta* Shtanchaeva *et* Subías, 2009, *nom. praeoc.* por Hammer, 1962)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Suctobelba discrepans* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba flagelliseta* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Suctobelba granulata* Hammen, 1952 (*S. trigona g.*)
  (=*Suctobelba saetosa* Kulijev, 1965)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Suctobelba lapidaria* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba media* Mihelčič, 1953 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Suctobelba regia* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Suctobelba reticulata* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

Suctobelba scalpellata Moritz, 1970
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba scalpellata scalpellata* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba scalpellata caucasica* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Suctobelba secta* Moritz, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba sorrentensis* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba trigona* (Michael, 1888) (*Notaspis*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y Groenlandia.
- *Suctobelba tumulata* Higgins *et* Woolley, 1976
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

Suctobelbata Gordeeva, 1991 (10 spp. y 1 ssp.)
(=***Unicobelba*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999)
ESPECIE TIPO: *Suctobelbata nova* Gordeeva, 1991
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.
- *Suctobelbata aomoriensis* (Fujikawa, 2004) (*Unicobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbata arcuata* (Hammer, 1968) (*Zeasuctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Suctobelbata elizabethae* (Jacot, 1938) (*Suctobelbila*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Suctobelbata hirauchiae* Chinone, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbata nova* Gordeeva, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Centro de Rusia europea.
- *Suctobelbata prelli* (Märkel *et* Meyer, 1958) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centrooccidental y Canadá).
- *Suctobelbata punctata* (Hammer, 1955) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Alaska y Japón).

Suctobelbata spicata (Jacot, 1938) (*Suctobelbila*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Suctobelbata spicata spicata* (Jacot, 1938)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Suctobelbata spicata lanceolata* (Jacot, 1938) (*Suctobelbila*) *ssp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Suctobelbata truncicola* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Suecia y "Japón").
- *Suctobelbata ypsilonsignata* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999) (*Unicobelba*)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.

Suctobelbella Jacot, 1937 (158 spp. y 11 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Suctobelbella serratirostrum* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Suctobelbella (Suctobelbella) Jacot, 1937 (73 spp. y 8 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Suctobelbella (S.) acuta* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
Suctobelbella (S.) acutidens (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Argentina.
- *Suctobelbella (S.) acutidens acutidens* (Forsslund, 1941)
(?=*Dameosoma cornigerum* Berlese, 1902 *sp. inq.*)
(=*Suctobelba glabroclava* Kulijev, 1965)
(=*Suctobelba perpendiculata* Forsslund, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Argentina.
- *Suctobelbella (S.) acutidens duplex* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba d.*)
(=*Suctobelba brachyodon* Mihelčič, 1958)
(=*Suctobelba hammerae* Krivolutsky, 1965)
(=*Suctobelba tuberosa* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Canadá).
- *Suctobelbella (S.) acutidens lobata* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
(=*Suctobelba ornata* Krivolutsky, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Suctobelbella (S) acutidens pilososetosa* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
(?=*Suctobelbella trichosa* Bayoumi, 1979 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Suctobelbella (S.) acutidens sarekensis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba s.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: (Paleártica occidental, Irán, Este de Rusia asiática y Neártica).
- *Suctobelbella (S.) alpina* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) amurica* (Krivolutsky, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte) e India (Tripura).
- *Suctobelbella (S.) angulata* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) arcana* Moritz, 1970
DISTRIBUCIÓN: Holárica: Paleártica (Europa: menos frecuente en el Norte, y Este de Rusia asiática) y Neártica (U.S.A.: Luisiana, y Canadá).
- *Suctobelbella (S.) biangulata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbella (S.) bullocki* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Suctobelbella (S.) cornuta* (Hammer, 1962) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Suctobelbella (S.) crispirhina* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) decorata* (P. Balogh, 1984) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctobelbella (S.) delessei* (Strenzke, 1955) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Groenlandia.
- *Suctobelbella (S.) flabellifera* (Balogh, 1958) (*Suctobelba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Suctobelbella (S.) frondosa* Aoki *et* Fukuyama, 1976
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Suctobelbella (S.) frothinghami* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Suctobelbella (S.) granifera* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica oriental: Japón y Sur de Siberia, y Paleártica occidental: Cáucaso y España).
- *Suctobelbella (S.) harteni* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
- *Suctobelbella (S.) hokkaidoensis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) hurshi* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá).
- *Suctobelbella (S.) italica* (Mahunka, 1966) (*Suctobelba*)
(=*Suctobelbella diffissa* Moritz, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (excepto Norte) e Irán.
- *Suctobelbella (S.) laevis* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A.: Carolina del Norte, e I. Kuriles).
- *Suctobelbella (S.) laiae* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Suctobelbella (S.) latipectoralis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S) liacariformis* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y España).
- *Suctobelbella (S.) lienhardi* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Suctobelbella (S.) lobodentata* (Mihelčič, 1957) (*Suctobelba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Suctobelbella (S.) longicurva* (Hammer, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Hawái).
Suctobelbella (S.) longicuspis Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (Neártica oriental, Europa e I. Kuriles), El Salvador, Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Suctobelbella (S.) longicuspis longicuspis* Jacot, 1937
(=*Suctobelba falcata* Forsslund, 1941)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (Neártica oriental, Europa: frecuente, e I. Kuriles), El Salvador, Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Suctobelbella (S.) longicuspis lanceolata* Jacot, 1939
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Suctobelbella (S.) longidentata* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) longirostris* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Europa: frecuente en el Norte, y Paleártica oriental) y Neártica (U.S.A.: Alaska y Carolina del Norte).
- *Suctobelbella (S.) longisensillata* Fujita *et* Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) longisetosa* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Cuba).
- *Suctobelbella (S.) macrodentata* (Hammer, 1962) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Ecuador).
- *Suctobelbella (S.) messneri* Moritz, 1971
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelbella (S.) microdentata* (Hammer, 1962) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Suctobelbella (S.) minor* (Mihelčič, 1958) (*Suctobelba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Suctobelbella (S.) naranensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Suctobelbella (S.) nayoroensis* Fujita *et* Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) nitida* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) obtusa* Liu *et* Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Suctobelbella (S.) opistodentata* (Golosova, 1970) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa meridional y Paleártica oriental).
- *Suctobelbella (S.) ornata* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Suctobelbila*)
(=*Suctobelbella neonominata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Suctobelbella (S.) ornatissima* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctobelbella (S.) palustris* (Forsslund, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Suctobelbella (S.) paracarinata* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Suctobelbella (S.) paracutidens* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Suctobelbella (S.) parapinnata* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Suctobelbella (S.) perarmata* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Suctobelbella (S.) perforata* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Suctobelbella (S.) pinnigera* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Suctobelbella (S.) prominens* (Moritz, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Europea (menos frecuente en el Norte).
- *Suctobelbella (S.) pseudoornatissima* (Balogh *et* Mahunka, 1981) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctobelbella (S.) pseudornata* (Woas, 1986) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (El Salvador y Ecuador).
- *Suctobelbella (S.) pulchra* (Mihelčič, 1958) (*Suctobelba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Suctobelbella (S.) pumila* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) reticulatoides* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) rotunda* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) scrofa* (Balogh *et* Mahunka, 1968) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Paraguay).

- *Suctobelbella (S.) serratirostrum* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Suctobelbella (S.) sexdentata* (Mihelčič, 1958) (*Suctobelba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Suctobelbella (S.) shironeseta* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) similidentata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Vietnam.
- *Suctobelbella (S.) similis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Este de Rusia asiática).
- *Suctobelbella (S.) singularis* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: excepto Oeste, Irán y Este de Paleártica oriental) y Taiwán [Formosa].
- *Suctobelbella (S.) squamiseta* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

Suctobelbella (S.) subcornigera (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Oriental y Nueva Zelanda.
- *Suctobelbella (S.) subcornigera subcornigera* (Forsslund, 1941)
(=*Suctobelba delicata* Krivolutsky, 1966)
(?=*Suctobelbella laxtoni* Jacot, 1937 *sp. inq.*)
(=*Suctobelba macrodon* Mihelčič, 1956)
(=*Suctobelbella semidentata* Hammer, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental y Nueva Zelanda.
- *Suctobelbella (S.) subcornigera hamata* Moritz, 1970 (*S. h.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centrooccidental y U.S.A.: Luisiana).
- *Suctobelbella (S) subcornigera maculata* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso e Ibérica).
- *Suctobelbella (S.) subcornigera vera* (Moritz, 1964) (*Suctobelba v.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Oeste de Siberia).

- *Suctobelbella (S.) toelgyesii* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Suctobelbella (S.) tohokuensis* Enami *et* Chinone, 1997
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) triangulata* Liu *et* Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Suctobelbella (S.) tschabovskyi* (Krivolutsky, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- *Suctobelbella (S.) tumida* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) variabilis* (Hammer, 1962) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctobelbella (S.) yezoensis* Fujita *et* Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Suctobelbella (Flagrosuctobelba) Hammer, 1979 (62 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Flagrosuctobelba multiplumosa* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) acutissima* (Balogh, 1958) (*Suctobelba*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) affinis* Hammer, 1977 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) alloenasuta* Moritz, 1971 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Europa centromeridional y U.S.A.: Carolina del Norte).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) ancorhina* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Japón).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) aokii* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) arcuata* Hammer, 1977 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) baloghi* (Forsslund, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) biarcuata* Hammer, 1979 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) carcharodon* Moritz, 1966 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional e India (Tripura).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) chabarica* Rjabinin, 1975 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) chitralensis* Hammer, 1977 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) conica* Zhao *et* Wen, 1993 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) dargoltsiana* (Krivolutsky, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

Suctobelbella (Flagrosuctobelba) diversosetosa (Hammer, 1979) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Cáucaso.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) diversosetosa diversosetosa* (Hammer, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) diversosetosa arilloi* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) elegantula* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
(=*Suctobelba naginata* Aoki, 1961)
(=*Suctobelba quadricarina* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical, Oriental y Etiópica (Sudáfrica y Tanzania), y subtropical: Holártica meridional (Paleártica meridional y U.S.A.: Luisiana).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) flabella* (Mondal, 1984) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) flagellifera* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Japón).
Suctobelbella (Flagrosuctobelba) forsslundi (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) forsslundi forsslundi* (Strenzke, 1950)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) forsslundi moritzi* Mahunka, 1987 (*S. m.*)
(=*Suctobelbella besucheti* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) hastata* Pankov, 1986 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) ibarakiensis* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) indica* (Haq, 1978) (*Suctobelba semiplumosa i.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) insulana* (Hammer, 1972) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Oriental.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) kaliurangensis* Hammer, 1979 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) kantoensis* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) kontschani* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Etiopía).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) lata* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) lineata* (Balogh, 1970) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) macroseta* Mahunka, 1996 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) magnicava* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) magnifera* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) memorabilis* (Hammer, 1979) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) meridionalis* (Kahwash, Subías *et* Ruiz, 1991) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) multiplumosa* (Hammer, 1979) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Filipinas), Neotropical y Cáucaso.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) muronokiensis* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) nana* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Cáucaso y España) e Irán.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) nasalis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
(?=*Dameosoma bellum* Berlese, 1904 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y Nueva Zelanda.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) parallelodentata* Hammer, 1979 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Vietnam).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) parva* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) penicillata* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical (Panamá y Ecuador).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) peracuta* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica (Sudáfrica).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) pilifera* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio) y Ecuador.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) plicata* Pankov, 1986 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) plumata* (Hammer, 1979) (*F.*)
(=*Suctobelbella (Flagrosuctobelba) praeoccupata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Taiwán [Formosa]).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) plumosa* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) ponticula* (Hammer, 1971) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) e India (Bengala Occidental).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) quadrata* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) quinquedentata* (Hammer, 1970) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) ramosa* (Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) ruzsinszkyi* Mahunka, 1983 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Sudáfrica) y Vietnam.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) sanjiangensis* Liu *et* Wu, 2013 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
Suctobelbella (Flagrosuctobelba) semiplumosa (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Oriental, Australiana, Neotropical (Brasil y Ecuador) y Etiópica.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) semiplumosa semiplumosa* (Balogh *et* Mahunka, 1967)
(=*Flagrosuctobelba simillima* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Oriental, Nueva Guinea, Neotropical (Brasil y Ecuador) y Etiópica (Etiopía y Tanzania).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) semiplumosa tahitiensis* (Hammer, 1972) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: "Oriental", Australiana y Etiópica (Sudáfrica y Camerún).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) sensillinuda* Shtanchaeva *et* Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Cáucaso y España) e Irán.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) setosa* (Hammer, 1979) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Tailandia) e I. Galápagos.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) setosoclavata* (Hammer, 1952) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) sicilifera* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) simplex* (Balogh, 1968) (*Suctobelba semiplumosa s.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) sinuata* (Hammer, 1982) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Bali), Australiana (Hawái) y subantártica (I. Amsterdam).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) solita* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) spiculigera* (Berlese, 1913) (*Suctobelba cornigera s.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) subtrigona* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)
(=*Suctobelba intermedia* Willmann, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente en Paleártica occidental, y Neártica septentrional), Méjico y Vietnam.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) tatarica* (Krivolutsky, 1968) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Europa occidental).
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) verrucosa* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Suctobelbella (Ussuribata) Rjabinin, 1975 (22 spp.)
(=***Bruneibelba*** Mahunka, 2001)
(=***Discosuctobelba*** Hammer, 1979)
ESPECIE TIPO: *Ussuribata clavata* Rjabinin, 1975
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Suctobelbella (Ussuribata) acutodentata* (Hammer, 1979) (*Discosuctbelba*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbella (Ussuribata) baliensis* Hammer, 1982 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Suctobelbella (Ussuribata) bivittata* (Hammer, 1979) (*Discosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Suctobelbella (Ussuribata) chinonei* Subías, 2017
(=*Suctobelbella reticulata* Chinone, 2003, *nom. praeoc.* por Hammer, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Ussuribata) clavata* (Rjabinin, 1975) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Suctobelbella (Ussuribata) flagellata* (Balogh, 1959) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Suctobelbella (Ussuribata) foliosa* Mahunka, 1988 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Suctobelbella (Ussuribata) latirostris* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Oeste de Siberia) y Vietnam.
- *Suctobelbella (Ussuribata) latodentata* (Hammer, 1979) (*Discosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbella (Ussuribata) magnodentata* Hammer, 1982 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Suctobelbella (Ussuribata) papuana* (Balogh, 1968) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Suctobelbella (Ussuribata) permixta* Balogh *et* P. Balogh, 2002 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Suctobelbella (Ussuribata) phylliformis* Ermilov, Shtanchaeva *et* Subías, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Suctobelbella (Ussuribata) reticulata* (Hammer, 1982) (*Discosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Suctobelbella (Ussuribata) separata* (Mahunka, 2001) (*Bruneibelba*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Suctobelbella (Ussuribata) sexsetosa* (Hammer, 1979) (*Discosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Vietnam).
- *Suctobelbella (Ussuribata) silva* Fujikawa, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (Ussuribata) sinica* Wen, 1997 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Suctobelbella (Ussuribata) spirochaeta* Mahunka, 1983 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Japón.
- *Suctobelbella (Ussuribata) tuberosa* (Mahunka, 2001) (*Bruneibelba*)
(no *Suctobelba tuberosa* Mihelčič, 1956, =*Suctobelbella acutidens*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Suctobelbella (Ussuribata) variosetosa* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y Japón.
- *Suctobelbella (Ussuribata) womersleyi* (Balogh, 1968) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

Suctobelbila Jacot, 1937 (35 spp. y 1 ssp.)
(=***Reticobella*** Hammer, 1962)
(=***Rhynchobella*** Hammer, 1961)
(=***Suctoppia*** Balogh, 1958)
ESPECIE TIPO: *Suctobelbila punctillata* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Suctobelbila approximata* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Suctobelbila baderi* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Suctobelbila cornuta* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Suctobelbila densipunctata* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
Suctobelbila dentata (Hammer, 1961) (*Rhynchobella*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: Perú y Panamá, Australiana, Etiópica: Etiopía y Sudáfrica, e India: Bengala Occidental) y Paleártica (Europa centromeridional y Paquistán).
- *Suctobelbila dentata dentata* (Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: Perú y Panamá, Australiana, Etiópica: Etiopía y Sudáfrica, e India: Bengala Occidental) y subtropical (Paquistán).
- *Suctobelbila dentata europaea* Moritz, 1974
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelbila excavata* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Suctobelbila fissurata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Suctobelbila fonticula* Hammer, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Argelia) y Etiópica (Congo y Sudáfrica).
- *Suctobelbila globulifera* (Balogh, 1958) (*Suctoppia*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Suctobelbila hauseri* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Suctobelbila kiyosumiensis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbila longitudinalis* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Suctobelbila margaritata* Balogh *et* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Suctobelbila minima* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Suctobelbila multituberculata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Suctobelbila neonominata* Subías, 2004
(=*Suctobelbila ornata* Hammer, 1979, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Mahunka, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Suctobelbila penniseta* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbila peruensis* Woas, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctobelbila pocsi* Balogh *et* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Suctobelbila popovi* Gordeeva, 2004
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Suctobelbila pulchella* (Hammer, 1962) (*Rhynchobella*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Suctobelbila punctillata* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Suctobelbila punctocostulata* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Suctobelbila quinquenodosa* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Suctobelbila scutata* Hammer, 1972 (*S. squamosa s.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) y Oriental (Borneo y Vietnam).
- *Suctobelbila sexnodosa* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas e India: Bengala Occidental).
- *Suctobelbila squamosa* (Hammer, 1961) (*Rhynchobella*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Melanesia (I. Fiji).
- *Suctobelbila suctobelboides* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Suctobelbila transrugosa* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Vietnam.
- *Suctobelbila trifasciata* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Suctobelbila tripartita* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Suctobelbila tuberculata* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Suctobelbila tumida* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Suctobelbila undulata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Taiwán [Formosa]).
- *Suctobelbila waterhouseri* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Suctobelbiloides Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Suctobelbiloides armatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Suctobelbiloides armatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Zeasuctobelba Hammer, 1966 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Zeasuctobelba quinquenodosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).
- *Zeasuctobelba endroedyyoungai* (Mahunka, 1985) (*Suctobelbila*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Zeasuctobelba processa* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).
- *Zeasuctobelba quinquenodosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Zeasuctobelba tierradelfuegoensis* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).
- *Zeasuctobelba trinodosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Rhynchoribatidae Balogh, 1961 (3 gen., 4 subgen. y 41 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Eurhynchoribates Miko, 2016 (17 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates borhidii* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).

Eurhynchoribates (Eurhynchoribates) Miko, 2016 (14 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Eurhynchoribates (E.) acutus* (Balogh, 1958) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Eurhynchoribates (E.) borhidii* (Mahunka, 1986) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Eurhynchoribates (E.) brevisensillatus* Bayartogtokh *et* Shimano, 2019
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (Palau).
- *Eurhynchoribates (E.) excelsior* (Mahunka, 1985) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Camerún).
- *Eurhynchoribates (E.) genavensium* (Mahunka, 1997) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Eurhynchoribates (E.) jendeki* Ermilov *et* Kalúz, 2021
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Eurhynchoribates (E.) misamisensis* Miko, Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eurhynchoribates (E.) montanus* (Balogh, 1962) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Eurhynchoribates (E.) obtusus* (Mahunka, 1985) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Eurhynchoribates (E.) pocsi* (Mahunka, 1986) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Eurhynchoribates (E.) radula* (Mahunka, 1983) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Eurhynchoribates (E.) robinsoni* (Balogh, 1962) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Madagascar y Costa de Marfil).
- *Eurhynchoribates (E.) serratus* (Balogh, 1958) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eurhynchoribates (E.) subaequalis* (Balogh, 1962) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Eurhynchoribates (E.) nuevavizcayaensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Eurhynchoribates (Orinchobates) Miko, Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eurhynchoribates (Orinchobates) samarensis* Miko, Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eurhynchoribates (Orinchobates) orientalis* (Balogh, 1970) (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Eurhynchoribates (Orinchobates) samarensis* Miko, Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Rhynchoribates Grandjean, 1929 (18 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates rostratus* Grandjean, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Rhynchoribates (Rhynchoribates) Grandjean, 1929 (8 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rhynchoribates (R.) amazonicus* Woas, 1986
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhynchoribates (R.) danbartai* Miko, 2016
DISTRIBUCIÓN: Guayana francesa.
- *Rhynchoribates (R.) edentatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rhynchoribates (R.) insignis* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Rhynchoribates (R.) longisetosus* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2014
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Rhynchoribates (R.) rostratus* Grandjean, 1929
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Rhynchoribates (R.) spathulatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rhynchoribates (R.) spectabilis* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Rhynchoribates (Parhynchoribates) Miko, 2016 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates parafabulosus* Ermilov *et* Kalúz, 2014
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rhynchoribates (Parhynchoribates) fabulosus* Beck, 1961 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Rhynchoribates (Parhynchoribates) grandis* Hammer, 1961 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Rhynchoribates (Parhynchoribates) parafabulosus* Ermilov *et* Kalúz, 2014 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) Miko, 2016 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) dynastes* Miko, 2016
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) brasiliensis* Woas, 1986 (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).
- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) dilatatus* Balogh *et* Mahunka, 1969 (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) dynastes* Miko, 2016
DISTRIBUCIÓN: Guayana francesa.
- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) ecuadoriensis* P. Balogh, 1988 (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) mirus* Beck, 1961 (*Rhynchoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) rioyuyapichisensis* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Perú.

Rhynchoribates (Tectorhynchoribates) Miko, 2016 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates (Tectorhynchoribates) jurobales* Miko, 2016
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rhynchoribates (Tectorhynchoribates) jurobales* Miko, 2016
DISTRIBUCIÓN: Guayana francesa.

Suctoribates Balogh, 1963 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Suctoribates suctorius* Balogh, 1963
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Suctoribates carinatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Suctoribates crassisetosus* Franklin *et* Woas, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Suctoribates foliatus* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Suctoribates neotropicus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctoribates palawanensis* Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Suctoribates suctorius* Balogh, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Angola.

Trizetidae Ewing, 1917 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Neotropical.

Trizetes Berlese, 1904 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trizetes pyramidalis* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Neotropical.
- *Trizetes pyramidalis* Berlese, 1904
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y Méjico.

Otocepheoidea Balogh, 1961

Dampfiellidae Balogh, 1961 (2 gen. y 58 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Beckiella Grandjean, 1964 (33 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dampfiella cejansis* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Beckiella acuta* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella africana* (Balogh, 1958) (*Dampfiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Etiopía).
- *Beckiella arcta* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Beckiella bloszyki* Starý, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella borhidii* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Beckiella bucephala* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Beckiella capitulum* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella carinata* (Beck, 1962) (*Dampfiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Beckiella cejansis* (Beck, 1962) (*Dampfiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Beckiella clavata* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Beckiella costulata* Mahunka, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Beckiella cubana* Starý, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella deficiens* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella discoidalis* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella disiuncta* Mahunka, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Beckiella duplicata* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Beckiella elongata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Beckiella foveolata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Beckiella fratercula* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella garciai* Balogh *et* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella inca* Starý, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Beckiella interlamellaris* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella irmayi* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Beckiella lamellata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Beckiella latirostris* Starý, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Beckiella microseta* Balogh *et* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Beckiella opposita* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Beckiella recta* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Ecuador).
- *Beckiella reticulofemorata* Balogh *et* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella sellnicki* (Hammer, 1961) (*Dampfiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Beckiella silvai* Balogh *et* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella synlamellata* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella vitiosa* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Dampfiella Sellnick, 1931 (25 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dampfiella procera* Sellnick, 1931
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Dampfiella ambigua* Pérez-Íñigo, 1976
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Dampfiella angusta* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Dampfiella dubia* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Dampfiella euaensis* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Dampfiella foliata* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Dampfiella jandai* Starý, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Dampfiella kinabalu* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dampfiella luzonica* Corpuz-Raros, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella mahunkai* Starý, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Dampfiella nebulosa* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dampfiella ovalis* Corpuz-Raros, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella papuana* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dampfiella paratina* (Mahunka, 1983) (*Beckiella*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dampfiella peseki* Starý, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Dampfiella philippica* Corpuz-Raros, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella procera* Sellnick, 1931
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Dampfiella prostrata* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).
- *Dampfiella putinglupa* Corpuz-Raros, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella sepilok* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dampfiella setosa* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Dampfiella similis* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Filipinas.
- *Dampfiella similoides* Corpuz-Raros, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella tupi* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Dampfiella vanalinearis* Corpuz-Raros, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella zellwegeri* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Tetracondylidae Aoki, 1961 (23 gen., 6 subgen., 325 spp. y 11 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Afrotocepheus Mahunka, 1985 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Afrotocepheus sinarmatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Afrotocepheus (Afrotocepheus) Mahunka, 1985 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Afrotocepheus sinarmatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Afrotocepheus (Didierotocepheus) Mahunka, 1994 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Didierotocepheus berndi* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Afrotocepheus (Didierotocepheus) berndi* (Mahunka, 1994) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Borneremaeus Mahunka, 1991 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Borneremaeus hauseri* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Borneremaeus hauseri* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Bulbocepheus Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Bulbocepheus hauserorum* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Bulbocepheus hauserorum* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Carabocepheus Berlese, 1910 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Carabodes (Carabocepheus) lounsburyi* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Carabocepheus latior* Balogh *et* Mahunka, 1966 (*C. lounsburyi l.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Carabocepheus lounsburyi* (Berlese, 1910) (*Carabodes (Caraboceph.)*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Sudáfrica y Zimbabue [Rodesia].

Cavernocepheus Balogh *et* Mahunka, 1969 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cavernocepheus monstruosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.

Cavernocepheus (Cavernocepheus) Balogh *et* Mahunka, 1969 (7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cavernocepheus acutus* P. Balogh *et* Palacios-Vargas, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Cavernocepheus furcatus* P. Balogh *et* Palacios-Vargas, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Cavernocepheus fusifer* P. Balogh *et* Palacios-Vargas, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Cavernocepheus monstruosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cavernocepheus monticola* P. Balogh, 1989
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Cavernocepheus obliquus* P. Balogh, 2002
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Cavernocepheus undulatus* P. Balogh, 2002
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Cavernocepheus (Paracavernocepheus) Ermilov *et* Starý, 2018 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cavernocepheus (Paracavernocepheus) nortonroyi* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Cavernocepheus (Paracavernocepheus) nortonroyi* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Cavernocepheus (Paracavernocepheus) concavus* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.

Dolicheremaeus Jacot, 1938 (182 spp. y 9 sspp.)
(=***Tetracondyla*** Newell, 1956)
ESPECIE TIPO: *Dolicheremaeus rubripedes* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Dolicheremaeus absolon* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Dolicheremaeus aethiopicus* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Dolicheremaeus africanus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus agusanus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Dolicheremaeus almerodai* Corpuz-Raros, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus alticola* Balogh *et* P. Balogh, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus alveolatus* (Oudemans, 1915) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus alviolai* Corpuz-Raros, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus amazonicus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
- *Dolicheremaeus andulauensis* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus aokii* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Dicondyla*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus attenuatus* Wen, 1998
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Dolicheremaeus baguioensis* Corpuz-Raros, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus balikous* Corpuz-Raros, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus baloghi* Aoki, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.
- *Dolicheremaeus bartkei* Rajski *et* Szudrowicz, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus baseyensis* Corpuz-Raros, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus batarazaensis* Corpuz-Raros, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus bengalensis* Sanyal, 1992
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Dolicheremaeus bifidus* (Csiszár, 1961) (*Tetracondyla*)
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus bolivianus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Dolicheremaeus borbolai* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Costa de Marfil).
- *Dolicheremaeus brasilianus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Dolicheremaeus bruneiensis* Aoki, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Noreste de India).
- *Dolicheremaeus bugiamapensis* Ermilov, Anichkin *et* Wu, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus caneteae* Corpuz-Raros, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Dolicheremaeus capillatus (Balogh, 1959) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.
- *Dolicheremaeus capillatus capillatus* (Balogh, 1959)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.
- *Dolicheremaeus capillatus neonominatus* Subías, 2004
  (=*Tetracondyla capillata minor* Wallwork, 1962, *nom. praeoc.* por Berlese, 1913)
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Dolicheremaeus capizensis* Corpuz-Raros, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus capreolatus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
  DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus carinatus* Aoki, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Dolicheremaeus cebuensis* Corpuz-Raros, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus ceylonicus* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus cicatricosus* Mahunka, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus claviger* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Borneo y Japón.
- *Dolicheremaeus conjunctus* Mahunka, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus contactus* Ermilov *et* Anichkin, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus coronarius* Chakrabarti, Bhaduri *et* Kundu, 1981
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Dolicheremaeus crispus* (Balogh, 1962) (*Tetracondyla*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus csuzdii* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Dolicheremaeus curvisetus* Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Dolicheremaeus cuspidatus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus cuyi* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus damoeoides* (Berlese, 1913) (*Otocepheus*)
(=*Dolicheremaeus berlesei* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
(=*Tetracondyla pallida* Newell, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (Java y Vietnam), Australiana y Neotropical (I. Juán Fernández).
- *Dolicheremaeus densefoveolatus* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus distinctus* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón e India (Arunachal Pradesh).
- *Dolicheremaeus donacunarensis* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus dorni* (Balogh, 1937) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Dolicheremaeus duplicarinatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus duplicatus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Dolicheremaeus dwalteri* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus elisabethae* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus elongatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
- *Dolicheremaeus euaensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Dolicheremaeus eusebioi* Corpuz-Raros *et* Lit, 2005
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus fijiensis* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Dolicheremaeus filipinus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus fujikawae* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus furcatus* (Balogh, 1961) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Dolicheremaeus furcillatus* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus furcula* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus gapudi* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus garciai* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus geminus* Mondal *et* Kundu, 1986
DISTRIBUCIÓN: India.
- *Dolicheremaeus genitalis* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus georgii* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Dolicheremaeus giganticus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Dolicheremaeus grafatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus granulatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus gruezoi* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus gyroplicatus* Wen, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Dolicheremaeus hammerae* Corpuz-Raros, 2000
(=*Dolicheremaeus obsessus* Subías, 2004)
(=*Dolicheremaeus lineolatus* Hammer, 1981, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Mahunka, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Tripura).
- *Dolicheremaeus heterotrichus* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus himalayensis* Chakrabarti, Bhaduri *et* Kundu, 1981
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Dolicheremaeus hirsutus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Dolicheremaeus imadatei* Aoki, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Dolicheremaeus inaequalis* Balogh *et* Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus indicus* Haq, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
Dolicheremaeus infrequens Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
- *Dolicheremaeus infrequens infrequens* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Dolicheremaeus infrequens amamiensis* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Dolicheremaeus infrequens coreanus* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Dolicheremaeus infrequens hachijoensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
- *Dolicheremaeus infrequens taiwanus* Aoki, 1991
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Japón.
- *Dolicheremaeus inopinatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Dolicheremaeus insolitus* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus junichiaokii* Subías, 2010
(=*Dolicheremaeus magnus* Aoki, 2006, *nom. praeoc.* por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Dolicheremaeus keralensis* Sanyal, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Dolicheremaeus krantzi* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus kummeri* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus leytensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus lineatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus lineolatus* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus liti* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus longipilus* (Higgins *et* Woolley, 1963) (*Autogneta*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Dolicheremaeus losbanosensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus lucidus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus luxtoni* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus luzonicellus* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus luzonicus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus machadoi* (Balogh, 1958) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
Dolicheremaeus magnus (Balogh, 1958) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Ghana).
- *Dolicheremaeus magnus magnus* (Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus magnus ghanensis* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus magnus iteratus* Subías, 2004
(=*Tetracondyla magna minor* Wallwork, 1962, *nom. praeoc.* por Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus magnus longiseta* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus mahabasensillus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus mahnerti* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Dolicheremaeus malakicondylus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus malakius* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus malangensis* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Dolicheremaeus maliit* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus mambusaoensis* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus manifera* Hammer, 1981

DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus mariehammerae* Corpuz-Raros, 1991
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus markusi* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus matulis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus mauritii* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Dolicheremaeus mindanaoensis* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus minor* (Berlese, 1913) (*Otocepheus longior m.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus misamisensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus montanus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Dolicheremaeus mutabilis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus nagpalae* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus nasalis* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Dolicheremaeus nepalensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Norte de Oriental.
- *Dolicheremaeus niedbalai* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus nimbus* Karppinen, 1966
DISTRIBUCIÓN: Guinea.
- *Dolicheremaeus obtusisetus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus oginoi* (Aoki, 1965) (*Dicondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).
- *Dolicheremaeus ohmensis* Aoki, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Dolicheremaeus orientalis* (Aoki, 1965) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam) y Japón.
- *Dolicheremaeus oroquietaensis* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus pahabaeus* Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2011
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus palawanus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus panayensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus pannosus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Dolicheremaeus papuensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India.
- *Dolicheremaeus pectinatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus perisi* Pérez-Íñigo, 1969
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Dolicheremaeus perreti* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Dolicheremaeus philippinensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Dolicheremaeus phyllotrichus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Costa de Marfil).
- *Dolicheremaeus porcinolus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Dolicheremaeus praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Dolicheremaeus curvisetus* Hammer, 1981, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus pseudofurcatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus punctatus* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus pustulatus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Dolicheremaeus quezonensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus rawisensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus renukae* Sanyal, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Dolicheremaeus repetitus* Subías, 2004
(=*Dolicheremaeus elongatus* Balogh, 1968, *nom. praeoc.* por Aoki, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus reyesi* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus rimandoi* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus robustus* Mahunka, 1973
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus romyi* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus rubripedes* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: Suereste de U.S.A.
- *Dolicheremaeus russiae* Mondal, Kundu *et* Roy, 1999
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Dolicheremaeus sabahnus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Dolicheremaeus samarensis* Corpuz-Raros, 1990
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus semicapillatus* (Balogh, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus semilunatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus seychellensis* (Warburton, 1912) (*Amerus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Dolicheremaeus siamensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Dolicheremaeus simplex* (Balogh, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus singaporensis* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Dolicheremaeus spatulatus* Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2009
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus speciosus* (Pearce, 1906) (*Amerus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Dolicheremaeus subiasi* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus subsimilis* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus sulcatus* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus sumatranus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Dolicheremaeus szentivanyi* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus taidinchani* Mahunka, 1976
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Dolicheremaeus tamurai* Aoki, 1990
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Dolicheremaeus tenuisetus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus triangularis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus tricornutus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Dolicheremaeus trimucronatus* Mahunka, 1973
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus upicentenarius* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus variolatus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Dolicheremaeus variolobatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y China suroriental).

Dolicheremaeus vilhenarum (Balogh, 1958) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Dolicheremaeus vilhenarum vilhenarum* (Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún).
- *Dolicheremaeus vilhenarum barbatula* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Dolicheremaeus visayasensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus viscaensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus vitraeus* (Balogh, 1958) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Dolicheremaeus wallacei* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus wallworki* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus wangi* Aoki *et* Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Dolicheremaeus waray* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus yoshii* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus zanzibarensis* Ermilov *et* Khaustov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Fernandocepheus Mahunka, 1982 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Fernandocepheus franzi* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Fernandocepheus franzi* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).

Fissicepheus Balogh *et* Mahunka, 1967 (28 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Fissicepheus elegans* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Fissicepheus (Fissicepheus) Balogh *et* Mahunka, 1967 (26 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Fissicepheus (F.) aokii* Zhen *et* Chen, 2018
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Fissicepheus (F.) chinensis* Wen, 1993
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Fissicepheus (F.) clavatus* (Aoki, 1959) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente) y China suroriental.
- *Fissicepheus (F.) claviopsis* Mahunka, 1971
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Fissicepheus (F.) combicondylus* Zhen *et* Chen, 2018
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Fissicepheus (F.) confragosus* Zhen *et* Chen, 2018
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Fissicepheus (F.) corniculatus* Aoki, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Fissicepheus (F.) coronarius Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
  - *Fissicepheus (F.) coronarius coronarius* Aoki, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
  - *Fissicepheus (F.) coronarius koreensis* Mahunka, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Fissicepheus (F.) curvisetosus* Kubota, 2001
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) defectus* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Fissicepheus (F.) elegans* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Fissicepheus (F.) gracilis* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) haradai* Choi, 1986 (*F. (Psammocepheus)*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.

Fissicepheus (F.) mitis Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
  - *Fissicepheus (F.) mitis mitis* Aoki, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
  - *Fissicepheus (F.) mitis takara* Aoki, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Nepal.

- *Fissicepheus (F.) mitratus* Mahunka, 1971
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Fissicepheus (F.) nakanei* Aoki, 1986
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) ornithorrhynchus* Wen, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Fissicepheus (F.) parastriganovae* Ermilov *et* Kalúz, 2019
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Fissicepheus (F.) sitnikovae* Sergienko, 1976
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Fissicepheus (F.) steinmanni* Mahunka, 1971
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Fissicepheus (F.) striganovae* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Fissicepheus (F.) subclavatus* Mahunka, 1971
DISTRIBUCIÓN: Corea y Taiwán [Formosa].

- *Fissicepheus (F.) takenouchiensis* Fujikawa *et* Nishi, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) thaiensis* Mahunka, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Fissicepheus (F.) vicinus* Aoki, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) wangae* Zhen *et* Chen, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Fissicepheus (Psammocepheus) Aoki, 1970 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Fissicepheus (Psammocepheus) amabilis* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Fissicepheus (Psammocepheus) amabilis* Aoki, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Flagellocepheus P. Balogh, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Flagellocepheus sagittatus* P. Balogh,1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Flagellocepheus sagittatus* P. Balogh, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Colombia.

Hydroecocepheus Corpuz-Raros, 1979 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Hydroecocepheus romeroi* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hydroecocepheus romeroi* Corpuz-Raros, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Leptotocepheus Balogh, 1961 (14 spp.)
ESPECIE TIPO: *Leptotocepheus trimucronatus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Leptotocepheus (Leptotocepheus) Balogh, 1961 (7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Leptotocepheus (L.) angustus* (Hammer, 1981) (*Dolicheremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Leptotocepheus (L.) corpuzrarosae* Subías, 2019
  (=*Leptotocepheus mahunkai* Corpuz-Raros, 1999, *nom. praeoc.* por Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Leptotocepheus (L.) flagellifer* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Leptotocepheus (L.) macromucronatus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Leptotocepheus (L.) murphyi* (Mahunka, 1989) (*Dolicheremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Orientall (Península Malaya y Vietnam).
- *Leptotocepheus (L.) orientalis* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Leptotocepheus (L.) trimucronatus* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.

Leptotocepheus (Longocepheus) Balogh *et* Mahunka, 1966 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Longocepheus australis* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Leptotocepheus (Longocepheus) australis* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Long.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Leptotocepheus (Longocepheus) globosus* (Grobler, 1995) (*Long.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Leptotocepheus (Longocepheus) longus* (Balogh, 1961) (*Pseudotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Leptotocepheus (Longocepheus) mahunkai* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980) (*Long.*)
  (=*Pseudotocepheus longus* Mahunka, 1973, *nom. praeoc.* por Balogh, 1961)
  (=*Pseudotocepheus neonominatus* Subías, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Leptotocepheus (Longocepheus) neozealandicus* Ermilov *et* Minor, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Leptotocepheus (Longocepheus) sexidimorphus* (Vasiliu *et* Călugăr, 1977) (*Nesotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Leptotocepheus (Longocepheus) youngai* (Mahunka, 1984) (*Nesotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Lophotocepheus Balogh *et* P. Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Lophotocepheus simplex* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Lophotocepheus simplex* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia e India (Bengala Occidental).

Neotrichocepheus Hammer, 1973 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Dolicheremaeus (Neotrichocepheus) tongaensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Neotrichocepheus tongaensis* (Hammer, 1973) (*Dolicheremaeus (N.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

Papillocepheus Balogh *et* Mahunka, 1966 (10 spp.)
(=***Clavazetes*** Hammer, 1966)
ESPECIE TIPO: *Papillocepheus heterotrichus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y subtropical austral.
- *Papillocepheus areolatus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Papillocepheus decoratus* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Papillocepheus decorus* (Hammer, 1966) (*Clavazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Papillocepheus deficiens* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Papillocepheus heterotrichus* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Papillocepheus longisetosus* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Yemen.
- *Papillocepheus neotropicus* (Balogh *et* P. Balogh, 1988) (*Clavazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Papillocepheus primus* Ermilov, Anichkin *et* Tolstikov, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillocepheus reductus* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Papillocepheus tuberculatus* (Mahunka, 1978) (*Clavazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Paradolicheremaeus Tseng, 1982 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Paradolicheremaeus tabulatus* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Paradolicheremaeus plurisetus* (Mahunka, 1988) (*Dolicheremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Paradolicheremaeus tabulatus* Tseng, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Pentacepheus Corpuz-Raros, 2004 (1 sp.)
EPECIE TIPO: *Pentacepheus malindangensis* Corpuz-Raros, 2004
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pentacepheus malindangensis* Corpuz-Raros, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Plenotocepheus Hammer, 1966 (12 spp.)
ESPECIE TIPO: *Plenotocepheus mollicoma* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral, Neotropical y Oriental.

Plenotocepheus (Plenotocepheus) Hammer, 1966 (10 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral, Neotropical y Oriental.
- *Plenotocepheus (P.) africanus* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Plenotocepheus (P.) crinitus* Grobler, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Plenotocepheus (P.) delicatissimus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Plenotocepheus (P.) dentatus* Grobler, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Plenotocepheus (P.) discrepans* Grobler, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Plenotocepheus (P.) mollicoma* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Plenotocepheus (P.) neotropicus* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Plenotocepheus (P.) trinidadensis* Ermilov, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Plenotocepheus (P.) undatus* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Plenotocepheus (P.) verrucosus* Grobler, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).

Plenotocepheus (Neotocepheus) Hammer, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Neotocepheus colliger* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).
- *Plenotocepheus (Neotocepheus) colliger* (Hammer, 1966) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Plenotocepheus (Neotocepheus) longipilus* (Trägårdh, 1931) (*Otocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).

Pseudotocepheus Balogh, 1961 (45 spp.)
(***=Constrictocepheus*** Grobler, 1998)
(=***Nesotocepheus*** Hammer, 1972)
ESPECIE TIPO: *Pseudotocepheus pauliani* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical austral.

- *Pseudotocepheus amonstruosus* Mahunka, 1973
  (=*Pseudotocepheus septemtuberculatus* Balogh *et* Mahunka, 1978)
  (=*Pseudotocepheus simplex* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
  (=*Pseudotocepheus transversalis* Mahunka, 1978)
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Etiópica (Sudáfrica y Malgache), Ceilán [Sri Lanka] y Neotropical.
- *Pseudotocepheus andinus* (Fernández, Martínez *et* Eguaras, 1990) (*Nesotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pseudotocepheus aokii* Grobler, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pseudotocepheus asymmetricus* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudotocepheus atolanaro* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pseudotocepheus australis* (Mahunka, 1980) (*Nesotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Pseudotocepheus bacilliger* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudotocepheus clavigerus* (Mahunka, 1978) (*Nesotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Pseudotocepheus coarctatus* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudotocepheus contractus* Grobler, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).
- *Pseudotocepheus curtipilus* (Trägårdh, 1931) (*Odontocepheus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernánadez).
- *Pseudotocepheus curtiseta* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudotocepheus dentatus* Grobler, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pseudotocepheus flagellatus* (Mahunka, 1987) (*Plenotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Pseudotocepheus foveolatus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudotocepheus geminatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pseudotocepheus gobletus* Chakrabarti *et* Mondal, 1978
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Pseudotocepheus granulatus* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pseudotocepheus hammerae* Chakrabarti *et* Kundu, 1978
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Pseudotocepheus hauseri* (Mahunka, 1980) (*Nesotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Pseudotocepheus lanceolatus* Grobler, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pseudotocepheus lienhardi* Mahunka, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pseudotocepheus medius* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pseudotocepheus monteithi* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudotocepheus orientalis* Mondal *et* Kundu, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de Oriental.
- *Pseudotocepheus parafoveolatus* Ermilov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Pseudotocepheus parallelus* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudotocepheus pauliani* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pseudotocepheus pauliensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pseudotocepheus promissus* Grobler, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pseudotocepheus punctatus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Chile.
- *Pseudotocepheus puntaarenasensis* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Pseudotocepheus pygmaeus* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pseudotocepheus radiatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Pseudotocepheus richmondensis* Ermilov *et* Minor, 2019
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudotocepheus setiger* (Hammer, 1972) (*Nesotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití), Etiópica (Congo) y Vietnam.
- *Pseudotocepheus sexdentatus* (Trägårdh, 1931) (*Odontocepheus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).
- *Pseudotocepheus shauni* Grobler, 1997
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pseudotocepheus sturmi* P. Balogh, 1984
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Pseudotocepheus subtilis* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pseudotocepheus szentivanyorum* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudotocepheus tenuiseta* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudotocepheus tolanaro* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pseudotocepheus vicarius* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudotocepheus whanganuiensis* Ermilov *et* Minor, 2019
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Seboetocepheus Mahunka, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Seboetocepheus coronatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Seboetocepheus coronatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Spinotocepheus Hammer, 1981 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Spinotocepheus javensis* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.
- *Spinotocepheus agerus* Fujikawa, 2016
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Spinotocepheus foveolatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Bengala Occidental).
- *Spinotocepheus javensis* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Spinotocepheus nigromaculatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Spinotocepheus tjibodensis* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.

Trichocepheus Balogh *et* Mahunka, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Trichocepheus lamellatus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Trichocepheus auriculus* Grobler, 1995
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Trichocepheus lamellatus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Trichocondyla Balogh *et* P. Balogh, 1986 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trichocondyla multisetosa* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Trichocondyla multisetosa* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Umashtanchaeviella Ermilov, Anichkin *et* Tolstikov, 2014 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Umashtanchaeviella plethotricha* Ermilov, Anichkin *et* Tolstikov, 2014
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Umashtanchaeviella plethotricha* Ermilov, Anichkin *et* Tolstikov, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Wallworkodes Subías, 2021 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Carabodes carinatus* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Wallworkodes carinatus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Wallworkodes hyalinus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

Otocepheidae Balogh, 1961 (12 gen., 7 subgen., 116 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).

Basiceramerus Corpuz-Raros, 1979 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Basiceramerus upelbensis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Basiceramerus babalus* Corpuz-Raros, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basiceramerus bangladeshensis* Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Bangladés.
- *Basiceramerus igorotus* Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Basiceramerus makilingensis* Corpuz-Raros, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basiceramerus rosaeus* (Corpuz-Raros, 2004) (*Leptotocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basiceramerus upelbensis* Corpuz-Raros, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Eurostocepheus Aoki, 1965 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eurostocepheus aquilinus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Eurostocepheus (Eurostocepheus) Aoki, 1965 (6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eurostocepheus (E.) aquilinus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia y Vietnam.
- *Eurostocepheus (E.) heterotrichus* Wen, 1999
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eurostocepheus (E.) mahunkai* Mondal *et* Kundu, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Eurostocepheus (E.) peterjaegeri* Ermilov, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Myanmar [Birmania].
- *Eurostocepheus (E.) sajisei* Corpuz-Raros, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eurostocepheus (E.) wojciechniedbalai* Ermilov *et* Starý, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Eurostocepheus (Cerostocepheus) Mahunka, 1973 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eurostocepheus trisetosus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eurostocepheus (Cerostocepheus) baloghi* (Corpuz-Raros, 1999) (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eurostocepheus (Cerostocepheus) isarogensis* (Corpuz-Raros, 2007) (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eurostocepheus (Cerostocepheus) trisetosus* Balogh, 1970 (*E.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka] y Filipinas).

Ikarotocepheus Mahunka, 1988 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ikarotocepheus alatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Ikarotocepheus alatus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Ikarotocepheus gruezoi* Corpuz-Raros, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Kalayaan Corpuz-Raros, 1998 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Kalayaan bonifacioi* Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Kalayaan (Kalayaan) Corpuz-Raros, 1998 (3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Kalayaan (K.) bonifacioi* Corpuz-Raros, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Kalayaan (K.) centenarius* Corpuz-Raros, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Kalayaan (K.) rizali* Corpuz-Raros, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Kalayaan (Rimandocepheus) Corpuz-Raros, 1998 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rimandocepheus leoi* Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Kalayaan (Rimandocepheus) brevisetosus* (Corpuz-Raros, 1998) (*R.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Kalayaan (Rimandocepheus) leoi* (Corpuz-Raros, 1998) (*R.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Kalayaan (Rimandocepheus) longisetosus* (Corpuz-Raros, 1998) (*R.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Megalotocepheus Aoki, 1965 (24 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Megalotocepheus japonicus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica.

Megalotocepheus (Megalotocepheus) Aoki, 1965 (12 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica.
- *Megalotocepheus (M.) aokii* Mondal *et* Kundu, 1990
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Megalotocepheus (M.) ceylonicus* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Megalotocepheus (M.) darjeelingensis* Mondal *et* Kundu, 1990
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Megalotocepheus (M.) fornicatus* Wen, 1999
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Megalotocepheus (M.) hainanensis* Wen *et* Zhao, 1993
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Megalotocepheus (M.) himalayensis* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.

Megalotocepheus (M.) japonicus Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
- *Megalotocepheus (M.) japonicus japonicus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
- *Megalotocepheus (M.) japonicus setosus* Aoki, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Megalotocepheus (M.) loksai* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Megalotocepheus (M.) mahunkarum* Balogh *et* P. Balogh, 2002
  (=*Megalotocepheus ceylanicus* Mahunka, 1973, *nom. praeoc.* por Balogh, 1970)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Megalotocepheus (M.) mindanensis* Corpuz-Raros, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Megalotocepheus (M.) nigrolobatus* Hammer, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Megalotocepheus (M.) tianshanicus* Krivolutsky, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Megalotocepheus (Archegotocepheus) Mahunka, 1988 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Archegotocepheus singularis* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica.
- *Megalotocepheus (Archegotocepheus) bengalensis* Mondal *et* Kundu, 1990 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Megalotocepheus (Archegotocepheus) brevisetus* (Mahunka, 1989) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Megalotocepheus (Archegotocepheus) crinitus* (Berlese, 1905) (*Carabodes (Otocepheus)*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam) y Este de Paleártica oriental.
- *Megalotocepheus (Archegotocepheus) latus* Aoki, 1965 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Megalotocepheus (Archegotocepheus) polyptychus* Wen, 1999 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Megalotocepheus (Archegotocepheus) robustus* (Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2006) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Megalotocepheus (Archegotocepheus) singularis* (Mahunka, 1988) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Megalotocepheus (Archegotocepheus) undulatus* Hammer, 1981 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Bengala Occidental).

Megalotocepheus (Dicondyla) Aoki, 1965 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dicondyla aurita* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Megalotocepheus (Dicondyla) auritus* (Aoki, 1965) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Megalotocepheus (Dicondyla) fossalis* (Zheng *et* Chen, 2020) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Megalotocepheus (Dicondyla) ornatus* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Megalotocepheus (Dicondyla) yunnanensis* (Wen, 1999) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Ocellotocepheus Mahunka, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ocellotocepheus tuberculatus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Ocellotocepheus tuberculatus* Mahunka, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Otocepheus Berlese, 1905 (56 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes (Otocepheus) longior* Berlese, 1905
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Australiana y "Neotropical") y subtropical (Paleártica meridional).

Otocepheus (Otocepheus) Berlese, 1905 (9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Australiana y "Neotropical") y subtropical (Paleártica meridional).
- *Otocepheus (O.) cristatus* (Canestrini, 1897) (*Eremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Java.
- *Otocepheus (O.) durian* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (O.) hauseri* Mahunka, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Otocepheus (O.) heterosetiger* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Myanmar [Birmania]).
- *Otocepheus (O.) longior* (Berlese, 1905) (*Carabodes (O.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Tailandia) y Cáucaso.
- *Otocepheus (O.) negrosensis* Corpuz-Raros, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (O.) pacificus* Trägårdh, 1931 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).
- *Otocepheus (O.) plumosus* Mahunka, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Otocepheus (O.) spatulatus* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).

Otocepheus (Acrotocepheus) Aoki, 1965 (46 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Otocepheus (Acrotocepheus) quateorum* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).
- *Otocepheus (Acrotocepheus) bajau* Mahunka, 2000 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Otocepheus (Acrotocepheus) banahawensis* (Corpuz-Raros, 1999) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) berndhauseri* Mahunka, 2000 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) besucheti* (Mahunka, 1973) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Otocepheus (Acrotocepheus) brevisetiger* (Aoki, 2009) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) bucephalus* (Balogh, 1970) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Otocepheus (Acrotocepheus) burckhardti* (Mahunka, 1987) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) caudatus* Hammer, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) consimilis* (Balogh, 1970) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Otocepheus (Acrotocepheus) curvisetiger* (Aoki, 1984) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) diehli* (Mahunka, 1989) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas).
- *Otocepheus (Acrotocepheus) digitatus* Zheng *et* Chen, 2020
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Otocepheus (Acrotocepheus) duplicornutus Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) duplicornutus duplicornutus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) duplicornutus discrepans* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) excelsus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) gracilis* (Aoki, 1973) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) grandis* (Mahunka, 1973) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Otocepheus (Acrotocepheus) heterotrichus* Balogh *et* Mahunka, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) holtmanni* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) horakae* (Mahunka, 1987) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) kadazan* Mahunka, 2000 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) keningau* Mahunka, 2000 (*O.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) lienhardi* (Mahunka, 1989) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) lienhardorum* Mahunka, 2000 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) loebli* (Mahunka, 1973) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Otocepheus (Acrotocepheus) macrodentatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) malindangensis* (Corpuz-Raros, 2007) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) multigranulatus* Zheng *et* Chen, 2020
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) nepenthes* Mahunka, 2000 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) occultatus* Zheng *et* Chen, 2020
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) orangutan* Mahunka, 2000 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) palawanus* (Corpuz-Raros, 1999) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) pangasuganensis* (Corpuz-Raros, 1990) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) paraduplicornutus* (Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2009) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) philippinensis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas e India: Kerala).
- *Otocepheus (Acrotocepheus) punctatus* (Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2006) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Otocepheus (Acrotocepheus) quateorum* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) rafflesiae* Mahunka, 2000 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) reniformis* Mahunka, 2000 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) samarus* (Corpuz-Raros, 2007) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) surigaoensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) taftensis* (Corpuz-Raros, 2007) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) triplicicornutus* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Taiwán [Formosa]).
- *Otocepheus (Acrotocepheus) tupasae* (Corpuz-Raros, 1990) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) verrucosus* Mahunka, 2000 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Otocepheus (Acrotocepheus) vietnamicus* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Nepal).
- *Otocepheus (Acrotocepheus) wallacei* (Mahunka, 1989) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Otocepheus (Hexatocepheus) Wen, 1993 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Acrotocepheus (Hexatocepheus) emeiensis* Wen, 1993
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Otocepheus (Hexatocepheus) emeiensis* (Wen, 1993) (*Acrotocepheus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Otopentacepheus Corpuz-Raros, 2007 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Otopentacepheus heterosetus* Corpuz-Raros, 2007
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Otopentacepheus heterosetus* Corpuz-Raros, 2007
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Papuacepheus Balogh, 1968 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Megalotocepheus (Papuacepheus) geminatus* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Papuacepheus garciai* Corpuz-Raros, 2004
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Papuacepheus geminatus* (Balogh, 1968) (*Megalotocepheus (P.)*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Papuacepheus hermosaensis* Corpuz-Raros, 2007
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Papuacepheus vagorum* Corpuz-Raros, 1990
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Philippotocepheus Balogh *et* P. Balogh, 1992 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Papuacepheus siniloanensis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Philippotocepheus siniloanensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Papuacepheus*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Philippotocepheus visayasensis* Corpuz-Raros, 2007
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Samarocepheus Corpuz-Raros, 1990 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Samarocepheus cavernicolus* Corpuz-Raros, 1990
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Samarocepheus (Samarocepheus) Corpuz-Raros, 1990 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Samarocepheus cavernicolus* Corpuz-Raros, 1990
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Samarocepheus (S.) cavernicolus* Corpuz-Raros, 1990
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Samarocepheus (Kaibacepheus) Corpuz-Raros, 2004 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Kaibacepheus contiguus* Corpuz-Raros, 2004
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Samarocepheus (Kaibacepheus) contiguus* (Corpuz-Raros, 2004) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Trichotocepheus Aoki, 1965 (3 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Trichotocepheus erabuensis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.
- *Trichotocepheus amamiensis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Trichotocepheus erabuensis Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Trichotocepheus erabuensis erabuensis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Trichotocepheus erabuensis modestus* Aoki, 1973
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichotocepheus parvus* Aoki, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Tokunocepheidae Aoki, 1966 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Tokunocepheus Aoki, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tokunocepheus mizusawai* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Tokunocepheus chiranensis* Fujikawa, 2014
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tokunocepheus mizusawai* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleárica oriental (frecuente) y Oriental (Vietnam).

Carabodoidea Koch, 1843

Carabodidae Koch, 1843 (35 gen., 18 subgen., 382 spp. y 5 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Afticarabodes Fernández, Theron *et* Rollard, 2013 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Afticarabodes anjavidilavai* Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Afticarabodes anjavidilavai* Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Antongilibodes Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Antongilibodes paulae* Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Antongilibodes paulae* Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Aokiella Balogh *et* Mahunka, 1967 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Aokiella florens* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Aokiella florens* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Aokiella latiseta* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Aokiella liaoi* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Aokiella rotunda* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Aokiella xuansoni* Vũ, Ermilov *et* Dao, 2010
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Apotomocepheus Aoki, 1965 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Apotomocepheus gressitti* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Apotomocepheus gressitti* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Archegocepheus Aoki, 1965 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Archegocepheus imadatei* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Archegocepheus imadatei* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).
- *Archegocepheus macrofoliatus* Wen, 1997
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Austrocarabodes Hammer, 1966 (98 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Carabodes ensifer* Sellnick, 1931
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y boreal).

Austrocarabodes (Austrocarabodes) Hammer, 1966 (79 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y boreal).
- *Austrocarabodes (A.) agalawatta* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Austrocarabodes (A.) albidus* (Balogh, 1961) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) alveolatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga) y Vietnam.
- *Austrocarabodes (A.) angulatus* (Balogh, 1958) (*Carabodes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Austrocarabodes (A.) arrogans* Pérez-Íñigo, 1967
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Austrocarabodes (A.) australis* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina e I. Galápagos).
- *Austrocarabodes (A.) bacilliger* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Austrocarabodes (A.) bellicosus* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Austrocarabodes (A.) bituberculatus* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Filipinas y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Austrocarabodes (A.) blancharti* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) boninensis* (Aoki, 1978) (*Carabodes australis b.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Austrocarabodes (A.) butiae* Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Uruguay y Brasil).
- *Austrocarabodes (A.) cadeti* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Austrocarabodes (A.) cellularis* (Balogh, 1962) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) corpulentus* (Trägårdh, 1931) (*Cepheus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).
- *Austrocarabodes (A.) costulatus* (Balogh, 1958) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Austrocarabodes (A.) crassimarginatus* Hugo-Coetzee, 2011
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) crenellatus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (A.) crinitus* (Trägårdh, 1931) (*Cepheus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).
- *Austrocarabodes (A.) curvisetiger* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Austrocarabodes (A.) davisi* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Austrocarabodes (A.) elegans* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrocarabodes (A.) ensifer* (Sellnick, 1931) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Austrocarabodes (A.) falcatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Polinesia: I. Tonga, y Nueva Caledonia), Neotropical (Costa Rica) y Oriental (Vietnam).
- *Austrocarabodes (A.) fenestralis* (Hammer, 1979) (*Gibbicepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Austrocarabodes (A.) flabellifer* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Angola.

Austrocarabodes (A.) foliaceisetus Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Austrocarabodes (A.) foliaceisetus foliaceisetus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

- *Austrocarabodes (A.) foliaceisetus georgiensis* Murvanidze *et* Weigmann, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Austrocarabodes (A.) glabrus* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Austrocarabodes (A.) gressitti* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrocarabodes (A.) haradai* (Aoki, 1978) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Austrocarabodes (A.) hendriksi* Hugo, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) heterosetosus* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Uganda).
- *Austrocarabodes (A.) horridus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

Austrocarabodes (A.) imperfectus (Sellnick, 1959) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Austrocarabodes (A.) imperfectus imperfectus* (Sellnick, 1959)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Austrocarabodes (A.) imperfectus squamosus* Hammer, 1970
  DISTRIBUCIÓN: I. de Pascua (I. Easter).

- *Austrocarabodes (A.) intermedius* Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1989
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Austrocarabodes (A.) lateoalveolatus* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) latissimus* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Yemen.
- *Austrocarabodes (A.) latohumeralis* (Hammer, 1979) (*Gibbicepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Austrocarabodes (A.) lepidus* (Aoki, 1978) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Filipinas.
- *Austrocarabodes (A.) lineasetosa* Hugo-Coetzee, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) longisetosus* Hugo-Coetzee, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) longulus* (Balogh, 1958) (*Carabodes*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (A.) lunaris* (Balogh, 1962) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) maculatus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Austrocarabodes (A.) madagascarensis* Ermilov *et* Starý, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) mahunkai* Hugo-Coetzee, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) microlaminatus* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (A.) mixtus* Mahunka, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) nodosus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Antártica (I. Auckland).
- *Austrocarabodes (A.) nortoni* Hugo-Coetzee, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) obscurus* Aoki, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Austrocarabodes (A.) obsoletus* (Berlese, 1916) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Austrocarabodes (A.) ocellatus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Austrocarabodes (A.) parapustulatus* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) patakii* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Austrocarabodes (A.) picturatus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Austrocarabodes (A.) pinnatus* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) planisetus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) pseudoreticulatus* Covarrubias, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Méjico).
- *Austrocarabodes (A.) pustuloreticulatus* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) rimosus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Austrocarabodes (A.) rugosus* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Austrocarabodes (A.) schauenbergi* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Malgache (I. Reunión) y Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) schwartzi* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Austrocarabodes (A.) semilunatus* Mahunka, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) similis* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Austrocarabodes (A.) sinuosociliatus* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Austrocarabodes (A.) sordidus* (Balogh, 1958) (*Carabodes*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Austrocarabodes (A.) spathulatus* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Austrocarabodes (A.) sphaeroideus* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Austrocarabodes (A.) sphaerula* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Austrocarabodes (A.) szentivanyi* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam y Japón.
- *Austrocarabodes (A.) tarandus* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Austrocarabodes (A.) travei* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Costa Rica).
- *Austrocarabodes (A.) vaucheri* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Méjico) y Vietnam.
- *Austrocarabodes (A.) ventrostriatus* (Hammer, 1979) (*Gibbicepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Austrocarabodes (A.) vernoncrookensis* Hugo, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) verrucatus* (Trägårdh, 1931) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Chile (I. Juán Fernández) y Méjico.

Austrocarabodes (Austroflexa) Subías, 2019 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Austrocarabodes brasiliensis* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).
- *Austrocarabodes (Austroflexa) agressor* Balogh *et* Mahunka, 1978 (*Austroc.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrocarabodes (Austroflexa) armatus* Mahunka, 2009 (*Austroc.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (Austroflexa) brasiliensis* Ermilov *et* Tolstikov, 2015 (*Austroc.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Austrocarabodes (Austroflexa) erectus* Mahunka, 1984 (*Austroc.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (Austroflexa) fenestratus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

Austrocarabodes (Baloghodes) Mahunka, 1986 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Baloghodes heterotrichosus* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Austrocarabodes (Baloghodes) heterotrichosus* (Mahunka, 1986) (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (Baloghodes) secundus* (Mahunka, 1993) (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Austrocarabodes (Synkrotima) Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017 (4 spp.)
(=***Rwandabodes*** Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2019)
(=***Zimbabwecepheus*** Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2017)
ESPECIE TIPO: *Synkrotima zimbabwae* Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Austrocarabodes (Synkrotima) kayoveae* (Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2019) (*Rwandabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Austrocarabodes (Synkrotima) luciensis* Hugo, 2008 (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (Synkrotima) maidii* (Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2017) (*Zimbabwecepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Austrocarabodes (Synkrotima) zimbabwae* (Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017) (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].

Austrocarabodes (Uluguroides) Mahunka, 1983 (10 spp.)
(=***Ngorongobodes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
ESPECIE TIPO: *Uluguroides trichosus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Australiana.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) aethiopicus* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) arboreus* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) grandis* (Mahunka, 1984) ("*Ulugurozetes*")
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) incrustatus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) kluttzi* Ermilov, Winchester, Lowman *et* Wassie, 2012
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) minitricha* (Mahunka, 1993) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) pentatrichus* (Balogh, 1962) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) polytrichus* Balogh *et* Mahunka, 1978 (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) trichosus* (Mahunka, 1983) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (Uluguroides) wallworki* Subías, 2019 (*A. (U.) pentatrichus w.*)
(=*Carabodes clavatus* Wallwork, 1977, *nom. praeoc.* por Warburton, 1912)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

Bathocepheus Aoki, 1978 (2 spp.)
(=***Philippobodes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
ESPECIE TIPO: *Bathoceheus concavus* Aoki, 1978
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica oriental.
- *Bathocepheus concavus* Aoki, 1978
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Bathocepheus manguiati* (Corpuz-Raros, 1979) (*Machadocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Bovicarabodes Fernández, Theron *et* Rollard, 2013 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Bovicarabodes deharvengi* Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Bovicarabodes deharvengi* Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Bovicarabodes fortdauphini* Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Bovicarabodes jacquelinae* Fernández, Theron, Rollard, Leiva *et* Tiedt, 2015
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Bovicarabodes levyi* Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Bunabodes Fujikawa, 2004 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Bunabodes truncatus* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Bunabodes truncatus* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Camcarabodes Ermilov *et* Starý, 2018 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Camcarabodes korupensis* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Camcarabodes korupensis* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.

Carabodes Koch, 1835 (137 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Carabodes coriaceus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Carabodes (Carabodes) Koch, 1835 (73 spp. y 1 ssp.)
(=***Neocepheus*** Willmann, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica y tropical (excepto Australiana).
- *Carabodes (C.) affinis* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Carabodes (C.) apuanicus* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Carabodes (C.) arduinii* Valle, 1955
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Carabodes (C.) areolatus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica).
- *Carabodes (C.) auriculatus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (C.) azoricus* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Carabodes (C.) basilewskyi* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Carabodes (C.) bellus* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Este de Paleártica oriental y Cáucaso).
- *Carabodes (C.) berninii* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Carabodes (C.) bicolor* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Carabodes (C.) brevis* Banks, 1896
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Carabodes (C.) cephalotes* Koch, 1835 *sp. inq.*
(=*Nothrus cynocephalus* Koch, 1839 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Carabodes (C.) cerebrum* Fujikawa, 1993
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Carabodes (C.) cherokee* Reeves, 1993
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Carabodes (C.) chirstlus* Mahunka, 1987
(=*Carabodes foliatus* Morell, 1990)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Carabodes (C.) clavatus* Warburton, 1912 (*C. labyrinthicus c.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Carabodes (C.) cochleaformis* Reeves, 1990
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Carabodes (C.) colorado* Reeves *et* Behan-Pelletier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Carabodes (C.) comas* Kulijev, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (C.) coriaceus* Koch, 1835
(=*Carabodes nepos* Hull, 1914)
(=*Carabodes papillosus* Lucas, 1849)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente) y “U.S.A. (Virginia)”.
- *Carabodes (C.) coweetaensis* Reeves, 1995
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Carabodes (C.) erectus* Reeves, 1992
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Carabodes (C.) falcatus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Carabodes (C.) femoralis* (Nicolet, 1855) (*Tegeocranus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Paleártica oriental meridional).
- *Carabodes (C.) flagellifer* Mihelčič, 1966
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Carabodes (C.) floridus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Carabodes (C.) fossatus* (Kramer, 1897) (*Tegeocranus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Carabodes (C.) gibbiceps* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Sur).
- *Carabodes (C.) grandjeani* Bernini, 1977
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Carabodes (C.) granulatus* Banks, 1895
(=*Carabodes omo* Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica oriental y Paleártica occidental: Cáucaso) y Neotropical.
- *Carabodes (C.) gregorioi* Gil-Martín *et* Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Carabodes (C.) guadarramicus* Subías *et* Arillo, 2001
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Carabodes (C.) hispanicus* Pérez-Íñigo, 1966
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Carabodes (C.) hoh* Reeves *et* Behan-Pelletier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Carabodes (C.) hummelincki* (Willmann, 1936) (*Neocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Carabodes (C.) hungaricus* Balogh, 1943
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Carabodes (C.) interruptus* Reeves, 1992
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Carabodes (C.) kintrishiana* Murvanidze, 2008
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (C.) labyrinthicus* (Michael, 1879) (*Tegeocranus*)
(=*Cepheus heimi* Oudemans, 1903)
(=*Carabodes marginepunctatus* Trägårdh, 1902)
(=*Carabodes scymnus* Hull, 1914)
(=*Carabodes vermiculatus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Méjico.
- *Carabodes (C.) magnus* Kunst, 1961
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Carabodes (C.) marginatus* (Michael, 1884) (*Tegeocranus*)
(=*Carabodes marginatus pontiger* Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Noroeste de Siberia).
- *Carabodes (C.) montanus* Bernini, 1979

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Carabodes (C.) nantahalaensis* Reeves, 1993
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Carabodes (C.) neonominatus* Subías, 2004
(=*Carabodes gibbiceps clavatus* Jacot, 1938, *nom. praeoc.* por Warburton, 1912)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Carabodes (C.) niger* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Carabodes (C.) oenipontanus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Carabodes (C.) ornatus* Štorkán, 1925
(=*Carabodes forsslundi* Sellnick, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente.
- *Carabodes (C.) palmifer* Berlese, 1904
(=*Carabodes peniculatus* Aoki, 1970)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: Mediterránea occidental y Este de Paleártica oriental, y Neártica oriental), Norte de Oriental y Norte de Neotropical.
- *Carabodes (C.) pentasetosus* Reeves, 1992
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Carabodes (C.) perezinigoi* Salinas, 1971
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Carabodes (C.) phylliformis* Reeves, 1993
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Carabodes (C.) pirenaicus* Subías *et* Arillo, 2001
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Carabodes (C.) pirinensis* Kunst, 1961
DISTRIBUCIÓN: Bulgaria.
- *Carabodes (C.) polyporetes* Reeves, 1991
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Carabodes (C.) procerus* Weigmann *et* Murvanidze, 2003
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (C.) prunum* Fujikawa, 1993
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Carabodes (C.) quadrangulus* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (excepto Este).
- *Carabodes (C.) reticulatus* Berlese, 1913 (*C. coriaceus r.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Carabodes (C.) rimosus* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
- *Carabodes (C.) rugosior* Berlese, 1916 (*C. femoralis r.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).
- *Carabodes (C.) scaber* Monson, 2009
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Carabodes (C.) silvosus* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Carabodes (C.) spiniformis* Reeves, 1995
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Carabodes (C.) spinosus* Štorkán, 1925 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Carabodes (C.) subalpinus* Thor, 1937 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Carabodes (C.) subarcticus* Trägårdh, 1902 (*C. elongatus s.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: menos frecuente en el Sur, y Paleártica oriental).
- *Carabodes (C.) subcarinatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000
(=*Carabodes carinatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999, *nom. praeoc.* por Wallwork, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Carabodes (C.) tenuis* Forsslund, 1953
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Paquistán.
- *Carabodes (C.) thaleri* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Carabodes (C.) transversarius* Choi *et* Aoki, 1986
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
Carabodes (C.) tsushimaensis Aoki, 1970 (*C. rimosus t.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
  - *Carabodes (C.) tsushimaensis tsushimaensis* Aoki, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
  - *Carabodes (C.) tsushimaensis dorsalis* Choi *et* Aoki, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Carabodes (C.) tyrrhenicus* Salomone, Avanzati, Baratti *et* Bernini, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Carabodes (C.) wettsteini* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Carabodes (C.) wonalancetanus* Reeves, 1990
DISTRIBUCIÓN: Neártica septetrional.

Carabodes (Flexa) Kulijev, 1977 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes dubius* Kulijev, 1968
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Carabodes (Flexa) bidens* (Djaparidze, 1990) (*F.*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (Flexa) breviclava* Aoki, 1970 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Carabodes (Flexa) djaparidzae* Murvanidze *et* Weigmann, 2007 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (Flexa) dubius* Kulijev, 1968 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (Flexa) horreo* (Djaparidze, 1990) (*F.*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (Flexa) intermedius* Willmann, 1951 (*C.*)
  (=*Carabodes tenuis longisetosus* Kulijev, 1968)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Carabodes (Flexa) scopulae* Kulijev, 1968 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (Flexa) tarbae* (Shtanchaeva, 2004) (*F.*)
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Carabodes (Klapperiches) Mahunka, 1979 (49 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Klapperiches nigrosetosus* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Carabodes (Klapperiches) afrominusculus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Carabodes (Klapperiches) agenjoi* Pérez-Íñigo, 1969 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Carabodes (Klapperiches) andasibe* Mahunka, 1993 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Carabodes (Klapperiches) atrichosus* Mahunka, 1984 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Carabodes (Klapperiches) borhidii* Balogh *et* Mahunka, 1979 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Carabodes (Klapperiches) california* Reeves *et* Behan-Pelletier, 1998 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A.
- *Carabodes (Klapperiches) chandleri* Reeves, 1992 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Carabodes (Klapperiches) coronatus* Mahunka, 1986 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Carabodes (Klapperiches) csikii* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Albania.
- *Carabodes (Klapperiches) depilatus* Balogh *et* Mahunka, 1969 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).
- *Carabodes (Klapperiches) dickinsoni* Reeves *et* Behan-Pelletier, 1998 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Carabodes (Klapperiches) dilatatus* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Carabodes (Klapperiches) dissimilis* Bernini, 1976 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Carabodes (Klapperiches) dudichi* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Carabodes (Klapperiches) ecuadoriensis* P. Balogh, 1988 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Ecuador y Méjico).
- *Carabodes (Klapperiches) excellens* Balogh *et* Mahunka, 1969 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Carabodes (Klapperiches) globiger* Balogh, 1970 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Carabodes (Klapperiches) granosus* Sellnick, 1959 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de Polinesia.
- *Carabodes (Klapperiches) higginsi* Reeves, 1988 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Carabodes (Klapperiches) ikeharai* Aoki, 1988 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Carabodes (Klapperiches) jamaicaensis* Woolley, 1967 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Carabodes (Klapperiches) kusseri* Balogh *et* P. Balogh, 1983 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia e India (Bengala Occidental).
- *Carabodes (Klapperiches) littoristicus* (Reeves, 1997) (*K.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Carabodes (Klapperiches) luteoauratus* Hammer, 1972 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Carabodes (Klapperiches) manganoi* Bernini, 1976 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Carabodes (Klapperiches) manifera* Hammer, 1977 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Carabodes (Klapperiches) microtrichus* Mahunka, 1984 (*C.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Carabodes (Klapperiches) mikhaetandreorum* Ermilov *et* Anichkin, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Carabodes (Klapperiches) minusculus* Berlese, 1923 (*C.*)
(=*Carabodes castrii* Mahunka, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Paleártica oriental meridional) y "U.S.A."
- *Carabodes (Klapperiches) nigrosetosus* (Mahunka, 1979) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Carabodes (Klapperiches) ornatissimus* Hammer, 1966 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Carabodes (Klapperiches) paravenezolanus* Ermilov, 2016 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Carabodes (Klapperiches) penicillatus* Berlese, 1916 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Carabodes (Klapperiches) penicillus* (Mahunka, 1998) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Carabodes (Klapperiches) pocsi* Mahunka, 1983 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Carabodes (Klapperiches) poggii* Bernini, 1976 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Carabodes (Klapperiches) problematicus* Mahunka, 1985 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
Carabodes (Klapperiches) pulcher Bernini, 1976 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Carabodes (Klapperiches) pulcher pulcher* Bernini, 1976
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Carabodes (Klapperiches) pulcher occidentalis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Carabodes (Klapperiches) purpurarius* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Carabodes (Klapperiches) radiatus* Berlese, 1916 (*C.*)
(=*Carabodes dendroetus* Reeves, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Carabodes (Klapperiches) samoensis* Balogh *et* P. Balogh, 1986 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa) y Vietnam.
- *Carabodes (Klapperiches) schatzi* Bernini, 1976 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Carabodes (Klapperiches) semengok* (Mahunka, 1996) (*Gymnobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
Carabodes (Klapperiches) similis Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1989 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Carabodes (Klapperiches) similis similis* Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1989
(?=*Carabodes egregius* Djaparidze, 1990 *sp. inq.*)
(?=*Carabodes paraspinosus* Kulijev, 1968 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e Irán.
- *Carabodes (Klapperiches) similis translamellatus* Pérez-Íñigo jr., 1990 (*C. t.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Carabodes (Klapperiches) strinovichi* Balogh *et* Mahunka, 1978 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Carabodes (Klapperiches) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1976 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Carabodes (Klapperiches) variabilis* Hammer, 1966 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Carabodes (Klapperiches) venezolanus* Subías *et* Arillo, 2004 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Carabodes (Klapperiches) willmanni* Bernini, 1975 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Irán y Neártica septentrional).

Carabodes (Phyllocarabodes) Balogh *et* Mahunka, 1969 (6 spp.)
(=***Antillobodes*** Mahunka, 1985)
(=***Pentabodes*** P. Balogh, 1984)
ESPECIE TIPO: *Phyllocarabodes octogonalis* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.
- *Carabodes (Phyllocarabodes) calcaratus* (Mahunka, 1985) (*Antillobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Carabodes (Phyllocarabodes) costaricensis* (Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Carabodes (Phyllocarabodes) inopinatus* (Mahunka, 1985) (*Antillobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas y Vietnam.
- *Carabodes (Phyllocarabodes) insolitus* (P. Balogh, 1984) (*Pentabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia y Méjico) e India (Bengala Occidental).
- *Carabodes (Phyllocarabodes) octogonalis* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Carabodes (Phyllocarabodes) pbaloghi* Subías, 2021
(=*Carabodes (Phyllocarabodes) schatzi* Subías, 2010, *nom. praeoc.* por Bernini, 1976)
(=*Phyllocarabodes ornatus* P. Balogh, 1986, *nom. praeoc.* por Štorkán, 1925)

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Vietnam.

Cavaecarabodes Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cavaecarabodes pulchritude* Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Cavaecarabodes anouchkae* Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Cavaecarabodes hauseri* (Mahunka, 1989) (*Congocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Cavaecarabodes orientalis* (Mahunka, 1987) (*Congocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Cavaecarabodes polilloensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Cavaecarabodes pulchritude* Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Gabón.

Cavernocarabodes Mahunka, 1974 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cavernocarabodes perreti* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Neotropical y Paleártica meridional.
- *Cavernocarabodes perreti* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Camerún y Méjico.
- *Cavernocarabodes trigonosternum* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Ceylobodes Balogh *et* P. Balogh, 1992 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Trichocarabodes capillatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Ceylobodes capillatus* (Balogh, 1970) (*Trichocarabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Ceylobodes hettigei* (Balogh, 1970) (*Trichocarabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Chistyakovella Ermilov, Aoki *et* Anichkin, 2013 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Chistyakovella insolita* Ermilov, Aoki *et* Anichkin, 2013
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Chistyakovella insolita* Ermilov, Aoki *et* Anichkin, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Congocepheus Balogh, 1958 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Congocepheus heterotrichus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Congocepheus (Congocepheus) Balogh, 1958 (10 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Congocepheus (C.) camerunensis* Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Congocepheus (C.) ektactesi* Fernández, Theron, Rollard *et* Tiedt, 2013
  DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.
- *Congocepheus (C.) gabonensis* Fernández, Theron, Rollard *et* Tiedt, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Gabón.
- *Congocepheus (C.) germani* Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Congocepheus (C.) heterotrichus* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.
- *Congocepheus (C.) involutus* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Congocepheus (C.) kardiae* Fernández, Theron *et* Leiva, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Congocepheus (C.) kayoveae* Fernández, Theron *et* Leiva, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Congocepheus (C.) rwandensis* Fernández, Theron *et* Leiva, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ruanda y Etiopia).
- *Congocepheus (C.) taurus* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.

Congocepheus (Tanzaniacepheus) Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2017 (3 spp.)
(=***Fernandezbodes*** Subías, 2018)
ESPECIE TIPO: *Congocepheus ornatus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Congocepheus (Tanzaniacepheus) ornatus* Mahunka, 1983 (*C.*)
  (=*Congocepheus latilamellatus* Mahunka, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Congocepheus (Tanzaniacepheus) thailandiae* Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Congocepheus (Tanzaniacepheus) velatus* Mahunka, 1986 (*C.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Costacarabodes Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Costacarabodes turrialbai* Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Costacarabodes confertus* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Cubabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Costacarabodes turrialbai* Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Costacarabodes verrucatus* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Cubabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Cubabodes Balogh *et* Mahunka, 1974 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cubabodes hexagonalis* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cubabodes hexagonalis* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Cubabodes radiatus* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Cubabodes spathulatus* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Gibbicepheus Balogh, 1958 (26 spp.)
ESPECIE TIPO: *Gibbicepheus elevatus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

Gibbicepheus (Gibbicepheus) Balogh, 1958 (13 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).
- *Gibbicepheus (G.) austroamericanus* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Gibbicepheus (G.) baccanensis* Jeleva *et* Vũ, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Gibbicepheus (G.) chinensis* Wen, 1992
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gibbicepheus (G.) elevatus* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Gibbicepheus (G.) ensifer* Balogh, 1958 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Gibbicepheus (G.) frondosus* (Aoki, 1959) (*Diplobodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Australiana: Islas del Pacífico) y Este de Paleártica oriental.
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Gibbicepheus (G.) micheli* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles, Japón y Filipinas.
- *Gibbicepheus (G.) novus* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Taiwán [Formosa]).
- *Gibbicepheus (G.) rugosus* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles y Filipinas.
- *Gibbicepheus (G.) sisiri* Sanyal, 1990
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Gibbicepheus (G.) tuberculatus* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Península Malaya.
- *Gibbicepheus (G.) waterhousei* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Gibbicepheus (Diplobodes) Aoki, 1958 (9 spp.)
(=***Mauribodes*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
ESPECIE TIPO: *Diplobodes kanekoi* Aoki, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.
- *Gibbicepheus (Diplobodes) africanus* (Mahunka, 1987) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Gibbicepheus (Diplobodes) aokii* (Mahunka, 1989) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Gibbicepheus (Diplobodes) floridus* (Mahunka, 1978) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Gibbicepheus (Diplobodes) foveolatus* (Mahunka, 1978) (*Machadocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Malgache: I. Mauricio, y Tanzania).
- *Gibbicepheus (Diplobodes) kanekoi* (Aoki, 1958) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón (frecuente) y Oriental.
- *Gibbicepheus (Diplobodes) karubei* (Aoki, 2002) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Gibbicepheus (Diplobodes) parakanekoi* (Ermilov *et* Khaustov, 2020) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Gibbicepheus (Diplobodes) superbus* (Mahunka, 1978) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Gibbicepheus (Diplobodes) thailande* (Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2019) (*D.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Gibbicepheus (Gibbibodes) Mahunka, 1986 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Gibbibodes similis* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Gibbicepheus (Gibbibodes) similis* (Mahunka, 1986) (*Gibbibodes*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.

Gibbicepheus (Kalloia) Mahunka, 1985 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Kalloia simpliseta* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana).
- *Gibbicepheus (Kalloia) gerdweigmanni* (Ermilov, Sandmann *et* Scheu, 2019) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Gibbicepheus (Kalloia) simpliseta* (Mahunka, 1985) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Costa de Marfil.

Gibbicepheus (Neocarabodes) Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Neocarabodes sexpilosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Oriental).
- *Gibbicepheus (Neocarabodes) sexpilosus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá) y Oriental (Filipinas e India: Bengala Occidental).

Gymnobodes Balogh, 1965 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Carabodes fraterculus* Balogh, 1963
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Gymnobodes cotedivoirensis* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Gymnobodes fraterculus* (Balogh, 1963) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental y Méjico.
- *Gymnobodes minimus* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Gymnobodes subnudus* (Balogh, 1963) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Hardybodes Balogh, 1970 (5 spp.)
(=***Carabodella*** Mahunka, 1986)
ESPECIE TIPO: *Hardybodes mirabilis* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Hardybodes calcaratus* (Mahunka, 1986) (*Carabodella*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hardybodes flabellatus* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hardybodes minutus* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2018
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hardybodes mirabilis* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas y Borneo).
- *Hardybodes penicillatus* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Machadocepheus Balogh, 1958 (12 spp.)
ESPECIE TIPO: *Machadocepheus excavatus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Machadocepheus (Machadocepheus) Balogh, 1958 (9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Machadocepheus (M.) excavatus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Méjico.
- *Machadocepheus (M.) filiferus* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Camerún).
- *Machadocepheus (M.) leoneae* Fernández, Theron, Rollard *et* Leiva, 2014
DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.
- *Machadocepheus (M.) pararachii* Ermilov *et* Khaustov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Machadocepheus (M.) pauliani* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Machadocepheus (M.) phyllophorus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Machadocepheus (M.) rachii* Fernández, Theron, Rollard *et* Leiva, 2014
DISTRIBUCIÓN: Gabón.
- *Machadocepheus (M.) taprobanicus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Machadocepheus (M.) tuberculosus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Machadocepheus (Sagittabodes) Balogh *et* P. Balogh, 1992 (3 spp.)
(=***Zimbabweae*** Fernández, Theron *et* Leiva, 2016)
ESPECIE TIPO: *Machadocepheus sagitta* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Machadocepheus (Sagittabodes) kenyaensis* (Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017) (*Zimbabweae*)
  DISTRIBUCIÓN:Kenia.
- *Machadocepheus (Sagittabodes)pluosiae* (Fernández, Theron *et* Leiva, 2016) (*Zimbabweae*)
  DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Machadocepheus (Sagittabodes) sagitta* Balogh *et* Mahunka, 1966 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Malgasodes Mahunka, 2000 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Malgasodes curvisetus* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Malgasodes curvisetus* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Malgasodes hungarorum* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Meriocepheus Aoki, 1973 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Meriocepheus peregrinus* Aoki, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Meriocepheus peregrinus* Aoki, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Odontocepheus Berlese, 1913 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tegeocranus elongatus* Michael, 1879
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australianooriental.

Odontocepheus (Odontocepheus) Berlese, 1913 (14 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.

- *Odontocepheus (O.) bandae* Subías *et* Arillo, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Marruecos.
- *Odontocepheus (O.) beijingensis* Wang, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Odontocepheus (O.) curtiseta* Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1989
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Odontocepheus (O.) elongatus* (Michael, 1879) (*Tegeocranus*)
  (=*Hermannia oblonga* Karpelles, 1893)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Sureste de U.S.A.).
- *Odontocepheus (O.) espatulatus* Saloña *et* Iturrondobeitia, 1989
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Odontocepheus (O.) hungaricus* Mahunka, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Odontocepheus (O.) immarginatus* Jacot, 1934
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Odontocepheus (O.) morikawai* Fujikawa, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Odontocepheus (O.) oblongus* (Banks, 1895) (*Carabodes*) *sp. inq.*
  (no *Hermannia oblonga* Karpelles, 1893, =*Odontocepheus elongatus*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Odontocepheus (O.) oglasae* Baratti *et* Bernini, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Odontocepheus (O.) piramidalis* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Odontocepheus (O.) rumbleseatus* Reeves, 1995
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. y Norte de Neotropical.
- *Odontocepheus (O.) villosus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Odontocepheus (O.) zaballosi* Subías *et* Arillo, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Marruecos.

Odontocepheus (Indotocepheus) Mondal *et* Kundu, 1999 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Indotocepheus himalayensis* Mondal *et* Kundu, 1999
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Odontocepheus (Indotocepheus) himalayensis* (Mondal *et* Kundu, 1999) (*I.*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).

Pasocepheus Aoki, 1976 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pasocepheus triarcuatus* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

Pasocepheus (Pasocepheus) Aoki, 1976 (4 spp.)
(=***Opisthocepheus*** Aoki, 1976)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Pasocepheus (P.) bako* Mahunka, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Pasocepheus (P.) eremaeozetoides* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Pasocepheus (P.) kirai* (Aoki, 1976) (*Opisthocepheus*)

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Pasocepheus (P.) triarcuatus* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Pasocepheus (Guineobodes) Mahunka, 1987 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Machadocepheus papuanus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Pasocepheus (Guineobodes) papuanus* (Balogh, 1970) (*Machadocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Pseudocarabodes Mahunka, 1991 (3 spp.)
(=***Bakobodes*** Mahunka, 1996)
(=***Yemenobodes*** Mahunka, 2000)
ESPECIE TIPO: *Pseudocarabodes xenus* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Pseudocarabodes improvisus* (Mahunka, 2000) (*Yemenobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Yemen.
- *Pseudocarabodes orangutan* (Mahunka, 1996) (*Bakobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Pseudocarabodes xenus* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Rugocepheus Mahunka, 2009 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rugocepheus formosus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Rugocepheus costaricensis* Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Rugocepheus formosus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rugocepheus joffrevillei* Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Singabodes Mahunka, 1998 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Singabodes rarus* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Singabodes rarus* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Spathulocepheus Balogh *et* Mahunka, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Spathulocepheus amazonicus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Spathulocepheus amazonicus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Spathulocepheus plumiger* Balogh *et* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).

Tansocepheus Mahunka, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tansocepheus serratus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Tansocepheus serratus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Tectocarabodes Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tectocarabodes monstruosus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Tectocarabodes monstruosus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Trichocarabodes Balogh, 1961 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Carabodes celisi* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Trichocarabodes celisi* (Balogh, 1958) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Trichocarabodes costulatus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Trichocarabodes tsalakpmenoi* (Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018) (*Synkrotima*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Zimbabue [Rodesia] y Kenia).

Tuberocepheus Balogh *et* Mahunka, 1969 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Machadocepheus longus* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Tuberocepheus (Tuberocepheus) Balogh *et* Mahunka, 1969 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Tuberocepheus (T.) kompsosis* Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Tuberocepheus (T.) longus* (Balogh, 1964) (*Machadocepheus*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Tuberocepheus (Mangabebodes) Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Mangabebodeskymatismosi* Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Tuberocepheus (Mangabebodes) kymatismosi* (Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Yoshiobodes Mahunka, 1986 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Carabodes irmayi* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).

Yoshiobodes (Yoshiobodes) Mahunka, 1986 (9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).
- *Yoshiobodes (Y.) arcuatus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Yoshiobodes (Y.) camerunensis* Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Camerún e India (Kerala).
- *Yoshiobodes* (*Y.*) *humidus* Mahunka, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Yoshiobodes (Y.) irmayi* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Carabodes*)
  (=*Yoshiobodes aokii* Mahunka, 1987)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente), U.S.A. meridional y Oriental.
- *Yoshiobodes (Y.) nakatamarii* (Aoki, 1973) (*Austrocarabodes*)
  (?=*Carabodes humeratus* Berlese, 1913 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Este de Paleártica oriental.
- *Yoshiobodes (Y.) neotrichorostralis* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Yoshiobodes (Y.) papuanus* (Balogh, 1970) (*Austrocarabodes humeratus p.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Yoshiobodes (Y.) plumosulus* (Balogh, 1970) (*Austrocarabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Yoshiobodes (Y.) plumosus* (Balogh, 1970) (*Austrocarabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Yoshiobodes (Berndobodes) Mahunka, 1986 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Berndobodes spiculifer* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Yoshiobodes (Berndobodes) hauseri* (Mahunka, 1996) (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Yoshiobodes (Berndobodes) spiculifer* (Mahunka, 1986) (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Yoshiobodes (Dongnaibodes) Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2014 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Yoshiobodes (Dongnaibodes) hexasetosus* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Yoshiobodes (Dongnaibodes) biconcavus* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Yoshiobodes (Dongnaibodes) hexasetosus* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Nippobodidae Aoki, 1959 (2 gen. y 19 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.

Leobodes Aoki, 1965 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Leobodes mirabilis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Leobodes anulatus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Leobodes carinatus* Chen *et* Wang, 2007
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Leobodes lijiangensis* Aoki, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Nepal).
- *Leobodes mirabilis* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Leobodes praeconcavus* Chen *et* Wang, 2007
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Leobodes trypasis* Fernández, Theron *et* Leiva, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Leobodes yinae* Aoki, 2000
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Nippobodes Aoki, 1959 (12 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nippobodes insolitus* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

- *Nippobodes brevisetiger* Aoki, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nippobodes chejuensis* Choi, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Nippobodes flagellifer* Chen *et* Wang, 2007
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nippobodes insolitus* Aoki, 1959
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Noreste de Oriental.
- *Nippobodes latus* Aoki, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Nippobodes monstruosus* (Vũ *et* Jeleva, 1987) (*Leobodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Nippobodes panemorfis* Fernández, Theron *et* Leiva, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Nippobodes peniculatus* Chen *et* Wang, 2007
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nippobodes pseudobrevisetiger* Chen *et* Wang, 2007
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nippobodes tamlaensis* Choi, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Corea y China suroriental.
- *Nippobodes tokaraensis* Aoki, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nippobodes yuwanensis* Aoki, 1984 (*N. brevisetiger y.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Tectocepheoidea Grandjean, 1954

Tectocepheidae Grandjean, 1954 (2 gen., 17 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Tectocepheus Berlese, 1896 (14 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Tegeocranus velatus* Michael, 1880
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Tectocepheus acutus* Nakamura, Y.- N. Nakamura *et* Fujikawa, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tectocepheus alatus* Berlese, 1913
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte).
- *Tectocepheus americanus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Tectocepheus cervus* Balogh *et* Mahunka, 1969 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Tectocepheus iheyaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tectocepheus knuellei* Vaněk, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Tectocepheus kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tectocepheus minor* Berlese, 1903
  (=*Tectocepheus bisignatus* Moritz, 1968)
  (=*Tectocepheus cuspidentatus* Knülle, 1954)
  (=*Tectocepheus velatus novus* Hammer, 1967)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Irán y Japón), U.S.A. (Virginia), Oriental, Neotropical (Ecuador e I. Galápagos), Nueva Zelanda y Etiopía.
- *Tectocepheus minutus* Kardar *et* Mattu, 1999
  DISTRIBUCIÓN: India (Himachal Pradesh).
- *Tectocepheus punctulatus* Djaparidze, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Rusia asiática).
- *Tectocepheus satsumaensis* Fujikawa, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tectocepheus shirakamiensis* Fujikawa, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Tectocepheus velatus (Michael, 1880) (*Tegeocranus*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Tectocepheus velatus velatus* (Michael, 1880)
  (=*Tectocepheus coniunctus* Knülle, 1954)
  (=*Tectocepheus spinosus* Mahunka, 1984)
  (=*Tectocepheus tenuis* Knülle, 1954)
  (=*Tectocepheus titanius* Ohkubo, 1982)
  (=*Tectocepheus translamellaris* Kardar, 1974)
  (=*Tectocepheus translamellatus* Knülle, 1954)
  (=*Tectocepheus velatus granulatus* Mihelčič, 1957)
  (=*Tectocepheus vicarius* Balogh, 1958)
  DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente).
- *Tectocepheus velatus clavatus* Mahunka, 1983 (*T. c.*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional e India (Tripura).
- *Tectocepheus velatus elegans* Ohkubo, 1981 (*T.e.*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Méjico y Vietnam.
- *Tectocepheus velatus sarekensis* Trägårdh, 1910
(=*Tectocepheus concurvatus* Knülle, 1954)
(=*Tectocepheus depressus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989)
(=*Tectocepheus latilamellaris* Kardar, 1974)
(=*Tectocepheus minor expansus* Berlese, 1914)
(=*Tectocepheus velatus angulatus* Mihelčič, 1957)
(=*Tectocepheus velatus ibericus* Mihelčič, 1957)
(=*Tectocepheus velatus inflexus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente).
- *Tectocepheus velatus universitatum* Abd-el-Hamid, 1965
DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Tegeozetes Berlese, 1913 (3 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Tegeozetes tunicatus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).
- *Tegeozetes angolensis* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Tegeozetes miyajima* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Tegeozetes tunicatus Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional (Hungría y Japón).
- *Tegeozetes tunicatus tunicatus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Europa (Hungría).
- *Tegeozetes tunicatus breviclava* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.

Tegeocranellidae P. Balogh, 1987 (1 gen. y 18 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Tegeocranellus Berlese, 1913 (18 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tegeocranus laevis* Berlese, 1905
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Tegeocranellus alas* Behan-Pelletier, 1997
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Tegeocranellus barbarae* Behan-Pelletier, 1997
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Tegeocranellus bolivianus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Paraguay).
- *Tegeocranellus bosniae* (Frank, 1961) (*Carabodes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Bosnia-Herzegovina.
- *Tegeocranellus concavus* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tegeocranellus convexus* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tegeocranellus hungarorum* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Tegeocranellus kethleyi* Behan-Pelletier, 1997
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Tegeocranellus knysnaensis* Kok, 1968
(=*Tegeocranellus africanus* Mahunka, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Tegeocranellus laevis* (Berlese, 1905) (*Tegeocranus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Oriental: Filipinas y Ceilán [Sri Lanka], y Australiana: Melanesia (I. Fiji).
- *Tegeocranellus martinezi* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Tegeocranellus mediolamellatus* Behan-Pelletier, 1997
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Tegeocranellus mississippii* Behan-Pelletier, 1997
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional
- *Tegeocranellus muscorum* Behan-Pelletier, 1997
DISTRIBUCIÓN: Neártica y U.S.A. (Florida).
- *Tegeocranellus nubatamae* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tegeocranellus opcus* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Tegeocranellus punctatus* Saha, Sanyal *et* Chakraborty, 2004
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Tegeocranellus sacchareus* Kok, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Charassobatoidea Grandjean, 1958

Charassobatidae Grandjean, 1958 (1 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Charassobates Grandjean, 1929 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Charassobates cavernosus* Grandjean, 1929
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Charassobates baudi* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Charassobates cavernosus* Grandjean, 1929
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Charassobates incipatus* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Charassobates minimus* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Charassobates ornatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Charassobates simplex* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Paraguay).
- *Charassobates tuberosus* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Nosybeidae Mahunka, 1993 (2 gen. y 12 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical.

Lamellocepheus Balogh, 1961 (2 spp.)
(=***Nosybea*** Mahunka, 1993)
(=***Tessacarus*** Grandjean, 1962)
ESPECIE TIPO: *Tectocepheus personatus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Lamellocepheus genavensis* (Mahunka, 1993) (*Nosybea*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lamellocepheus personatus* (Berlese, 1910) (*Tectocepheus*)
  (=*Lamellocepheus ambitus* Kulijev, 1966)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Topalia Balogh *et* Csiszár, 1963 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Topalia problematica* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral.
- *Topalia africana* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Topalia caliginosa* Colloff, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Topalia clavata* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Topalia corinnensis* Colloff, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Topalia dunlopi* Colloff, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (Isla Norfolk).
- *Topalia granulata* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Topalia katyae* Colloff, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (Isla Norfolk).
- *Topalia problematica* Balogh *et* Csiszár, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Topalia royi* Colloff, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Topalia velata* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN. Nueva Zelanda.

Microtegeidae Balogh, 1972 (2 gen. y 33 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica merdional).

Microtegeus Berlese, 1916 (30 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tegeocranus (Microtegeus) undulatus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica merdional).
- *Microtegeus alvarezi* Pérez-Íñigo, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Microtegeus asiaticus* Aoki *et* Yamamoto, 2000
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Microtegeus borhidii* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental (Filipinas y Vietnam) y Japón.
- *Microtegeus cardosensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Microtegeus cervus* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtegeus ceylonicus* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Microtegeus cornutus* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka] y Vietnam).

- *Microtegeus curvisetosus* Wen, 1997
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Microtegeus foveolatus* Balogh, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea) y Oriental.
- *Microtegeus globifer* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Brasil) e India (Bengala Occidental).
- *Microtegeus granulatus* Wang *et* Shen, 2001
  DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Microtegeus hauseri* Mahunka, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Microtegeus hirashimai* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Microtegeus humeratus* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Filipinas.
- *Microtegeus khaustovi* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Microtegeus labyrinthicus* Balogh, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Microtegeus lucianus* Mahunka, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Microtegeus mexicanus* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Microtegeus modestus* Aoki, 1976
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Microtegeus papillosus* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtegeus paracervus* Mahunka, 1997
  (=*Microtegeus cervus* Mahunka, 1996, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Microtegeus quadrisetosus* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Ceilán [Sri Lanka] y Etiópica (Congo).
- *Microtegeus quadristriatus* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Paraguay y Vietnam.
- *Microtegeus reticulatus* Aoki, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y "Este de Paleártica oriental".
- *Microtegeus rugosus* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Microtegeus sabahnus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo e India: Bengala Occidental).
- *Microtegeus similis* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Microtegeus undulatus* (Berlese, 1916) (*Tegeocranus (M.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Somalia y Tanzania) y Paleártica meridional (Cáucaso).
- *Microtegeus variabilis* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtegeus zigzag* Mahunka, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Suctotegeus Mahunka, 1987 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Suctotegeus tumescitus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Suctotegeus philippinensis* Corpuz-Raros, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Suctotegeus rimosus* (Hammer, 1982) (*Microtegeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Suctotegeus tumescitus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Hydrozetoidea Grandejan, 1954

Hydrozetidae Grandjean, 1954 (1 gen., 35 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Hydrozetes Berlese, 1902 (35 spp. y 3 sspp.)
(=***Argentinobates*** Fernández, 1984)
(=***Heloribates*** Grandjean, 1966)
(=***Ojaithrus*** Habeeb, 1982)
ESPECIE TIPO: *Notaspis lacustris* Michael, 1882
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Hydrozetes amudariensis* Koshchanova, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Hydrozetes behanpelletierae* Bayartogtokh *et* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hydrozetes californiensis* Habeeb, 1974
  (=*Ojaithrus nymphoides* Habeeb, 1982: juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).

- *Hydrozetes capensis* Engelbrecht, 1974
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Corea.
- *Hydrozetes confervae* (Schrank, 1781) (*Acarus*)
(=*Hydrozetes terrestris* Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Hydrozetes dimorphus Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Brasil).
- *Hydrozetes dimorphus dimorphus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Hydrozetes dimorphus virginalis* Fernández *et* Travé, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Brasil).

- *Hydrozetes edentulus* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Hydrozetes eichhornia* (Soliman, Hussein *et* Ramadan, 1991) (*Linobia*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Hydrozetes escobari* Fernández *et* Travé, 1984
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Hydrozetes gueyeae* Mahunka, 1990
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Senegal y Etiopía).
- *Hydrozetes harundinosus* Kuriki, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hydrozetes indicator* Habeeb, 1974
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Connecticut).
- *Hydrozetes inquirenda* Subías, 2010 *sp. inq.* (juvenil)
(=*Linobia nilotica* Soliman, Hussein *et* Ramadan, 1991, *nom. praeoc.* por Trägårdh, 1905)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Hydrozetes japonicus* Kuriki, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hydrozetes laccosis* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

Hydrozetes lacustris (Michael, 1882) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Siberia centrooccidenal, Japón y Canadá).
- *Hydrozetes lacustris lacustris* (Michael, 1882)
DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (Eurosiberiana y Canadá).
- *Hydrozetes lacustris octosetosus* Willmann, 1931
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Paleártica occidental).
- *Hydrozetes lacustris parisiensis* Grandjean, 1948 (*H. p.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).

- *Hydrozetes lemnae* (Coggi, 1897) (*Notaspis*)
(=*Hydrozetes mollicoma* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica occidental (frecuente), Paleártica oriental (Irán), Neártica (U.S.A.: Nueva York), Etiópica (Yemen y Malgache: I. Comores), Oriental (Bali), Australiana (frecuente) y Neotropical (frecuente).
- *Hydrozetes longisetosus* Seniczak *et* A. Seniczak, 2009
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Hydrozetes megacephalum* (Berlese, 1901) (*Dameosoma*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Hydrozetes mindanaoensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hydrozetes niloticus* (Trägårdh, 1905) (*Notaspis*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Sudán.
- *Hydrozetes paulista* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hydrozetes petrunkevitchi* Newel, 1945
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Hydrozetes platensis* Berlese, 1902 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Hydrozetes replacementica* (Soliman, Hussein *et* Ramadan, 1991) (*Linobia*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Hydrozetes ringueleti* Fernández, 1984 (*H. (Argentinobates)*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Pequeñas Antillas).
- *Hydrozetes speciosus* (Piersig, 1895) (*Notaspis*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Hydrozetes sphagnicolus* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Theron, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hydrozetes tamarae* Tolstikov, 1996 (*H. (Heloribates)*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Siberia.
- *Hydrozetes thienemanni* Strenzke, 1943
(=*Hydrozetes incisus* Grandjean, 1948)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental (menos frecuente en el Sur), Irán y Alaska, y Vietnam.
- *Hydrozetes tobaicus* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Hydrozetes tridactylus* Abd-el-Hamid, 1964
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Hydrozetes uberabensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hydrozetes vicarius* Balogh, 1958 *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Hydrozetes videor* Habeeb, 1974
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).

Ameronothroidea Vitzthum, 1943

Ameronothridae Vitzthum, 1943 (9 gen., 42 spp. y 8 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Alaskozetes Hammer, 1955 (3 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Alaskozetes coriaceus* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Anfipolar.
Alaskozetes antarcticus (Michael, 1903) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica y Nueva Zelanda.
- *Alaskozetes antarcticus antarcticus* (Michael, 1903)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente) y Nueva Zelanda.
- *Alaskozetes antarcticus grandjeani* (Dalenius, 1958) (*Halozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Alaskozetes antarcticus intermedius* Wallwork, 1967
DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica y Neotropical austral.
- *Alaskozetes bouvetoyaensis* Pletzen *et* Kok, 1971
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Alaskozetes coriaceus* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Alaska y Nueva Zelanda.

Ameronothrus Berlese, 1896 (14 spp.)
(=***Hygroribates*** Jacot, 1934)
ESPECIE TIPO: *Eremaeus lineatus* Thorell, 1871
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- *Ameronothrus bilineatus* (Michael, 1888) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa y Sudáfrica.
- *Ameronothrus dubinini* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Erosiberiana (Norte de Europa y Oeste de Siberia).
- *Ameronothrus harioti* (Michael, 1891) (*Scutovertex*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Ameronothrus lapponicus* Dalenius, 1963
DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa.
- *Ameronothrus lineatus* (Thorell, 1871) (*Eremaeus*)
(=*Scutovertex corrugatus* Michael, 1888)
(=*Scutovertex occidentalis* Hull, 1918)
DISTRIBUCIÓN: Boreal y Méjico.
- *Ameronothrus maculatus* (Michael, 1882) (*Scutovertex*)
(=*Scutovertex maculatus groenlandicus* Trägårdh, 1905)
(=*Scutovertex pseudomaculaltus* Hull, 1914)
(=*Scutovertex pseudomaculatus insularis* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (excepto Paleártica oriental) y Pequeñas Antillas.
- *Ameronothrus marinus* (Banks, 1896) (*Nothrus*)
(?=*Ameronothrus fucicolum* Brady, 1875 *sp. inq.*)
(=*Scutovertex spoofi* Oudemans, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (excepto Paleártica oriental).
- *Ameronothrus nidicola* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Erosiberiana.
- *Ameronothrus nigrofemoratus* (L. Koch, 1879) (*Nothrus*)
(=*Ameronothrus lineatus brevipes* Willmann, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (excepto Paleártica oriental).
- *Ameronothrus oblongus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental) y Canadá.
- *Ameronothrus schneideri* (Oudemans, 1903) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Ameronothrus schubarti* Weigmann *et* Schulte, 1975
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Ameronothrus schusteri* Schubart, 1970
DISTRIBUCIÓN: Croacia.
- *Ameronothrus yoichi* Pfingstl *et* Shimano, 2019
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Aquanothrus Engelbrecht, 1975 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Aquanothrus montanus* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Aquanothrus montanus* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Botsuana).

Capillibates Hammer, l966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Capillibates stagaardi* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Capillibates stagaardi* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Chudalupia Wallwork, 1981 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Chudalupia meridionalis* Wallwork, 1981
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Chudalupia meridionalis* Wallwork, 1981
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Halozetes Berlese, 1916 (16 spp. y 5 sspp.)
(=***Anarea*** Dalenius, 1958)
(=***Pertorgunia*** Dalenius, 1958)
ESPECIE TIPO: *Notaspis marina* Lohmann, 1907
DISTRIBUCIÓN: Austral.
- *Halozetes bathamae* Luxton, 1984
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
Halozetes belgicae (Michael, 1903) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Halozetes belgicae belgicae* (Michael, 1903)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente).
- *Halozetes belgicae brevipilis* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).
- *Halozetes belgicae longisetae* Wallwork, 1967
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Halozetes belgicae mickii* Coetzee, 2000
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Príncipe Eduardo).
- *Halozetes capensis* Coetzee *et* D. Marshall, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Halozetes crozetensis* (Richters, 1908) (*Scutovertex*)
(=*Pertorgunia colobanthi* Dalenius, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica (frecuente), y Neotropical austral.
- *Halozetes edwardensis* Pletzen *et* Kok, 1971
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Príncipe Eduardo).
- *Halozetes fulvus* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Príncipe Eduardo).
- *Halozetes impeditus* Niedbała, 1986
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Shetland del Sur).
- *Halozetes intermedius* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Halozetes littoralis* Wallwork, 1970
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
- *Halozetes macquariensis* (Dalenius, 1958) (*Pertorgunia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
Halozetes marinus (Lohmann, 1907) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Austral (Antártica, subantártica, Neotropical y Nueva Zelanda).
- *Halozetes marinus marinus* (Lohmann, 1907)
(=*Anarea macquariensis* Dalenius, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica (frecuente), y Nueva Zelanda.
- *Halozetes marinus devilliersi* Engelbrecht, 1974
DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Halozetes marinus minor* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Halozetes marionensis* Engelbrecht, 1974
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Halozetes necrophagus* Wallwork, 1967
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Shetland del Sur).
- *Halozetes otagoensis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Halozetes plumosus* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Halozetes scotiae* (Trouessart, 1912) (*Notaspis*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Antártica: I. Orcadas del Sur (I. Orkney).

Paraquanothrus Norton *et* Franklin, 2018 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Paraquanothrus grahami* Norton *et* Franklin, 2018
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Paraquanothrus grahami* Norton *et* Franklin, 2018
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Paraquanothrus spooneri* Norton *et* Franklin, 2018
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).

Podacarus Grandjean, 1954 (1 sp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Podacarus auberti* Grandejan, 1954
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
Podacarus auberti Grandjean, 1954
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Podacarus auberti auberti* Grandjean, 1954

DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente).
- *Podacarus auberti occidentalis* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Pseudantarcticola Balogh, 1970 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pseudantarcticola tropica* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australiana y austral.
- *Pseudantarcticola aquatica* Ermilov *et* Pešić, 2011
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Pseudantarcticola georgiae* (Wallwork, 1970) (*Antarcticola*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Pseudantarcticola tropica* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Selenoribatidae Schuster, 1963 (8 gen. y 33 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.

Arotrobates Luxton, 1992 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Arotrobates lanceolatus* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.
- *Arotrobates granulatus* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong) y Japón.
- *Arotrobates lanceolatus* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

Carinozetes Pfingstl *et* Schuster, 2012 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Carinozetes trifoveolatus* Pfingstl *et* Schuster, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Carinozetes bermudensis* Pfingstl *et* Schuster, 2012
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Carinozetes mangrovi* Pfingstl, Lienhard *et* Jagersbacher-Baumann, 2014
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Carinozetes trifoveolatus* Pfingstl *et* Schuster, 2012
DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

Indopacifica Pfingstl, Shimano *et* Lienhard, 2018 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Indopacifica pantai* Pfingstl, Shimano *et* Lienhard, 2018
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Etiópica.
- *Indopacifica iohanna* Resch, Baumann *et* Pfingstl, 2019
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Indopacifica mauritiana* Resch, Baumann *et* Pfingstl, 2019
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Indopacifica pantai* Pfingstl, Shimano *et* Lienhard, 2018
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Tailandia).
- *Indopacifica parva* Pfingstl, Shimano *et* Lienhard, 2018
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Psednobates Luxton, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Psednobates uncunguis* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Psednobates uncunguis* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

Schusteria Grandjean, 1968 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Schusteria littorea* Grandjean, 1968
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Neotropical.
- *Schusteria littorea* Grandjean, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil e I. Galápagos).
- *Schusteria marina* Pfingstl *et* Lienhard, 2017
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Schusteria nagisa* Karasawa *et* Aoki, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Schusteria saxea* Karasawa *et* Aoki, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Selenoribates Strenzke, 1961 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Selenoribates foveiventris* Strenzke, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Oriental) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Selenoribates arotroventer* Pfingstl, 2015
DISTRIBUCIÓN: I. Maldivas.
- *Selenoribates asmodaeus* Pfingstl, 2015
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Selenoribates divergens* Pfingstl, 2015
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Selenoribates elegans* Pfingstl, 2013
DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

- *Selenoribates foveiventris* Strenzke, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Selenoribates ghardaqensis* Abd-el-Hamid, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Selenoribates mediterraneus* Grandjean, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Selenoribates niccus* Pfingstl, 2015
  DISTRIBUCIÓN: I. Maldivas.
- *Selenoribates quasimodo* Pfingstl, 2013
  DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.
- *Selenoribates satanicus* Pfingstl, 2013
  DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

Thalassozetes Schuster, 1963 (8 spp.)
(=***Rhizophobates*** Karasawa *et* Aoki, 2005)
ESPECIE TIPO: *Thalassozetes riparius* Schuster, 1963
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y subtropical.

- *Thalassozetes balboa* Pfingstl, Lienhard *et* Baumann, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Thalassozetes barbara* Pfingstl, 2013
  DISTRBUCIÓN: Antillas.
- *Thalassozetes canariensis* Pfingstl, Paz *et* Hernández-Teixidor, 2020
  DISTRBUCIÓN: I. Canarias.
- *Thalassozetes melanomerus* (D. Marshall *et* Pugh, 2000) (*Schusteria*)
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Thalassozetes riparius* Schuster, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Thalassozetes shimojanai* (Karasawa *et* Aoki, 2005) (*Rhizophobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Thalassozetes tenuisetosus* Bayartogtokh *et* Chatterjee, 2010
  DISTRBUCIÓN: India (Goa).
- *Thalassozetes ugraseni* (D. Marshall *et* Pugh, 2000) (*Schusteria*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Thasecazetes Pfingstl, Baumann, Lienhard *et* Schatz, 2017 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Thasecazetes falcidactylus* Pfingstl, Baumann, Lienhard *et* Schatz, 2017
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Thasecazetes falcidactylus* Pfingstl, Baumann, Lienhard *et* Schatz, 2017
  DISTRBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Fortuyniidae Hammen, 1963 (4 gen., 27 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Alismobates Luxton, 1992 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Alismobates reticulatus* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.

- *Alismobates galapagoensis* Pfingstl *et* Schatz, 2017
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Alismobates inexpectatus* Pfingstl *et* Schuster, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Alismobates keniaensis* Pfingstl, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Alismobates pseudoreticulatus* Pfingstl, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Tailandia).
- *Alismobates reticulatus* Luxton, 1992
  DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong) y Japón.
- *Alismobates rotundus* Luxton, 1992
  DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

Circellobates Luxton, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Circellobates venustus* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Circellobates venustus* Luxton, 1992
  DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

Fortuynia Hammen, 1960 (17 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Fortuynia marina* Hammen, 1960
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Fortuynia arabica* Bayartogtokh, Chatterjee *et* Ingole, 2009
  DISTRIBUCIÓN: India (Goa).
- *Fortuynia atlantica* Krisper *et* Schuster, 2008
  DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.
- *Fortuynia churaumi* Pfingstl, Wagner, Hiruta, Koblmüller, Hagino *et* Shimano, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fortuynia dimorpha* Pfingstl, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Fortuynia elamellata Luxton, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón.
- *Fortuynia elamellata elamellata* Luxton, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Fortuynia elamellata micromorpha* D. Marshall *et* Pugh, 2002
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Fortuynia elamellata shibai* Aoki, 1974
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Fortuynia hawaiiensis* Pfingstl *et* Jagersbacher-Baumann, 2016
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Fortuynia inhambanensis* D. Marshall *et* Pugh, 2002
DISTRIBUCIÓN: Mozambique.
- *Fortuynia iranica* Akrami, 2020
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Fortuynia longiseta* Pfingstl, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental (I. Maldivas y Tailandia) y Paquistán.
- *Fortuynia maculata* Luxton, 1986
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Fortuynia maledivensis* Pfingstl, 2015
DISTRIBUCIÓN: I. Maldivas.
- *Fortuynia marina* Hammen, 1960
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Fortuynia rotunda* D. Marshall *et* Pugh, 2002
DISTRIBUCIÓN: Mozambique y Japón.
- *Fortuynia sinensis* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Fortuynia smiti* Ermilov, Tolstikov, Mary *et* Schatz, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia y Oriental (Península Malaya y Tailandia).
- *Fortuynia taiwanica* Bayartogtokh, Chatterjee *et* Chan, 2009
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Fortuynia yunkeri* Hammen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Panamá.

Litoribates Pfingstl *et* Schatz, 2017 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Litoribates caelestis* Pfingstl *et* Schatz, 2017
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Litoribates bonairensis* Pfingstl, Baumann, Lienhard *et* Schatz, 2017
DISTRBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Litoribates caelestis* Pfingstl *et* Schatz, 2017
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Litoribates floridae* Pfingstl, Lienhard *et* Baumann, 2019
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

Cymbaeremaeoidea Sellnick, 1928

Adhaesozetidae Hammer, 1973 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Adhaesozetes Hammer, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Adhaesozetes barbarae* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Adhaesozetes barbarae* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Adhaesozetes polyphyllos* Walter *et* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).

Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928 (7 gen. y 126 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Bulleremaeus Hammer, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Bulleremaeus reticulatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Bulleremaeus reticulatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Bulleremaeus tuberculatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Cymbaeremaeus Berlese, 1896 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremaeus cymba* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Oriental y Neotropical.
- *Cymbaeremaeus cymba* (Nicolet, 1855) (*Eremaeus*)
(=*Cymbaeremaeus frequens* Schäffer, Kerschbaumer *et* Koblmüller, 2019)
(=*Cymbaeremaeus habsburgeri* Schäffer, Kerschbaumer *et* Koblmüller, 2019)
(=*Cymbaeremaeus montanus* Schäffer, Kerschbaumer *et* Koblmüller, 2019)
(=*Cymbaeremaeus pulvillifer* Willmann, 1931: juvenil)
(=*Cymbaeremaeus styriacus* Schäffer, Kerschbaumer *et* Koblmüller, 2019)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente), India (Sikkim) y Méjico.
- *Cymbaeremaeus foliatus* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Cymbaeremaeus inexpectatus* Schäffer, Kerschbaumer *et* Koblmüller, 2019
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Cymbaeremaeus pervagatus* Schäffer, Kerschbaumer *et* Koblmüller, 2019
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Cymbaeremaeus silva* Fujikawa, 2002
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Glanderemaeus Balogh *et* Csiszár, 1963 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Glanderemaeus hammerae* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Glanderemaeus hammerae* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Scapheremaeus Berlese, 1910 (117 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremaeus patella* Berlese, 1886
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Scapheremaeus alisonae* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus allmani* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus alvarezius* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus alveolatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scapheremaeus angusi* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus anteriorugosus* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Scapheremaeus arboreus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scapheremaeus arcuatus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Scapheremaeus argentinensis* Travé *et* Fernández, 1986
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scapheremaeus ascissuratus* Ermilov *et* Anichkin, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scapheremaeus balazsi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Cuba) y Oriental (India: Bengala Occidental).
- *Scapheremaeus baloghius* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus baylyi* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus bicornutus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Scapheremaeus bisculpturatus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).
- *Scapheremaeus bituberculatus* Wang, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Scapheremaeus boninensis* Bayartogtokh, Hiruta *et* Shimano, 2018
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scapheremaeus bulbosensillatus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus carinatus* Willmann, 1936
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Scapheremaeus cellulatifer* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scapheremaeus chaac* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus chaquensis* Fernández *et* Cleva, 2009
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scapheremaeus cheloniella* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus clavifer* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scapheremaeus clavisetus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Scapheremaeus convexus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Scapheremaeus corniger* (Berlese, 1908) (*Cymbaeremaeus*)
(=*Scapheremaeus madeirensis* Willmann, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Scapheremaeus cornutus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Scapheremaeus crassus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scapheremaeus cuspidatus* Pérez-Íñigo, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Scapheremaeus cyclops* (Oudemans, 1915) (*Cymbaeremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Scapheremaeus demeteri* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Scapheremaeus digitatus* Wang, 1998
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Scapheremaeus dirzoius* Palacios-Vargas *et* Páez, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus emarginatus* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scapheremaeus eugenius* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus euthemellus* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus ewani* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus fimbriatus* (Michael, 1890) (*Eremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Argelia.
- *Scapheremaeus fisheri* Aoki, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Oriental: India (Bengala Occidental) y Vietnam.
- *Scapheremaeus flamiferus* Palacios-Vargas *et* Ríos, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Scapheremaeus foveolatus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scapheremaeus fungisetosus* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus gibbus* Ermilov *et* Minor, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scapheremaeus glaber* Hammer, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Scapheremaeus grahamius* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Scapheremaeus guerini* (Berlese, 1908) (*Cymbaeremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Scapheremaeus hectorperezius* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus hieroglyphicus* (Hall, 1911) (*Hermannia*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Scapheremaeus humeratus* Balogh *et* Mahunka, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Scapheremaeus hungarorum* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Scapheremaeus insularis* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scapheremaeus johnsi* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Scapheremaeus lambieae* Colloff, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus latirostris* Willmann, 1936
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Argentina).
- *Scapheremaeus latus* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Scapheremaeus longicuspis* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Scapheremaeus longilamellatus* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Scapheremaeus luxtoni* Ermilov *et* Minor, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scapheremaeus magdalenae* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus mahunkaius* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus marginalis* (Banks, 1896) (*Eremaeus*)
  (=*Cymbaeremaeus (Scapheremaeus) marmoratus* Berlese, 1910)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Scapheremaeus minjambuta* Colloff, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus morenoi* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Scutovertex*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba e Irán.
- *Scapheremaeus morulisensillatus* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus nakanoshimensis* Bayartogtokh, Hiruta *et* Shimano, 2018

DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scapheremaeus nashiroi* Nakatamari, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
- *Scapheremaeus nivalis* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus nogueraius* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus notoverrucatus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus nuciferosa* Ramani *et* Haq, 1998
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Scapheremaeus obliteratus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú y U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Scapheremaeus ornatus* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).
- *Scapheremaeus ovivorus* (Packard, 1868) (*Nothrus*) *sp. inq.*
(=*Oribata aspidioti* Ashmead, 1879)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Scapheremaeus pacificus* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Scapheremaeus palaciosi* Ríos, 1996
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus palustris* (Sellnick, 1924) (*Cymbaeremaeus (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Mongolia y Neártica), I. Santa Helena y Méjico.
- *Scapheremaeus parvulus* (Banks, 1909) (*Cymbaeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental y Norte de Neotropical.
- *Scapheremaeus patella* (Berlese, 1886) (*Eremaeus*)
(=*Scapheremaeus hammerae* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y Nueva Zelanda.
- *Scapheremaeus pauliani* Fernández *et* Cleva, 2010
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Scapheremaeus petrosus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Scapheremaeus pinguis* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Scapheremaeus pisacensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Scapheremaeus polysetosus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Scapheremaeus pseudoreticulatus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Scapheremaeus pulchellus* (Berlese, 1910) (*Cymbaeremaeus (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Scapheremaeus pulleni* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus pundamiliaensis* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scapheremaeus quadrilineatus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Scapheremaeus quadrireticulatus* Wang, 1998
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Scapheremaeus rodickae* Norton, Franklin *et* Crossley jr., 2010
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
- *Scapheremaeus retestriatus* Wang, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Scapheremaeus reticulatus* (Berlese, 1910) (*Cymbaeremaeus (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Scapheremaeus rustenburgensis* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scapheremaeus schatzi* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus semiconvexus* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Scapheremaeus semiornatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Scapheremaeus simplex* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus sinuosus* Aoki, 1964
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scapheremaeus stratus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Scapheremaeus striatomarginatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Scapheremaeus subcorniger* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Scapheremaeus subglaber* Balogh *et* Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Scapheremaeus taurus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Scapheremaeus tegulatus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus tillandsiae* Fernández *et* Cleva, 1997
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scapheremaeus tillandsiophilus* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus tonatiuh* Palacios-Vargas, Ríos *et* Vázquez, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus tosaensis* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scapheremaeus tricarinatus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Scapheremaeus trirugis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina y Japón.
- *Scapheremaeus truncatus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus tuberculosus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus tumidus* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Scapheremaeus uncinatus* Wang, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Scapheremaeus volcanicus* Ríos *et* Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus walteri* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus yamashitai* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Scapheremaeus zephyrus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).

Sculpteremaeus Behan-Pelletier *et* Ermilov, 2020 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sculpteremaeus olszanowskii* Behan-Pelletier *et* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Sculpteremaeus olszanowskii* Behan-Pelletier *et* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: California.

Seteremaeus Hammer, 1971 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Setermaeus spinosus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Seteremaeus spinosus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Spineremaeus Colloff, 2011 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Spineremaeus smithi* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Spineremaeus smithi* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).

Ametroproctidae Subías, 2004 (2 gen., 1 subgen. y 9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Ametroproctus Higgins *et* Woolley, 1968 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ametroproctus oresbios* Higgins *et* Woolley, 1968
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Ametroproctus (Ametroproctus) Higgins *et* Woolley, 1968 (3 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Ametroproctus (A.) aridus* Behan-Pelletier, 1987
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Ametroproctus (A.) oresbios* Higgins *et* Woolley, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Ametroproctus (A.) tuberculosus* Behan-Pelletier, 1987
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Ametroproctus (Coropoculia) Aoki *et* Fujikawa, 1972 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Coropoculia reticulata* Aoki *et* Fujikawa, 1972
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Ametroproctus (Coropoculia) beringianus* Behan-Pelletier, 1987
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Canadá y Este de Rusia asiática).
- *Ametroproctus (Coropoculia) canningsi* Behan-Pelletier, 1987
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ametroproctus (Coropoculia) lamellatus* (Schweizer, 1956) (*Cymbaeremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Ametroproctus (Coropoculia) mongolicus* Bayartogtokh, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ametroproctus (Coropoculia) reticulatus* (Aoki *et* Fujikawa, 1972) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica y Este de Paleártica oriental).

Scapuleremaeus Behan-Pelletier, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Scapuleremaeus kobauensis* Behan-Pelletier, 1989
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Scapuleremaeus kobauensis* Behan-Pelletier, 1989
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Eremellidae Balogh, 1961 (2 gen., 2 subgen. y 15 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Archeremella Balogh *et* Mahunka, 1974 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremella (Archeremella) leowae* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Archeremella (Archeremella) Balogh *et* Mahunka, 1974 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Archeremella (A.) africana* Pérez-Íñigo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Archeremella (A.) leowae* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Eremella (A.)*)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Archeremella (Multieremella) Subías, 2020 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Archeremella bartlae* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Archeremella (Multieremella) bartlae* Mahunka, 2008 (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Eremella Berlese, 1913 (12 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremella vestita* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Holártica meridional.

Eremella (Eremella) Berlese, 1913 (6 spp.)
(=***Proteremella*** Balogh, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Eremella (E.) africana* (Balogh, 1966) (*Proteremella*)
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Eremella (E.) ensifera* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Argentina e Irán.
- *Eremella (E.) funnagasatoensis* Y.- N. Nakamura, Hashimoto, Nishi, Nakamura *et* Fujikawa, 2015
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eremella (E.) induta* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical: Oriental, Japón, Australiana (I. Tonga), Neotropical (Brasil), y Etiópica (Congo y Madagascar).
- *Eremella (E.) pulchella* (Balogh, 1959) (*Proteremella*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Eremella (E.) vestita* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Eremella (Licnocepheus) Woolley, 1969 (6 spp.)
(=***Afreremella*** Mahunka, 1974)
(=***Triteremella*** Kunst, 1971)
ESPECIE TIPO: *Licnocepheus reticulatus* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional, Etiópica y Neotropical.
- *Eremella (Licnocepheus) kaszabi* Csiszár, 1962 (*E.*)
(?=*Licneremaeus tuberculatus* Paoli, 1908 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Eremella (Licnocepheus) luisiae* (Mahunka, 1974) (*Afreremella*)
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Eremella (Licnocepheus) matildebellae* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1995 (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Eremella (Licnocepheus) reticulatus* (Woolley, 1969) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).
- *Eremella (Licnocepheus) simpliseta* (Mahunka, 2011) (*Triteremella*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Eremella (Licnocepheus) vazdemelloi* Ermilov *et* Frolov, 2019 (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Infraorden PORONOTICAE Grandjean, 1954

Licneremaeoidea Grandjean, 1954

Dendroeremaeidae Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2005 (1gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.

Dendroeremaeus Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2005 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dendroeremaeus krantzi* Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2005
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Dendroeremaeus foveolatus* Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2005
  DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Dendroeremaeus krantzi* Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2005
  DISTRIBUCIÓN: Neártica noroccidental.

Micreremidae Grandjean, 1954 (5 gen. y 21 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Fenichelia Balogh, 1970 (3 spp.)
(=***Porofenichelia*** Mahunka, 1985)
ESPECIE TIPO: *Fenichelia biroi* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Australiana).
- *Fenichelia biroi* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Fenichelia latipilosa* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Congo).
- *Fenichelia porosa* (Mahunka, 1985) (*Porofenichelia*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Mexiceremus Balogh *et* P. Balogh, 1998 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Micreremus rafaelius* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1995
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mexiceremus rafaelius* (Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1995) (*Micreremus*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Micreremus Berlese, 1908 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremaeus brevipes* Michael, 1888
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica y Paleotropical).
- *Micreremus africanus* Balogh, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Malgache: I. Reunión).
- *Micreremus brevipes* (Michael, 1888) (*Eremaeus*)
  (=*Micreremus gracilior* Willmann, 1931)
  (=*Eremaeus minimus* Berlese, 1891)
  (=*Eremaeus minutipes* Berlese, 1902)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental).
- *Micreremus elongatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Micreremus faviger* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Micreremus florens* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Micreremus granulatus* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Micreremus longisetus* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Micreremus macrofissura* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Micreremus subglaber* Ito, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Phylleremus Behan-Pelletier *et* Walter, 2007 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Phylleremus leei* Behan-Pelletier *et* Walter, 2007
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Phylleremus hunti* Behan-Pelletier *et* Walter, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phylleremus leei* Behan-Pelletier *et* Walter, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Phylloribatula Balogh *et* Mahunka, 1978 (6 spp.)
(=***Balazsella*** Mahunka, 1983)
ESPECIE TIPO: *Phylloribatula pulchella* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.
- *Phylloribatula ilhabellae* (Balogh *et* Palacios-Vargas, 1996) (*Balazsella*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Phylloribatula luzonensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Tuberemaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Phylloribatula mexicana* (Balogh *et* Palacios-Vargas, 1996) (*Balazsella*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Phylloribatula pilososetosa* (Mahunka, 1983) (*Balazsella*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Phylloribatula pulchella* Balogh *et* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Phylloribatula xanthoparmeliae* Martínez *et* Palacios-Vargas, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Lamellareidae Balogh, 1972 (4 gen. y 14 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepo Neártica).

Cultroribella Mahunka, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cultroribella lineata* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Cultroribella lineata* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Lamellarea Kok, 1968 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lamellarea ardua* Kok, 1968
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Lamellarea americana* Ermilov, 2020
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Lamellarea ardua* Kok, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lamellarea digitata* Kok, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lamellarea forceps* Kok, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lamellarea koki* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lamellarea quadrata* Coetzee, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Microlamellarea Coetzee, 1987 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Microlamellarea engelbrechti* Coetzee, 1987
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Australiana.
- *Microlamellarea coetzeeae* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Microlamellarea engelbrechti* Coetzee, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Microlamellarea minuta* Ermilov *et* Minor, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Tenuelamellarea Subías *et* Iturrondobeitia, 1978 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tenuelamellarea hispanica* Subías *et* Iturrondobeitia, 1978
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepo Neártica).
- *Tenuelamellarea argentinensis* Martínez, Velis, Eguaras *et* Fernández, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Tenuelamellarea hawaiiensis* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Tenuelamellarea hispanica* Subías *et* Iturrondobeitia, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso), Etiópica (Sudáfrica) y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).
- *Tenuelamellarea taprobanae* (Oudemans, 1915) (*Carabodes*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Licneremaeidae Grandjean, 1954 (2 gen. y 20 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Huilicheremaeus Fernández, Marcangeli *et* Eguaras, 1997 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Huilicheremaeus michaii* Fernández, Marcangeli *et* Eguaras, 1997
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Huilicheremaeus atypicus* (Mahunka, 1984) (*Licneremaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Huilicheremaeus michaii* Fernández, Marcangeli *et* Eguaras, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Licneremaeus Paoli, 1908 (18 spp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis licnophorus* Michael, 1882
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Licneremaeus altiplanicus* Covarrubias, 2005
  DISTRIBUCION: Chile.
- *Licneremaeus braziliensis* Bomfim, Silva *et* Oliveira, 2017
  DISTRIBUCION: Brasil.
- *Licneremaeus costulatus* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Licneremaeus cristatus* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Licneremaeus cubanus* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Licneremaeus discoidalis* Willmann, 1930
(=*Licneremaeus antillensis* Mahunka, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Licneremaeus embeyisztini* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Licneremaeus exornatus* Grandjean, 1931
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Licneremaeus giustii* Bernini, 1973
DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
- *Licneremaeus indicus* Arun *et* Ramani, 2020
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Licneremaeus licnophorus* (Michael, 1882) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Carolina del Norte), Neotropical y Oriental (Vietnam).
- *Licneremaeus linieatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Licneremaeus novaeguineae* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Australiana: Nueva Guinea y Komodo, y Neotropical: Perú y Brasil) y Japón.
- *Licneremaeus novus* Karppinen *et* Shtanchaeva, 1987
(=*Licneremaeus similis* Pérez-Íñigo jr., 1990)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Licneremaeus polygonalis* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico, Vietnam y Madagascar.
- *Licneremaeus prodigiosus* Schuster, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centomeridional y Asia centrooccidental).
- *Licneremaeus propinquus* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Licneremaeus semiareolatus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Scutoverticidae Grandjean, 1954 (8 gen., 2 subgen. y 68 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Arthrovertex Balogh, 1970 (8 spp.)
(=***Argentinovertex*** Fernández *et* Cleva, 2002)
ESPECIE TIPO: *Arthrovertex segmentatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Arthrovertex baloghi* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Arthrovertex bispinatus* (Hammer, 1961) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina).
- *Arthrovertex coineaui* (Fernández *et* Cleva, 2002) (*Argentinovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Arthrovertex hauseri* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Brasil).
- *Arthrovertex ilocanus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Arthrovertex leucaena* Corpuz-Raros, 1991
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Arthrovertex segmentatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arthrovertex xena* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Ethiovertex Mahunka, 1982 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ethiovertex macrosetosus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Austaliana) y Paleártica meridional.

Ethiovertex (Ethiovertex) Mahunka, 1982 (9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Austaliana) y Paleártica meridional.
- *Ethiovertex (E.) africanus* (Evans, 1953) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Ethiovertex (E.) arcualis* (Hammer, 1977) (*Hypovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Ethiovertex (E.) elisae* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Ethiovertex (E.) laminipes* (Hammer, 1961) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) y Oriental (India: Uttarakhand).
- *Ethiovertex (E.) macrosetosus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Ethiovertex (E.) saxicola* (Sitnikova, 1975) (*Hypovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Ethiovertex (E.) sculperens* (Kok, 1968) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Ethiovertex (E.) transversalis* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropial (Argentina) y Oriental (India: Bengala Occidental).
- *Ethiovertex (E.) vanharteni* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Emiratos Árabes.

Ethiovertex (Biethiovertex) Subías, 2020 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: (*Scutovertex bidactylus* Mahunka, 1989, *nom. praeoc.* por Coggi, 1900) =*Ethiovertex mahunkai* Subías, 2017
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Ethiovertex (Biethiovertex) mahunkai* Subías, 2017 (*E.*)
(=*Scutovertex bidactylus* Mahunka, 1989, *nom. praeoc.* por Coggi, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Exochocepheus Woolley *et* Higgins, 1968 (6 spp.)
(=***Latovertex*** Mahunka, 1987)
ESPECIE TIPO: *Exochocepheus eremitus* Woolley *et* Higgins, 1968
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Exochocepheus contiguus* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Exochocepheus eremitus* Woolley *et* Higgins, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Exochocepheus hungaricus* (Mahunka, 1987) (*Latovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Exochocepheus laticuspis* (Balogh *et* Mahunka, 1965) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sureste de Europa y Paleártica oriental meridional).
- *Exochocepheus stenolamellatus* (Golosova, 1984) (*Hypovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Exochocepheus tuberculatus* (Golosova, 1984) (*Hypovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Hypovertex Krivolutsky, 1969 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hypovertex mirabilis* Krivolutsky, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Hypovertex bajartogtokhi* Netuzhilin *et* Shtanchaeva, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Hypovertex borealis* Rjabinin, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paleártica Oriental (excepto Oeste).
- *Hypovertex lenticulatus* Kahwash, Ruiz *et* Subías, 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hypovertex mirabilis* Krivolutsky, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

Lamellovertex Bernini, 1976 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Scutovertex caelatus* Berlese, 1895
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Lamellovertex caelatus* (Berlese, 1895) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Sur de Siberia).

Provertex Mihelčič, 1959 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Provertex kuehnelti* Mihelčič, 1959
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

Provertex (Provertex) Mihelčič, 1959 (4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Provertex (P.) delamarei* Travé, 1963
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Provertex (P.) forsslundi* Krivolutsky, 1969
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Provertex (P.) kuehnelti* Mihelčič, 1959
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Europa occidental).
- *Provertex (P.) mailloli* Travé, 1965
DISTRIBUCIÓN: Francia.

Provertex (Shtanchaeviella) Subías, 2020 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Provertex travei* Netuzhilin *et* Shtanchaeva, 2003
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.
- *Provertex (Shtanchaeviella) cendsureni* Netuzhilin *et* Shtanchaeva, 2003 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Provertex (Shtanchaeviella) nepalensis* Piffl, 1971 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Provertex (Shtanchaeviella) travei* Netuzhilin *et* Shtanchaeva, 2003 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centroccidental.

Scutovertex Michael, 1879 (30 spp.)
(=***Neoscutovertex*** Mihelčič, 1957)
ESPECIE TIPO: *Scutovertex sculptus* Michael, 1879
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (excepto Antártica y Neotropical).
- *Scutovertex alpinus* Willmann, 1953
DISTRIBUCIÓN: Europea (Austria y Cáucaso).
- *Scutovertex arenocolus* Pfingstl *et* Schäffer, 2009

DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Scutovertex armazi* Murvanidze *et* Weigmann, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Scutovertex bulgaricus* Kunst, 1961
DISTRIBUCIÓN: Bulgaria.
-*Scutovertex clypeatus* (Nicolet, 1855) (*Tegeocranus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Scutovertex evansi* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scutovertex fossatus* Wallwork, 1967
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Scutovertex glandulosus* Balogh *et* Mahunka, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Rusia europea y Mongolia).
- *Scutovertex granulatus* Mihelčič, 1957 (*S. (Neoscutovertex)*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia central rusa).
- *Scutovertex ianus* Pfingstl, Schäffer, Ebermann *et* Krisper, 2010
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Scutovertex inlenticulatus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Cáucaso y Portugal) y Asia centrooccidental.
- *Scutovertex japonicus* Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scutovertex jindianensis* Wen, 1985
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Scutovertex marginatus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Scutovertex mikoi* Weigmann, 2009
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Scutovertex minutus* (Koch, 1835) (*Cepheus*)
(=*Eremaeus ovalis siculus* Berlese, 1887)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y Groenlandia.
- *Scutovertex neonominatus* Subías, 2004
(=*Scutovertex perforatus* Sitnikova, 1975, *nom. praeoc.* por Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Oeste) e Irán.
- *Scutovertex niger* Moskacheva, 1964
DISTRIBUCIÓN: Bielorrusia.
- *Scutovertex ornatus* Bulanova-Zachvatkina, 1964
DISTRIBUCIÓN: Rusia (Este de Europa y Asia central).
- *Scutovertex pannonicus* Schuster, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Paleártica oriental meridional).
- *Scutovertex perforatulus* Mihelčič, 1958
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Scutovertex petrophagus* Banks, 1906
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Scutovertex pictus* Kunst, 1959
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Scutovertex pileatus* Schäffer, Krisper, Pfingstl *et* Sturmbauer, 2010
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Scutovertex pilosetosus* Polderman, 1977
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Scutovertex punctatus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea, Asia centrooccidental y Mongolia) y Vietnam.
- *Scutovertex sculptus* Michael, 1879
(=*Scutovertex (Neoscutovertex) glaber* Mihelčič, 1957)
(?=*Cepheus ovalis* Koch, 1841 *sp. inq.*)
(=*Scutovertex rugosus* Mihelčič, 1957)
(=*Scutovertex steineri* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Nueva Zelanda.
- *Scutovertex serratus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Paleártica oriental meridional).
- *Scutovertex spinipes* Berlese, 1916 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Scutovertex subspinipes* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Scutoverticosus Kok, 1968 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Scutoverticosus arcanus* Kok, 1968
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.
- *Scutoverticosus arcanus* Kok, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scutoverticosus insperatus* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Passalozetidae Grandjean, 1954 (3 gen., 1 subgen., 49 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

Bipassalozetes Mihelčič, 1957 (30 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Passalozetes (Bipassalozetes) permixtus* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Etiópica y Neotropical.

Bipassalozetes (Bipassalozetes) Mihelčič, 1957 (26 spp. y 1 ssp.)
(=***Salpasozetes*** Mahunka, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Etiópica y Neotropical.
- *Bipassalozetes (B.) bidactylus* (Coggi, 1900) (*Scutovertex*)
(=*Passalozetes vicinus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Sudáfrica.
- *Bipassalozetes (B.) californicus* (Wallwork, 1972) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. meridional y Canadá) y Méjico.
- *Bipassalozetes (B.) deserticus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia y Yemen.
- *Bipassalozetes (B.) elegans* (Sitnikova, 1975) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Bipassalozetes (B.) gobiensis* (Mahunka, 1964) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (España y Paleártica oriental meridional).
- *Bipassalozetes (B.) intermedius* (Mihelčič, 1954) (*Passalozetes*)
(=*Passalozetes variatepictus* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y "Canadá".
- *Bipassalozetes (B.) lineolatus* (Sitnikova, 1975) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Bipassalozetes (B.) macedonicus* (Tarman, 1962) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Macedonia.
- *Bipassalozetes (B.) mahunkai* Bayartogtokh *et* Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Bipassalozetes (B.) microsculptratus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Bipassalozetes (B.) mongolicus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Bipassalozetes (B.) moniles* (Higgins *et* Woolley, 1975) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
Bipassalozetes (B.) neomexicanus (Wallwork, Weems *et* Kamill, 1984) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico) y Méjico.
- *Bipassalozetes (B.) neomexicanus neomexicanus* (Wallwork, Weems *et* Kamill, 1984)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico) y Méjico.
- *Bipassalozetes (B.) neomexicanus neonominatus* (Subías, 2004) (*Passalozetes*)
(=*Passalozetes neomexicanus granulatus* Wallwork, Weems *et* Kamill, 1984, *nom. praeoc.* por Mihelčič, 1955)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Bipassalozetes (B.) nesebarensis* (Vaněk, 1966) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Bulgaria.
- *Bipassalozetes (B.) niger* (Mahunka, 1987) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Bipassalozetes (B.) nitidus* (Bayoumi *et* Al-Khalifa, 1984) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Bipassalozetes (B.) orientalis* (Wallwork, Weems *et* Kamill, 1984) (*Passalozetes californicus o.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Bipassalozetes (B.) pectinatus* (Wallwork, 1964) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Bipassalozetes (B.) perforatus* (Berlese, 1910) (*Scutovertex*)
(=*Passalozetes granulatus* Mihelčič, 1955)
(=*Passalozetes propinquus* Mihelčič, 1956)
(?=*Eremaeus tibialis* Nicolet, 1855 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Bipassalozetes (B.) permixtus* (Mihelčič, 1957) (*Passalozetes (B.)*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Bipassalozetes (B.) pilosus* Bayartogtokh *et* Smelyansky, 2003
DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
- *Bipassalozetes (B.) reticulatus* (Mihelčič, 1957) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Bipassalozetes (B.) rugosus* (Sitnikova, 1975) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sureste de Europa y Oeste de Paleártica oriental).
- *Bipassalozetes (B.) strenzkei* (Weigmann, 2006) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Alemania y Kenia.
- *Bipassalozetes (B.) striatus* (Mihelčič, 1955) (*Passalozetes*)
(=*Passalozetes kaszabi* Mahunka, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Bipassalozetes (B.) wolwekransensis* (Engelbrecht, 1974) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Bipassalozetes (Passalobates) Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Passalobates asper* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Etiópica.
- *Bipassalozetes (Passalobates) asper* (Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Bipassalozetes (Passalobates) berndhauseri* (Mahunka, 1997) (*Passalozetes (B.)*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Bipassalozetes (Passalobates) humeratus* (Mahunka, 1978) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Bipassalozetes (Passalobates) linearis* (Higgins *et* Woolley, 1962) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (U.S.A.: Utah, y Mediterránea).
- *Bipassalozetes (Passalobates) sabulosus* (Shtanchaeva, 1986) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso e Irán.

Passalomonia Mahunka, 1987 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Passalozetes (Passalomonia) demeteri* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Passalomonia demeteri* (Mahunka, 1987) (*Passalozetes (Passalom.)*)
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.

Passalozetes Grandjean, 1932 (17 spp.)
ESPECIE TIPO: *Passalozetes africanus* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- *Passalozetes africanus* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (frecuente) y Guinea Ecuatorial.
- *Passalozetes agricola* Mínguez *et* Subías, 1983
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Passalozetes alumbrensis* Martínez *et* Herrero, 2006
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Passalozetes douglasensis* Engelbrecht, 1974
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Passalozetes hauseri* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Passalozetes hispanicus* Mihelčič, 1955
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Passalozetes imperfectus* Pérez-Íñigo jr., 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Passalozetes inlenticulatus* Mihelčič, 1959
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Passalozetes karppineni* Mikhaltzova, 1982
DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa.
- *Passalozetes lienhardi* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Passalozetes onubensis* Subías, Ruiz *et* Kahwash, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Passalozetes paucesculptus* Bernini, 1973
DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
- *Passalozetes prominens* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Argentina e Irán.
- *Passalozetes ruderalis* Mínguez *et* Subías, 1983
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Passalozetes scholzi* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Passalozetes stellatus* Mikhaltzova, 1982
DISTRIBUCIÓN: Norte de Rusia europea.
- *Passalozetes stellifer* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Phenopelopoidea Petrunkevitch, 1955

Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955 (4 gen., 1 subgen., 99 spp. y 7 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Eupelops Ewing, 1917 (66 spp. y 7 sspp.)
(=***Allopelops*** Hammer, 1952)
(=***Celaeno*** Koch, 1835, *nom. praeoc.* por Leach, 1821)
(=***Globonothrus*** Tseng, 1982)
(=***Pelops*** Koch, 1835, *nom. praeoc.* por Gistl, 1834)
(=***Phenopelops*** Petrunkevitch, 1955)
(=***Tectopelops*** Jacot, 1929)
ESPECIE TIPO: *Pelops ureaceus* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Eupelops absalom* (Berlese, 1916) (*Pelops*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".

Eupelops acromios (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica, Oriental, Etiópica y Neotropical.
- *Eupelops acromios acromios* (Hermann, 1804)
(=*Pelops kochi* Jacot, 1929)
(=*Pelops phytophilus* Berlese, 1916)
(?=*Acarus planicornis* Schrank, 1803 *sp. inq.*)
(=*Celaeno spinosa* Koch, 1835: juvenil)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica (frecuente), Oriental, Etiópica (Sudáfrica y Etiopía) y Neotropical (Argentina y Méjico).

- *Eupelops acromios minor* Chakrabarti, Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Bengala Occidental) y Nepal.

- *Eupelops apicalis* (Hammer, 1962) (*Pelops*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Ecuador).
- *Eupelops berlesei* (Oudemans, 1929) (*Peloptulus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Eupelops brevipilus* (Jacot, 1937) (*Pelops*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eupelops capensis* Grobler, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops caucasicus* Sitnikova, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Eupelops claviger (Berlese, 1916) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental).

- *Eupelops claviger claviger* (Berlese, 1916)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Este de Paleártica oriental).
- *Eupelops claviger fuerteventurae* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Eupelops contaminatus* Choi, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Eupelops costulatus* Mahunka, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Eupelops crinitus* (Grube, 1859) (*Pelonia*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Eupelops distinctus* Grobler, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops ecuadoriensis* P. Balogh, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Eupelops engelbrechti* Grobler, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops erinaceus* Balogh *et* Mahunka, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Eupelops eximius Sitnikova, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.

- *Eupelops eximius eximius* Sitnikova, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Eupelops eximius dicornus* Sitnikova, 1967 *ssp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

- *Eupelops forsslundi* (Balogh, 1959) (*Pelops*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.
- *Eupelops fusiformis* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Eupelops foveolatus* Engelbrecht, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica e India (Bengala Occidental).
- *Eupelops geminus* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).
- *Eupelops gibbus* (Mihelčič, 1957) (*Pelops*)
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Eupelops grandis* (Mihelčič, 1958) (*Pelops*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Eupelops halophilus* Pérez-Íñigo, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Eupelops heegi* (Balogh, 1958) (*Pelops*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Congo.

Eupelops hirtus (Berlese, 1916) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional, Paquistán y Neártica septentrional).

- *Eupelops hirtus hirtus* (Berlese, 1916)
  (=*Pelops differens* Mihelčič, 1953)
  (?=*Pelops farinosus* Nicolet, 1855 *sp. inq.*)
  (?=*Pelops hirsutus* Koch, 1844 *sp. inq.*)
  (?=*Pelops major* Hull, 1914 *sp. inq.*)
  (=*Pelops perarmatus* Hull, 1916)
  (=*Pelops simplex* Berlese, 1916)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional: frecuente, Paquistán y Canadá).
- *Eupelops hirtus franconia* (Jacot, 1939) (*Pelops simplex f.*) *ssp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).

- *Eupelops hygrophilus* (Knülle, 1954) (*Pelops*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Eupelops incompletus* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Eupelops intermedius* (Hammer, 1979) (*Nesopelops*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eupelops japonensis* Fujikawa, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Eupelops kivuensis* (Balogh, 1958) (*Pelops*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eupelops kumaensis* Fujikawa, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eupelops kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eupelops latipilosus* (Ewing, 1909) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. centrooriental, Cáucaso y Asia centrooccidental).
- *Eupelops limbulatus* (Tseng, 1982) (*Globonothrus*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Eupelops longisetosus* Chakrabarti *et* Mondal, 1981
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Eupelops margatensis* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops minutus* Grobler, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops miyamaensis* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eupelops mongolicus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1999
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Eupelops occultus* (Koch, 1835) (*Pelops*)
(=*Pelops brevicuspis* Knülle, 1954)
(=*Pelops parvus* Mihelčič, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: frecuente.
- *Eupelops oudemansi* (Hammen, 1952) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holanda.
- *Eupelops philippinensis* (Corpuz-Raros *et* García, 2011) (*Nesopelops*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eupelops plicatus* (Koch, 1835) (*Celaeno*) (juvenil)
(=*Pelops acromios diversipilus* Mihelčič, 1957)
(=*Pelops approximatus* Hull, 1916)
(=*Pelops auritus* Koch, 1839)
(=*Pelops fuligineus* Koch, 1839)
(=*Pelops fusiger* Mihelčič, 1957)
(=*Pelops laevigatus* Nicolet, 1855)
(=*Pelops siculus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Alaska y Virginia).
- *Eupelops pocsi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Eupelops rapaensis* (Sellnick, 1959) (*Phenopelops*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai].
- *Eupelops reticulatus* (Willmann, 1939) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Macaronesica (Madeira).
- *Eupelops sculptus* (Haupt, 1882) (*Pelops*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Eupelops septentrionalis* (Trägårdh, 1910) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Eupelops shagdarsureni* Bayartogtokh *et* Aoki, 1999
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Eupelops silvestris* (Jacot, 1937) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eupelops similis* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Eupelops somalicus* (Berlese, 1916) (*Pelops curtipilus s.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Somalia.
- *Eupelops spongiosus* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Venezuela).
- *Eupelops strenzkei* (Knülle, 1954) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Eupelops subexutus* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
(?=*Pelops glaber* Canestrini *et* R. Canestrini, 1882 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
-*Eupelops subulatus* (Berlese, 1916) (*Pelops*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Eupelops subuliger* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
(=*Pelops diversus* Mihelčič, 1957)
(=*Pelops longifissus* Willmann, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
Eupelops sulcatus (Oudemans, 1914) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Groenlandia) y Sudáfrica.
- *Eupelops sulcatus sulcatus* (Oudemans, 1914)
(=*Pelops bilobus* Sellnick, 1928)
(=*Pelops curtipilus* Berlese, 1916)
(=*Pelops depilatus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (excepto Este) y Groenlandia.
- *Eupelops sulcatus thabazimbiensis* Engelbrecht, 1975 (*E. curtipilus t.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops suramericanus* (Hammer, 1961) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eupelops tahitiensis* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Eupelops tardus* (Koch, 1835) (*Pelops*)
(=*Pelops nepotulus* Berlese, 1916)
(=*Pelops pulchellus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este).
- *Eupelops terminalis* (Banks, 1909) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá).
- *Eupelops tibialis* (Banks, 1910) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).
Eupelops torulosus (Koch, 1839) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este) y Etiopía.
- *Eupelops torulosus torulosus* (Koch, 1839)
(=*Pelops duplex* Berlese, 1916)
(=*Pelops variolosus* Nicolet, 1855)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este): frecuente, y Etiopía.
- *Eupelops torulosus macroporosus* Pérez-Íñigo jr., 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Eupelops torulosus meridionalis* Pérez-Íñigo, 1969
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Eupelops ureaceus* (Koch, 1839) (*Pelops*)
(=*Pelops affinis* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Asia centrooccidental) y Groenlandia.
- *Eupelops variatus* (Mihelčič, 1957) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Nesopelops Hammer, 1973 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nesopelops caudatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Nesopelops caudatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Nesopelops crassus* (Hammer, 1972) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Nesopelops higginsi* (Balogh, 1970) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nesopelops laensis* (Balogh, 1970) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nesopelops monodactylus* (Hammer, 1966) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Nesopelops polynesius* (Hammer, 1972) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Nesopelops punctatus* (Hammer, 1966) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Nesopelops samoaensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Nesopelops tongatapuensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Nesopelops transversus* (Balogh, 1970) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Peloptulus Berlese, 1908 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pelops phaeonotus* Koch, 1844
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Peloptulus (Peloptulus) Berlese, 1908 (14 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Peloptulus (P.) americanus* (Ewing, 1907) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Peloptulus (P.) borgesi* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Peloptulus (P.) denticuspidatus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1999
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Mongolia e Irán).
- *Peloptulus (P.) foveolatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador) y Oriental (India: Himalaya).
- *Peloptulus (P.) gibbus* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Peloptulus (P.) ibericus* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Peloptulus (P.) laticuspidatus* (Ewing, 1909) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Peloptulus (P.) latilamellatus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Peloptulus (P.) latirostris* Pérez-Íñigo, 1969

DISTRIBUCIÓN: España.
- *Peloptulus (P.) montanus* Hull, 1914
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Asia centrooccidental).
- *Peloptulus (P.) phaeonotus* (Koch, 1844) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Peloptulus (P.) reticulatus* Mihelčič, 1957
(=*Peloptulus trinacriae* Arcidiacono, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Peloptulus (P.) tanytrichosus* Higgins *et* Woolley, 1972
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Peloptulus (P.) wadatsumi* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Peloptulus (Sacculoptulus) Subías, 2017 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Peloptulus sacculiferus* Weigmann, 2008
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Peloptulus (Sacculoptulus) sacculiferus* Weigmann, 2008 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Portugal.

Propelops Jacot, 1937 (8 spp.)
(=***Hammeria*** Sellnick, 1944)
ESPECIE TIPO: *Propelops pinicus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Propelops alaskensis* (Hammer, 1955) (*Hammeria*)
DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- *Propelops canadensis* (Hammer, 1952) (*Hammeria*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica y Paleártica oriental).
- *Propelops groenlandicus* (Sellnick, 1944) (*Hammeria*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Este de Rusia asiática).
- *Propelops minnesotensis* (Ewing, 1913) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Sur).
- *Propelops monticolus* (Ewing, 1918) (*Eupelops*)
(=*Eupelops monticolus subborealis* Ewing, 1918)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Propelops pacificus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Propelops pinicus* Jacot, 1937 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.
- *Propelops rossicus* (Shaldybina, 1971) (*Hammeria*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Unduloribatoidea Kunst, 1971

Unduloribatidae Kunst, 1971 (3 gen. y 8 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

Scutoribates Sellnick, 1918 (2 spp.)
(=***Koreoribates*** Choi, 1994)
(=***Kunstella*** Krivolutsky, 1974)
ESPECIE TIPO: *Scutoribates perornatus* Sellnick, 1918 [†]
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Scutoribates foliatus* (Choi, 1994) (*Koreoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Scutoribates foveolatus* (Krivolutsky, 1974) (*Kunstella*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y Méjico.

Unduloribates Balogh, 1943 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes (Tectoribates) undulatus* Berlese, 1914
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.
- *Unduloribates brevisetosus* Nübel-Reidelbach *et* Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Unduloribates dianae* Behan-Pelletier *et* Walter, 2009
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Unduloribates hebes* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Himalaya y Asia centrooccidental.
- *Unduloribates medusa* Piffl, 1972
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Unduloribates undulatus* (Berlese, 1914) (*Sphaerozetes (Tectoribates)*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional e Himalaya).

Valbehanella Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Valbehanella freestatensis* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Valbehanella freestatensis* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Eremaeozetidae Piffl, 1972 (6 gen. y 52 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Eremaeozetes Berlese, 1913 (34 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremaeozetes tuberculatus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Eremaeozetes acutus* Covarrubias, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Méjico).
- *Eremaeozetes aokii* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eremaeozetes araucanus* Monetti, Oppedisano *et* Fernández, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Eremaeozetes arboreus* Nübel-Reidelbach *et* Woas, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Eremaeozetes bilunatifer* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Eremaeozetes capensis* Schatz, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eremaeozetes chancanii* Fernández *et* Cleva, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Eremaeozetes costulatus* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eremaeozetes darwinensis* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Eremaeozetes darwini* Schatz, 2001
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Eremaeozetes dividipeltatus* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Eremaeozetes ephippiger* Balogh, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Eremaeozetes himalayensis* Sanyal, 1992
  DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Eremaeozetes irenae* Schatz, 2001
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Eremaeozetes kurozumii* Aoki, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Eremaeozetes lineatus* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental: India (Himalaya) y Vietnam.
- *Eremaeozetes louisae* Schatz, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eremaeozetes machadoi* Mahunka, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Sudáfrica).
- *Eremaeozetes maculosus* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Eremaeozetes malleensis* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Eremaeozetes nasutus* Schatz, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eremaeozetes octomaculatus* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia (Samoa), Oriental: Filipinas y Java, y Japón.
- *Eremaeozetes reticulatus* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Eremaeozetes rogersi* Schatz, McAloon *et* Hagan, 2006
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
- *Eremaeozetes roguini* Mahunka, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Eremaeozetes sabinae* Schatz, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Eremaeozetes schatzi* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Eremaeozetes trifurcus* Wen, 1994
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eremaeozetes tsavoensis* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Eremaeozetes tuberculatus* Berlese, 1913
  DISTRIBUCIÓN: Java, Polinesia (Tahití) y Méjico.
- *Eremaeozetes undulatus* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Japón.
- *Eremaeozetes ursulae* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Eremaeozetes verai* Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Eremaeozetes woelkei* Piffl, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Idiozetes Aoki, 1976 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Idiozetes erectus* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Paleártica meridional.
- *Idiozetes erectus* Aoki, 1976
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Idiozetes javensis* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Idiozetes hagenensis* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Idiozetes malgache* Fernández, Cleva *et* Theron, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Mahunkaia Schatz, 2002 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eremaeozetes bituberculatus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Mahunkaia bituberculata* (Mahunka, 1983) (*Eremaeozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: África oriental y Vietnam.
- *Mahunkaia gracilis* (Mahunka, 1985) (*Eremaeozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mahunkaia schwendingeri* Mahunka, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Mahunkaia tricornis* Schatz, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Retrozetes Colloff, 2012 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Retrozetes koghisensis* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Retrozetes fernandezi* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Retrozetes hanswursti* (Mahunka, 1999) (*Eremaeozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Retrozetes koghisensis* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Retrozetes mirabilis* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Retrozetes novaecaledoniae* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

Rogerzetes Fernández, Theron *et* Cleva, 2011 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rogerzetes lacouturieri* Fernández, Theron *et* Cleva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Rogerzetes betschi* (Fernández *et* Cleva, 2009) (*Eremaeozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rogerzetes lacouturieri* Fernández, Theron *et* Cleva, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rogerzetes samueli* Colloff, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Rogerzetes spathulatus* (Balogh, 1968) (*Eremaeozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

Seteremaeozetes P. Balogh, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Eremaeozetes (Seteremaeozetes) obtectus* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Seteremaeozetes obtectus* (P. Balogh, 1988) (*Eremaeozetes (S.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Microzetoidea Grandjean, 1936

Microzetidae Grandjean, 1936 (46 gen., 5 subgen., 207 spp. y 5 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Acanthozetes Balogh, 1958 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Acanthozetes platypterus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Acanthozetes platypterus* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Congo.

Acaroceras Grandjean, 1936 (22 spp.)
ESPECIE TIPO: *Acaroceras odontotus* Grandjean, 1936
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Etiópica).

Acaroceras (Acaroceras) Grandjean, 1936 (20 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Etiópica).
- *Acaroceras (A.) aegypticus* Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid *et* Khalil, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Acaroceras (A.) becki* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Acaroceras (A.) brasiliensis* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Acaroceras (A.) cavernosus* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Acaroceras (A.) dechambrieri* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acaroceras (A.) feideri* Călugăr *et* Vasiliu, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Acaroceras (A.) furcatus* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina).
- *Acaroceras (A.) galapagoensis* Schatz *et* Palacios-Vargas, 1999
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Acaroceras (A.) hamifer* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).
- *Acaroceras (A.) index* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Acaroceras (A.) interiunctus* Schatz *et* Palacios-Vargas, 1999
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Acaroceras (A.) oaxacanus* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Acaroceras (A.) odontotus* Grandjean, 1936
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Acaroceras (A.) porosus* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Acaroceras (A.) pseudofurcatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).
- *Acaroceras (A.) pugio* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acaroceras (A.) schalleri* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Acaroceras (A.) similis* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico).
- *Acaroceras (A.) szerediae* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Acaroceras (A.) taurus* Schatz *et* Palacios-Vargas, 1999
  DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.

Acaroceras (Malgoceras) Mahunka, 1993 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Acaroceras (Malgoceras) helleri* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Acaroceras (Malgoceras) helleri* Mahunka, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Acaroceras (Trichacaroceras) Mahunka, 1991 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Acaroceras (Trichacaroceras) africanus* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Acaroceras (Trichacaroceras) africanus* Mahunka, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).

Afrozetes Engelbrecht, 1972 (3 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Afrozetes magoebaensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Afrozetes champaignensis* Engelbrecht, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Afrozetes magoebaensis Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afrozetes magoebaensis magoebaensis* Engelbrecht, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afrozetes magoebaensis capensis* Engelbrecht, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Afrozetes natalensis* Engelbrecht, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Amiracarus Miko, 2013 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Miracarus senensis* Bernini, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Amiracarus discrepans* (Mahunka, 1966) (*Miracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Amiracarus grootaerti* (Wauthy *et* Ducarme, 2011) (*Miracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Bélgica.
- *Amiracarus senensis* (Bernini, 1975) (*Miracarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Amiracarus similis* (Subías *et* Iturrondobeitia, 1978) (*Miracarus*)
  (=*Miracarus abeloosi* Lions, 1979)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Anakingia Hammer, 1961 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Anakingia williamsae* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).
- *Anakingia borneensis* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Anakingia reticulata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Anakingia williamsae* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Perú.

Arenozetes Krivolutsky, 1971 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Arenozetes christovi* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Arenozetes christovi* Krivolutsky, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centroocidental).

Baloghoizetes Mahunka, 2003 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Baloghoizetes pluritrichosus* Mahunka, 2003
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Baloghoizetes pluritrichosus* Mahunka, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Berlesezetes Mahunka, 1980 (17 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: (*Microzetes auxiliaris* Grandjean, 1936) =*Microzetes ornatissimus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Berlesezetes aegypticus* (Bayoumi, 1977) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Egipto e Irán.
- *Berlesezetes alces* (Piffl, 1961) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Berlesezetes arenarius* (Krivolutsky, 1966) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centroocidental.
- *Berlesezetes baloghi* Bose, Dogra, Singh *et* Jain, 1998
  DISTRIBUCIÓN: India (Haryana).
- *Berlesezetes brazilozetoides* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical, India (Kerala) e Irán.
- *Berlesezetes brevis* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica: I. Seychelles, y Neotropical: Guyana [Guayana Británica].
- *Berlesezetes cuspidatus* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Berlesezetes foveolatus* Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid *et* Khalil, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Berlesezetes glaber* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Berlesezetes grandjeani* (Mahunka, 1977) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Berlesezetes kingi* Bayoumi *et* Al-Khalifa, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Berlesezetes longistriatus* (Sarkar, 1992) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Berlesezetes monoramai* (Sarkar, 1992) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Berlesezetes natalensis* (Engelbrecht, 1972) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Berlesezetes ornatissimus (Berlese, 1913) (*Microzetes*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Berlesezetes ornatissimus ornatissimus* (Berlese, 1913)
  (=*Microzetes africanus* Balogh, 1958)
  (=*Microzetes auxiliaris* Grandjean, 1936)
  (=*Microzetes auxiliaris pachyseta* Hammer, 1971)
  DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (frecuente).
- *Berlesezetes ornatissimus appalachicola* (Jacot, 1938) (*Microzetes auxiliaris a.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental e India (Bengala Occidental).
- *Berlesezetes ornatissimus mirus* (Mihelčič, 1956) (*Microzetes m.*)
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Berlesezetes ornatissimus orkneyensis* (Engelbrecht, 1972) (*Microzetes auxiliaris o.*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica: I. Orcadas del Sur (I. Orkney).

- *Berlesezetes peruensis* (Hammer, 1961) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Bengala Occidental).
- *Berlesezetes rudrasagarensis* (Sarkar, 1992) (*Microzetes*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Brazilozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brazilozetes flagellatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Brazilozetes flagellatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).

- *Brazilozetes fusiger* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Brazilozetes phaseolus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Paraguay).

Calozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Calozetes monticola* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Calozetes monticola* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Caucasiozetes Shtanchaeva, 1984 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Caucasiozetes lamellatus* Shtanchaeva, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.
- *Caucasiozetes frankeae* Ermilov *et* Anichkin, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Caucasiozetes lamellatus* Shtanchaeva, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Cavernozetes Mahunka, 1984 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cavernozetes excavatus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Cavernozetes excavatus* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Cavernozetes interruptus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Cavernozetes latus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Christovizetes Krivolutsky, 1975 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Christovizetes ovatus* Krivolutsky, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Christovizetes iranensis* Akrami *et* Behmanesh, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Christovizetes ovatus* Krivolutsky, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Asia centroocidental.
- *Christovizetes prasadi* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Comorozetes Mahunka, 1994 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Comorozetes atavisticus* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Comorozetes atavisticus* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Comorozetes concurvatus* Mahunka, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Comorozetes corrugatus* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Cosmozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (16 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmozetes striatissimus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

Cosmozetes (Cosmozetes) Balogh *et* Mahunka, 1969 (10 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cosmozetes (C.) cubanus* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Cosmozetes (C.) damjanovichi* Mahunka, 2005
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Cosmozetes (C.) ecuadoriensis* P. Balogh, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Cosmozetes (C.) instans* Mahunka, 2005
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Cosmozetes (C.) jaccoudi* Mahunka, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Cosmozetes (C.) negroi* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Cosmozetes (C.) rohri* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Pequeñas Antillas).
- *Cosmozetes (C.) simplisetosus* Mahunka, 2005
  DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Cosmozetes (C.) striatissimus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Cosmozetes (C.) vermiculatus* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Rhopalozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Ecuador).

Cosmozetes (Magoebazetes) Engelbrecht, 1973 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Magoebazetes magoebaensis* Engelbrecht, 1973
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Cosmozetes (Magoebazetes) cornutus* (Mahunka, 1999) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Cosmozetes (Magoebazetes) engelbrechti* (Mahunka, 1985) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Cosmozetes (Magoebazetes) magoebaensis* (Engelbrecht, 1973) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Cosmozetes (Magoebazetes) natalensis* (Engelbrecht, 1973) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Cosmozetes (Magoebazetes) pentasetarum* (Engelbrecht, 1973) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Cosmozetes (Magoebazetes) reticulatus* (Balogh, 1962) (*Rhopalozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.

Cuspitegula Hammer, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cuspitegula stellifer* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Cuspitegula stellifer* Hammer, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Dinozetes Balogh, 1962 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dinozetes mirabilis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Dinozetes latissimus* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Dinozetes mirabilis* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Perú.

Fusozetes Balogh, 1972 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Rhopalozetes fusiger* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Fusozetes fusiger* (Balogh, 1962) (*Rhopalozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.

Hauserozetes Mahunka, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Hauserozetes mausiae* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hauserozetes mausiae* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

Hymenozetes Balogh, 1964 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hymenozetes mirabilis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hymenozetes csuzdii* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hymenozetes mirabilis* Balogh, 1964
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hymenozetes quadricornutus* Mahunka, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hymenozetes reticulatus* Mahunka, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hymenozetes stellifer* Mahunka, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hymenozetes verticillatus* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Kalyptrazetes Balogh, 1972 (6 spp.)
(=***Allozetes*** Higgins, 1965, *nom. praeoc.* por Berlese, 1913)
ESPECIE TIPO: *Allozetes harpezus* Higgins, 1965
DISTRIBUCIÓN: Neártica meridional, Neotropical y Oriental.
- *Kalyptrazetes americanus* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).
- *Kalyptrazetes bifurcatus* Ermilov, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Kalyptrazetes desaussurei* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Kalyptrazetes harpezus* (Higgins, 1965) (*Allozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Kalyptrazetes kbayan* Ermilov, 2021
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Kalyptrazetes lupitae* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico e I. Galápagos).

Kaszabozetes Mahunka, 1988 (2 spp.)

(=***Sinozetes*** Mahunka, 2000)
ESPECIE TIPO: *Kaszabozetes velatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Kaszabozetes botulus* (Mahunka, 2000) (*Sinozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Kaszabozetes velatus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Licnozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Licnozetes flabellatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Licnozetes (Licnozetes) Balogh *et* Mahunka, 1969 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Licnozetes (L.) flabellatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Licnozetes (L.) multiareolatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Licnozetes (Undulozetes) Balogh *et* Mahunka, 1969 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Undulozetes granulatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Licnozetes (Undulozetes) granulatus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*U.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Licnozetes (Undulozetes) margaritatus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*U.*)
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Licnozetes (Undulozetes) topali* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Rhopalozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Microzetes Berlese, 1913 (32 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes (Tectoribates) mirandus* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y tropical (excepto Australiana).

Microzetes (Microzetes) Berlese, 1913 (23 spp.)
(=***Nellacaroides*** Mahunka, 1998)
(=***Nellacarus*** Grandjean, 1936)
(=***Teraja*** Mahunka, 1995)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Paleotropical.
- *Microzetes (M.) adansoni* (Lions, 1966) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Microzetes (M.) asiaticus* (Krivolutsky, 1975) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (España, Ucrania, y Asia centrooccidental).
- *Microzetes (M.) asymmetricus* (Mahunka, 2001) (*Teraja*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Microzetes (M.) baloghi* (Jeleva, 1962) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional e Irán.
- *Microzetes (M.) castrii* (Mahunka, 1966) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Microzetes (M.) caucasicus* (Krivolutsky, 1967) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Microzetes (M.) costulatus* (Travé, 1956) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Microzetes (M.) hellenicus* (Mahunka, 1977) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Microzetes (M.) lunaris* (Aoki, 1984) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Microzetes (M.) mirandus* (Berlese, 1908) (*Sphaerozetes (Tectoribates)*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Microzetes (M.) petrocoriensis* (Grandjean, 1936) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Microzetes (M.) phitosi* (Mahunka, 1979) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (Grecia y España).
- *Microzetes (M.) pyrenaicus* (Travé, 1956) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Microzetes (M.) raczi* Mahunka, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Microzetes (M.) rugosus* (Mahunka, 1986) (*Megazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microzetes (M.) samarensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Microzetes (M.) septentrionalis* (Kunst, 1963) (*Nellacarus*)
  (=*Nellacarus latens* Moritz, 1964)
  DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Microzetes (M.) sestai* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Microzetes (M.) simplisetus* (Mahunka, 1998) (*Nellacaroides*)

DISTRIBUCIÓN: Uganda y Marruecos.
- *Microzetes (M.) singaporensis* Subías, 2017
(=*Microzetes flagellifer* Mahunka, 1989, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Microzetes (M.) sungai* Mahunka, 1997 (*Teraja*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Microzetes (M.) tuberculatus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Microzetes (M.) viedmai* Subías, Ruiz *et* Kahwash, 1990
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Microzetes (Megazetes) Balogh, 1959 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Megazetes micropterus* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Microzetes (Megazetes) eckeri* (Mahunka, 1982) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Microzetes (Megazetes) fimbriatus* Mahunka, 1988 (*Micr.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Microzetes (Megazetes) flagellifer* (Mahunka, 1988) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microzetes (Megazetes) lineatus* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2010) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Microzetes (Megazetes) micropterus* (Balogh, 1959) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Microzetes (Megazetes) pocsi* (Mahunka, 1998) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Microzetes (Megazetes) scriptus* (Mahunka, 1988) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microzetes (Megazetes) tanzicus* (Mahunka, 1983) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microzetes (Megazetes) wongi* (Mahunka, 1995) (*Teraja*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Mirabilozetes Mahunka, 1977 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Mirabilozetes dentatus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Mirabilozetes dentatus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Miracarus Kunst, 1959 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Miracarus hurkai* Kunst, 1959
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Miracarus hurkai* Kunst, 1959
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (excepto Oeste).
- *Miracarus longisetosus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.

Mystacozetes Balogh, 1962 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mystacozetes ornatus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mystacozetes nervosus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Acaroceras*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mystacozetes ornatus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.

Mysterozetes Hammer, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Mysterozetes scapulatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mysterozetes scapulatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.

Orthozetes Balogh, 1962 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Orthozetes dispar* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).
- *Orthozetes bidentatus* Ermilov, Sandmann *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Orthozetes depilatus* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Orthozetes dispar* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú e India (Maharastra).
- *Orthozetes papuanus* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Oxyzetes Balogh, 1958 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oxyzetes pectiniger* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Oxyzetes pectiniger* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Papuazetes Balogh, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Papuazetes insignis* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Papuazetes insignis* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Phylacozetes Grandjean, 1936 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Phylacozetes membranulifer* Grandjean, 1936
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Phylacozetes ensifer* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Phylacozetes membranulifer* Grandjean, 1936
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Méjico).
- *Phylacozetes quadridentatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Physozetes Mahunka, 2008 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Physozetes inflatus* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Physozetes inflatus* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Plumozetes Balogh, 1972 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Rhopalozetes plumifer* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Plumozetes plumifer* (Balogh *et* Mahunka, 1968) (*Rhopalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).

Protozetes Balogh, 1962 (4 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Protozetes capitulum* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Protozetes capitulum* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Protozetes clavatus* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996
DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Protozetes digitifer Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
  - *Protozetes digitifer digitifer* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
  - *Protozetes digitifer alticola* P. Balogh, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Protozetes longicornis* P. Balogh, 1989
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Rhabdozetes Hammer, 1962 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Rhabdozetes pennatus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rhabdozetes pennatus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Rhopalozetes Balogh, 1964 (12 spp.)
(=***Austrozetes*** Balogh *et* Mahunka, 1969)
ESPECIE TIPO: *Rhopalozetes milloti* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Rhopalozetes bisculpturatus* Mahunka, 2005
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Rhopalozetes brazilianus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Austrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Paraguay).
- *Rhopalozetes canagaratnami* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Rhopalozetes capensis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Rhopalozetes filiferus* Mahunka, 2005
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Rhopalozetes georgensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Rhopalozetes lokobensis* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rhopalozetes madecassus* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rhopalozetes maximus* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994) (*Austrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhopalozetes milloti* Balogh, 1964

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rhopalozetes panabokkei* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Rhopalozetes witfonteinensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Rugozetes Balogh, 1960 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Microzetes grandjeani* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Rugozetes gladiator* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rugozetes grandjeani* (Balogh, 1959) (*Microzetes*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Schalleria Balogh, 1962 (14 spp.)
ESPECIE TIPO: *Schalleria sexcornuta* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Schalleria bacillifera* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Schalleria brevisetosa* Ermilov, Sandmann *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Schalleria cruciata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Brasil).
- *Schalleria csuzdii* Mahunka, 2005
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Schalleria forceps* Balogh *et* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Schalleria incurvata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Schalleria latilamellata* Balogh *et* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Schalleria martii* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Schalleria mexicana* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Schalleria monoceros* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Schalleria pectinata* Ermilov, Sandmann *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Schalleria ramosa* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Schalleria sexcornuta* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Schalleria trifurcata* Balogh *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Schalleriella Engelbrecht, 1972 (4 spp.)
(=***Mahunkaceras*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
(=***Megazetes*** Mahunka, 1993, *nom. praeoc.* por Balogh, 1959)
ESPECIE TIPO: *Schalleriella gravouwensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Schalleriella gravouwensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Schalleriella nosybe* (Mahunka, 1993) (*Megazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Schalleriella phaseola* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Schalleriella vietnamica* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Schizozetes Balogh, 1962 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Schizozetes quadrilineatus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Schizozetes quadrilineatus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (India: Tripura).
- *Schizozetes similis* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Sturmozetes Balogh *et* P. Balogh, 1992 (2 spp.)
(=***Gymnozetes*** P. Balogh, 1984, *nom. praeoc.* por Călugăr *et* Vasiliu, 1983)
ESPECIE TIPO: *Gymnozetes marginatus* P. Balogh, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Sturmozetes longisetus* (P. Balogh, 1989) (*Gymnozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Sturmozetes marginatus* (P. Balogh, 1984) (*Gymnozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia.

Stylozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Stylozetes physoseta* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Stylozetes discrepans* (Balogh, 1962) (*Nellacarus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico).
- *Stylozetes physoseta* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Stylozetes processus* Balogh *et* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Stylozetes spinosus* Balogh *et* Mahunka, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Paraguay.

Szentivanyella Balogh *et* Mahunka, 1969 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Szentivanyella latilamellata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Szentivanyella africana* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Szentivanyella latilamellata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN. Bolivia.
- *Szentivanyella szentivanyi* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Java.

Trichozetes Balogh *et* Mahunka, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trichozetes neotrichus* Balogh *et* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Trichozetes neotrichus* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Vermacarus Balogh *et* Mahunka, 1980 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Vermacarus longissimus* Balogh *et* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Vermacarus armatus* Mahunka, 1997
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Vermacarus longissimus* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Achipterioidea Thor, 1929

Achipteriidae Thor, 1929 (9 gen., 4 subgen., 108 spp. y 5 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Achipteria Berlese, 1885 (32 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: (*Oribata nicoleti* Berlesle, 1883) =*Acarus coleoptratus* Linnaeus, 1758
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Paleotropical).

Achipteria (Achipteria) Berlese, 1885 (29 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Paleotropical).
- *Achipteria (A.) acuta* Berlese, 1908
  (=*Notaspis anglicus* Oudemans, 1914)
  (=*Notaspis mixtus* Sellnick, 1943)
  (=*Oribata nitens* Nicolet, 1855, *nom. praeoc.* por Gervais, 1844)
  (=*Oribata nitens* L. Koch, 1879, *nom. praeoc.* por Gervais, 1844)
  (=*Achipteria nitens* Kishida, 1930)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).
- *Achipteria (A.) armata* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
  - *Achipteria (A.) armata armata* (Banks, 1895)
    DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
  - *Achipteria (A.) armata spinosa* Jacot, 1938 *ssp. inq.*
    DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Achipteria (A.) baleensis* Ermilov, Rybalov *et* Kemal, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Achipteria (A.) bentonensis* Marshall, Reeves *et* Norton, 1987
  (=*Achipteria oregonensis borealis* Ewing, 1918, *nom. praeoc.* por Banks, 1898)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Achipteria (A.) bicarinata* Moskacheva, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Bielorrusia.
- *Achipteria (A.) borealis* (Banks, 1898) (*Oribatella*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Achipteria (A.) catskillensis* Nevin, 1977
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Achipteria (A.) clarencei* Nevin, 1977
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Achipteria (A.) coleoptrata* (Linnaeus, 1758) (*Acarus*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional), Oriental (India: Sikkim, y Vietnam) y Etiópica (I. Santa Helena y Sudáfrica).

- *Achipteria (A.) coleoptrata coleoptrata* (Linnaeus, 1758)
(=*Oribata intermedia* Michael, 1898)
(=*Oribata nicoleti* Berlese, 1883)
(=*Oribata ovalis* Nicolet, 1855, *nom. praeoc.* por Koch, 1835)
(=*Oribata redux* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional), Oriental (India: Sikkim, y Vietnam) e I. Santa Helena.
- *Achipteria (A.) coleoptrata major* Mihelčič, 1963 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Achipteria (A.) cucullata* Moskacheva, 1973
DISTRIBUCIÓN: Bielorrusia.
- *Achipteria (A.) curta* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Neártica septentrional) y Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Achipteria (A.) elegans* Schweizer, 1956 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Achipteria (A.) gigantea* Seniczak *et* A. Seniczak, 2016
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Achipteria (A.) hasticeps* (Hull, 1914) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Achipteria (A.) holomonensis* Cancela da Fonseca *et* Stamou, 1987
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Achipteria (A.) italica* (Oudemans, 1914) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Achipteria (A.) languida* (Nicolet, 1855) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Achipteria (A.) longesensillus* Schweizer, 1956 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Achipteria (A.) longisetosa* Weigmann *et* Murvanidze, 2003
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Achipteria (A.) moderatior* Berlese, 1923 (*A. nitens m.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Achipteria (A.) oregonensis* Ewing, 1918
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Achipteria (A.) oudemansi* Jacot, 1929 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Achipteria (A.) praeoccupata* Subías, 2004
(=*Achipteria oudemansi* Hammen, 1952, *nom. praeoc.* por Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Achipteria (A.) quadridentata* (Willmann, 1951) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Achipteria (A.) regalis* Berlese, 1908 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Achipteria (A.) sellnicki* Hammen, 1952
DISTRIBUCIÓN: Europea y Mongolia.
- *Achipteria (A.) serrata* Hirauchi *et* Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Achipteria (A.) sumatrensis* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Achipteria (A.) verrucosa* Rjabinin, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

Achipteria (Izuachipteria) Balogh *et* Mahunka, 1979 (3 spp.)
(=***Hokkachipteria*** Balogh *et* Mahunka, 1979)
ESPECIE TIPO: *Achipteria imperfecta* Suzuki, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y Oriental.
- *Achipteria (Izuachipteria) alpestris* (Aoki, 1973) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Achipteria (Izuachipteria) imperfecta* (Suzuki, 1972) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Achipteria (Izuachipteria) setulosa* Golosova, 1981 (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Anachipteria Grandjean, 1932 (16 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Anachipteria deficiens* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Anachipteria (Anachipteria) Grandjean, 1932 (13 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
Anachipteria (A.) achipteroides (Ewing, 1913) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. y Japón).
- *Anachipteria (A.) achipteroides achipteroides* (Ewing, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. septentrional y Japón).
- *Anachipteria (A.) achipteroides australoides* Jacot, 1938 *ssp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Anachipteria (A.) acuta* (Ewing, 1918) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica noroccidental.
- *Anachipteria (A.) aegyptiaca* Abd-el-Hamid, 1964
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Anachipteria (A.) deficiens* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Anachipteria (A.) grandis* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental) y Nepal.
- *Anachipteria (A.) howardi* (Berlese, 1908) (*Sphaerozetes*)
(=*Anachipteria achipteroides milleri* Jacot, 1936)
(=*Oribata corpuscula* Ewing, 1908)
(=*Sphaerozetes latitectus* Berlese, 1908)
(=*Oribata major* Mihelčič, 1956)
(=*Oribata perisi* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa, Asia centrooccidental y Neártica).
- *Anachipteria (A.) magnilamellata* (Ewing, 1909) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica centrooriental.
- *Anachipteria (A.) major* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*
(no *Oribata major* Mihelčič, 1956, =*Anachipteria howardi*)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Anachipteria (A.) pratensis* Scull, Jeleva *et* Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Anachipteria (A.) shtanchaevae* Subías, 2009
(=*Oribata tecta alpina* Schweizer, 1922, *nom. praeoc.* por Halbert, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Anachipteria (A.) signata* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
(=*Oribatella achipteroides australis* Ewing, 1917)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Anachipteria (A.) svetlanae* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Anachipteria (A.) valida* (Banks, 1910) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).

Anachipteria (Hoffmanacarus) Mahunka, 1995 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Hoffmanacarus virginianus* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Anachipteria (Hoffmanacarus) virginiana* (Mahunka, 1995) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).

Anachipteria (Weigmanniella) Subías, 2010 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Anachipteria dubia* Weigmann, 2001
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Anachipteria (Weigmanniella) dubia* Weigmann, 2001 (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Anachipteria (Weigmanniella) sacculifera* Root, Kawahara *et* Norton, 2007 (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).

Austrachipteria Balogh *et* Mahunka, 1966 (14 spp.)
(=***Parahypozetes*** Hammer, 1967)
ESPECIE TIPO: *Austrachipteria lamellata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.
- *Austrachipteria bidactyla* (Balogh *et* P. Balogh, 1983) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrachipteria bidentata* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria breviseta* (Balogh *et* P. Balogh, 1983) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrachipteria gigantea* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria grandis* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Bengala Occidental).
- *Austrachipteria hammerae* Balogh *et* P. Balogh, 1992
(=*Parahypozetes hammerae* Mahunka, 1997, *nom. praeoc.* por Balogh *et* P. Balogh, 1992)
(=*Parahypozetes lobatus* Balogh *et* P. Balogh, 1983, *nom. praeoc.* por Hammer, 1967)
(=*Austrachipteria marieae* Colloff *et* Halliday, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrachipteria lamellata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrachipteria lobata* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria macrodentata* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria maxima* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria novazealandica* Ermilov *et* Minor, 2015

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria phongnhae* Ermilov *et* Vũ, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Austrachipteria pulla* Aoki *et* Honda, 1985
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Austrachipteria quadridentata* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Campachipteria Aoki, 1995 (23 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Campachipteria uenoi* Aoki, 1995
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Campachipteria (Campachipteria) Aoki, 1995 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Campachipteria uenoi* Aoki, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Neotropical.
- *Campachipteria (C.) brevisetosa* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Campachipteria (C.) lushuiensis* Ren, Yang, Tang *et* Liang, 2019
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Campachipteria (C.) uenoi* Aoki, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).

Campachipteria (Triachipteria) Subías, 2017 (20 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Parachipteria petiti* Travé, 1960
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Campachipteria (Triachipteria) barguzini* (Golosova *et* Karppinen, 1984) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Campachipteria (Triachipteria) bella* (Sellnick, 1928) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
Campachipteria (Triachipteria) distincta (Aoki, 1959) (*Achipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Oriental.
  - *Campachipteria (Triachipteria) distincta distincta* (Aoki, 1959)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Oriental (China suroriental y Vietnam).
  - *Campachipteria (Triachipteria) distincta incurva* (Aoki, 1991) (*Parachipteria*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Campachipteria (Triachipteria) ewingi* (Berlese, 1910) (*Achiperia nicoleti e.*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Campachipteria (Triachipteria) fanzagoi* (Jacot, 1929) (*Achipteria*)
(=*Parachipteria willmanni* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia) y Norte de Neotropical.
- *Campachipteria (Triachipteria) heintoogensis* (Nevin, 1979) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Campachipteria (Triachipteria) hummelincki* Ermilov, 2016 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Campachipteria (Triachipteria) ludingensis* Ren, Yang, Tang *et* Liang, 2019
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Campachipteria (Triachipteria) neotropicalis* (Mahunka, 1983) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Campachipteria (Triachipteria) nivalis* (Hammer, 1952) (*Achipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa oriental, Paleártica oriental y Neártica septentrional).
- *Campachipteria (Triachipteria) patavina* (Oudemans, 1914) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europea: menos frecuente en el Norte, y Rusia asiática).
- *Campachipteria (Triachipteria) perproxima* (Sellnick, 1931) (*Notaspis*)
(=*Parachipteria georgica* Murvanidze *et* Weigmann, 2003)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Campachipteria (Triachipteria) petiti* (Travé, 1960) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Campachipteria (Triachipteria) savagei* (Nevin, 1976) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Campachipteria (Triachipteria) sgardelisi* (Seniczak *et* A. Seniczak, 2017) (*Achipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Campachipteria (Triachipteria) sibirica* (Krivolutsky *et* Grishina, 1970) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Rusia asiática.
- *Campachipteria (Triachipteria) snowdonensis* (Colloff *et* Seyd, 1987) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Campachipteria (Triachipteria) travei* (Nevin, 1977) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Campachipteria (Triachipteria) truncata* (Aoki, 1976) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Campachipteria (Triachipteria) weigmanni* (Pérez-Íñigo, 1987) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

Cerachipteria Grandjean, 1935 (5 spp. y 1 ssp.)
(=***Zygachipteria*** Mihelčič, 1956)
ESPECIE TIPO: *Cerachipteria digita* Grandjean, 1935
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Cerachipteria digita Grandjean, 1935
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Cerachipteria digita digita* Grandjean, 1935
(=*Cerachipteria fusiger* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Cerachipteria digita jugata* Mihelčič, 1956 (*C. (Zygachipteria) j.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cerachipteria franzi* Willmann, 1953
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Cerachipteria iturrondobeitiai* A. *et* S. Seniczak, 2017
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cerachipteria minuscula* (Berlese, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Cerachipteria pyrenaica* Pérez-Íñigo jr., 1991 (*C. digita p.*)
DISTRIBUCIÓN: España.

Cubachipteria Balogh *et* Mahunka, 1979 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Achipteria (Cubachipteria) remota* Balogh *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.
- *Cubachipteria bispina* (Călugăr, 1990) (*Achipteria (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Cubachipteria clavata* Ren, Yang, Liang *et* Q. Zheng, 2019
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Cubachipteria gaoligongensis* Tang, Yang *et* Liang, 2015
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Cubachipteria maxsellnicki* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Cubachipteria mayariana* (Palacios-Vargas *et* Socarrás, 2001) (*Achipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Cubachipteria pianmaensis* Tang, Yang *et* Liang, 2015
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Cubachipteria remota* (Balogh *et* Mahunka, 1979) (*Achipteria (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Dentachipteria Nevin, 1974 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dentachipteria ringwoodensis* Nevin, 1974
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Oriental.
- *Dentachipteria highlandensis* Nevin, 1974
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Dentachipteria ringwoodensis* Nevin, 1974
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Dentachipteria sidorchukae* Ren, Yang, Liang *et* Q. Zheng, 2019
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Parachipteria Hammen, 1952 (7 spp.)
(=***Pseudachipteria*** Travé, 1960)
ESPECIE TIPO: *Oribata punctata* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.
- *Parachipteria agenjoi* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Pseudachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Parachipteria floresiana* (Pérez-Íñigo, 1992) (*Pseudachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Parachipteria insularis* (Pérez-Íñigo, 1992) (*Pseudachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Parachipteria magna* (Sellnick, 1928) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Parachipteria orientalis* (Mondal *et* Kundu, 1999) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Parachipteria ovalis* (Koch, 1835) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Parachipteria punctata* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) e I. Santa Helena.

Separachipteria Subías, 2019 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Anachipteria geminus* Lindo, Clayton *et* Behan-Pelletier, 2008
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Separachipteria geminus* (Lindo, Clayton *et* Behan-Pelletier, 2008) (*Anachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica noroccidental.

Tegoribatidae Grandjean, 1954 (11 gen., 36 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Lemurobates Mahunka, 1997 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Lemurobates antsiranana* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Lemurobates antsiranana* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Neophysobates Luxton, 1987 (5 spp.)
(=***Paraphysobates*** Luxton, 1985, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1985)
(=***Pseudophysobates*** Fujikawa, 1991)
ESPECIE TIPO: *Physobates monodactylus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Neotropical).
- *Neophysobates incrassatus* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neophysobates monodactylus* (Hammer, 1966) (*Physobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neophysobates montanus* (Engelbrecht, 1986) (*Tegoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Neophysobates nudus* (Engelbrecht, 1986) (*Tegoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Neophysobates zealandicus* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Paraphysobates Mahunka, 1985 (2 spp.)
(=***Monophysobates*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
ESPECIE TIPO: *Paraphysobates abditus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Paraphysobates abditus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paraphysobates natalensis* (Engelbrecht, 1986) (*Tegoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Physobates Hammer, 1962 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Physobates spinipes* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Physobates spinipes* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Plakoribates Popp, 1960 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Plakoribates multicuspidatus* Popp, 1960
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Plakoribates africanus* (Balogh, 1959) (*Tectoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Plakoribates asiaticus* Ermilov *et* Anichkin, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Plakoribates confluens* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Plakoribates multicuspidatus* Popp, 1960
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Plakoribates neotropicus* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Bolivia y Vietnam.
- *Plakoribates scutatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

Protectoribates Behan-Pelletier, 2017 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Protectoribates occidentalis* Behan-Pelletier, 2017
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Protectoribates occidentalis* Behan-Pelletier, 2017
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

Pseudotectoribates Subías, 1977 (2 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: (*Pseudotectoribates bellus* Subías, 1977) =*Anachipteria subsimilis* Mihelčič, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.
- *Pseudotectoribates minidentatus* Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
Pseudotectoribates subsimilis (Mihelčič, 1956) (*Anachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Pseudotectoribates subsimilis subsimilis* (Mihelčič, 1956)
(=*Pseudotectoribates bellus* Subías, 1977)
(=*Anachipteria kittenbergeri* Balogh, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán) y Etiópica (Tanzania y Sudáfrica).
- *Pseudotectoribates subsimilis striatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008 (*P. kittenbergeri s.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Scutozetes Hammer, 1952 (3 spp.)
(=***Neolepidozetes*** Hammer, 1977)
ESPECIE TIPO: *Scutozetes lanceolatus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Scutozetes clavatosensillus* Ermilov, Martens *et* Tolstikov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Scutozetes lanceolatus* Hammer, 1952

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional: frecuente, Paleártica occidental: Mediterránea oriental, y Paleártica oriental: frecuente) y Surinám.
- *Scutozetes ovalis* (Hammer, 1977) (*Neolepidozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Paquistán y Corea).

Tectoribates Berlese, 1910 (9 spp.)
(=***Anoribatella*** Kunst, 1962)
ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes (Tectoribates) proximus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Tectoribates alcecampestris* Behan-Pelletier *et* Walter, 2013
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Tectoribates borealis* Behan-Pelletier *et* Walter, 2013
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Tectoribates campestris* Behan-Pelletier *et* Walter, 2013
DISTRIBUCIÓN: Holárica: Neártica (Este de Canadá y U.S.A.: Kansas) y Paleártica: Irán.
- *Tectoribates deserticola* (Balogh *et* Mahunka, 1965) (*Anoribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Tectoribates mahunkai* (Aoki, 1974) (*Anachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y China suroriental.
- *Tectoribates mongolicus* Bayartogtokh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Tectoribates ornatus* (Schuster, 1958) (*Anachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical (Argentina y Uruguay).
- *Tectoribates proximus* (Berlese, 1910) (*Spaerozetes (T.)*)
(=*Tectoribates punctatus* Sellnick, 1943)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Tectoribates shekarii* Ahaniazad *et* Akarami, 2018
DISTRIBUCIÓN: Irán.

Tegoribates Ewing, 1917 (5 spp.)
(=***Lepidoribates*** Sellnick, 1920)
ESPECIE TIPO: *Tegoribates subniger* Ewing, 1917
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Oriental.
- *Tegoribates americanus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional: frecuente, y Este de Rusia asiática), Argentina y Vietnam.
- *Tegoribates bryophilus* Woolley, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Tegoribates latirostris* (Koch, 1844) (*Zetes*)
(=*Oribata alzanii* Coggi, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur).
- *Tegoribates subniger* Ewing, 1917
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Indiana).
- *Tegoribates walteri* Behan-Pelletier, 2017
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).

Williamszetes Hammer, 1961 (1 sp.)
(=***Williamsia*** Hammer, 1958, *nom. praeoc.* por Carus, 1890)
ESPECIE TIPO: *Williamsia elsosneadensis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Williamszetes elsosneadensis* (Hammer, 1958) (*Williamsia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Epactozetidae Grandjean, 1930 (2 gen. y 8 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Epactozetes Grandjean, 1930 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Epactozetes imitator* Grandjean, 1930
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Epactozetes imitator* Grandjean, 1930
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Epactozetes setosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Truncozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Truncozetes mucronatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Truncozetes ecuadoriensis* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Ecuador y Perú).
- *Truncozetes monodactylus* Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Truncozetes mucronatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Truncozetes paraecuadoriensis* Ermilov, Alvarado-Rodríguez *et* Retana-Salazar, 2015
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Truncozetes rugosus* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- *Truncozetes sturmi* P. Balogh, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Oribatelloidea Jacot, 1925

Oribatellidae Jacot, 1925 (10 gen., 7 subgen., 172 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Cuspidozetes Hammer, 1962 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cuspidozetes armatus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cuspidozetes armatus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).

Ferolocella Grabowski, 1971 (2 spp.)
(=***Gendzella*** Kulijev, 1977)
ESPECIE TIPO: (*Oribatella carolina* Banks, 1947) =*Oribatella tessellata* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Ferolocella cribraria* (Kulijev, 1977) (*Gendzella*)
(=*Oribatella sitnikovae* Djaparidze, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ferolocella tessellata* (Berlese, 1908) (*Oribatella*)
(=*Oribatella carolina* Banks, 1947)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.

Joelia Oudemans, 1906 (5 spp.)
(=***Coggiella*** Berlese, 1916)
ESPECIE TIPO: *Oribata fiorii* Coggi, 1898
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Joelia americana* (Haller, 1884) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: "Neártica".
- *Joelia appalachia* Behan-Pelletier, 2013
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia Occidental).
- *Joelia dubia* (Kulijev, 1967) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Méjico.
- *Joelia fiorii* (Coggi, 1898) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Méjico.
- *Joelia spina* Kulijev, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Lamellobates Hammer, 1958 (14 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: (*Lamellobates palustris* Hammer, 1958) =*Achipteria molecula* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Lamellobates (Lamellobates) Hammer, 1958 (12 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Lamellobates (L.) argentinensis* (Fredes, 2017) (*Paralamellobates*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Lamellobates (L.) botari* Balogh *et* Mahunka, 1977
(=*Lamellobates gyoergyi* Balogh *et* Mahunka, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Lamellobates (L.) cuneatus* Mahunka, 2010
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lamellobates (L.) engelbrechti* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Lamellobates (L.) furcatus* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lamellobates (L.) intermedius* Nübel-Reidelbach *et* Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y España.

Lamellobates (L.) molecula (Berlese, 1916) (*Achipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Lamellobates (L.) molecula molecula* (Berlese, 1916)
(=*Lamellobates angolensis* Balogh, 1958)
(=*Lamellobates hauseri* Mahunka 1977)
(=*Lamellobates palustris* Hammer, 1958)
(=*Lamellobates rotundatus* Scull, Jeleva *et* Cruz, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Lamellobates (L.) molecula aegypticus* Bayoumi, 1979 (*L. hauseri a.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Lamellobates (L.) nitidus* Călugăr, 1987
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Lamellobates (L.) ocularis* Jeleva *et* Vũ, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Lamellobates (L.) orientalis* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y Paleártica meridional (Egipto y Japón).
- *Lamellobates (L.) quadricornis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1985

DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Lamellobates (L.) reticulatus* Behan-Pelletier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Lamellobates (Paralamellobates) Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1968 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lamellobates (Paralamellobates) bengalensis* Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Lamellobates (Paralamellobates) bengalensis* Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1968
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Lamellobates (Paralamellobates) misella* (Berlese, 1910) (*Oribatella*)
(=*Oribatella ceylanica* Oudemans, 1915)
(=*Oribatella schoutedeni* Balogh, 1959)
(=*Paralamellobates striatus* Behan-Pelletier, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: frecuente, y Paleártica meridional.

Novoribatella Engelbrecht, 1986 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tectoribates transcriptus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental.
- *Novoribatella minutisetarum* Engelbrecht, 1986
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.
- *Novoribatella pentasetarum* Engelbrecht, 1986
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Novoribatella transcripta* (Mahunka, 1985) (*Tectoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Ophidiotrichus Grandjean, 1953 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Oribata connexa* Berleser, 1904) =*Oribata tecta* Michael, 1884
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Ophidiotrichus corsicanus* Bernini *et* Avanzati, 1983
DISTRIBUCIÓN: Francia (Córcega).
- *Ophidiotrichus exastus* Higgins, 1965
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A..
- *Ophidiotrichus oglasae* Bernini, 1975
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ophidiotrichus tectus* (Michael, 1884) (*Oribata*)
(=*Notaspis borussicus* Sellnick, 1908)
(=*Oribata connexa* Berlese, 1904)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Ophidiotrichus ussuricus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental.
- *Ophidiotrichus vindobonensis* Piffl, 1961 (*O. connexus v.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

Oribatella Banks, 1895 (133 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribatella quadridentata* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Oribatella (Oribatella) Banks, 1895 (99 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Oribatella (O.) abdurachmanovi* Shtanchaeva, 2009
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribatella (O.) abhorrens* Weigmann, 2014
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Oribatella (O.) abmi* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Oribatella (O.) angulosa* Csiszár, 1962
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatella (O.) anomola* Grabowski, 1970
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Dakota del Sur).
- *Oribatella (O.) arabia* Kardar, 1988 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
Oribatella (O.) arctica Thor, 1930
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
  - *Oribatella (O.) arctica arctica* Thor, 1930
  DISTRIBUCIÓN: Boreal (Eurosiberiana y Neártica septentrional: frecuente).
  - *Oribatella (O.) arctica litoralis* Strenzke, 1950
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Euroatlántica y Este de Paleártica oriental).
- *Oribatella (O.) asiatica* Krivolutsky, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Oribatella (O.) avicula* P. Balogh, 1989
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Oribatella (O.) azizia* Kardar *et* Mattu, 1999 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Oribatella (O.) banksi* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) barbata* Choi, 1986

DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Oribatella (O.) berlesei* (Michael, 1898) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática) y Canadá.
- *Oribatella (O.) berninii* Pérez-Íñigo, 1989
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribatella (O.) blocki* Starý, 1995
DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Oribatella (O.) brevicornuta* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica oriental y Japón).
- *Oribatella (O.) brevicuspidata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Oribatella (O.) brevilamellata* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Oribatella (O.) byzovae* Krivolutsky, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Oribatella (O.) calcarata* (Koch, 1835) (*Oribata*)
(=*Oribatella decumana* Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica, Canadá y "U.S.A").
- *Oribatella (O.) canadensis* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2010
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Oribatella (O.) cespitum* (Koch, 1841) (*Zetes*) *sp. inq.*
(=*Zetes morticinus* Koch, 1841 *sp. inq.*: juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Oribatella (O.) ewingi* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) exilicornis* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) extensa* Jacot, 1934 (*O. brevicornuta e.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Oribatella (O.) flagellata* Behan-Pelletier, 2011
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Oribatella (O.) foliata* Krivolutsky, 1974
(=*Oribatella brevipila* Bernini, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Este de Rusia oriental).
- *Oribatella (O.)gerdweigmanni* Ermilov *et* Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribatella (O.) gigantea* Berlese, 1916 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Oribatella (O.) gomerae* Pérez-Íñigo, 1986
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) heatherae* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Oribatella (O.) ichnusae* Bernini *et* Avanzati, 1983
DISTRIBUCIÓN: Italia (Cerdeña).
- *Oribatella (O.) illuminata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile) y Vietnam.
- *Oribatella (O.) incurvata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Oribatella (O.) inflexa* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) jacoti* Behan-Pelletier, 2011
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Oribatella (O.) kashmiriensis* Kardar, 1975
DISTRIBUCIÓN: Cachemira.
- *Oribatella (O.) krivolutskyi* Karppinen *et* Shtanchaeva, 1987
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso e Irán.
- *Oribatella (O.) kunsti* Bernini, 1972
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (O.) linjiangensis* Gao *et* Wen, 1992
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Oribatella (O.) longispina* Berlese, 1914
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Oribatella (O.) luisae* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) madagascarensis* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribatella (O.) mahani* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) malaya* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Oribatella (O.) manningensis* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) maryae* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) mediocris* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.

- *Oribatella (O.) microfoveolata* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Oribatella (O.) minuta* Banks, 1896
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Mongolia.
- *Oribatella (O.) monospicus* Wharton, 1938
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Oribatella (O.) neonominata* Subías, 2004
(=*Oribatella longisetosa* Fernández *et* Alzuet, 1978, *nom. praeoc.* por Hammer, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico) e Irán.
- *Oribatella (O.) nigra* Kulijev, 1967
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatella (O.) nugarica* Bernini *et* Avanzati, 1983
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Oribatella (O.) oregonensis* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Oribatella (O.) orientalis* Choi *et* Aoki, 1993
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Oribatella (O.) palustris* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico), subantártica (I. Malvinas [I. Falkland]) e India (Himachal Pradesh).
- *Oribatella (O.) parallelus* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Oribatella (O.) paraumaetluisorum* Ermilov *et* Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Oribatella (O.) pavelklimovi* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribatella (O.) pawnee* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) phyllophora* Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Oribatella (O.) prolongata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Oribatella (O.) puertomonttensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Oribatella (O.) punctata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oribatella (O.) punctulata* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Oribatella (O.) pusilla* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Oribatella (O.) quadricornuta* (Michael, 1880) (*Oribata*)
(?=*Oribata flammula* Koch, 1839 *sp. inq.*)
(?=*Oribata quadricuspis* Grube, 1859 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente.
- *Oribatella (O.) quadridentata* Banks, 1895
(=*Oribatella magniseta* Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental y Europa: Rumanía).
- *Oribatella (O.) quadrispinata* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Argentina y Vietnam.
- *Oribatella (O.) reducta* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia y Península Malaya.
- *Oribatella (O.) reticulata* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional: Europa centromeridional, Paleártica oriental meridional y U.S.A. oriental.
- *Oribatella (O.) reticulatoides* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Boreal: Neártica septentrional y Noreste de Siberia.
- *Oribatella (O.) rossica* (Krivolutsky, 1974) (*Fenestrobates*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Cáucaso.
- *Oribatella (O.) rugosula* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Oribatella (O.) sardoa* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Oribatella (O.) sculpturata* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribatella (O.) serrata* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oribatella (O.) shaldybinae* Rjabinin, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Oribatella (O.) similesuperbula* Weigmann, 2001
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Oribatella (O.) similis* Fujikawa, 1990
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Oribatella (O.) sintranslamella* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) strinatii* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Oribatella (O.) szemesi* Mahunka, 2008

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Oribatella (O.) szunyoghyi* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Oribatella (O.) talpae* (Štorkán, 1923) (*Galumna*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Oribatella (O.) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1986
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) texana* Behan-Pelletier, 2011
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Oribatella (O.) transtriata* Behan-Pelletier, 2011
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neártica.
- *Oribatella (O.) triangulata* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribatella (O.) trichoptera* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oribatella (O.) tridactyla* Ruiz, Subías *et* Kahwash, 1991
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Oribatella (O.) tyrrhenica* Bernini, 1975
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (O.) umaetluisorum* Ermilov *et* Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribatella (O.) undulata* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Oribatella (O.) unispinata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia e India (Tripura).
- *Oribatella (O.) vicina* (Rjabinin, 1975) (*Fenestrobates*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Oribatella (O.) willmanni* Subías *et* Gil-Martín, 1995
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Oribatella (O.) yukonensis* Behan-Pelletier *et* Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Oribatella (O.) zsilavii* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Oribatella (Bioribatella) Subías, 2017 (4 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oribatella crassipilosa* Bernini, 1975
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Oribatella (Bioribatella) crassipilosa* Bernini, 1975 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (Bioribatella) dentaticuspis* Ewing, 1909 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Oribatella (Bioribatella) hungarica* Balogh, 1943 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Oribatella (Bioribatella) superbula (Berlese, 1904) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Norte de Oriental.
- *Oribatella (Bioribatella) superbula superbula* (Berlese, 1904)
(=*Oribatella meridionalis* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Paleártica oriental meridional) y Norte de Oriental.
- *Oribatella (Bioribatella) superbula longisetosa* Hammer, 1977 (*O. meridionalis l.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

Oribatella (Fberninia) Özdikmen, 2008 (1 sp.)
(=***Cavernella*** Bernini, 1975, *nom. praeoc.* por Morozova, 1975)
(=***Berniniella*** Özdikmen, 2008, *nom. praeoc.* por Balogh, 1983)
ESPECIE TIPO: *Cavernella helenae* Bernini, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Oribatella (Fberninia) helenae* (Bernini, 1975) (*Cavernella*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

Oribatella (Fenestrobates) Balogh *et* Mahunka, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Fenestrobates capucinus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oribatella (Fenestrobates) capucinus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).
- *Oribatella (Fenestrobates) marauni* (Ermilov *et* Behan-Pelletier, 2014) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Oribatella (Monoribatella) Subías, 2017 (21 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata ornata* Coggi, 1900
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Oribatella (Monoribatella) brevicuspidis* Bernini, 1972 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (Monoribatella) bulanovae* Kulijev, 1962 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Oribatella (Monoribatella) colchica* Krivolutsky, 1974 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatella (Monoribatella) dechambrieri* Mahunka, 1983 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Oribatella (Monoribatella) dudichi* Willmann, 1938 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Oribatella (Monoribatella) euthricha* Berlese, 1908 (*O.*)
(=*Oribatella producta quadrimucronata* Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Oribatella (Monoribatella) heterodentata* Karppinen *et* Shtanchaeva, 1987 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediteránea oriental.
- *Oribatella (Monoribatella) incisa* Dalenius, 1963 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Suecia.
- *Oribatella (Monoribatella) jucunda* Călugăr, 1987 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Oribatella (Monoribatella) metzi* Behan-Pelletier, 2011 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Oribatella (Monoribatella) molodovi* Krivolutsky, 1971 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Oribatella (Monoribatella) nortoni* Behan-Pelletier, 2011 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Oribatella (Monoribatella) ornata* (Coggi, 1900) (*Oribata*)
(=*Oribatella producta* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Oribatella (Monoribatella) parvula* Bernini, 1974 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Oribatella (Monoribatella) plummeri* Jacot, 1934 (*O. brevicornuta p.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Oribatella (Monoribatella) pulchra* Bernini, 1974 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Oribatella (Monoribatella) serrula* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1985 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Oribatella (Monoribatella) sexdentata* Berlese, 1916 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa, Este de Rusia asiática y U.S.A.: Virginia).
- *Oribatella (Monoribatella) szaboi* Balogh *et* Mahunka, 1979 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Oribatella (Monoribatella) tenuis* Csiszár, 1962 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatella (Monoribatella) valerieae* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2010 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Grecia.

Oribatella (Multoribatella) Subías, 2004 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribatella bromeliarum* Behan-Pelletier *et* Paoletti, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Paleártica y Oriental.
- *Oribatella (Multoribatella) alami* Kardar, 1975 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Cachemira.
- *Oribatella (Multoribatella) bromeliarum* Behan-Pelletier *et* Paoletti, 1993 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Oribatella (Multoribatella) kurchevae* Krivolutsky, 1974 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatella (Multoribatella) pseudonigra* Subías *et* Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Oribatella (Sacculoribatella) Shtanchaeva *et* Subías, 2012 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribatella (Sacculoribatella) caspica* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Oribatella (Sacculoribatella) caspica* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribatella (Sacculoribatella) nasuorum* Fujikawa, 2012 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Palmitalia Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Palmitalia latilamellata* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Palmitalia latilamellata* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Prionoribatella Aoki, 1975 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Anachipteria dentilamellata* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Prionoribatella dentilamellata* (Aoki, 1965) (*Anachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Prionoribatella impar* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Siciliotrichus Bernini, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Siciliotrichus siculus* Bernini, 1983

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Siciliotrichus siculus* Bernini, 1983
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Sagittazetes Balogh *et* P. Balogh, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sagittazetes agressor* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Sagittazetes agressor* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Ceratokalummidae Balogh, 1970 (5 gen. y 13 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Achipterina Berlese, 1916 (4 spp.)
(=***Ceratokalumma*** Balogh, 1970)
ESPECIE TIPO: *Achipteria (Achipterina) oribatelloides* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Achipterina insignis* (Balogh, 1970) (*Ceratokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Achipterina kaszabi* (Balogh *et* P. Balogh, 1988) (*Ceratokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Achipterina naisselinei* (Balogh *et* P. Balogh, 1988) (*Ceratokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) e I. Galápagos.
- *Achipterina oribatelloides* (Berlese, 1916) (*Achipteria (Achipterina)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.

Arcozetes Hammer, 1958 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Arcozetes bicuspidatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Arcozetes bicuspidatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Arcozetes rotundatus* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

Cultrobates Willmann, 1930 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cultrobates heterodactylus* Willmann, 1930
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y subtropical (Holártica meridional).
- *Cultrobates heterodactylus* Willmann, 1930
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cultrobates niponicus* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cultrobates quadricuspidatus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.

Genavensia Mahunka, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Genavensia hungarorum* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Genavensia hungarorum* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Genavensia longiseta* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Guaranozetes Balogh *et* Mahunka, 1981 (2 spp.)
(=***Belemacarus*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997)
ESPECIE TIPO: *Guaranozetes nudus* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Guaranozetes amazonicus* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997) (*Belemacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Guaranozetes nudus* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Ceratozetoidea Jacot, 1925

Limnozetidae Thor, 1937 (3 gen. y 18 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).

Antarcticola Wallwork, 1967 (1 sp.)
(=***Petrozetes*** Sitnikova, 1968)
ESPECIE TIPO: *Antarcticola meyeri* Wallwork, 1967
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Antarcticola meyeri* Wallwork, 1967
(=*Petrozetes oblongus* Sitnikova, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Antártida.

Limnozetella Willmann, 1932 (2 spp.)
(=***Austroceratobates*** Mahunka, 1985)

ESPECIE TIPO: *Limnozetella lamellata* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Limnozetella endroedyi* (Mahunka, 1985) (*Austroceratobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Limnozetella lamellata* Willmann, 1932
  DISTRIBUCIÓN: Java.

Limnozetes Hull, 1916 (15 spp.)
(=***Vietobates*** Mahunka, 1987)
ESPECIE TIPO: (*Oribata sphagni* Michael, 1880) =*Acarus ciliatus* Schrank, 1803
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica y Australiana).
- *Limnozetes amnicus* Behan-Pelletier, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional e Ibérica).
- *Limnozetes atmetos* Behan-Pelletier, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Limnozetes borealis* Behan-Pelletier, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Limnozetes ciliatus* (Schrank, 1803) (*Acarus*)
  (=*Limnozetes canadensis* Hammer, 1952)
  (=*Limnozetes ciliatus foveolatus* Willmann, 1939)
  (=*Oribata sphagni* Michael, 1880)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica y Centroamérica.
- *Limnozetes feuerborni* Willmann, 1932
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Limnozetes guyi* Behan-Pelletier, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Limnozetes latilamellatus* Behan-Pelletier, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Limnozetes lustrum* Behan-Pelletier, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional y Euroatlántica).
- *Limnozetes onondaga* Behan-Pelletier, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional y España).
- *Limnozetes palmerae* Behan-Pelletier, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional y Europa: Polonia) y Etiópica (Sudáfrica).
- *Limnozetes pustulatus* (Mahunka, 1987) (*Vietobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Limnozetes rugosus* (Sellnick, 1923) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Japón.
- *Limnozetes silvicola* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Perú y Japón.
- *Limnozetes solhoyorum* A. Seniczak *et* Seniczak, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Limnozetes similis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Ceratozetidae Jacot, 1925 (33 gen., 14 subgen., 333 spp. y 11 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Adoribatella Woolley, 1967 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Adoribatella punctata* Woolley, 1967
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Adoribatella punctata* Woolley, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica occidental y Este de Rusia asiática).

Allozetes Berlese, 1913 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratozetes (Allozetes) pusillus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Allozetes africanus* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Allozetes alas* Behan-Pelletier, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Allozetes lacandonicus* Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Allozetes latus* Tseng, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Allozetes levis* Ohkubo, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Allozetes philippinensis* Corpuz-Raros *et* Lit, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Allozetes pusillus* (Berlese, 1913) (*Ceratozetes (A.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Neotropical (Perú).
- *Allozetes translamellatus* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental: Java e "India", Polinesia: I. Samoa, y Venezuela).

Ceratozetella Shaldybina, 1966 (32 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratozetes sellnicki* Rajski, 1958

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Pantropical.

Ceratozetella (Ceratozetella) Shaldybina, 1966 (27 spp. y 1 ssp.)
(=***Ceratozetoides*** Shaldybina, 1966)
(=***Ceresella*** Pavlichenko, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Pantropical.

- *Ceratozetella (C.) aokii* (Bayartogtokh, 1999) (*Ceratozetoides*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ceratozetella (C.) behanae* (Seniczak, A. Seniczak *et* Kaczmarek, 2017) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ceratozetella (C.) bregetovae* Shaldybina, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Sur de Siberia).
- *Ceratozetella (C.) brissago* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2006) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Ceratozetella (C.) cisalpina* (Berlese, 1908) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: menos frecuente en el Oeste, Paleártica oriental y Neártica oriental).
- *Ceratozetella (C.) cuspidodenticulata* (Kulijev, 1962) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ceratozetella (C.) djaparidzae* Shaldybina, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ceratozetella (C.) fjellbergi* (Behan-Pelletier, 1986) (*Ceratozetes*)
  (=*Ceratozetella helenae* Pavlichenko, 1993)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: Neártica septentrional y Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Norte).
- *Ceratozetella (C.) heterocuspis* (Balogh *et* Mahunka, 1965) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

Ceratozetella (C.) imperatoria (Aoki, 1963) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y China suroriental.

- *Ceratozetella (C.) imperatoria imperatoria* (Aoki, 1963)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Ceratozetella (C.) imperatoria magna* Hammer, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Ceratozetella (C.) incurva* (Aoki, 1964) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Ceratozetella (C.) kirgisica* Shaldybina, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Ceratozetella (C.) maxima* (Berlese, 1908) (*Ceratozetes*)
  (?=*Oribata gracilis maior* Berlese, 1904 *sp. inq.*)
  (=*Sphaerozetes mator* Irk, 1939)
  (=*Sphaerozetes maximus* Willmann, 1953, *nom. praeoc.* por Berlese, 1908)
  (=*Ceratozetes maximus jeanneli* Trägårdh, 1912)
  (?=*Acarus spinipes* Müller, 1776 *sp. inq.*)
  (?=*Sphaerobates subseminulum* Oudemans, 1902 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte), Cuba, Vietnam y Sudáfrica.
- *Ceratozetella (C.) minima* (Sellnick, 1928) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: menos frecuente en el Norte, y Paleártica oriental meridional).
- *Ceratozetella (C.) oresbios* (Behan-Pelletier, 1984) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ceratozetella (C.) platyrhina* (Hammer, 1958) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
- *Ceratozetella (C.) platyrhinoides* (Hammer, 1961) (*Ceratozetes*)
  (=*Magellozetes mahnerti* Mahunka, 1984)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Ceratozetella (C.) redempta* (Caroli *et* Maffia, 1934) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Ceratozetella (C.) reevesi* (Behan-Pelletier *et* Earmer, 2008) (*Ceresella*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
- *Ceratozetella (C.) rotunda* (Schweizer, 1956) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Ceratozetella (C.) sellnicki* (Rajski, 1958) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: excepto Oeste, y Paleártica oriental): frecuente.
- *Ceratozetella (C.) shaldybinae* (Seniczak, Kaczmarek *et* A. Seniczak, 2016) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Asia central).
- *Ceratozetella (C.) similis* (Schweizer, 1956) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Ceratozetella (C.) thienemanni* (Willmann, 1943) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (frecuente Boreal) y Neotropical.
- *Ceratozetella (C.) translamellata* (Shaldybina, 1970) (*Ceratozetoides*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Este).
- *Ceratozetella (C.) venusta* (Pavlichenko, 1993) (*Ceresella*)
  DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Ceratozetella (C.) yezoensis* Fujita *et* Fujikawa, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Ceratozetella (Cyrtozetes) Behan-Pelletier, 1985 (5 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratozetes shiranensis* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Holártica.
Ceratozetella (Cyrtozetes) denaliensis (Behan-Pelletier, 1985) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional y Este de Paleártica oriental).
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) denaliensis denaliensis* (Behan-Pelletier, 1985) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Noreste de Siberia).
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) denaliensis minor* (Hirauchi, 1999) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) inupiaq* (Behan-Pelletier, 1986) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) rectangularis* (Pavlichenko, 1993) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) lindoae* (Behan-Pelletier *et* Eamer, 2008) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) shiranensis* (Aoki, 1976) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Ceratozetes Berlese, 1908 (50 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata gracilis* Michael, 1884
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Ceratozetes (Ceratozetes) Berlese, 1908 (49 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Ceratozetes (C.) angustus* (Banks, 1947) (*Minunthozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Ceratozetes (C.) armatus* Mihelčič, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- *Ceratozetes (C.) baleensis* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Ceratozetes (C.) biporosus* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2009
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misisipí).
- *Ceratozetes (C.) borealis* Behan-Pelletier, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Ceratozetes (C.) campestris* Mihelčič, 1956
(=*Ceratozetes obtusus* Mihelčič, 1956)
(=*Ceratozetes petrovi* Kulijev, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ceratozetes (C.) colchicus* Murvanidze *et* Weigmann, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Ceratozetes (C.) conjunctus* Mihelčič, 1956
(=*Ceratozetes contiguus* Jeleva, 1962)
(?=*Oribata myrmobates* Berlese, 1903 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea: frecuente, e Irán).
- *Ceratozetes (C.) cuspidatus* Jacot, 1939 (*C. gracilis c.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Ceratozetes (C.) cyclopeus* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2009
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
- *Ceratozetes (C.) enodis* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
(=*Oribata figurata* Ewing, 1909)
(=*Trachyoribates zeteki* Ewing, 1917)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Ceratozetes (C.) erupentus* Fujikawa, 2015
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ceratozetes (C.) gaussi* (Richters, 1908) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Ceratozetes (C.) gemmula* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ceratozetes (C.) gotoensis* Shirosaki, Nakamura *et* Fujikawa, 2017
DISTRIBUCIÓN: Japón.
Ceratozetes (C.) gracilis (Michael, 1884) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica, Etiópica (I. Santa Helena y Sudáfrica), Oriental, Nueva Zelanda, Neotropical y Antártica (I. Shetland del Sur).
- *Ceratozetes (C.) gracilis gracilis* (Michael, 1884)
(=*Ceratozetes fusiger* Mihelčič, 1956)
(=*Ceratozetes grandis* Berlese, 1908)
(=*Ceratozetes longocuspidatus* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica, Etiópica (I. Santa Helena y Sudáfrica), Oriental, Nueva Zelanda, Neotropical y Antártica (I. Shetland del Sur).
- *Ceratozetes (C.) gracilis minor* (Schweizer, 1922) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Ceratozetes (C.) guadarramicus* Pérez-Íñigo, 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ceratozetes (C.) hamobatoides* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Caledonia).
- *Ceratozetes (C.) invitus* (Hull, 1914) (*Oribata*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Ceratozetes (C.) kananaskis* Mitchell, 1976

DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ceratozetes (C.) lagrecai* Bernini, 1973
(?=*Sphaerozetes elongatissimus* Berlese, 1908 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ceratozetes (C.) laticuspidatus* Menke, 1964
(?=*Ceratozetes japonicus* Aoki, 1961 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Europa centromeridional) y Taiwán [Formosa].
- *Ceratozetes (C.) longispina* Jacot, 1936 (*C. subaquila l.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Ceratozetes (C.) macromediocris* Shaldybina, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa oriental e Irán).
- *Ceratozetes (C.) mediocris* Berlese, 1908
(=*Ceratozetes aelleni* Mahunka, 1983)
(=*Ceratozetes dubius* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental, Australiana (Nueva Zelanda) y Neotropical (Méjico).
- *Ceratozetes (C.) microsetosus* Ayyildiz *et* Luxton, 1989
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ceratozetes (C.) minutissimus* Willmann, 1951
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Ceratozetes (C.) monticola* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico).
- *Ceratozetes (C.) nanus* Subías, 2001
(=*Ceratozetes minutissimus* Subías *et* Arillo, 2000, *nom. praeoc.* por Willmann, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso).
- *Ceratozetes (C.) nasutus* Subías, Kahwash *et* Ruiz, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ceratozetes (C.) neonomintus* Subías, 2004
(=*Ceratozetes similis* Fujikawa, 1996, *nom. praeoc.* por Schweizer, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ceratozetes (C.) ovidianus* Vasiliu *et* Călugăr, 1981
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Ceratozetes (C.) pacificus* Behan-Pelletier, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Ceratozetes (C.) pallidus* (Lombardini, 1961) (*Cosmochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Ceratozetes (C.) paritractus* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Ceratozetes (C.) parvulus* Sellnick, 1922 (*C. (Allozetes)*)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Eurosiberiana, Cáucaso y Neártica septentrional).
- *Ceratozetes (C.) peritus* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Este de Rusia asiática y Canadá).
- *Ceratozetes (C.) psammophilus* Horak, 2000
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Ceratozetes (C.) pseudomediocris* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2009
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Ceratozetes (C.) simulator* Pérez-Íñigo, 1970
(=*Ceratozetes petri* Weigmann, 1976)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ceratozetes (C.) spiculatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Ceratozetes (C.) spitsbergensis* Thor, 1934
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Eurosiberiana, Mongolia y Neártica septentrional).
- *Ceratozetes (C.) striatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Ceratozetes (C.) subaquila* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
  - *Ceratozetes (C.) subaquila subaquila* (Ewing, 1909)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
  - *Ceratozetes (C.) subaquila curtispina* Jacot, 1936
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ohio).
- *Ceratozetes (C.) subinconspicuus* (Berlese, 1908) (*Punctoribates*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).
- *Ceratozetes (C.) virginicus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
(=*Ceratozetes jeweli* Rockett *et* Woodring, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Ceratozetes (C.) volgini* Shaldybina, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Ceratozetes (C.) watertonensis* Behan-Pelletier, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neártica noroccidental.
- *Ceratozetes (C.) xinjiangensis* Wen *et* Bu, 1988
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Ceratozetes (Mixozetes) Balogh *et* P. Balogh, 1990 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Arcozetes intermedius* Covarrubias, 1967
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Ceratozetes (Mixozetes) intermedius* (Covarrubias, 1967) (*Arcozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Dentizetes Hammer, 1952 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dentizetes rudentiger* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Dentizetes ledensis* Behan-Pelletier, 2000
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Dentizetes rudentiger* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Edwardzetes Berlese, 1913 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata edwardsi* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (excepto Oriental).

Edwardzetes (Edwardzetes) Berlese, 1913 (9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (excepto Oriental).
- *Edwardzetes (E.) andicola* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Edwardzetes (E.) armatus* (Hammer, 1958) (*Jugatala*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Edwardzetes (E.) australis* Starý *et* Block, 1995
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
- *Edwardzetes (E.) dentifer* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Austral (Neotropical y Nueva Zelanda), Antártica y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Edwardzetes (E.) edwardsi* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)
(=*Notaspis edwardsi lapponicus* Trägårdh, 1902)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina: Euroatlántica (frecuente), Cáucaso y Groenlandia.
- *Edwardzetes (E.) elongatus* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur), Neotropical (Méjico) y Australiana (Tasmania).
- *Edwardzetes (E.) novazealandicus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Malgache: I. Comores.
- *Edwardzetes (E.) trilobus* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Edwardzetes (E.) ubali* Iturrondobeitia *et* Caballero, 2000
DISTRIBUCIÓN: España.

Edwardzetes (Gamerozetes) Balogh *et* P. Balogh, 1990 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Magellozetes brevitutorium* Covarrubias, 1967
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Edwardzetes (Gamerozetes) brevitutorium* (Covarrubias, 1967) (*Magellozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Euzetes Berlese, 1908 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata globula* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
- *Euzetes centroamericanus* (Stoll, 1890) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Euzetes globulus* (Nicolet, 1855) (*Oribata*) *nom. protect.*
(*nom. praeoc.* por *Oribata globula* Koch, 1841 *nom. oblit.*)
(?=*Oribata aterrima* Koch, 1844 *sp. inq.*)
(?=*Carabodes nitens* Johnston, 1853 *sp. inq.*)
(?=*Acarus seminulum* Müller, 1776 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Este de Paleártica oriental) y Neotropical (Argentina).

Farchacarus Wallwork, 1967 (3 spp.)
(=***Africacarus*** Wallwork, 1965, *nom. praeoc.* por Viets, 1962)
ESPECIE TIPO: *Africacarus calcaratus* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.
- *Farchacarus calcaratus* (Wallwork, 1965) (*Africacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Senegal), Macaronésica (Cabo Verde) y Vietnam.
- *Farchacarus philippinensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Hypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Farchacarus insignis* (Balogh, 1966) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.

Furcobates Sellnick, 1959 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata hastata* Kramer, 1898
DISTRIBUCIÓN: Austral, Oriental y boreal.

Furcobates (Furcobates) Sellnick, 1959 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Anfipolar.
- *Furcobates (F.) hastatus* (Kramer, 1898) (*Oribata*)
(?=*Oribata fisheri* Michael, 1897 *sp. inq.*)
(=*Oribata longicornuta* Berlese, 1901)
DISTRIBUCIÓN: Anfipolar (Neotropical austral, subantártica: I. Malvinas [I. Falkland] y Rusia: Islas Francisco José).

- *Furcobates (F.) lewissmithi* Starý, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

Furcobates (Parafurcobates) Hammer, 1967 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Parafurcobates cuspidatus* Hammer 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Furcobates (Parafurcobates) cuspidatus* (Hammer, 1967) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Furcobates (Pseudogeminozetes) Tseng, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pseudogeminozetes obliqus* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Furcobates (Pseudogeminozetes) obliqus* (Tseng, 1984) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Fuscozetes Sellnick, 1928 (16 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata fuscipes* Koch, 1844
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Fuscozetes angustus* (Banks, 1910) (*Oribatella*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Fuscozetes bidentatus* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Fuscozetes coulsoni* A. Seniczak *et* Seniczak, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Fuscozetes cuauhtemoctzini* Palacios-Vargas *et* Martínez-Crespo, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Fuscozetes floridae* Jacot, 1935 (*F. bidentatus f.*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Fuscozetes fuscipes* (Koch, 1844) (*Oribata*)
  (=*Galumna slossonae* Banks, 1906)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur), Costa Rica y Vietnam.
- *Fuscozetes heteroporosus* (Wen *et* Bu, 1988) (*Trichoribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Fuscozetes intermedius* Caroli *et* Maffia, 1934
  (?=*Zetes rubens* Koch, 1841 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Este).
- *Fuscozetes kamchatkicus* Seniczak, Kaczmarek *et* A. Seniczak, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Siberia (Kamchatka).
- *Fuscozetes montanus* Fujikawa, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fuscozetes novus* Shaldybina, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Fuscozetes pini* Dalenius, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Suecia y Cáucaso).
- *Fuscozetes pseudosetosus* Shaldybina, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Europa centrooriental y Oeste de Paleártica oriental) y Canadá.
- *Fuscozetes rotundatus* Willmann, 1930 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Holanda.
- *Fuscozetes setosus* (Koch, 1839) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica nororiental).
- *Fuscozetes tatricus* Seniczak, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: Polonia, y Paleártica oriental: Mongolia y Noreste de China).

Geminozetes Balogh *et* Csiszár, 1963 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Geminozetes lineatus* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Etiópica) y Holártica.

Geminozetes (Geminozetes) Balogh *et* Csiszár, 1963 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Geminozetes (G.) lamellatus* Balogh, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Geminozetes (G.) lineatus* Balogh *et* Csiszár, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Geminozetes (Naiazetes) Behan-Pelletier, 1996 (3 spp.)
(=***Cyranozetes*** Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2003)
(=***Selvazetes*** Behan-Pelletier, 1998)
ESPECIE TIPO: *Naiazetes reevesi* Behan-Pelletier, 1996
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Geminozetes (Naiazetes) nasalis* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2003) (*Cyranozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Geminozetes (Naiazetes) reevesi* (Behan-Pelletier, 1996) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.
- *Geminozetes (Naiazetes) silvanus* (Behan-Pelletier, 1998) (*Selvazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Ghilarovizetes Shaldybina, 1969 (6 spp.)
(=**Koreozetes** Aoki, 1974)
ESPECIE TIPO: *Ghilarovizetes obtusus* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Ghilarovizetes altaicus* (Shaldybina, 1969) (*Melanozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Ghilarovizetes longiporosus* Ermilov *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Ghilarovizetes maruyamai* Hirauchi, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ghilarovizetes obtusus* Shaldybina, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Paleártica oriental).
- *Ghilarovizetes parvisetiger* (Aoki, 1974) (*Koreozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Ghilarovizetes rostralis* Shaldybina, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental y Cáucaso.

Granizetes Hammer, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Granizetes curvatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y subantártica.
- *Granizetes curvatus* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Tierra del Fuego) y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

Heterozetes Willmann, 1917 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratozetes (Heterozetes) palustris* Willmann, 1917
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Heterozetes aquaticus* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
  (=*Heterozetes patchlorum* Habeeb, 1974)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente) y Norte de Neotropical.
- *Heterozetes cuspidatus* Willmann, 1932
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Heterozetes heleios* Behan-Pelletier, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Heterozetes minnesotensis* (Ewing, 1913) (*Oribata*)
  (=*Heterozetes cayugensis* Habeeb, 1974)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Heterozetes palustris* (Willmann, 1917) (*Ceratozetes (H.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Hispanozetes Subías *et* Shtanchaeva, 2012 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratozetes aragonensis* Pérez-Íñigo jr., Herrero *et* Pérez-Íñigo, 1988
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Hispanozetes aragonensis* (Pérez-Íñigo jr., Herrero *et* Pérez-Íñigo, 1988) (*Ceratozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Hispanozetes bicarinatus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hispanozetes bicorniculatus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hispanozetes foveolatus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hispanozetes punctulatus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Hispanozetes striatus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
  DISTRIBUCIÓN: España.

Jugatala Ewing, 1913 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Jugatala tuberosa* Ewing, 1913
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Jugatala angulata* (Koch, 1839) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Jugatala tuberosa* Ewing, 1913
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Neártica septentrional).

Lepidozetes Berlese, 1910 (8 spp.)
(=***Onazetes*** Bugrov, 1991)
ESPECIE TIPO: *Lepidozetes singularis* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.
- *Lepidozetes acutirostrum* Ermilov, Martens *et* Tolstikov, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Lepidozetes baikalensis* Rjabinin, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Lepidozetes bavaricus* Weigmann, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Lepidozetes dashidorzsi* Balogh *et* Mahunka, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Lepidozetes latipilosus* Hammer, 1952

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional, Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Este).
- *Lepidozetes singularis* Berlese, 1910
(=*Lepidozetes conjunctus* Schweizer, 1922)
(=*Lepidozetes chernovi* Rjabinin, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente, y Sudáfrica.
- *Lepidozetes trifolius* (Fujikawa, 1972) (*Tegoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y U.S.A.: California) y Vietnam.
- *Lepidozetes umbellatus* (Bugrov, 1991) (*Onazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Lobozetes Hammer, 1958 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lobozetes bilobatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Neártica.
- *Lobozetes bilobatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Lobozetes kutchin* (Behan-Pelletier, 1986) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Macrogena Wallwork, 1966 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Macrogena monodactyla* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica, Australiana austral, Oriental y Paleártica meridional.

Macrogena (Macrogena) Wallwork, 1966 (9 spp.)
(=***Lophozetes*** P. Balogh, 1985)
(=***Paralobozetes*** Tseng, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Antártica, Australiana austral, Oriental y Paleártica meridional.
- *Macrogena (M.) abbreviata* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) brevisensilla* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) crassa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) hexasetosa* Ermilov *et* Minor, 2016
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) longirostralis* (Tseng, 1984) (*Paralobozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Macrogena (M.) minor* (Subías, Kahwash *et* Ruiz, 1990) (*Mycobates*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Macrogena (M.) monodactyla* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Macrogena (M.) rudentiger* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) truncata* (P. Balogh, 1985) (*Lophozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Macrogena (Safrobates) Mahunka, 1989 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Safrobates miniporus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australiana austral.
- *Macrogena (Safrobates) gerdi* (Ermilov *et* Minor, 2016) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (Safrobates) insignis* (Ermilov, Minor *et* Behan-Pelletier, 2016) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (Safrobates) miniporus* (Mahunka, 1989) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

Magellozetes Hammer, 1962 (3 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Magellozetes processus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica, y austral.
Magellozetes antarcticus (Michael, 1895) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica y Neotropical austral.
- *Magellozetes antarcticus antarcticus* (Michael, 1895)
DISTRIBUCIÓN: Antártica y Neotropical austral.
- *Magellozetes antarcticus traegardhi* (Subías, 2010) (*Ceratozetes (M.)*) *ssp. inq.*
(=*Oribata antarctica major* Trägårdh, 1907, *nom. praeoc.* por Pearce,1906)
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Magellozetes crassisetosus* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Magellozetes processus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica: I. Malvinas [I. Falkland], y Neotropical austral.

Melanozetes Hull, 1916 (22 spp. y 1 sspp.)
(=***Alphypochthonius*** Schweizer, 1956)
(=***Sculptozetes*** Mahunka, 1984)
ESPECIE TIPO: *Oribata mollicomus* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Etiópica.
- *Melanozetes aequalis* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)

DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes africanus* (Mahunka, 1984) (*Ghilarovizetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Melanozetes avachai* Seniczak, Kaczmarek *et* A. Seniczak, 2016
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
Melanozetes azoricus Weigmann, 1976
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: I. Azores y Siberia (Kamchatka).
- *Melanozetes azoricus azoricus* Weigmann, 1976
(=*Melanozetes azoricus floresianus* Pérez-Íñigo, 1992)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: I. Azores y Siberia (Kamchatka).
- *Melanozetes azoricus sanctaemariae* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Melanozetes crossleyi* Behan-Pelletier, 2000
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Melanozetes curtipilis* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes exobothridialis* Bayartogtokh *et* Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Melanozetes hermannioides* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes interruptus* Willmann, 1953
(=*Melanozetes longesensillus* Schweizer, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa central y Paleártica oriental meridional).
- *Melanozetes jueradae* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes lischanni* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes longisetosus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional: frecuente, y Este de Rusia asiática).
- *Melanozetes mahunkai* Subías, 2010
(=*Sculptozetes longisetosus* Mahunka, 1984, *nom. praeoc.* por Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Melanozetes medius* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes meridianus* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Melanozetes mollicomus* (Koch, 1839) (*Oribata*)
(=*Alphypochthonius alpinus* Schweizer, 1956: juvenil)
(=*Melanozetes mollisimilis* Schweizer, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Paleártica occidental: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental: excepto Este, y Neártica septentrional).
- *Melanozetes nivalis* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes orientalis* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Norte de Rusia asiática.
- *Melanozetes sellnicki* (Hammer, 1952) (*Fuscozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (frecuente en Neártica septentrional).
- *Melanozetes stagnatilis* (Hull, 1914) (*Oribata*)
(=*Oribata alpina* Halbert, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Europa noroccidental.
- *Melanozetes tanana* Behan-Pelletier, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Melanozetes trupchumi* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.

Neogymnobates Ewing, 1917 (5 spp. y 1 ssp.)
(=***Boreozetes*** Hammer, 1955)
ESPECIE TIPO: *Oribata multipilosa* Ewing, 1907
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Etiópica.
- *Neogymnobates capitatus* Wang *et* Solhøy, 2001
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Neogymnobates donghaksaensis* (Choi, 1986) (*Boreozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
Neogymnobates luteus (Hammer, 1955) (*Boreozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Corea y Neártica septentrional) y Etiópica (Tanzania).
- *Neogymnobates luteus luteus* (Hammer, 1955)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional y Tanzania.
- *Neogymnobates luteus asiaticus* Aoki, 1974
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Neogymnobates marilynae* Behan-Pelletier, 2000
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Neogymnobates multipilosus* (Ewing, 1907) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).

Onychobates Hammer, 1967 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Onychobates nidicola* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Onychobates nidicola* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Oromurcia Thor,1930 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oromurcia bicuspidata* Thor, 1930
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Oromurcia bicuspidata* Thor, 1930
(?=*Trichoribates lucens distinguendus* Berlese, 1923 *sp. inq.*)
(=*Oromurcia sudetica* Willmann, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Boreal: Paleártica occidental (frecuente en Norte de Europa), Noroeste de Siberia y Groenlandia.
- *Oromurcia lucens* (L. Koch, 1879) (*Oribata*)
(=*Notaspis setosa curta* Trägårdh, 1902)
(=*Claviceps trimaculatus* L. Koch, 1879: juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.

Patagonozetes Balogh *et* P. Balogh, 1990 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes exornatus* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Patagonozetes exornatus* (Balogh *et* Csiszár, 1963) (*Sphaerozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Pentazetes Balogh *et* P. Balogh, 1983 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pentazetes mandjeliae* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.

Pentazetes (Pentazetes) Balogh *et* P. Balogh, 1983 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Pentazetes (P.) mandjeliae* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

Pentazetes (Porallozetes) Balogh *et* P. Balogh, 1992 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Allozetes dispar* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
- *Pentazetes (Porallozetes) badamdorji* (Ermilov *et* Minor, 2016) (*Po.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pentazetes (Porallozetes) dispar* (Hammer, 1973) (*Allozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga) y Méjico.

Punctizetes Hammer, 1971 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Punctizetes penicillifer* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Punctizetes penicillifer* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Filipinas.

Sacculozetes Behan-Pelletier *et* Rjabinin, 1991 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sacculozetes filosus* Behan-Pelletier *et* Rjabinin, 1991
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Sacculozetes filosus* Behan-Pelletier *et* Rjabinin, 1991
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.

Scotiazetes Wallwork, 1966 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Scotiazetes bidens* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neártica, Neotropical y Antártica.

Scotiazetes (Scotiazetes) Wallwork, 1966 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Antártica.
- *Scotiazetes (S.) bidens* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
- *Scotiazetes (S.) cuspidatus* (Covarrubias, 1967) (*Porozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Brasil).

Scotiazetes (Guatemalozetes) Mahunka, 1980 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Guatemalozetes aelleni* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.
- *Scotiazetes (Guatemalozetes) aelleni* (Mahunka, 1980) (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Scotiazetes (Guatemalozetes) atypicus* (Mahunka, 2006) (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Scotiazetes (Guatemalozetes) danos* (Behan-Pelletier *et* Rjabinin, 1991) (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.

Sphaerozetes Berlese, 1885 (21 spp. y 1 ssp.)
(=***Incudozetes*** Balogh *et* P. Balogh, 2002)
(=***Porozetes*** Hammer, 1962)
(=***Sphaerozetella*** Jacot, 1929)

ESPECIE TIPO: *Oribata orbicularis* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica).
- *Sphaerozetes affinis* (Trägårdh, 1907) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Sphaerozetes arcticus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Norte de Rusia europea, Siberia centrooccidental: frecuente, y Neártica septentrional: frecuente).
- *Sphaerozetes bugiamapensis* Ermilov, Anichkin *et* Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Sphaerozetes castaneus* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- *Sphaerozetes chavinensis* (Hammer, 1961) (*Jugatala*)
DISTRIBUCIÓN: Perú y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Sphaerozetes clathratus* (Hammer, 1967) (*Magellozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Sphaerozetes firthensis* Behan-Pelletier, 1986
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
Sphaerozetes globularis Lombardini, 1962 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Sphaerozetes globularis globularis* Lombardini, 1962
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Sphaerozetes globularis neonominatus* Subías, 2004 *ssp. inq.*
(=*Sphaerozetes globularis maior* Lombardini, 1962, *nom. praeoc.* por Irk, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Sphaerozetes neglectus* (Kulijev, 1979) (*Trichoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Sphaerozetes olympicus* A. *et* S. Seniczak *et* Sgardelis, 2016
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Sphaerozetes orbicularis* (Koch, 1835) (*Oribata*)
(=*Sphaerozetes italiensis* Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente.
- *Sphaerozetes perezinigoi* Gómez-Llusá, 1988
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Sphaerozetes piriformis* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: frecuente, y Noroeste de Siberia).
- *Sphaerozetes polygonalis* (Hammer, 1962) (*Porozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica, América austral y Oriental.
- *Sphaerozetes quadrilobatus* (Wallwork, 1966) (*Porozetes polygonalis q.*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica y Neotropical austral (Chile).
- *Sphaerozetes rostratus* (Covarrubias, 1967) (*Porozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico).
- *Sphaerozetes setiger* (Trägårdh, 1910) (*Oribata piriformis s.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa.
- *Sphaerozetes shogranensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Sphaerozetes subintectus* Berlese, 1908 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Sphaerozetes tricuspidatus* Willmann, 1923
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Asia central rusa).
- *Sphaerozetes winchesteri* Behan-Pelletier, 2000
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Trichoribates Berlese, 1910 (64 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: (*Oribata setosa* Koch *sensu* Berlese, 1887) =*Sphaerozetes (Trichoribates) berlesei* Jacot, 1929
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

Trichoribates (Trichoribates) Berlese, 1910 (52 spp. y 2 sspp.)
(?=***Claviceps*** Canestrini *et* Fanzago, 1877 *gen. inq.*)
(?=***Murcia*** Koch, 1835 *gen. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Oriental.
- *Trichoribates (T.) acaroides* (Koch, 1835) (*Murcia*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Trichoribates (T.) alpinus* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Trichoribates (T.) angustatus* Mihelčič, 1957
(?=*Sphaerozetes prudens* Berlese, 1913 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Trichoribates (T.) aokii* Maruyama, Shimano *et* Bayartogtokh, 2016
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichoribates (T.) austroamericanus* (Berlese, 1910) (*Sphaerozetes (T.) setosus a.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).
- *Trichoribates (T.) berlesei* (Jacot, 1929) (*Sphaerozetes (T.)*)
(?=*Oribata boletorum* Ewing, 1913 *sp. inq.*)
(?=*Murcia trimaculata* Koch, 1835 *sp. inq.*: juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Camboya.
- *Trichoribates (T.) biarea* Gjelstrup *et* Solhøy, 1994

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Europa).
- *Trichoribates (T.) botschi* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Trichoribates (T.) brevicuspis* Mihelčič, 1958
(=*Trichoribates longipilis* Mihelčič, 1956, *nom. praeoc.* por Willmann, 1951)
(=*Trichoribates pilosus* Mihelčič, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Trichoribates (T.) brevilamellaris* Bayartogtokh, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Trichoribates (T.) caucasicus* Shaldybina, 1971
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Trichoribates (T.) copperminensis* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Paleártica oriental: excepto Este, y Neártica septentrional).
- *Trichoribates (T.) deliensis* (Oudemans, 1922) (*Murcia*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Trichoribates (T.) dubiosus* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Trichoribates (T.) ephippiatus* (Koch, 1841) (*Murcia*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Trichoribates (T.) formosus* (Banks, 1909) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica nororiental.
- *Trichoribates (T.) fumigatus* (Koch, 1841) (*Murcia*) *sp. inq.* (juvenil)
(?=*Murcia obsoleta* Koch, 1841 *sp. inq.*: juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Trichoribates (T.) furcatus* Schweizer, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: Suiza, y Este de Rusia asiática).
- *Trichoribates (T.) hammerae* Subías, 2010
(=*Jugatala montana* Hammer, 1961, *nom. praeoc.* por Irk, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Trichoribates (T.) hauseri* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Trichoribates (T.) hirauchiae* Maruyama, Shimano *et* Bayartogtokh, 2016
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichoribates (T.) hirtus* (Canestrini *et* Fanzago, 1877) (*Claviceps*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Trichoribates (T.) laeviusculus* (Canestrini *et* Fanzago, 1877) (*Claviceps*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
Trichoribates (T.) latincisus (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Trichoribates (T.) latincisus latincisus* (Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Trichoribates (T.) latincisus giganteus* (Hall, 1911) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Connecticut).
- *Trichoribates (T.) latirostratus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Trichoribates (T.) longipilis* Willmann, 1951
(=*Trichoribates perlongum* Schweizer, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Trichoribates (T.) myricus* Gjelstrup *et* Solhøy, 1994
(?=*Sphaerozetes (Trichoribates) oxypterus* Berlese, 1910 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Trichoribates (T.) monticola* (Trägårdh, 1902) (*Notaspis*)
(=*Trichoribates montanus* Irk, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Euroatlántica y Cáucaso).
Trichoribates (T.) novus (Sellnick, 1928) (*Murcia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Virginia).
- *Trichoribates (T.) novus novus* (Sellnick, 1928)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).
- *Trichoribates (T.) novus dentatus* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Trichoribates (T.) oblongarea* Gjelstrup *et* Solhøy, 1994
DISTRIBUCIÓN: Islandia.
- *Trichoribates (T.) ocotlicus* Palacios-Vargas *et* Norton, 1984
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Trichoribates (T.) ogilviensis* Behan-Pelletier, 1986
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Trichoribates (T.) perfectus* (Banks, 1896) (*Oribatella*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Trichoribates (T.) persimilis* (Banks, 1906) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Trichoribates (T.) punctatus* Shaldybina, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa suroriental y Paleártica oriental meridional).
- *Trichoribates (T.) rausensis* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón y Norte de India.
- *Trichoribates (T.) rotundicuspidatus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Trichoribates (T.) rotundus* (Willmann, 1953) (*Jugatala*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Trichoribates (T.) scilierensis* Bayartogtokh *et* Schatz, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Trichoribates (T.) serratus* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1993
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Trichoribates (T.) sidorchukae* Behan-Pelletier *et* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Trichoribates (T.) spatulasetosus* Reeves, 1967
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Trichoribates (T.) spinogenuala* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Trichoribates (T.) stabelchodi* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Trichoribates (T.) striatus* Hammer, 1952
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional e India (Himachal Pradesh).
- *Trichoribates (T.) strigatus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Trichoribates (T.) tectopedacutus* (Thor, 1937) (*Murcia*) *sp. inq.* (juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Trichoribates (T.) tianshanensis* Wen *et* Bu, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Trichoribates (T.) tjanshanicus* Shaldybina, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Trichoribates (T.) valerieae* Schatz, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Trichoribates (T.) zingerlei* Bayartogtokh *et* Schatz, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Italia.

Trichoribates* (*Laminizetes) Behan-Pelletier, 1986 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Laminizetes fortispinosus* Behan-Pelletier, 1986
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Trichoribates (Laminizetes) fortispinosus* (Behan-Pelletier, 1986) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Trichoribates (Laminizetes) tabulatus* (Huang *et* Yang, 2013) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Trichoribates (Latilamellobates) Shaldybina, 1971 (9 spp. y 1 ssp.)
(=***Trichoribatella*** Mahunka, 1983)
(=***Vicinebates*** Pavlichenko, 1991)
ESPECIE TIPO: *Oribata incisella* Kramer, 1897
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Trichoribates (Latilamellobates) algarvensis* (Subías *et* Gil-Martín, 1990) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Trichoribates (Latilamellobates) clavatus* Mihelčič, 1956 (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Trichoribates (Latilamellobates) columbreti* (Mínguez *et* Subías, 1986) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: España (I. Columbretes).
- *Trichoribates (Latilamellobates) incisellus* (Kramer, 1897) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica.
  - *Trichoribates (Latilamellobates) incisellus incisellus* (Kramer, 1897)
    (=*Trichoribatella baloghi* Mahunka, 1983)
    (=*Oribata cribelliger germanica* Schweizer, 1926)
    (=*Sphaerozetes (Trichoribates) oxypterus meridionalis* Berlese, 1910)
    (=*Trichoribates setosus apenninicus* Berlese, 1923)
    DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y Canadá.
  - *Trichoribates (Latilamellobates) incisellus rotundatus* Willmann, 1939 (*T.*)
    DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Trichoribates (Latilamellobates) latilamellatus* Mihelčič, 1956 (*T.*)
  (=*Trichoribates latilamellatus angustissima* Mihelčič, 1957)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (frecuente).
- *Trichoribates (Latilamellobates) naltschicki* (Shaldybina, 1971) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Trichoribates (Latilamellobates) naltschicki* (Shaldybina, 1971) (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental, Irán y Suroeste de Rusia asiática.
- *Trichoribates (Latilamellobates) obesus* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
  (=*Jugatala lamellata* Ewing, 1918)
  DISTRIBUCIÓN: Boreal (Finlandia y Neártica septentrional).
- *Trichoribates (Latilamellobates) sergienkoae* (Pavlichenko, 1991) (*Vicinebates*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Trichoribates (Latilamellobates) tepetlensis* Palacios-Vargas *et* Norton, 1984 (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Trichoribates (Sacculoribates) Subías, 2021 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trichoribates polaris* Hammer, 1953
DISTRIBUCIÓN: Boreal.

- *Trichoribates (Sacculoribates) polaris* Hammer, 1953 (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal: Neártica noroccidental (frecuente) y Noreste de Siberia.

Trichoribates (Viracochiella) Hammer, 1961 (3 spp.)
(=***Leebates*** Balogh *et* Mahunka, 1996)
ESPECIE TIPO: *Viracochiella tuberculata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana) y Paleártica meridional.
- *Trichoribates (Viracochiella) bornemisszai* (Balogh *et* Mahunka, 1996) (*Leebates*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Trichoribates (Viracochiella) orientalis* (Rjabinin *et* Zaitsev, 2008) (*V.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática: I. Sajalín.
- *Trichoribates (Viracochiella) tuberculatus* (Hammer, 1961) (*V.*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.

Umbellozetes Krivolutsky, 1969 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Umbellozetes fuscus* Krivolutsky, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Umbellozetes combinatus* Wang *et* Solhøy, 1999
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Umbellozetes fuscus* Krivolutsky, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Umbellozetes parvus* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Umbellozetes petrovae* (Golosova *et* Karppinen, 1984) (*Tutoridens* [†])
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Umbellozetes slaveki* Seniczak *et* A. Seniczak, 2011
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Umbellozetes squamaceus* Wang *et* Shen, 1999
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).

Zetomimus Hull, 1916 (21 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata furcata* Warburton *et* Pearce, 1905
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Zetomimus (Zetomimus) Hull, 1916 (10 spp.)
(=***Hamobates*** Hammer, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita: Holártica y tropical (excepto Etiópica).
- *Zetomimus (Z.) bicornis* (Hammer, 1967) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Zetomimus (Z.) boothianus* (Hull, 1915) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Zetomimus (Z.) brevis* Ohkubo, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Zetomimus (Z.) cristatus* (Hammer, 1962) (*Hamobates*)
DISTRIBUCIÓN: Chile e India (Andhra Pradesh).
- *Zetomimus (Z.) francisi* (Habeeb, 1974) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Zetomimus (Z.) furcatus* (Warburton *et* Pearce, 1905) (*Oribata*)
(=*Ceratozetes argentinensis* Hammer, 1958)
(?=*Oribata avenifera* Michael, 1884 *sp. inq.*)
(?=*Oribata clypeata* Nicolet, 1855 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte) y Este de Rusia asiática, y Neotropical (Argentina y Perú).
- *Zetomimus (Z.) magnificus* (Berlese, 1910) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Italia y Cáucaso).
- *Zetomimus (Z.) naias* Behan-Pelletier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Zetomimus (Z.) nigrisetosus* (Hammer, 1958) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
- *Zetomimus (Z.) spinosus* (Hammer, 1962) (*Hamobates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Méjico).

Zetomimus (Protozetomimus) Pérez-Íñigo, 1990 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratozetes acutirostris* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Etiópica.
- *Zetomimus (Protozetomimus) acutirostris* (Mihelčič, 1957) (*Ceratozetes*)
(=*Ceratozetes bulanovae* Kulijev, 1962)
(=*Ceratozetes rostroundulatus* Pavlichenko, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Zetomimus (Protozetomimus) ambiguus* (Behan-Pelletier, 1998) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Zetomimus (Protozetomimus) behanae* (Weigmann, 2012) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Zetomimus (Protozetomimus) catarinensis* (Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1993) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Zetomimus (Protozetomimus) cooki* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2003 *(Z.)*

DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Zetomimus (Protozetomimus) genavensis* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2006) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Zetomimus (Protozetomimus) longispina* (Mahunka *et* Topercer, 1983) (*Ceratozetella*)
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
- *Zetomimus (Protozetomimus) polpaicoensis* (Hammer, 1962) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Zetomimus (Protozetomimus) rostroserratus* (Wallwork, 1965) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Zetomimus (Protozetomimus) setosus* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Zetomimus (Protozetomimus) undulatus* (Hammer, 1958) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Chamobatidae Thor, 1937 (7 gen., 1 subgen., 60 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Ceratobates Balogh *et* Mahunka, 1969 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratobates pontiger* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Ceratobates cangioensis* Ermilov *et* Anichkin, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Ceratobates fornerisae* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Ceratobates monosacculatus* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Ceratobates pontiger* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Ceratobates spathulatus* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Chamobates Hull, 1916 (31 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata cuspidata* Michael, 1884
DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (excepto Australiana).

Chamobates (Chamobates) Hull, 1916 (21 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (excepto Australiana).
- *Chamobates (C.) apathyi* (Tafner, 1905) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Chamobates (C.) birulai* (Kulczynski, 1902) (*Notaspis*)
(=*Chamobates cuspidatus alpinus* Schweizer, 1956)
(=*Chamobates tricuspidatus* Willmann, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (excepto Este) y Groenlandia.
- *Chamobates (C.) caucasicus* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Chamobates (C.) confusus* Subías, 2000
(?=*Chamobates angulatus* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*)
(?=*Chamobates triangularis* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental (excepto Norte): frecuente, Este de Paleártica oriental y Alaska.
- *Chamobates (C.) cuspidatiformis* Dalenius, 1963
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Chamobates (C.) cuspidatus* (Michael, 1884) (*Oribata*)
(=*Oribata dominae* Hull, 1914)
(=*Oribata lucifer* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) e I. Seychelles.
- *Chamobates (C.) dentatus* Mihelčič, 1956
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Chamobates (C.) dentotutorii* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Chamobates (C.) egenus* (Berlese, 1910) (*Euzetes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Chamobates (C.) geminus* Fujikawa, 1997
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Chamobates (C.) hauseri* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Marruecos.
- *Chamobates (C.) illinoisensis* (Ewing, 1909) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Chamobates (C.) javensis* (Hammer, 1979) (*Sphaerozetes*)
(=*Unguizetes hammerae* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Chamobates (C.) lapidarius* (Lucas, 1849) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Argelia.
- *Chamobates (C.) pedemontanus* (Berlese, 1910) (*Sphaerozetes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Chamobates (C.) perezinigoi* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Chamobates (C.) pusillus* (Berlese, 1895) (*Oribata*)
(=*Notaspis cuspidatus borealis* Trägårdh, 1902)
(=*Chamobates incisus* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y "Canadá".
- *Chamobates (C.) roynortoni* Weigmann, 2012
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Chamobates (C.) schuetzi* (Oudemans, 1902) (*Notaspis*)
(=*Oribata omissa* Warburton *et* Pearce, 1905)
(=*Euzetes paolii* Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Este de Rusia asiática y U.S.A.: Virginia y Alaska).
- *Chamobates (C.) subglobulus* (Oudemans, 1900) (*Notaspis*)
(=*Chamobates nasutus* Mihelčič, 1957)
(=*Euzetes nigerrimus* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, Irán y Este de Rusia asiática).
- *Chamobates (C.) vartismithi* Hull, 1916 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.

Chamobates (Xiphobates) Pavlichenko, 1993 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis voigtsi* Oudemans, 1902
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Chamobates (Xiphobates) bispinosus* Mahunka, 1987 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Chamobates (Xiphobates) callipygis* Pavlichenko, 1991 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Chamobates (Xiphobates) dactyloscopicus* Bernini *et* Mahunka, 1982 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Chamobates (Xiphobates) depauperatus* (Berlese, 1887) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Chamobates (Xiphobates) interpositus* Pschorn-Walcher, 1953
(=*Chamobates kieviensis* Shaldybina, 1980)
(=*Chamobates longipilis* Willmann, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Chamobates (Xiphobates) latissimus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Albania.
- *Chamobates (Xiphobates) rastratus* (Hull, 1914) (*Oribata*)
(=*Chamobates spinosus* Sellnick, 1928) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: frecuente, y Siberia centrooccidental).
- *Chamobates (Xiphobates) sergienkoae* Shaldybina, 1980 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Chamobates (Xiphobates) voigtsi* (Oudemans, 1902) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: frecuente, y centrooeste de Paleártica oriental).

Globozetes Sellnick, 1928 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Globozetes longipilus* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Globozetes longipilus* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Globozetes microtus* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Globozetes petrinjensis* (Willmann, 1940) (*Chamobates*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Hypozetes Balogh, 1959 (10 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Hypozetes imitator* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Hypozetes andreii* Ermilov, Hugo-Coetzee, Khaustov *et* Kontschán, 2019
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hypozetes aviger* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Hypozetes brevisetus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Hypozetes bulgaricus* Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional e India (Orissa).
- *Hypozetes imitator* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (África oriental y Emiratos Árabes) e India (Bengala Occidental).
- *Hypozetes inexpectatus* Maróy, 1972
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Hypozetes laysanensis* Aoki, 1964
DISTRIBUCIÓN: Hawái e India.
- *Hypozetes rostralis* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Hypozetes stellifer* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2010
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Hypozetes translamellatus Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Arabia Saudita e Irán.
- *Hypozetes translamellatus translamellatus* Wallwork, 1965

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo) e Irán.
- *Hypozetes translamellatus saudicus* Bayoumi *et* Al-Khalifa, 1984
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.

Iugoribates Sellnick, 1944 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Iugoribates gracilis* Sellnick, 1944
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Iugoribates mihelcici* (Winkler, 1958) (*Chamobates*)
(=*Iugoribates cornutus* Mínguez, 1981)
(=*Chamobates incisus* Mihelčič, 1957, *nom. praeoc.* por Hammen, 1952)
(=*Chamobates mihelcici* Pavlichenko, 1992, *nom. praeoc.* por Winkler, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Iugoribates gracilis* Sellnick, 1944
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional (frecuente).

Ocesobates Aoki, 1965 (7 spp.)
(=***Chamozetes*** Sellnick, 1974)
(=***Danobates*** Gjelstrup, 1978)
ESPECIE TIPO: *Ocesobates kumadai* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Paleotropical.
- *Ocesobates boedvarssoni* (Sellnick, 1974) (*Chamozetes*)
(=*Ocesobates bregetovae* Shaldybina, 1974)
(=*Danobates insignitus* Gjelstrup, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europea y Este de Rusia asiática).
- *Ocesobates galaicus* Subías *et* Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ocesobates kumadai* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ocesobates kumasoi* (K. Nakamura, Y.-N. Nakamura *et* Fujikawa, 2014) (*Humerobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ocesobates schatzi* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Ocesobates tumidisetosus* (Monson, 2002) (*Chamobates*)
DISTRIBUCIÓN: Europea (I. Británicas y Grecia).
- *Ocesobates ziweiensis* Ermilov *et* Liao, 2018
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Pedunculozetes Hammer, 1962 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pedunculozetes andinus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).
- *Pedunculozetes andinus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (Nueva Zelanda y Neotropical austral).
- *Pedunculozetes minutus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pedunculozetes ovatum* Ermilov *et* Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Maudheimiidae Balogh *et* P. Balogh, 1984 (4 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Antártica, Australiana y Neotropical.

Crassoribatula Hammer, 1967 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Crassoribatula maculosa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
- *Crassoribatula biobioensis* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Crassoribatula maculosa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Caledonia).

Maudheimia Dalenius, 1958 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Maudheimia wilsoni* Dalenius, 1958
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Maudheimia petronia* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Antártida.
- *Maudheimia tanngardenensis* Coetzee, 1997
DISTRIBUCIÓN: Antártida.
- *Maudheimia wilsoni* Dalenius, 1958
DISTRIBUCIÓN: Antártida.

Multimaudheimia Subías, 2004 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Maudheimia marshalli* Coetzee, 1997
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Multimaudheimia marshalli* (Coetzee, 1997) (*Maudheimia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártida.

Zealandozetes Ermilov, Minor *et* Behan-Pelletier, 2015 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Zealandozetes southensis* Ermilov, Minor *et* Behan-Pelletier, 2015

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
- *Zealandozetes southensis* Ermilov, Minor *et* Behan-Pelletier, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Chile.

Humerobatidae Grandjean, 1971 (8 gen., 85 spp. y 7 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Africoribates Evans, 1953 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Africoribates ornatus* Evans, 1952
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Africoribates amorphus* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Africoribates australis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Africoribates evansi* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Africoribates glabratus* (Berlese, 1908) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Africoribates macfarlanei* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Africoribates maximus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Africoribates ornatus* Evans, 1953
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Africoribates pilosus* (Mahunka, 1985) (*Kilimabates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Africoribates subiasi* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

Afroleius Mahunka, 1984 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Afroleius deformis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Afroleius amieae* Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius caudatus* Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius crassus* Coetzee, 2013
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius decurvatus* Coetzee, 2013
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius deformatoides* Coetzee, 2013
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius deformis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius floridus* (Mahunka, 1985) (*Magyaria*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius inae* Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius lucidus* Coetzee, 2015
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius minor* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius natalensis* Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius polygonatus* (Mahunka, 1985) (*Kilimabates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius simplex* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius undulatus* (Balogh, 1959) (*Africoribates*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Afroleius valerieae* Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Antarctozetes Balogh, 1961 (14 spp.)
(=***Anellozetes*** Hammer, 1962)
(=***Kilimabates*** Mahunka, 1984)
ESPECIE TIPO: *Oribata crozetensis* Richters, 1908
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental), subtropical austral y Antártica.
- *Antarctozetes auriculatus* (Mahunka, 1984) (*Kilimabates*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Sudáfrica).
- *Antarctozetes bicuspidatus* (Mahunka, 1985) (*Kilimabates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Antarctozetes crozetensis* (Richters, 1908) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Antarctozetes depilatus* (Berlese, 1910) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía).

- *Antarctozetes discifer* (Hammer, 1973) (*Anellozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Antarctozetes fusiformis* (Hammer, 1970) (*Anellozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana: I. de Pascua (I. Easter) y Nueva Zelanda.
- *Antarctozetes intermedius* (Hammer, 1967) (*Anellozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Antarctozetes longicaulis* (Hammer, 1967) (*Anellozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Antarctozetes luteus* (Hammer, 1967) (*Anellozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Antarctozetes mariehammerae* Ermilov, Minor *et* Behan-Pelletier, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Antarctozetes muscicola* (Hammer, 1962) (*Anellozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Antarctozetes nasalis* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011) (*Africoribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Antarctozetes processus* (Mahunka, 1984) (*Kilimabates*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Antarctozetes translamellatus* (Mahunka, 1985) (*Kilimabates*)
  (=*Anellozetes neonominatus* Subías, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Diapterobates Grandjean, 1936 (24 spp. y 4 sspp.)
ESPECIE TIPO: (*Sphaerozetes (Trichoribates) numerosus* Sellnick, 1924) =*Notaspis humeralis* Hermann, 1804
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Diapterobates altaicus* Bayartogtokh, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Diapterobates altimontanus* Hammer, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán y Nepal.
- *Diapterobates arnoldii* Krivolutsky, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Rusia asiática).
- *Diapterobates bogduulensis* Bayartogtokh *et* Aoki, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Diapterobates brevidentatus* Bayartogtokh, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Diapterobates crinitus* Pankov, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Islas del Este de Rusia asiática.
- *Diapterobates dubinini* Shaldybina, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
- *Diapterobates humeralis* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
  (=*Oribata facula* Koch, 1839)
  (=*Sphaerozetes (Trichoribates) numerosus* Sellnick, 1924)
  (=*Oribata picipes* Koch, 1839)
  (=*Claviceps ruber* Canestrini *et* Fanzago, 1877)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica).
- *Diapterobates izuensis* Suzuki, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Diapterobates japonicus* Aoki, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Diapterobates montivagus* (Hull, 1914) (*Oribata*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Diapterobates nayoroensis* Fujikawa, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Diapterobates notatus* (Thorell, 1871) (*Oribata*)
  (=*Claviceps bimaculatus* L. Koch, 1879: juvenil)
  (=*Sphaerozetes strandi* Berlese, 1910)
  DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (frecuente).
- *Diapterobates oblongus* (L. Koch, 1879) (*Oppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (excepto Oeste) y Paleártica oriental.
- *Diapterobates oromurcii* Shaldybina, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Asia centooccidental.

Diapterobates pusillus Aoki, 1969
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

  - *Diapterobates pusillus pusillus* Aoki, 1969
    DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
  - *Diapterobates pusillus cuspidatus* Choi, 1986
    DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Diapterobates reticulatus* (L. Koch, 1879) (*Oribata*)
  (=*Sphaerozetes (Trichoribates) principalis* Berlese, 1914)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa meridional, Siberia, Mongolia y Canadá).
- *Diapterobates rostralis* Shaldybina, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
- *Diapterobates rostrotuberculatus* Shaldybina, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Ucrania y Asia centrooccidental).
- *Diapterobates rotundocuspidatus* Shaldybina, 1970
  (=*Diapterobates siccatus* Behan-Pelletier, 1986)

DISTRIBUCIÓN: Boreal (Noreste de Siberia y Neártica septentrional).
- *Diapterobates sitnikovae* Shaldybina, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y "Alaska".
- *Diapterobates songliensis* Choi, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental.
- *Diapterobates unimaculatus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
Diapterobates variabilis Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Boreal (excepto Europa occidental) y Nepal.
- *Diapterobates variabilis variabilis* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Boreal (excepto Europa occidental): frecuente.
- *Diapterobates variabilis altissimus* Piffl, 1971
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Diapterobates variabilis honshuensis* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Diapterobates variabilis yezoensis* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Humerobates Sellnick, 1928 (15 spp. y 3 sspp.)
(=***Baloghobates*** Hammer, 1967)
(=***Banksinus*** Jacot, 1938)
(=***Cordylobates*** Luxton, 1995)
(=***Jeannelia*** Dalenius, 1958, *nom. praeoc.* por Raffray, 1913)
(=***Trihumerozetes*** Sellnick, 1959)
ESPECIE TIPO: (*Notaspis humeralis* Hermann *sensu* Sellnick, 1928) =*Humerobates rostrolamellatus* Grandjean, 1936
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Humerobates africanus* (Mahunka, 1984) (*Baloghobates*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Humerobates cornutus* (Sellnick, 1959) (*Trihumerozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai].
- *Humerobates flechtmanni* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1993
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela) y Corea.
- *Humerobates fragilis* (Luxton, 1995) (*Cordylobates*)
DISTRIBUCIÓN: I. Ascensión.
- *Humerobates nudus* (Hammer, 1967) (*Baloghobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda, Corea y Oriental (Taiwán [Formosa] y China suroriental).
- *Humerobates papuanus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Humerobates parvoglobosus* (Hammer, 1967) (*Baloghobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Humerobates perkinsi* Jacot, 1934 (*H. humeralis p.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Humerobates pomboi* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
Humerobates rostrolamellatus Grandjean, 1936
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: excepto Paleártica oriental, Etiópica, Islas del Pacífico y Méjico).
-*Humerobates rostrolamellatus rostrolamellatus* Grandjean, 1936
(?=*Oribata arborea* Banks, 1895 *sp. inq.*)
(=*Sphaerobates dentatus* Mihelčič, 1957)
(?=*Acarus fungorum* Linnaeus, 1758 *sp. inq.*)
(?=*Murcia rubra* Koch, 1841 *sp. inq.*: juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Neártica, Etiópica, Australiana: Islas de Pacífico y Nueva Caledonia, y Méjico).
- *Humerobates rostrolamellatus giganteus* Willmann, 1939 (*H. fungorum g.*)
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
- *Humerobates rostrolamellatus guadarramicus* Pérez-Íñigo, 1972
(?=*Chamobates magnus* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Humerobates rostrolamellatus mauritius* Jacot, 1936 (*H. humeralis m.*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Humerobates setosus* Behan-Pelletier *et* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Humerobates taiwanensis* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Humerobates translamellatus* Shaldybina, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Cáucaso).
- *Humerobates varius* Ohkubo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Humerobates zumpti* Sellnick, 1957
DISTRIBUCIÓN: Namibia.

Nuhivabates Niemi *et* Behan-Pelletier, 2004 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nuhivabates nukuhiva* Niemi *et* Behan-Pelletier, 2004
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Nuhivabates hivaoa* Niemi *et* Behan-Pelletier, 2004
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).

- *Nuhivabates nukuhiva* Niemi *et* Behan-Pelletier, 2004
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).

Ramsayellus Spain *et* Luxton, 1970 (5 spp.)
(=***Ulugurozetes*** Mahunka, 1984)
(=***Zealandobates*** Hammer, 1967, *nom. praeoc.* por Hopkins, 1966)
ESPECIE TIPO: *Zealandobates grandis* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Ramsayellus conspicuus* (Berlese, 1916) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Ramsayellus fallax* (Pearce, 1906) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Ramsayellus grandis* (Hammer, 1967) (*Zealandobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Ramsayellus seychellensis* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Ramsayellus turbulentus* (Mahunka, 1984) (*Ulugurozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Svalbardia Thor, 1930 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Svalbardia paludicola* Thor, 1930
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.
- *Svalbardia paludicola* Thor, 1930
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Norte de Europa, Sur de Siberia, Neártica septentrional: frecuente, y Cáucaso).

Punctoribatidae Thor, 1937 (12 gen., 5 subgen. y 101 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Allomycobates Aoki, 1976 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Allomycobates lichensis* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Allomycobates lichenis* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Cryptobothria Wallwork, 1963 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cryptobothria monodactyla* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Antártica.
- *Cryptobothria monodactyla* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).
- *Cryptobothria papuana* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Ellipsozetes Bernini, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ellipsozetes sphaerulus* Bernini, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Ellipsozetes sphaerulus* Bernini, 1980
DISTRIBUCIÓN: Italia.

Feiderzetes Subías, 1977 (1 sp.)
(=***Allozetes*** Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1971, *nom. praeoc.* por Berlese, 1913)
ESPECIE TIPO: *Punctoribates (Minunthozetes) latus* Schweizer, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Feiderzetes latus* (Schweizer, 1956) (*Punctoribates (Minunthozetes)*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Minunthozetes Hull, 1916 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Oribata fusigera* Michael, 1884) =*Zetes semirufus* Koch, 1841
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Minunthozetes (Minunthozetes) Hull, 1916 (4 spp.)
(=***Jurabates*** Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Minunthozetes (M.) pseudofusiger* (Schweizer, 1922) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Minunthozetes (M.) quadriareatus* Mínguez, Subías *et* Ruiz, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Minunthozetes (M.) semirufus* (Koch, 1841) (*Zetes*)
(=*Punctoribates bicornis* Berlese, 1908)
(=*Oribata fusigera* Michael, 1884)
(=*Minunthozetes major* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Asia centrooccidental) y Canadá.
- *Minunthozetes (M.) tarmani* Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1971
(?=*Punctoribates atomus* Berlese, 1908 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Este de Rusia asiática).

Minunthozetes (Inigozetes) Subías, 2000 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Minunthozetes reticulatus* Pérez-Íñigo, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Minunthozetes (Inigozetes) reticulatus* Pérez-Íñigo, 1969 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.

Mycobates Hull, 1916 (35 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata parmeliae* Michael, 1884
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y "Neotropical".

Mycobates (Mycobates) Hull, 1916 (16 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Mycobates (M.) acuspidatus* Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2001
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (M.) cambricus* (Hull, 1916) (*Melanozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Mycobates (M.) carli* (Schweizer, 1922) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Mycobates (M.) corticeus* Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2001
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Mycobates (M.) debilis* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Mycobates (M.) exigualis* Behan-Pelletier, 1994
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Noruega y Neártica septentrional).
- *Mycobates (M.) flabelliger* (Berlese, 1908) (*Sphaerozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).
- *Mycobates (M.) hylaeus* Behan-Pelletier, 1994
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. oriental y Canadá).
- *Mycobates (M.) integer* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Mycobates (M.) monodactylus* Shaldybina, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental y Paleártica oriental.
- *Mycobates (M.) parmeliae* (Michael, 1884) (*Oribata*)
(=*Sphaerozetes (Trichoribates) lenicomus* Berlese, 1910)
(=*Mycobates nadiji* Pavlichenko, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: frecuente, Paleártica oriental y Canadá) y Méjico.
- *Mycobates (M.) perates* Behan-Pelletier, 1994
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Mycobates (M.) rileyi* (Haller, 1884) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: "Neártica".
- *Mycobates (M.) tricostatus* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Mycobates (M.) tridentatus* Weigmann, 1976
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Mycobates (M.) yukonensis* Behan-Pelletier, 1994
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Mycobates (Calyptozetes) Thor, 1930 (19 spp.)
(=***Permycobates*** Strenzke, 1954)
ESPECIE TIPO: *Oribata sarekensis* Trägårdh, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Mycobates (Calyptozetes) alpinus* (Willmann, 1951) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Mycobates (Calyptozetes) altus* Behan-Pelletier, 1994 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Mycobates (Calyptozetes) austroamericanus* Hammer, 1958 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia e Irán.
- *Mycobates (Calyptozetes) azaleos* Behan-Pelletier, 1994 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Mycobates (Calyptozetes) beringianus* Behan-Pelletier, 1994 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (Calyptozetes) bicornis* (Strenzke, 1954) (*Permycobates*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Mycobates (Calyptozetes) brevilamellatus* Behan-Pelletier, 1994 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Mycobates (Calyptozetes) conitus* Hammer, 1952 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal: Neártica septentrional (frecuente) y Noreste de Rusia asiática.
- *Mycobates (Calyptozetes) cribelliger* (Berlese, 1904) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Mycobates (Calyptozetes) dryas* Behan-Pelletier, 1994 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (Calyptozetes) hammerae* Behan-Pelletier, 1994 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (Calyptozetes) incurvatus* Hammer, 1952 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica y Este de Paleártica oriental).
- *Mycobates (Calyptozetes) monocornis* Aoki, 1973 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Mycobates (Calyptozetes) occidentalis* Behan-Pelletier, 1994 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (Calyptozetes) patrius* Shaldybina, 1970 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
- *Mycobates (Calyptozetes) punctatus* Hammer, 1955 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Rusia asiática y Neártica septentrional).
- *Mycobates (Calyptozetes) royi* Palacios-Vargas *et* Vázquez, 1988 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Mycobates (Calyptozetes) sarekensis* (Trägårdh, 1910) (*Oribata*)
  (=*Mycobates consimilis* Hammer, 1952)
  DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Euroatlántica: frecuente, Asia central rusa y Neártica septentrional: frecuente).
- *Mycobates (Calyptozetes) tridactylus* Willmann, 1929 (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional) y Oriental (India: Tripura).

Mycozetes Spain, 1968 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Mycozetes oleariae* Spain, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Mycozetes oleariae* Spain, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Neomycobates Wallwork, 1963 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Neomycobates tridentatus* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Antártica y Australiana.
- *Neomycobates tridentatus* Wallwork, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie) y Nueva Zelanda.

Pelopsis Hall, 1911 (3 spp.)
(=***Ewingozetes*** Hammer, 1952)
(=***Parapelops*** Jacot, 1938)
ESPECIE TIPO: (*Pelopsis nudiuscula* Hall, 1911) =*Pelops bifurcatus* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.
- *Pelopsis baloghi* Behan-Peletier *et* Eamer, 2003
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Pelopsis bidentatus* (Hammer, 1961) (*Parapelops*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pelopsis bifurcatus* (Ewing, 1909) (*Pelops*)
  (=*Pelopsis nudiuscula* Hall, 1911)
  (=*Galumna partita* Banks, 1910)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (frecuente).

Punctoribates Berlese, 1908 (30 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata punctum* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Punctoribates (Punctoribates) Berlese, 1908 (20 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Australianooriental).
- *Punctoribates (P.) angulatus* Bayartogtokh, Grobler *et* Cobanoglu, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Punctoribates (P.) aveiroensis* Weigmann, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Punctoribates (P.) brevicuspidatus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Punctoribates (P.) ezoensis* (Fujikawa, 1982) (*Mycobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Punctoribates (P.) ghilarovi* Shaldybina, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental y Mongolia.
- *Punctoribates (P.) grishinae* Shaldybina, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Siberia central).
- *Punctoribates (P.) latilobatus* Kunst, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (excepto Este).
- *Punctoribates (P.) liber* Pavlichenko, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Punctoribates (P.) meridianus* Shaldybina, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Punctoribates (P.) minimus* Shaldybina, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (excepto Este).
- *Punctoribates (P.) moldavicus* Vasiliu *et* Călugăr, 1976
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Punctoribates (P.) mundus* Shaldybina, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Paleártica oriental: excepto Norte).
- *Punctoribates (P.) pannonicus* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Punctoribates (P.) punctum* (Koch, 1839) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, Este de U.S.A., Oriental y Nueva Zelanda).
- *Punctoribates (P.) selgae* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Minunthozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Punctoribates (P.) sellnicki* Willmann, 1928
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (frecuente) y Mongolia.
- *Punctoribates (P.) sibiricus* Grishina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Punctoribates (P.) sphaericus* Shaldybina, 1987
(?=*Punctoribates pragensis* Winkler, 1957 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (excepto Este).
- *Punctoribates (P.) torii* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Punctoribates (P.) tschernovi* Shtanchaeva *et* Subías, 2014
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Punctoribates (Minguezetes) Subías, Kahwash *et* Ruiz, 1990 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Minguezetes conjunctus* Subías, Kahwash *et* Ruiz, 1990
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Punctoribates (Minguezetes) conjunctus* (Subías, Kahwash *et* Ruiz, 1990) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Punctoribates (Minguezetes) hexagonus* Berlese, 1908 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental meridional y Neártica septentrional), Vietnam y Zambia.
- *Punctoribates (Minguezetes) inecola* (Nozaki *et* Nakamura, 2004) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Punctoribates (Minguezetes) insignis* Berlese, 1910 (*P.*)
(=*Punctoribates hygrophilus* Mihelčič, 1957)
(=*Punctoribates manzanoensis* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Etiópica) y subtropical.
- *Punctoribates (Minguezetes) longiporosus* Balogh, 1963 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Madagascar), Noreste de China, Oriental y Méjico.
- *Punctoribates (Minguezetes) palustris* (Banks, 1895) (*Oribata*)
(=*Galumna armipes* Banks, 1906)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Neártica (frecuente) y Paleártica occidental (Italia y Cáucaso).
- *Punctoribates (Minguezetes) weigmanni* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2008 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Misuri, y Canadá).

Punctoribates (Semipunctoribates) Mahunka, 1987 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Semipunctoribates hungaricus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Punctoribates (Semipunctoribates) astrachanicus* Shaldybina, 1973 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa suroriental.
- *Punctoribates (Semipunctoribates) hungaricus* (Mahunka, 1987) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Punctoribates (Semipunctoribates) zachvatkini* Shaldybina, 1969 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Mongolia).

Tutorozetes Hammer, 1967 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tutorozetes termophilus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Austral (Australiana y Neotropical).
- *Tutorozetes incisirostris* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Tutorozetes termophilus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania).

Zachvatkinibates Shaldybina, 1973 (19 spp.)
ESPECIE TIPO: *Zachvatkinibates nemoralis* Shaldybina, 1973
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Zachvatkinibates (Zachvatkinibates) Shaldybina, 1973 (17 spp.)
(=***Eupunctoribates*** Hammer, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Zachvatkinibates (Z.) anoporosus* (Mahunka, 2006) (*Schweizerzetes*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Zachvatkinibates (Z.) conjunctus* Shaldybina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Zachvatkinibates (Z.) eoeryi* (Mahunka, 1972) (*Punctoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (Croacia y Portugal).
- *Zachvatkinibates (Z.) epiphytos* Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2001
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Zachvatkinibates (Z.) erimo* Shimano *et* Aoki, 2019
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Zachvatkinibates (Z.) humectus* (Hull, 1915) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Zachvatkinibates (Z.) latilamellatus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Zachvatkinibates (Z.) lobatus* (Hammer, 1977) (*Eupunctoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Zachvatkinibates (Z.) maritimus* Shaldybina, 1973

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Este de Paleártica oriental, Cáucaso y Neártica septentrional).
- *Zachvatkinibates (Z.) mongolicus* Bayartogtokh, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Zachvatkinibates (Z.) nemoralis* Shaldybina, 1973
DISTRIBUCIÓN: Asia central.
- *Zachvatkinibates (Z.) nortoni* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2005
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Zachvatkinibates (Z.) quadrivertex* (Halbert, 1920) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental, Paleártica oriental (I. Kuriles) y Neártica septentrional.
- *Zachvatkinibates (Z.) schatzi* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2005
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Zachvatkinibates (Z.) shaldybinae* Behan-Pelletier *et* Eamer, 2005
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Zachvatkinibates (Z.) tetrasklerosis* Behan-Pelletier, 1988
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Zachvatkinibates (Z.) volgini* Shaldybina, 1973
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Zachvatkinibates (Alpizetes) Mahunka, 2001 (2 spp.)
(=***Schweizerzetes*** Mahunka, 2001)
ESPECIE TIPO: *Alpizetes behanae* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Zachvatkinibates (Alpizetes) behanae* (Mahunka, 2001) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Zachvatkinibates (Alpizetes) perlongus* (Balogh, 1959) (*Punctoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Zetomotrichoidea Grandjean, 1934

Zetomotrichidae Grandjean, 1934 (10 gen., 3 subgen., 42 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Anoplozetes Lee *et* Pajak, 1987 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Anoplozetes jamiesoni* Lee *et* Pajak, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Anoplozetes jamiesoni* Lee *et* Pajak, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Demisalto Coetzee, 1993 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Demisalto engelbrechti* Coetzee, 1993
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Demisalto (Demisalto) Coetzee, 1993 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Demisalto (D.) engelbrechti* Coetzee, 1993
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).

Demisalto (Saltatrichus) Coetzee, 1993 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Saltatrichus magnus* Coetzee, 1993
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Demisalto (Saltatrichus) louiseae* (Ermilov, Hugo-Coetzee, Khaustov *et* Theron, 2019) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Demisalto (Saltatrichus) magnus* (Coetzee, 1993) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Zambia).
- *Demisalto (Saltatrichus) marshalli* (Coetzee, 1995) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Demisalto (Saltatrichus) minus* (Coetzee, 1993) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Demisalto (Saltatrichus) robustus* (Coetzee, 1993) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Floritrichus Coetzee, 2003 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Floritrichus louisbothai* Coetzee, 2003
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Floritrichus louisbothai* Coetzee, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Ghilarovus Krivolutsky, 1966 (16 spp. y 1 ssp.)
(=***Desertozetes*** Khanbekyan, 1990)
ESPECIE TIPO: *Ghilarovus humeridens* Krivolutsky, 1966
DISTRIBUCIÓN: Subtropical (excepto Etiópica).
- *Ghilarovus armenicus* Khanbekyan, 1990
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ghilarovus changlingensis* Wen, 1990
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Ghilarovus daliensis* Yamamoto *et* Aoki, 2000

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Ghilarovus elegans* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
Ghilarovus hispanicus Subías *et* Pérez-Íñigo, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Ghilarovus hispanicus hispanicus* Subías *et* Pérez-Íñigo, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (España, Cáucaso e Irán).
- *Ghilarovus hispanicus guadarramicus* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ghilarovus humeridens* Krivolutsky, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Ghilarovus khentiicus* Bayartogtokh *et* Smelyansky, 2007
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ghilarovus krivolutskyi* Bayartogtokh *et* Smelyansky, 2007
DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
- *Ghilarovus kvavadzei* Murvanidze, 2014
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ghilarovus metsamoricus* (Khanbekyan, 1990) (*Desertozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ghilarovus mongolicus* Bayartogtokh *et* Smelyansky, 2007
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ghilarovus robinsoni* Behan-Pelletier *et* Knee, 2019
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Arkansas).
- *Ghilarovus sanukiensis* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ghilarovus saxicola* Aoki *et* Hirauchi, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ghilarovus stipatus* Krivolutsky *et* Smelyanski, 1997
DISTRIBUCIÓN: Asia centooccidental.
- *Ghilarovus turcmenicus* Krivolutsky, 1974
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Mabulatrichus Coetzee, 1993 (5 spp.)
(=***Hungaromotrichus*** Mahunka, 1993)
ESPECIE TIPO: *Mabulatrichus dentatus* Coetzee, 1993
DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional y Etiópica).
- *Mabulatrichus baloghi* (Mahunka, 1993) (*Hungaromotrichus*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Mabulatrichus dentatus* Coetzee, 1993
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mabulatrichus iranicus* Akarmi *et* Coetzee, 2007
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Mabulatrichus kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Mabulatrichus litoralis* Aoki *et* Hirauchi, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Mikizetes Hammer, 1958 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mikizetes diamantensis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Paleártica meridional.

Mikizetes (Mikizetes) Hammer, 1958 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mikizetes (M.) diamantensis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Mikizetes (M.) flagellifer* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile).

Mikizetes (Oglasacarus) Bernini, 1979 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oglasacarus oglasae* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Mikizetes (Oglasacarus) oglasae* (Bernini, 1979) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

Pallidacarus Krivolutsky, 1975 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pallidacarus tichomirovae* Krivolutsky, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Pallidacarus tichomirovae* Krivolutsky, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sur de Rusia europea y Asia centrooccidental).

Rohria Balogh *et* Mahunka, 1977 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Rohria pulchella* Balogh *et* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rohria pulchella* Balogh *et* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Turkmenitrichus Krivolutsky *et* Karppinen, 2006 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Turkmenitrichus caverniculus* Krivolutsky *et* Karppinan, 2006
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Turkmenitrichus caverniculus* Krivolutsky *et* Karppinan, 2006
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Zetomotrichus Grandjean, 1934 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Zetomotrichus lacrimans* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).

Zetomotrichus (Zetomotrichus) Grandjean, 1934 (6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Zetomotrichus (Z.) bidentatus* Hammer, 1977 (*Z. lacrimans b.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Zetomotrichus (Z.) kenyaensis* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Zetomotrichus (Z.) lacrimans* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y tropical: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía), Filipinas y Cuba.
- *Zetomotrichus (Z.) lienhardi* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Zetomotrichus (Z.) linearis* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Zetomotrichus (Z.) persicus* Akrami *et* Behmanesh, 2013
DISTRIBUCIÓN: Irán.

Zetomotrichus (Keralotrichus) Mahunka, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Keralotrichus plumosus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Zetomotrichus (Keralotrichus) plumosus* (Mahunka, 1985) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Oripodoidea Jacot, 1925

Drymobatidae Balogh *et* P. Balogh, 1984 (2 gen., 1 subgen. y 8 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Drymobates Grandjean, 1930 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Drimobates silvicola* Grandjean, 1930
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Drymobates silvicola* Grandjean, 1930
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Perú).

Drymobatoides Jacot, 1936 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Drymobatoides mauritius* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Drymobatoides (Drymobatoides) Jacot, 1936 (4 spp.)
(=***Pelokylla*** Adolph *et* Haq, 1982)
(=***Seychellozetes*** Mahunka, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Drymobatoides (D.) benoiti* (Mahunka, 1984) (*Seychellozetes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Drymobatoides (D.) boronganensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Drymobatoides (D.) malabaricus* (Adolph *et* Haq, 1982) (*Pelokylla*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Drymobatoides (D.) mauritius* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

Drymobatoides (Rykella) Balogh, 1962 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rykella insignis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Drymobatoides (Rykella) asiatica* (Yamamoto *et* Aoki, 2000) (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Drymobatoides (Rykella) elamellata* (Berlese, 1916) (*Podoribates*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Drymobatoides (Rykella) insignis* (Balogh, 1962) (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Mochlozetidae Grandjean, 1960 (10 gen., 3 subgen., 74 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Dynatozetes Grandjean, 1960 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dynatozetes amplus* Grandjean, 1960
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.
- *Dynatozetes amplus* Grandjean, 1960

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Dynatozetes hexaporosus* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Dynatozetes magnus* (Banks, 1895) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica nororiental y Ecuador.
- *Dynatozetes obesus* Grandjean, 1960
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Gephyrazetes Hirauchi, 1999 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Gephyrazetes fasciatus* Hirauchi, 1999
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Paleotropical.

Gephyrazetes (Gephyrazetes) Hirauchi, 1999 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Paleotropical.
- *Gephyrazetes (G.) fasciatus* Hirauchi, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Taiwán [Formosa] y China suroriental).
- *Gephyrazetes (G.) umukusumae* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.

Gephyrazetes (Oligogephyrazetes) Subías, 2019 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Gephyrazetes ndrii* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Gephyrazetes (Oligogephyrazetes) ndrii* Ermilov, 2018 (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.

Mahunkazetes Balogh *et* P. Balogh, 1992 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mochlozetes africanus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Mahunkazetes africanus* (Mahunka, 1988) (*Mochlozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Méjico.
- *Mahunkazetes longicuspis* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Podoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Mochlobates Norton, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata affinis* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Mochlobates affinis* (Banks, 1895) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.

Mochloribatula Mahunka, 1979 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mochloribatula multiporosa* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Mochloribatula bahamensis* Norton, 1983
(=*Mochloribatula calycifera* Mahunka, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y U.S.A. meridional
- *Mochloribatula depilis* (Ewing, 1909) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Mochloribatula floridana* (Banks, 1904) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Mochloribatula grandjeani* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Mochloribatula metzi* Norton, 1983
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Mochloribatula multiporosa* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Antillas e I. Galápagos, y Paleártica oriental (Irán).
- *Mochloribatula texana* (Ewing, 1909) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).

Mochlozetes Grandjean, 1930 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mochlozetes penetrabilis* Grandjean, 1930
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Etiópica) y subtropical.
- *Mochlozetes asculpturatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mochlozetes chambrieri* Mahunka, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Indonesia: Lombok).
- *Mochlozetes flatus* Grandjean, 1930
DISTRIBUCIÓN: Panamá.
- *Mochlozetes grandis* Wang *et* Lu, 1996
(=*Mochlozetes grandis* Lu *et* Wang, 1996, *nom. praeoc.* por Wang *et* Lu, 1996)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Mochlozetes maximus* (Ewing, 1908) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. central.
- *Mochlozetes officiosus* Grandjean, 1930
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Mochlozetes penetrabilis* Grandjean, 1930
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical, Península Malaya y Nueva Caledonia) y Japón.

- *Mochlozetes ryukyuensis* Aoki, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Mochlozetes saltaensis* Alzuet, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Nesiotizetes Jacot, 1934 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Nesiotizetes adamsoni* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Nesiotizetes adamsoni* Jacot, 1934
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).

Podoribates Berlese, 1908 (15 spp. y 1 ssp.)
(=***Cardioribates*** Jacot, 1934)
(=***Falsolobozetes*** Tseng,1984)
(=***Sphaerobates*** Sellnick, 1928)
ESPECIE TIPO: *Oribata longipes* Berlese, 1887
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Podoribates artilamellatus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Podoribates cuscensis* (Hammer, 1961) (*Sphaerobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Podoribates cuspidatus* Sakakibara *et* Aoki, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Podoribates foveolatus* (Hammer, 1958) (*Sphaerobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Podoribates glaber* (Berlese, 1916) (*Sphaerozetes (Trichoribates)*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

Podoribates javensis (Willmann, 1932) (*Sphaerobates*)
DISTRIBUCIÓN: Java y Sudáfrica.
- *Podoribates javensis javensis* (Willmann, 1932)
  DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Podoribates javensis africanus* Jacot, 1940
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Podoribates laneus* (Tseng, 1984) (*Falsolobozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Podoribates longipes* (Berlese, 1887) (*Oribata*)
  (=*Sphaerozetes gratus* Sellnick, 1921)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Asia central rusa y Canadá).
- *Podoribates minusculus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Podoribates oriformis* (Pearce, 1910) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Podoribates platensis* Berlese, 1916 (*P. longipes p.*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina y Mongolia.
- *Podoribates pratensis* (Banks, 1895) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Podoribates rectus* Berlese, 1916
  DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Podoribates turgidus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Norte).

Unguizetes Sellnick, 1925 (22 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata sphaerula* Berlese, 1905
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Unguizetes (Unguizetes) Sellnick, 1925 (21 spp.)
(=***Terrazetes*** Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Unguizetes (U.) acutirostris* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Unguizetes (U.) asiaticus* Ermilov *et* Anichkin, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Ceilán [Sri Lanka]).
- *Unguizetes (U.) atypicus* (Mahunka, 1982) (*Mochlozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Unguizetes (U.) cattienensis* Ermilov *et* Anichkin, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Península Malaya).
- *Unguizetes (U.) clavatus* Aoki, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Este de Paleártica oriental.
- *Unguizetes (U.) curypterus* Wen *et* Zhao, 1994
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Unguizetes (U.) ermilovi* Seniczak, Kaczmarek *et* A. Seniczak, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Unguizetes (U.) granulatus* Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2006
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Unguizetes (U.) incertus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Uracrobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Unguizetes (U.) inermis* Mahunka, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Indonesia: Lombok).
- *Unguizetes (U.) keralensis* (Balakrishnan, 1989) (*Terrazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Unguizetes (U.) latus* Ermilov *et* Anichkin, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Unguizetes (U.) longiporosus* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Terrazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Unguizetes (U.) mauritius* (Jacot, 1936) (*Terrazetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio) e India (Tripura).
- *Unguizetes (U.) paraincertus* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Unguizetes (U.) reticulatus* Wallwork, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo) y Arabia Saudita.
- *Unguizetes (U.) setiger* (Balogh *et* Mahunka, 1978) (*Uracrobates*)
  (=*Podoribates brasiliensis* Mahunka, 1983)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Unguizetes (U.) similis* Mahunka, 1998
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Ecuador).
- *Unguizetes (U.) sphaerula* (Berlese, 1905) (*Oribata*)
  (=*Unguizetes triplicatulus* Grandjean, 1960)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Japón.
- *Unguizetes (U.) striatus* Fujikawa, 2004
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Unguizetes (U.) yemeniticus* Mahunka, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Yemen y Costa de Marfil).

Unguizetes (Calugarella) Balogh *et* P. Balogh, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Unguizetes sabahnus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Unguizetes (Calugarella) sabahnus* Mahunka, 1987 (*U.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Uracrobates Balogh *et* Mahunka, 1967 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Uracrobates magniporosus* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Uracrobates (Uracrobates) Balogh *et* Mahunka, 1967 (6 spp.)
(=***Urobates*** Hammer, 1973)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Uracrobates (U.) africanus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Méjico.
- *Uracrobates (U.) indicus* Ramani *et* Haq, 1990
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala y Arunachal Pradesh).
- *Uracrobates (U.) magniporosus* Balogh *et* Mahunka, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: Vietnam y Taiwán [Formosa].
- *Uracrobates (U.) masneri* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Uracrobates (U.) mayottensis* Ermilov *et* Mary, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Malgache: I. Comores.
- *Uracrobates (U.) pygiseta* (Hammer, 1973) (*Urobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.

Uracrobates (Parauracrobates) Ermilov *et* Martens, 2015 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Uracrobates (Parauracrobates) truncatus* Ermilov *et* Anichkin, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Uracrobates (Parauracrobates) newtaipeiensis* Ermilov *et* Liao, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Uracrobates (Parauracrobates) truncatus* Ermilov *et* Martens, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.

Oribatulidae Thor, 1929 (16 gen., 6 subgen., 205 spp. y 6 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Capilloppia Balogh *et* Mahunka, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Capilloppia capillata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Capilloppia capillata* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Capilloppia hessei* (Jacot, 1940) (*Oribatula*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Gerloubia Coetzer, 1968 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eporibatula bicuspidata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional y tropical (excepto Australiana).

Gerloubia (Gerloubia) Coetzer, 1968 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.
- *Gerloubia (G.) chinensis* Aoki *et* Yamamoto, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gerloubia (G.) saifulmalukensis* Hammer, 1977
(=*Liebstadia khugniensis* Bayartogtokh, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Ibérica y Paleártica oriental meridional).

Gerloubia (Baobabula) Mahunka, 1975 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Baobabula mussardi* Mahunka, 1975
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Gerloubia (Baobabula) mussardi* Mahunka, 1975 (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.

Gerloubia (Monophauloppia) P. Balogh, 1988 (3 spp.)
(=***Fuerteventuria*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996)
ESPECIE TIPO: *Paraphauloppia (Monophauloppia) planissima* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional y Neotropical.
- *Gerloubia (Monophauloppia) bicuspidata* (Hammer, 1958) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina y U.S.A. (California).
- *Gerloubia (Monophauloppia) hispanica* Subías, 1977 (*G.*)
(=*Liebstadia ahumerata* Mahunka, 1987)
(=*Fuerteventuria mirabilis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Gerloubia (Monophauloppia) planissima* (P. Balogh, 1988) (*Paraphauloppia (M.)*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Grandjeania Balogh, 1963 (1 sp.)
(=***Grandjeanella*** Balogh, 1961, *nom. praeoc.* por Southcott, 1961)
ESPECIE TIPO: *Grandjeanella bicaudata* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Grandjeania bicaudata* (Balogh, 1961) (*Grandjeanella*)
DISTRIBUCIÓN: Angola y Pequeñas Antillas.

Jornadia Wallwork *et* Weems, 1984 (4 spp.)
(=***Woolleybates*** Balogh *et* P. Balogh, 1984)
ESPECIE TIPO: *Jornadia larreae* Wallwork *et* Weems, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neártica subtropical y Neotropical.
- *Jornadia altimontanoides* (Hammer, 1958) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Jornadia dactyloscopica* (Balogh *et* Mahunka, 1968) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral e Irán.
- *Jornadia larreae* Wallwork *et* Weems, 1984
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Jornadia longipilis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Lucoppia Berlese, 1908 (3 spp.)
(=***Romanobates*** Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1970)
ESPECIE TIPO: (*Zetes lucorum* Koch *sensu* Berlese, 1892) =*Notaspis burrowsi* Michael, 1890
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Lucoppia burrowsi* (Michael, 1890) (*Notaspis*)
(=*Zygoribatula apletosa* Higgins *et* Woolley, 1975)
(=*Phauloppia banksi* Marshall, Reeves *et* Norton, 1987)
(=*Zygoribatula longiseta* Golosova, 1970)
(=*Romanobates maiensis* Choi, 1995)
(=*Lucoppia orientalis* Djaparidze, 1985)
(=*Notaspis pectinata* Hall, 1912, *nom. praeoc.* por Michael, 1885)
(=*Scutovertex pilosus* Banks, 1895)
(=*Eremaeus sanremensis* Oudemans, 1900)
(=*Zygoribatula spinosissima* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Paleártica oriental y Neártica) y tropical (China suroriental y Hawái).
- *Lucoppia feideri* Subías, 2010
(=*Romanobates reticulatus* Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1970, *nom. praeoc.* por Willmann, 1933)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Chile.
- *Lucoppia nicora* Djaparidze, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Lunoribatula Mahunka, 1982 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Lunoribatula polygonata* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Lunoribatula polygonata* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía y Chile.

Megatrichobates Grobler, 2000 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Megatrichobates striatus* Grobler, 2000
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Megatrichobates longisetosus* Grobler, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Megatrichobates smithersi* (Jacot, 1940) (*Oribatula*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Megatrichobates striatus* Grobler, 2000
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Neolucoppia Tseng, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Neolucoppia luculenta* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Neolucoppia luculenta* Tseng, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Oribatula Berlese, 1896 (133 spp. y 6 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis tibialis* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Oribatula (Oribatula) Berlese, 1896 (35 spp. y 3 sspp.)
(=***Ceroribatula*** Lee *et* Birchby, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Oribatula (O.) acuminata* Wallwork, 1964
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad).
- *Oribatula (O.) angustolamellata* Iordansky, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Oribatula (O.) arboricola* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999
  DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Oribatula (O.) colemani* Franklin, Norton *et* Crossley jr., 2008 (*O. (Zygoribatula)*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
- *Oribatula (O.) elegantissima* Balogh *et* Mahunka, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Oribatula (O.) elegantula* (Schweizer, 1956) (*Trhypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Oribatula (O.) exsudans* Travé, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Oribatula (O.) franklinensis* Ermilov, Hugo-Coetzee, Khaustov *et* V. Khaustov, 2021
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribatula (O.) incerta* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribatula (O.) incompleta* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Oribatula (O.) incrustata* (Lee *et* Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Oribatula (O.) interrupta (Willmann, 1939) (*Zygoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional) y Etiopía.
- *Oribatula (O.) interrupta interrupta* (Willmann, 1939)
  (=*Zygoribatula bulanovae* Kulijev, 1961)
  (=*Oribatula divida* Mahunka, 1987)
  (=*Zygoribatula eucalla* Wen *et* S. Zhang, 1988)
  (=*Oribatula parisi* Travé, 1961)
  (=*Oribatula sitnikovae* Iordansky, 1991)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional) y Etiopía.
- *Oribatula (O.) interrupta major* Mihelčič, 1963
  (=*Oribatula robusta* Iordansky, 1991)
  (=*Zygoribatula saxicola* Kunst, 1959, *nom. praeoc.* por Halbert, 1920)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).

- *Oribatula (O.) kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribatula (O.) latirostris* (Schweizer, 1956) (*Hypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
  (no *Oribatula latirostris* Willmann, 1951, =*Paraphauloppia latirostris*)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Oribatula (O.) longelamellata* Schweizer, 1956
  DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Oribatula (O.) macrorostrum* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Oribatula (O.) macrostega* Iturrondobeitia, 1985
  (=*Oribatula longilamellata* Subías, 1977, *nom. praeoc.* por Schweizer, 1956)
  (?=*Eporibatula nodifer* Mihelčič, 1956 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribatula (O.) megaforamina* (Lee *et* Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (O.) mesosetosa* (Lee *et* Birchby, 1991) (*Fovoribatula*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (O.) nativa* Tseng, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Oribatula (O.) nayoroensis* Fujita *et* Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribatula (O.) neonominata* Subías, 2004
(=*Oribatula dentata* Mihelčič, 1969, *nom. praeoc.* por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Oribatula (O.) nivalis* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Oribatula (O.) pannonica* Willmann, 1949
(=*Oribatula tenella* Mihelčič, 1956)
(=*Oribatula tenella longipilus* Mihelčič, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Oribatula (O.) polytuberculata* Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Orobitg, 2012
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Oribatula (O.) praeoccupata* Subías, 2004
(=*Oribatula dentata* Grobler *et* Skubala, 2000, *nom. praeoc.* por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribatula (O.) repetita* Subías, 2004
(=*Oribatula lineata* Bayartogtokh *et* Aoki, 1997, *nom. praeoc.* por Hammer, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oribatula (O.) rotundata* Thor, 1937 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Oribatula (O.) runcinata* Lee, 1992
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (O.) tablasoti* (Schweizer, 1956) (*Trhypochthonius*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.

Oribatula (O.) tibialis (Nicolet, 1855) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, India (Sikkim) y Norte de Neotropical.
- *Oribatula (O.) tibialis tibialis* (Nicolet, 1855)
(=*Oribatula affinis* Hull, 1914)
(=*Oribatula coggii* Jacot, 1929)
(=*Oribata crassipes* L. Koch, 1879)
(=*Notaspis exilis maculatus* Schweizer, 1922)
(=*Oribatula tibialis azerbeidjanica* Kulijev, 1962)
(=*Oribatula tibialis sardoa* Berlese, 1916)
(=*Oribatula (Zygoribatula) transitans* Berlese, 1916)
(=*Oribatula unica* Golosova *et* Karppinen, 1985)
(=*Oribatula venusta* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), India (Sikkim) y Norte de Neotropical.
- *Oribatula (O.) tibialis amblyptera* Berlese, 1916 (*O. a.*)
(=*Oribatula alpina* Schweizer, 1956)
(=*Oribatula commutata* Iordansky, 1991)
(?=*Notaspis minuta* Ewing, 1909 *sp. inq.*)
(?=*Liacarus minutus* Ewing, 1909 *sp. inq.*)
(?=*Oribatula pallida* Banks, 1906 *sp. inq.*)
(= *Oribatula saljanica* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Holartica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Neártica).
- *Oribatula (O.) tibialis caliptera* Berlese, 1902 (*O. c.*)
(=*Oribatula beccus* Djaparidze, 1990)
(=*Oribatula intermedia* Mihelčič, 1969)
(=*Oribatula tibialis alata* Iordansky, 1991, *nom. praeoc.* por Mihelčič, 1956)
(=*Oribatula tibialis allifera* Subías, 2000)
(=*Zygoribatula vera* Bulanova-Zachvatkina, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Mediterránea, Irán y Neártica septentrional).

- *Oribatula (O.) torrijosi* Subías, Ruiz *et* Kahwash, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Oribatula (O.) translineata* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Irán.
- *Oribatula (O.) variaporosa* Iordansky, 1991
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Oribatula (O.) zhangi* Wang *et* Cui, 1996
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Oribatula (Zygoribatula) Berlese, 1916 (98 spp. y 3 sspp.)
(=***Fovoribatula*** Lee *et* Birchby, 1991)
(=***Neoribatula*** Ewing, 1917)
(=***Zetobelba*** Hull, 1916)
ESPECIE TIPO: *Oribatula connexa* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Oribatula (Zygoribatula) aegyptica* (Abd-el-Hamid, Al-Assiuty *et* Trrad, 1982) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Oribatula (Zygoribatula) agaveae* (Aoki *et* Wang, 1986) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) andrianovae* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sureste de Europa y Mongolia).
- *Oribatula (Zygoribatula) arcuata* (Hammer, 1977) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Oribatula (Zygoribatula) arcuatissima* Berlese, 1916
(=*Zygoribatula concinna* Iordansky, 1990)
(=*Zygoribatula trigonella* Bulanova-Zachvatkina, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Sur de Europa).
- *Oribatula (Zygoribatula) baloghi* (Mahunka, 1986) (*Z.*)
(=*Zygoribatula koki* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
(=*Zygoribatula undulata* Balogh, 1966, *nom. praeoc.* por Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Tanzania).
- *Oribatula (Zygoribatula) beloniensis* (Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2004) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Oribatula (Zygoribatula) bizygata* (Lee *et* Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) bonairensis* (Willmann, 1936) (*Z.*)
(=*Zygoribatula heterotricha* Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Malgache (I. Mauricio) y Holártica: U.S.A. (Tejas) e Irán.
- *Oribatula (Zygoribatula) brevisetosa* (Ewing, 1909) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Oribatula (Zygoribatula) capitata* (Banks, 1910) (*Liacarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. central.
- *Oribatula (Zygoribatula) caspica* Shtanchaeva, Grikurova *et* Subías, 2011
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribatula (Zygoribatula) clavata* Ewing, 1917 (*O.*)
(?=*Hoploderma capitata* Hall, 1911 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Oribatula (Zygoribatula) clavatotrichobothria* (Kulijev, 1962) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribatula (Zygoribatula) cognata* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*)
(=*Zygoribatula diversa* Mihelčič, 1956)
(=*Oribatula (Zygoribatula) socia* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Oribatula (Zygoribatula) concolor* (Banks, 1895) (*Scutovertex*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.

Oribatula (Zygoribatula) connexa Berlese, 1904 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Sudáfrica y Méjico.
- *Oribatula (Zygoribatula) connexa connexa* Berlese, 1904
(=*Zygoribatula sayedi* Elbadry *et* Nasr, 1974)
(=*Zygoribatula tritici* Elbadry *et* Nasr, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribatula (Zygoribatula) connexa substriata* (Grobler *et* Kok, 1993) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Oribatula (Zygoribatula) contracta* (Grobler, 1994) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribatula (Zygoribatula) cyclosporosa* (Lee, 1992) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) dactylaris* (Subías, Ruiz *et* Kahwash, 1990) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Oribatula (Zygoribatula) dentata* (Balogh, 1958) (*Z.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Oribatula (Zygoribatula) diverseta* (Bose, Mathur, Jain *et* Dogra, 1996) (*Rekharibatula*)
DISTRIBUCIÓN: India (Haryana).
- *Oribatula (Zygoribatula) egelida* (Tseng, 1984) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Oribatula (Zygoribatula) endroedyi* (Mahunka, 1986) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribatula (Zygoribatula) exarata* Berlese, 1916
(=*Oribatula rugifrons* Sellnick, 1943)
(=*Oribatula rugifrons striata* Mihelčič, 1955)
(=*Oribatula rugosa* Kulijev, 1979)
(=*Zygoribatula smirnovi* Bulanova-Zachvatkina, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (frecuente).

Oribatula (Zygoribatula) excavata Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical (austral, Neotropical, Australiana y Paleártica meridional).
- *Oribatula (Zygoribatula) excavata excavata* Berlese, 1916
(?=*Notaspis bisignata* Coggi, 1898 *sp. inq.*)
(=*Zygoribatula magna* Ramsay, 1966)
(=*Zygoribatula striatissima* Hammer, 1962)
(=*Zygoribatula terricola* Hammen, 1952)
(=*Zygoribatula trichosa* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical (Paleártica meridional, Neotropical: América austral y Brasil, y Australiana: Australia y Nueva Zelanda).
- *Oribatula (Zygoribatula) excavata ucrainica* (Iordansky, 1990) (*Z. terricola u.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).

Oribatula (Zygoribatula) exilis (Nicolet, 1855) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica e I. Santa Helena.
- *Oribatula (Zygoribatula) exilis exilis* (Nicolet, 1855)
(=*Dameosoma jugorum* Hull, 1914)

(=*Oribatula (Zygoribatula) lineola* Berlese, 1916)
(=*Zygoribatula zicsii* Bayoumi, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) e I. Santa Helena.
- *Oribatula (Zygoribatula) exilis spherisensilla* (Djaparidze, 1985) (*Z. s.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Oribatula (Zygoribatula) floridana* (Fritz, 1982) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: U.S.A. (Florida) y Méjico.
- *Oribatula (Zygoribatula) frisiae* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)
(=*Zygoribatula debilitranslamellata* Kulijev, 1962)
(=*Zygoribatula frisiae insularis* Travé, 1961)
(=*Notaspis pyrostigmata* Ewing, 1909)
(=*Zygoribatula tenuelamellata* Mihelčič, 1956)
(=*Oribatula variabilis* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica meridional).
- *Oribatula (Zygoribatula) fusca* (Ewing, 1913) (*Notaspis pyrostigmata f.*)
(=*Zygoribatula rostrata* Jacot, 1938)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. nororiental y "Canadá").
- *Oribatula (Zygoribatula) galula* (Mahunka, 2001) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Oribatula (Zygoribatula) glabra* (Michael, 1890) (*Notaspis*)
(=*Oribatula (Zygoribatula) angulata* Berlese, 1916)
(=*Zygoribatula kelbadjarica* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Oribatula (Zygoribatula) globosa* (Mahunka, 2000) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Yemen.
- *Oribatula (Zygoribatula) gozmanyi* (Mahunka, 1980) (*Z.*)
(?=*Notaspis aequalis* Michael, 1890 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Oribatula (Zygoribatula) gracilata* (Grobler *et* Kok, 1993) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía) e India (Bengala Occidental).
- *Oribatula (Zygoribatula) grandjeani* (Nawar *et* El-Borolossy, 1993) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Oribatula (Zygoribatula) granulata* (Kunst, 1958) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) gratiosa* (Tseng, 1984) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Oribatula (Zygoribatula) guadarramica* (E. Pérez-Íñigo, 1978) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribatula (Zygoribatula) hailongensis* (Wen *et* S. Zhang, 1988) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Oribatula (Zygoribatula) heterochaeta* (Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1970) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oribatula (Zygoribatula) hispanica* Subías *et* Arillo, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso).
- *Oribatula (Zygoribatula) iheyaensis* (Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribatula (Zygoribatula) incurva* (Mihelčič, 1969) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Oribatula (Zygoribatula) josefstaryi* Ermilov *et* Rybalov, 2013 (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Oribatula (Zygoribatula) keralensis* (Ramani *et* Haq, 1999) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Oribatula (Zygoribatula) knighti* (Luxton, 1987) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Oribatula (Zygoribatula) lata* (Hammer, 1961) (*Z.*)
(=*Zygoribatula elongata* Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) y Corea.
- *Oribatula (Zygoribatula) lenticulata* (Mínguez *et* Subías, 1986) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y "Etiópica".
- *Oribatula (Zygoribatula) levigata* (Wen *et* Bu, 1988) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Oribatula (Zygoribatula) lineaporosa* (Grobler, 1993) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribatula (Zygoribatula) lineata* (Hammer, 1979) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Oribatula (Zygoribatula) longicuspis* (Balogh, 1966) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Oribatula (Zygoribatula) longilinea* (Wang *et* Li, 1997) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) longisensilla* (Djaparidze, 1985) (*Z.*)
(=*Zygoribatula lanceolata* Grobler, Bayram *et* Cobanoglu, 2004)
(=*Zygoribatula longa* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2010)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) lucida* (Ewing, 1909) (*Liacarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Oribatula (Zygoribatula) mabar* (Mahunka, 2000) (*Z.*)

DISTRIBUCIÓN: Península Arábiga.
- *Oribatula (Zygoribatula) mariana* Aoki, 1994 (*O. acuminata m.*)
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Oribatula (Zygoribatula) mariehammerae* (Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1970) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oribatula (Zygoribatula) marina* (Fujikawa, 1972) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribatula (Zygoribatula) meruensis* (Mahunka, 1969) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Oribatula (Zygoribatula) microporosa* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).
- *Oribatula (Zygoribatula) mongolica* (Bayartogtokh *et* Smeliansky, 2008) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oribatula (Zygoribatula) monozygata* (Lee *et* Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) niliaca* (Bayoumi, 1980) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Oribatula (Zygoribatula) novazealandica* (Hammer, 1967) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribatula (Zygoribatula) obsessa* Subías, 2004
(=*Fovoribatula brevisetosa* Lee *et* Birchby, 1991, *nom. praeoc.* por Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) oceana* (Hammer, 1972) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) e I. Galápagos.
- *Oribatula (Zygoribatula) ornata* (Berlese, 1916) (*Lucoppia*)
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Oribatula (Zygoribatula) hessei* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*) *sp. inq.*
(=*Oribatula (Zygoribatula) oudemansi* Subías, 2010)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Oribatula (Zygoribatula) pennata* (Grobler, 1993) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.
- *Oribatula (Zygoribatula) prima* (Ermilov *et* Anichkin, 2011) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribatula (Zygoribatula) prodorsissima* (Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1970) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oribatula (Zygoribatula) propinqua* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*)
(=*Eremaeus brauni* Sellnick, 1908)
(=*Zygoribatula extremodentata* Kulijev, 1962)
(=*Zygoribatula laubieri* Travé, 1961)
(=*Zygoribatula laubieri canariensis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997)
(=*Zygoribatula laubieri meridionalis* Travé, 1961)
(=*Zygoribatula matritensis* Mihelčič, 1966)
(=*Eremaeus varius* Oudemans *et* Voigts, 1904)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte).
- *Oribatula (Zygoribatula) ruchljadevi* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) sabulosa* (Balogh, 1966) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Oribatula (Zygoribatula) salina* (Balogh, 1966) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Oribatula (Zygoribatula) schauenbergi* (Mahunka, 1978) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Congo y Malgache (I. Mauricio).
- *Oribatula (Zygoribatula) sculpturata* (Mahunka, 1989) (*Phauloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Oribatula (Zygoribatula) semicirculata* (Bayartogtokh *et* Smeliansky, 2008) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Oribatula (Zygoribatula) setosa* Evans, 1953
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Oribatula (Zygoribatula) sharjah* (Mahunka, 2009) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Emiratos Árabes.
- *Oribatula (Zygoribatula) similitricha* Subías, 2010
(=*Zygoribatula robusta* Grobler, 1993, *nom. praeoc.* por Iordansky, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribatula (Zygoribatula) skrjabini* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental: frecuente).
- *Oribatula (Zygoribatula) socotrensis* (Mahunka, 2000) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Yemen.
- *Oribatula (Zygoribatula) subantarctica* (Pletzen *et* Kok, 1971) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Marion).
- *Oribatula (Zygoribatula) talis* (Tseng, 1984) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Oribatula (Zygoribatula) tameya* (Elbadry *et* Nasr, 1974) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Oribatula (Zygoribatula) tenuiseta* (Hammer, 1977) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya e Irán.
- *Oribatula (Zygoribatula) thalassophila* Grandjean, 1935

(=*Oribatula travei* Bernini, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Oribatula (Zygoribatula) tortilis* (Hammer, 1977) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Oribatula (Zygoribatula) trirostrata* (Lee *et* Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) truncata* (Aoki, 1961) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Finlandia y Paleártica oriental) y Noreste de Oriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) undulata* Berlese, 1916
(=*Zygoribatula dubita* Coetzer, 1968)
(=*Zygoribatula heteroporosa* Wallwork, 1972)
(=*Zygoribatula longiporosa* Hammer, 1953)
(=*Zygoribatula tadrosi* Popp, 1960)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical.
- *Oribatula (Zygoribatula) vanharteni* (Mahunka, 2000) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Yemen.
- *Oribatula (Zygoribatula) vegeta* (Tseng, 1984) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Oribatula (Zygoribatula) vicina* (Aoki, 2000) (*Z.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribatula (Zygoribatula) vulgaris* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Z.*)
(=*Zygoribatula hortobagyensis* Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia central rusa).

Ovobates Mahunka, 1994 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Micreremus subnitidus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Ovobates subnitidus* (Berlese, 1913) (*Micreremus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

Paraphauloppia Hammer, 1967 (20 spp.)
ESPECIE TIPO: *Paraphauloppia novaezealandica* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y austral.

Paraphauloppia (Paraphauloppia) Hammer, 1967 (19 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y austral.
- *Paraphauloppia (P.) acutinotata* Lee *et* Birchby, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Paraphauloppia (P.) altimontana* (Hammer, 1958) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (India: Bengala Occidental).
- *Paraphauloppia (P.) australis* (Hammer, 1962) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Paraphauloppia (P.) chilensis* (Covarrubias *et* Toro, 1997) (*Zygoribatula bonairensis c.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Paraphauloppia (P.) cordylinosa* Higgins *et* Woolley, 1975
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Paraphauloppia (P.) endroedyi* (Mahunka, 1985) (*Subphauloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paraphauloppia (P.) fraenzlei* (Balogh *et* Mahunka, 1968) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Paraphauloppia (P.) globata* Lee *et* Birchby, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Paraphauloppia (P.) gracilis* (Hammer, 1958) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Paraphauloppia (P.) lamellata* (Mahunka, 1985) (*Subphauloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paraphauloppia (P.) latirostris* (Willmann, 1951) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Paraphauloppia (P.) magniporosa* (Hammer, 1958) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Paraphauloppia (P.) morenoi* (Hammer, 1962) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Paraphauloppia (P.) novazealandica* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Paraphauloppia (P.) obtusinotata* Lee *et* Birchby, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Paraphauloppia (P.) pisacensis* (Hammer, 1961) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Paraphauloppia (P.) quadrisetosa* (Hammer, 1961) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Paraphauloppia (P.) triforata* Lee *et* Birchby, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Paraphauloppia (P.) variabilis* (Bayartogtokh *et* Aoki, 2000) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Paraphauloppia (Ermilovia) Subías, 2017 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Paraphauloppia reducta* Ermilov *et* Minor, 2016
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Paraphauloppia (Ermilovia) reducta* Ermilov *et* Minor, 2016 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Phauloppia Berlese, 1908 (22 spp.)
(=***Calvoppia*** Jacot, 1934)
(=***Eporibatula*** Sellnick, 1928)
(=***Imparatoppia*** Jacot, 1934)
(?=***Oribata*** Latreille, 1802 *gen. inq.*)
(=***Paraliodes*** Hall, 1911)
(=***Trichoribatula*** Balogh, 1961)
ESPECIE TIPO: (*Oppia conformis* Berlese, 1895) =*Zetes lucorum* Koch, 1841
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Phauloppia adjecta* Aoki *et* Ohkubo, 1974
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Phauloppia boletorum* (Ewing, 1913) (*Lucoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Phauloppia bryani* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phauloppia caudata* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Phauloppia curviseta* (Ewing, 1909) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centroseptentrional.
- *Phauloppia gracilis* Sellnick, 1952
DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.
- *Phauloppia hessei* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Holanda.
- *Phauloppia imparata* (Jacot, 1934) (*Imparatoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phauloppia incomperta* (Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996) (*Zygoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Phauloppia knoepffleri* Travé, 1961
DISTRIBUCIÓN: Francia (Córcega).
- *Phauloppia lucorum* (Koch, 1841) (*Zetes*)
(=*Lucoppia (Phauloppia) asperula* Berlese, 1916)
(=*Oppia berlesei* Leonardi, 1896)
(=*Oppia conformis* Berlese, 1895)
(=*Eremaeus conjunctus* Oudemans, 1902)
(?=*Acarus corticalis* De Geer, 1778 *sp. inq.*)
(=*Phauloppia djaparidzae* Mahunka, 1997)
(?=*Acarus geniculatus* Linnaeus, 1758 *sp. inq.*)
(=*Paraliodes incurvata* Hall, 1911)
(=*Phauloppia longiporosa* Kulijev, 1968)
(=*Eporibatula longiporosa* Pérez-Íñigo, 1976)
(=*Phauloppia longiporosa* Mahunka, 1982, *nom. praeoc.* por Kulijev, 1968)
(=*Phauloppia longiporosa* Djaparidze, 1985, *nom. praeoc.* por Kulijev, 1968)
(=*Liacarus modestus* Banks, 1904)
(=*Eremaeus modestus* Banks, 1910)
(?=*Acarus musci* Schrank, 1781 *sp. inq.*)
(=*Phauloppia ohat* Mahunka, 1997)
(=*Phauloppia saakadzei* Djaparidze, 1985)
(=*Eremaeus schneideri* Oudemans, 1896)
(=*Lohmannia spinosa* Hall, 1911)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica occidental) y Nepal.
- *Phauloppia mitakensis* Suzuki, 1979
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Phauloppia nemoralis* (Berlese, 1916) (*Lucoppia (P.)*)
(=*Phauloppia coineaui* Travé, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Europea (frecuente).
- *Phauloppia perkinsi* (Jacot, 1934) (*Calvoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phauloppia pilosa* (Michael, 1888) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental (excepto Norte) y U.S.A. (Virginia).
- *Phauloppia prominens* (Bayartogtokh *et* Aoki, 1998) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Phauloppia rauschenensis* (Sellnick, 1908) (*Eremaeus*)
(=*Eporibatula gessneri* Willmann, 1931)
(=*Oribatula lucida* Sellnick, 1921)
(=*Phauloppia paspalevi* Csiszár, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Asia central rusa), Méjico y Sudáfrica.
- *Phauloppia sakamorii* (Aoki, 1970) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Phauloppia saxicola* Travé, 1961
(=*Eporibatula tuberosa* Fujikawa, 1972)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Phauloppia sloupensis* (Absolon, 1900) (*Oribata*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Phauloppia tavruei* (Schweizer, 1956) (*Eporibatula*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Phauloppia topali* Balogh *et* Csiszár, 1963
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Phauloppia vallei* Bernini, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
- *Phauloppia xinjiangensis* L. Wang, Zheng, X. Wang, X. Zhang *et* Wen, 1990
  DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Phauloppiella Subías, 1977 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Phauloppiella striata* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Etiópica y Australiana.

Phauloppiella (Phauloppiella) Subías, 1977 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Phauloppiella (P.) glabra* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Phauloppiella (P.) striata* Subías, 1977
  DISTRIBUCIÓN: España.

Phauloppiella (Ausoribula) Lee, 1992 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ausoribula quagesetosa* Lee, 1992
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Etiópica.
- *Phauloppiella* (*Ausoribula*) *bloemfonteinensis* (Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2017) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phauloppiella* (*Ausoribula*) *quagesetosa* (Lee, 1992) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phauloppiella* (*Ausoribula*) *termitophila* (Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2017) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Sellnickia Oudemans, 1927 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: (*Sellnickia heveae* Oudemans, 1927) =*Notaspis caudata* Michael, 1908
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Sellnickia caudata* (Michael, 1908) (*Notaspis*)
  (=*Oribatula caudata* Berlese, 1910, *nom. praeoc.* por Michael, 1908)
  (=*Sellnickia heveae* Oudemans, 1927)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia) y Oriental.

Spinoppia Higgins *et* Woolley, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Spinoppia magniserrata* Higgins *et* Woolley, 1966
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Spinoppia magniserrata* Higgins *et* Woolley, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Subphauloppia Hammer, 1967 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Subphauloppia dentonyx* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Subphauloppia (Subphauloppia) Hammer, 1967 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Subphauloppia (S.) dentonyx* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Subphauloppia (S.) glabra* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

Subphauloppia (Diphauloppia) Balogh *et* P. Balogh, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Subphauloppia luminosa* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Subphauloppia (Diphauloppia) luminosa* Hammer, 1973 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia (I. Tonga) y Nueva Zelanda.

Nesozetidae Balogh *et* P. Balogh, 1984 (1 gen. y 2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Etiópica.

Nesozetes Hammer, 1971 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nesozetes rostropterus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Etiópica.
- *Nesozetes membranus* Ermilov, Hugo-Coetzee, Theron *et* Behan-Pelletier, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Nesozetes rostropterus* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Pseudoppiidae Mahunka, 1975 (4 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Etiópica y Australiana.

Behanpseudoppia Subías, 2017 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Parapirnodus hexaporosus* Behan-Pelletier, Clayton *et* Humble, 2002
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Behanpseudoppia coniferina* (Behan-Pelletier, Clayton *et* Humble, 2002) (*Parapirnodus*)
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Behanpseudoppia hexaporosa* (Behan-Pelletier, Clayton *et* Humble, 2002) (*Parapirnodus*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Pontiobates Luxton, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pontiobates denigratus* Luxton, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Pontiobates denigratus* Luxton, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Pseudoppia Pérez-Íñigo, 1966 (3 spp.)
(=***Micropirnodus*** Weigmann, 2009)
(=***Symphauloppia*** Balogh, 1972)
ESPECIE TIPO: *Lucoppia mediocris* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Pseudoppia interrupta* (Jeleva, 1962) (*Phauloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Etiópica (Congo).
- *Pseudoppia longissima* (Weigmann, 2009) (*Micropirnodus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Pseudoppia mediocris* (Mihelčič, 1957) (*Lucoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).

Senoribula Mahunka, 1975 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Senoribula africana* Mahunka, 1975
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Senoribula africana* Mahunka, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Senegal.

Caloppiidae Balogh, 1960 (6 gen. y 35 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Brassiella Balogh, 1970 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Carabodes reticulatus* Oudemans, 1915) =*Brassiella neonominata* Subías, 2004
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.
- *Brassiella arboricola* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Brassiella brevisetigera* Aoki, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Brassiella neonominata* Subías, 2004
  (=*Carabodes reticulatus* Oudemans, 1915, *nom. praeoc.* por Berlese, 1913)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nueva Guinea).
- *Brassiella penicillifer* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Brassiella taiwanica* Ermilov, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Luissubiasia Ermilov, 2016 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Luissubiasia microporosa* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Luissubiasia microporosa* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Neotrichozetes Travé, 1961 (1 sp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis spinulosa* Michael, 1908
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).
Neotrichozetes spinulosus (Michael, 1908) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania) y Argentina.
- *Neotrichozetes spinulosus spinulosus* (Michael, 1908)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania).
- *Neotrichozetes spinulosus germaineae* Travé, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Reticuloppia Balogh *et* Mahunka, 1966 (2 spp.)
(=***Decoribatula*** Lee *et* Birchby, 1989)
ESPECIE TIPO: *Reticuloppia reticulata* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Reticuloppia pustulata* (Lee *et* Birchby, 1989) (*Decoribatula*)
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Reticuloppia reticulata* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Stelechobates Grandjean, 1965 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Stelechobates megalotrichus* Grandjean, 1965
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Stelechobates brazilianus* P. Balogh, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Stelechobates megalotrichus* Grandjean, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Zetorchella Berlese, 1916 (24 spp.)
(=***Caloppia*** Balogh, 1958)
(=***Chaunoproctellus*** Mahunka, 1992)
(=***Chaunoproctus*** Pearce, 1906, *nom. praeoc.* por Bonaparte, 1850)
(=***Pabulozetes*** Tseng, 1982)
ESPECIE TIPO: *Chaunoproctus cancellatus* Pearce, 1906
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Zetorchella abalai* (Bhaduri, Bhattacharya *et* Chakrabarti, 1975) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Zetorchella amarpurensis* (Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2003) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Zetorchella asperula* (Pearce, 1906) (*Chaunoproctus*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Zetorchella basilewskyi* (Balogh, 1958) (*Caloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Zetorchella cancellata* (Pearce, 1906) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Zetorchella cotedivoirensis* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Zetorchella deleoni* (Higgins, 1966) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: Guyana [Guayana Británica].
- *Zetorchella latior* (Berlese, 1913) (*Oppia*)
  (=*Chaunoproctus clavisetosus* Bhaduri, Bhattacharya *et* Chakrabarti, 1975)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Zetorchella longipilosa* (Mahunka, 1974) (*Caloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Zetorchella longisetosa* (Dhali *et* Bhaduri, 1981) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (India y Nepal).
- *Zetorchella minor* (Balogh, 1958) (*Caloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Sudáfrica) e India.
- *Zetorchella nortoni* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Zetorchella orbiculata* (Wen *et* Zhao, 1994) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Myanmar [Birmania]).
- *Zetorchella orientalis* (Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2003) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Zetorchella pedestris* Berlese, 1916
  (=*Chaunoproctus crinitus* Karppinen, 1966)
  (=*Caloppia papillata* Balogh, 1958)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (frecuente).
- *Zetorchella plumosa* (Tseng, 1982) (*Pabulozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Zetorchella reticulata* (Willmann, 1933) (*Lucoppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Vietnam).
- *Zetorchella rugosa* (Mahunka, 1992) (*Chaunoproctellus*)
  DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Zetorchella sejugata* (Ramani *et* Haq, 1997) (*Caloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Zetorchella semirugosa* (Mahunka, 2011) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Zetorchella sisiri* (Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2003) (*Chaunoproctus*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Zetorchella sottoetgarciai* (Corpuz-Raros, 1979) (*Caloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Japón.
- *Zetorchella taungensis* Ermilov, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Myanmar [Birmania].
- *Zetorchella vargai* (Balogh, 1959) (*Caloppia*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Hemileiidae Balogh *et* P. Balogh, 1984 (8 gen., 10 subgen., 122 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Constrictobates Balogh *et* Mahunka, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Constrictobates lineolatus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Constrictobates lineolatus* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Dometorina Grandjean, 1951 (23 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribatula plantivaga* Berlese, 1895
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Dometorina (Dometorina) Grandjean, 1951 (20 spp. y 3 sspp.)
(=***Cryptozetes*** Hammer, 1962)
(=***Floribates*** Norton *et* Kethley, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).
- *Dometorina (D.) chilensis* (Hammer, 1962) (*Cryptozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Dometorina (D.) crystallina* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Dometorina (D.) elongata* Balogh *et* Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Dometorina (D.) florens* (Berlese, 1908) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Dometorina (D.) inflata* (Berlese, 1916) (*Oribatula (Hemileius)*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Dometorina (D.) lata* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Dometorina (D.) limpida* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Dometorina (D.) malabarica* (Ramani *et* Haq, 1998) (*Siculobata*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Dometorina (D.) marionensis* Pletzen *et* Kok, 1971
DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Dometorina (D.) plantivaga (Berlese, 1895) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).
- *Dometorina (D.) plantivaga plantivaga* (Berlese, 1895)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Neártica, Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Paleártica oriental, Etiópica: Yemen, Oriental y Neotropical: frecuente).
- *Dometorina (D.) plantivaga brasiliana* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1993
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Dometorina (D.) plantivaga insularis* Travé, 1969
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (I. Salvajes).
- *Dometorina (D.) plantivaga saxicola* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Dometorina (D.) platensis* (Berlese, 1916) (*Oribatula (Hemileius) sicula p.*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Dometorina (D.) praedatoria* Lan, Xin *et* Aoki, 1986
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Dometorina (D.) rostrata* Luxton, 1993
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Dometorina (D.) sanpabloensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dometorina (D.) sculpturata* (Mahunka, 1988) (*Aellenobates*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Dometorina (D.) sicata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Dometorina (D.) taiwanica* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Dometorina (D.) tropica* (Balogh, 1958) (*Hemileius*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Dometorina (D.) tuberculata* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Dometorina (D.) usnea* (Norton *et* Palacios-Vargas, 1987) (*Cryptozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical e I. Galápagos.

Dometorina (Siculobata) Grandjean, 1953 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia tibialis sicula* Berlese, 1892
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Dometorina (Siculobata) sicula* (Berlese, 1892) (*Oppia tibialis s.*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Islas del Pacífico, Argentina, Sudáfrica e India (Kerala), y subtropical: Paleártica meridional (Mediterránea, Polonia e Irán).
- *Dometorina (Siculobata) talarica* (Fredes *et* Martínez, 2013) (*D. (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Dometorina (Vesiculobates) Hammer, 1979 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Vesiculobates silvaticus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Dometorina (Vesiculobates) silvatica* (Hammer, 1979) (*V.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).

Exoribatula Jacot, 1936 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Exoribatula biundata* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y subtropical (Holártica meridional).

Exoribatula (Exoribatula) Jacot, 1936 (3 spp.)
(=***Nesoribatula*** Aoki, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Australiana) y subtropical (Neártica meridional).
- *Exoribatula (E.) biundata* Jacot, 1936
(=*Nesoribatula pacifica* Aoki, 1964)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte) y Hawái.
- *Exoribatula (E.) ensifer* (Mahunka, 1983) (*Nesoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Exoribatula (E.) rotunda* (Mahunka, 1988) (*Nesoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Exoribatula (Multoribates) Hammer, 1961 (2 spp.)
(=***Setulobates*** Mahunka, 1984)
ESPECIE TIPO: *Multoribates chavinensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Etiópica y subtropical (Paleártica meridional).
- *Exoribatula (Multoribates) chavinensis* (Hammer, 1961) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Cáucaso.
- *Exoribatula (Multoribates) heterotricha* (Mahunka, 1984) (*Setulobates*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Hemileius Berlese, 1916 (74 spp.)
ESPECIE TIPO: *Protoribates (Scheloribates) initialis* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Hemileius (Hemileius) Berlese, 1916 (28 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Hemileius (H.) biclavulus* Lee, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hemileius (H.) brevilamellatus* (Willmann, 1932) (*Liebstadia*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Hemileius (H.) clavatus* Aoki, 1992
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hemileius (H.) copectus* Lee, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hemileius (H.) dimentmani* Vasiliu *et* Ivan, 1995
DISTRIBUCIÓN: Israel.
- *Hemileius (H.) eperezinigoae* Subías, 2010
(=*Hemileius elongatus* E. Pérez-Íñigo, 1978, *nom. praeoc.* por Krivolutsky, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Mongolia).
- *Hemileius (H.) glaber* (Balogh, 1970) (*Tuberemaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Hemileius (H.) gressitti* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Hemileius (H.) haydeni* (Higgins *et* Woolley, 1975) (*Multoribates*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Hemileius (H.) hierrensis* Pérez-Íñigo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Hemileius (H.) initialis* (Berlese, 1908) (*Protoribates (Scheloribates)*)
(=*Scheloribates confundatus* Sellnick, 1928)
(?=*Zetes gilvulus* Koch, 1841 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A. (Nuevo Méjico), Oriental: Bali, y Neotropical).
- *Hemileius (H.) lagunensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Tuberemaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hemileius (H.) major* (Mahunka, 1985) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Venezuela).
- *Hemileius (H.) microclava* (Hammer, 1961) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hemileius (H.) montanus* (Krivolutsky *et* Grishina, 1970) (*Simkinia*)
(=*Hemileius humeralis* Pérez-Íñigo jr., 1991)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea y Paleártica oriental).
- *Hemileius (H.) muscicola* (Hammer, 1961) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hemileius (H.) nicki* Denmark *et* Woodring, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Hemileius (H.) proximus* (Berlese, 1916) (*Oribatula (H.)*)
(=*Hemileius laticlava* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hemileius (H.) quadripilis* (Fitch, 1856) (*Oribata*)
(=*Oribatula (Hemileius) comatus* Berlese, 1920)
(=*Notaspis nuda* Hall, 1911)
(=*Notaspis pallida* Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Hemileius (H.) rectus* Lee, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hemileius (H.) robustus* Pérez-Íñigo, 1969

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).
- *Hemileius (H.) simplex* (Gervais, 1849) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Hemileius (H.) spirulatus* (Vasiliu *et* Călugăr, 1973) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Hemileius (H.) stefanetfranzorum* (Ermilov, 2018) (*Scheloribates (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hemileius (H.) suramericanus* (Hammer, 1958) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente) y U.S.A. (Kentucky).
- *Hemileius (H.) thujae* Choy *et* Cho, 1995
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Hemileius (H.) translamellatus* Karppinen, 1958
DISTRIBUCIÓN: Finlandia.
- *Hemileius (H.) trichosus* (Hammer, 1958) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Hemileius (Monoschelobates) Balogh *et* Mahunka, 1969 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Monoschelobates parvus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Hemileius (Monoschelobates) foveolatus* (Balogh, 1958) (*Liebstadia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hemileius (Monoschelobates) hemileiformis* (Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hemileius (Monoschelobates) masani* (Ermilov, 2016) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hemileius (Monoschelobates) parvus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hemileius (Monoschelobates) thienemanni* (Willmann, 1932) (*Liebstadia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Polinesia (I. Samoa).

Hemileius (Simkinia) Krivolutsky, 1966 (6 spp.)
(=***Tenuileius*** Lee, 1989)
(=***Turcibates*** Ayyildiz *et* Luxton, 1989)
ESPECIE TIPO: *Simkinia turanica* Krivolutsky, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Australiana.
- *Hemileius (Simkinia) minimus* Lee, 1989 (*H. (Tenuileius)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hemileius (Simkinia) ovalis* Kulijev, 1968 (*H.*)
(=*Hemileius lanceolatus* Bayartogtokh *et* Aoki, 1997)
(=*Turcibates parvus* Ayyildiz *et* Luxton, 1989)
(=*Urubambates perlongus* Vasiliu *et* Călugăr, 1976)
(?=*Dometorina rossica* Bashkirova, 1958 *sp. inq.*)
(=*Urubambates xerophilus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2007)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Hemileius (Simkinia) paratenuis* Lee, 1989 (*H. (Tenuileius)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hemileius (Simkinia) tenuis* Aoki, 1982 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hemileius (Simkinia) tianshanicus* (Krivolutsky, 1971) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Hemileius (Simkinia) turanicus* (Krivolutsky, 1966) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

Hemileius (Tuberemaeus) Sellnick, 1930 (28 spp.)
(=***Anisochthodes*** Newell, 1957)
ESPECIE TIPO: *Tuberemaeus singularis* Sellnick, 1930
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Hemileius (Tuberemaeus) areolatus* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hemileius (Tuberemaeus) asiaticus* (Yamamoto *et* Aoki, 2000) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hemileius (Tuberemaeus) bellissimus* (Hammer, 1971) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Hemileius (Tuberemaeus) deletus* (Hammer, 1979) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Hemileius (Tuberemaeus) dispar* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Hemileius (Tuberemaeus) fissuratus* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Hemileius (Tuberemaeus) formosanus* (Tseng, 1984) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Taiwán [Formosa] y Filipinas).
- *Hemileius (Tuberemaeus) impolita* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Hemileius (Tuberemaeus) indentatus* (Hammer, 1973) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Hemileius (Tuberemaeus) inornatus* (Pérez-Íñigo, 1982) (*T.*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], y Etiopía).
- *Hemileius (Tuberemaeus) lineatus* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Hemileius (Tuberemaeus) longisetosus* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Hemileius (Tuberemaeus) nagaii* (Mahunka, 1988) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hemileius (Tuberemaeus) neonominatus* Subías, 2004
(=*Tuberemaeus punctatus* Balogh, 1970, *nom. praeoc.* por Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Península Malaya.
- *Hemileius (Tuberemaeus) papillifer* (Newell, 1957) (*Anisochthodes*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái y Filipinas.
- *Hemileius (Tuberemaeus) perforatoides* (Hammer, 1979) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Hemileius (Tuberemaeus) perforatus* (Willmann, 1932) (*Liebstadia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas) y Australiana (Polinesia).
- *Hemileius (Tuberemaeus) propinquus* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Hemileius (Tuberemaeus) pseudoareolatus* (Mahunka, 1977) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hemileius (Tuberemaeus) puruczkyi* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hemileius (Tuberemaeus) scrobinus* (Berlese, 1916) (*Oribatula (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Hemileius (Tuberemaeus) sculpturatus* (Mahunka, 1987) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Hemileius (Tuberemaeus) similis* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hemileius (Tuberemaeus) singularis* (Sellnick, 1930) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Este de Paleártica oriental y Hawái.
- *Hemileius (Tuberemaeus) tridactylus* (Balogh, 1959) (*Liebstadia foveolata t.*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Hemileius (Tuberemaeus) tuberculatus* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Hemileius (Tuberemaeus) vanharteni* (Mahunka, 2006) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Salomón).
- *Hemileius (Tuberemaeus) vermiculatus* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

Hemileius (Urubambates) Hammer, 1961 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Urubambates punctatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Neotropical y Etiópica.
- *Hemileius (Urubambates) elongatus* (Krivolutsky, 1969) (*Simkinia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional (frecuente) y Cáucaso.
- *Hemileius (Urubambates) flagellatus* (Mahunka, 1985) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Hemileius (Urubambates) paraguayensis* (Balogh *et* Mahunka, 1981) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Argentina).
- *Hemileius (Urubambates) punctatus* (Hammer, 1961) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hemileius (Urubambates) romanicus* (Vasiliu *et* Călugăr, 1981) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Hemileius (Urubambates) schachtachtinskoi* (Kulijev, 1961) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Hemileius (Urubambates) ueckermanni* (Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2021) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Heteroleius Balogh *et* Mahunka, 1966 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Heteroleius longissimus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.
- *Heteroleius flagellifer* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Heteroleius longissimus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Congo y Filipinas.
- *Heteroleius navicula* (Berlese, 1913) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Heteroleius planus* (Aoki, 1984) (*Symphauloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Mucrobates Balogh *et* Mahunka, 1979 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Mucrobates fissuratus* Balogh *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mucrobates cayoaguaensis* Ermilov *et* Kontschán, 2021
DISTRIBUCIÓN: Panamá.
- *Mucrobates fissuratus* Balogh *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Mucrobates microsetosus* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Nasozetes Sellnick, 1930 (5 spp.)
(=***Kinabaluella*** Mahunka, 1996)
ESPECIE TIPO: *Nasozetes sumatrensis* Sellnick, 1930
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Nasozetes choerognathus* Willmann, 1932
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Filipinas).
- *Nasozetes lienhardi* Mahunka, 2006
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Nasozetes porcella* (Mahunka, 1996) (*Kinabaluella*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Nasozetes stunkardi* Sengbusch, 1957
  DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Filipinas.
- *Nasozetes sumatrensis* Sellnick, 1930
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas) y Australiana (Melanesia: I. Fiji).

Paraleius Travé, 1960 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribella leontonycha* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Paraleius (Paraleius) Travé, 1960 (4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Paraleius (P.) americanus* (Ermilov *et* OConnor, 2020) (*Siculobata (P.)*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Míchigan).
- *Paraleius (P.) leahae* Knee, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Este de Canadá.
- *Paraleius (P.) leontonycha* (Berlese, 1910) (*Oribella*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica y Méjico.
- *Paraleius (P.) trinidadensis* (Ermilov *et* OConnor, 2020) (*Siculobata (P.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Trinidad.

Paraleius (Metaleius) Travé, 1960 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Metaleius strenzkei* Travé, 1960
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Paraleius (Metaleius) strenzkei* (Travé, 1960) (*M.*)
  (?=*Oribatula (Hemileius) sternalis* Berlese, 1916 *sp. inq.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Paraleius (Wallworkiella) Hammer, 1979 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Wallworkiella nasalis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Paraleius (Wallworkiella) nasalis* (Hammer, 1979) (*W.*)
  DISTRIBUCIÓN: Java.

Plumobates Balogh *et* Mahunka, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Plumobates decoratus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Plumobates decoratus* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

Zeascheloribates Luxton, 1982 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Zeascheloribates palustris* Luxton, 1982
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Zeascheloribates palustris* Luxton, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Liebstadiidae Balogh *et* P. Balogh, 1984 (8 gen., 1 subgen., 63 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Angullozetes Hammer, 1967 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Angullozetes rostratus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Angullozetes arilloi* Ermilov, Shtanchaeva *et* Subías, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Angullozetes kahurangiensis* Ermilov *et* Minor, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Angullozetes rostratus* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Areozetes Hammer, 1961 (1 spp.)
ESPECIE TIPO: *Areozetes altimontanus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y subtropical (Paleártica meridional).
- *Areozetes altimontanus* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Perú e I. Canarias.

Cordiozetes Mahunka, 1983 (2 spp.)
(=***Mixoribatula*** Mahunka, 1987)
ESPECIE TIPO: *Cordiozetes clavisetus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).
- *Cordiozetes clavisetus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Chile).
- *Cordiozetes olahi* Mahunka, 1987 (*C. (Mixoribatula)*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Haloribatula Schuster, 1957 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Haloribatula tenareae* Schuster, 1957
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Haloribatula tenareae* Schuster, 1957
DISTRIBUCIÓN: Francia e India (Tripura).

Liebstadia Oudemans, 1906 (15 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis similis* Michael, 1888
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, "Etiópica", Australiana y Neotropical).

Liebstadia (Liebstadia) Oudemans, 1906 (12 spp. y 1 ssp.)
(=***Irinobates*** Krivolutsky *et* Christov, 1970)
(=***Rajskibates*** Balogh *et* P. Balogh, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, "Etiópica" y Australiana).
- *Liebstadia (L.) gallardoi* (Morell, 1987) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Liebstadia (L.) gratiosa* (Vasiliu *et* Călugăr, 1973) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Liebstadia (L.) humerata* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Asia centooccidental y Neártica) y Oriental (Vietnam y Nepal).
- *Liebstadia (L.) longior* (Berlese, 1908) (*Protoribates*)
(=*Protoribates badensis* Sellnick, 1928)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Canadá).
- *Liebstadia (L.) mongolica* Bayartogtokh, 2001
(=*Liebstadia elongata* Bayartogtokh, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Liebstadia (L.) neonominata* Subías, 2004 *sp. inq.*
(=*Oribata monodactyla* Štorkán, 1925, *nom. praeoc.* por Haller, 1884)
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
Liebstadia (L.) pannonica (Willmann, 1951) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y U.S.A. (Carolina del Norte), y Oriental: Vietnam.
- *Liebstadia (L.) pannonica pannonica* (Willmann, 1951)
(=*Protoribates austriacus* Willmann, 1953)
(=*Protoribates divergens* Mihelčič, 1955)
(=*Protoribates novus* Willmann, 1953)
(=*Protoribates variabilis* Rajski, 1958)
(=*Liebstadia willmanni* Miko *et* Weigmann, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y U.S.A. (Carolina del Norte), y Oriental: Vietnam.
- *Liebstadia (L.) pannonica microptera* (Mihelčič, 1957) (*Protoribates*)
(?=*Oribatula alata* Mihelčič, 1956 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Liebstadia (L.) parabadensis* (Kulijev, 1968) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Liebstadia (L.) piligera* Balogh, 1958 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Liebstadia (L.) pilosa* (Krivolutsky *et* Christov, 1970) (*Irinobates*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Liebstadia (L.) similis* (Michael, 1888) (*Notaspis*)
(=*Oribatula anomala* Hull, 1916)
(=*Protoribates serratomarginatus* Mahunka, 1983)
(=*Protoribates silesius* Sellnick, 1925)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente, India (Sikkim) y Nueva Zelanda.
- *Liebstadia (L.) tenuis* (Ayyildiz *et* Luxton, 1989) (*Rajskibates*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Liebstadia (Lagenobates) Weigmann *et* Miko, 2002 (3 spp.)
(=***Pseudoprotoribates*** Weigmann *et* Monson, 2004)
ESPECIE TIPO: *Oribata lagenula* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.
- *Liebstadia (Lagenobates) lagenula* (Berlese, 1904) (*Oribata*)
(?=*Protoribates pupula* Berlese, 1910 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Canadá.
- *Liebstadia (Lagenobates) luxtoni* (Weigmann *et* Monson, 2004) (*Pseudoprotoribates*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Liebstadia (Lagenobates) ryabinini* (Ermilov, 2018) (*Areozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Poroscheloribates Arillo, Gil-Martín *et* Subías, 1994 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Poroscheloribates canariensis* Arillo, Gil-Martín *et* Subías, 1994
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Poroscheloribates canariensis* Arillo, Gil-Martín *et* Subías, 1994
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Poroscheloribates incertus* (Balogh, 1970) (*Areozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] y Vietnam.

Reductobates Balogh *et* Mahunka, 1966 (6 spp.)
(=***Ingella*** Hammer, 1967)
ESPECIE TIPO: *Reductobates humeratus* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Reductobates bicolor* (Hammer, 1973) (*Ingella*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Reductobates brassi* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Reductobates bullager* (Hammer, 1967) (*Ingella*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Reductobates humeratus* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Reductobates latiohumeralis* Hammer, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Reductobates perangustus* Ermilov *et* Minor, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Totobates Hammer, 1961 (32 spp.)
(=***Maculobates*** Hammer, 1962)
(=***Subulobates*** Hammer, 1972)
ESPECIE TIPO: *Totobates discifer* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental, Paleártica meridional y austral.
- *Totobates acutissimus* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates albulus* (Hammer, 1972) (*Subulobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Totobates anareensis* (Dalenius, 1958) (*Liebstadia*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).
- *Totobates antarcticus* Wallwork, 1964 (*T. elegans a.*)
  DISTRIBUCIÓN: Austral (Antártica y Nueva Zelanda).
- *Totobates breviporosus* (Mahunka, 1980) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Totobates bruneiensis* (Ermilov, Chatterjee *et* D. Marshall, 2013) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo) y Japón.
- *Totobates capita* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates communis* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates concretus* (Kramer, 1898) (*Oribata*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Totobates discifer* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Totobates dubius* (Hammer, 1971) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Totobates elatus* Ermilov *et* Minor, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates elegans* (Hammer, 1958) (*Protoribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Austral (Argentina y Antártica).
- *Totobates endroedyyoungai* (Mahunka, 1989) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Totobates latus* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates longipilosus* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates longiporosus* (Hammer, 1962) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Totobates longus* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates luteomarginatus* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates luteus* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates macroonyx* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates magnus* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates marionensis* Pletzen *et* Kok, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Totobates microseta* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates minimus* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates minor* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates mollicoma* Hammer, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Totobates nordenskjoeldi* (Trägårdh, 1907) (*Oribatula*)
  DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Shetland del Sur) y América austral (Tierra del Fuego).
- *Totobates ovalis* Hammer, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Totobates pterygoides* Hammer, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Totobates ventroacutus* (Hammer, 1971) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas de Pacífico).
- *Totobates viviparus* Hammer, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Totobates vulgaris* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Symbioribatidae Aoki, 1966 (3 gen. y 5 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.

Piffliella Hammer, 1979 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Piffliella eduardi* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Piffliella eduardi* Hammer, 1979
  DISTRIBUCIÓN: Java.

Separatoribates Matsushima, Y.-N. Nakamura *et* Nakamura, 2009 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Separatoritates kujuensis* Matsushima, Y.-N. Nakamura *et* Nakamura, 2009
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Separatoribates kujuensis* Matsushima, Y.-N. Nakamura *et* Nakamura, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Symbioribates Aoki, 1966 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Symbioribates papuensis* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Paleártica meridional.
- *Symbioribates aokii* Karasawa *et* Behan-Pelletier, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Symbioribates papuensis* Aoki, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Symbioribates yukiguni* Maruyama *et* Shimano, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Japón.

Scheloribatidae Grandjean, 1933 (19 gen., 6 subgen., 362 spp. y 20 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Annobonzetes Pérez-Íñigo, 1983 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Annobonzetes sphaericus* Pérez-Íñigo, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Annobonzetes latissimus* (Berlese, 1916) (*Podoribates*)
  DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Annobonzetes latus* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Annobonzetes sphaericus* Pérez-Íñigo, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].

Coronibatula Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Coronibatula lienhardi* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Coronibatula lienhardi* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Cosmobates Balogh,1959 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmobates tunicatus* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Cosmobates tunicatus* Balogh, 1959
  DISTRIBUCIÓN: Congo.

Ecuadoribates Ermilov *et* Kalúz, 2012 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Perscheloribates (Ecuadoribates) pentasacculus* Ermilov *et* Kalúz, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Ecuadoribates olszanowskii* (Ermilov *et* Friedrich, 2016) (*Perscheloribates (E.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Ecuadoribates pentasacculus* (Ermilov *et* Kalúz, 2012) (*Perscheloribates (E.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Euscheloribates Kunst, 1958 (14 spp.)
ESPECIE TIPO: *Euscheloribates samsinaki* Kunst, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Pantropical.

Euscheloribates (Euscheloribates) Kunst, 1958 (7 spp.)
(=***Ambrobates*** Mahunka, 2009)
(=***Corynobates*** Balogh *et* P. Balogh, 1992)
(=***Tribates*** Mahunka, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Pantropical.

- *Euscheloribates (E.) clavisetus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión) e India (Kerala).
- *Euscheloribates (E.) cryptus* (Mahunka, 1978) (*Tribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Euscheloribates (E.) mixtus* (Mahunka, 1978) (*Tribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Euscheloribates (E.) olszanowskii* Bayartogtokh *et* Shimano, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia: Palau.
- *Euscheloribates (E.) pembertoni* (Jacot, 1934) (*Protoschelobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Euscheloribates (E.) samsinaki* Kunst, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Europa (Eslovaquia), Oriental (India y Vietnam) y Méjico.
- *Euscheloribates (E.) translamellatus* (Mahunka, 2009) (*Ambrobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Euscheloribates (Trischeloribates) Hammer, 1971 (7 spp.)
(=***Berndibula*** Mahunka, 2000)
(=***Nanobates*** Balogh *et* P. Balogh,1984)
ESPECIE TIPO: *Trischeloribates acutus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Euscheloribates (Trischeloribates) acutus* (Hammer, 1971) (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Euscheloribates (Trischeloribates) bisculpturatus* (Mahunka, 2000) (*Berndibula*)
  DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Euscheloribates (Trischeloribates) clavatus* (Mahunka, 1988) (*Nanobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Euscheloribates (Trischeloribates) fenicheli* (Balogh, 1970) (*Birobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Euscheloribates (Trischeloribates) latus* (Hammer, 1971) (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Euscheloribates (Trischeloribates) payatosensillus* (Corpuz-Raros, 1979) (*Birobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Euscheloribates (Trischeloribates) rotundus* (Hammer, 1971) (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Fijibates Hammer, 1971 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Fijibates rostratus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).

- *Fijibates aelleni* (Mahunka, 1988) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).
- *Fijibates anterostratus* Corpuz-Raros, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Fijibates dlouhyi* (Mahunka, 1984) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Himachal Pradesh).
- *Fijibates problematicus* Ermilov, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Fijibates rostratus* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Islas del Pacífico).
- *Fijibates rostropilosus* (Sanyal, 1988) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Bután.
- *Fijibates sanyali* Subías, 2017
  (=*Fijibates rostropilosus* Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2006, *nom. praeoc.* por Sanyal, 1988)
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Fissurobates Balogh *et* Mahunka, 1969 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Fissurobates spectabilis* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Fissurobates neotropicus* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Fissurobates spectabilis* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Hammerabates Balogh, 1970 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hammerabates trisetosus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Pantropical, Paleártica meridional y subantártica.

Hammerabates (Hammerabates) Balogh, 1970 (6 spp.)
(=***Otaheitea*** Hammer, 1972)
(=***Yoronoribates*** Aoki, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Pantropical, Paleártica meridional y subantártica.
- *Hammerabates (H.) elongatus* Tseng, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Hammerabates (H.) minusculus* (Aoki, 1987) (*Yoronoribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Vietnam y China suroriental).
- *Hammerabates (H.) nasalis* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).
- *Hammerabates (H.) rotundus* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hammerabates (H.) sulcatus* (Hammer, 1972) (*Otaheitea*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Hammerabates (H.) trisetosus* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (India: Bengala Occidental), Australiana (Nueva Guinea y Polinesia: I. Tokelau) y Méjico.

Hammerabates (Philoribates) Corpuz-Raros, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Philoribates filipinus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Hammerabates (Philoribates) filipinus* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Muliercula Coetzer, 1968 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Muliercula muliercula* Coetzer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Muliercula bilineata* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Muliercula chiayiensis* Tseng, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Muliercula discrepans* (Balogh, 1959) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Muliercula femoroserrata* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Muliercula inexpectata* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
  DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Muliercula longisacculus* (Mahunka, 1984) (*Incabates*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Muliercula muliercula* Coetzer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Muliercula ngoyensis* Coetzer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Muliercula orixaensis* (Badejo, Woas *et* Beck, 2002) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Muliercula spora* Coetzer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Cuba.
- *Muliercula walalensis* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

Nannerlia Coetzer, 1968 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nannerlia longinqua* Coetzer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.
- *Nannerlia bombretensis* Hammer, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Nannerlia elongatissima* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Nannerlia longinqua* Coetzer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Pachygena Hammer, 1972 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pachygena falcata* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Paleártica meridional.
- *Pachygena falcata* Hammer, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Pachygena makarovae* Shtanchaeva *et* Subías, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Planobates Hammer, 1973 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Planobates circumalatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Planobates circumalatus* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

Rhabdoribates Aoki, 1967 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Rhabdoribates siamensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Rhabdoribates siamensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Samoabates Hammer, 1973 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Samoabates acutirostrum* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Samoabates acutirostrum* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

Scheloribates Berlese, 1908 (277 spp. y 20 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Zetes latipes* Koch, 1844
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Scheloribates (Scheloribates) Berlese, 1908 (209 spp. y 19 sspp.)
(=***Andeszetes*** Hammer, 1961)
(=***Megascheloribates*** Lee *et* Pajak, 1990)
(=***Neoscheloribates*** Hammer, 1973)
(=***Paraschelobates*** Jacot, 1934)
(=***Protoschelobates*** Jacot, 1934)
(=***Semischeloribates*** Hammer, 1973)
(=***Storkania*** Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Scheloribates (S.) abraensis* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (S.) acutirostris* Călugăr *et* Vasiliu, 1983
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Scheloribates (S.) acutirostrum* Ermilov, Rybalov *et* Franke, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Scheloribates (S.) aequalis* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (S.) aethiopicus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica e I. Canarias.
- *Scheloribates (S.) agricolus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (S.) alexandrinae* Vasiliu *et* Ivan, 1995
DISTRIBUCIÓN: Israel.
- *Scheloribates (S.) angulatus* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Scheloribates (S.) angustus* (Hammer, 1967) (*Incabates*)
(=*Incabates medius* Hammer, 1971)
DISTRIBUCIÓN: Australiana, Filipinas y Este de Paleártica oriental.
- *Scheloribates (S.) anzacensis* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (S.) artigasi* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (S.) ascendens* Weigmann *et* Wunderle, 1990
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Scheloribates (S.) atahualpensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina).
- *Scheloribates (S.) azovicus* Subbotina, 1989
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Scheloribates (S.) azumaensis* Enami, Nakamura *et* Katsumata, 1996
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) barbatulus* Mihelčič, 1956
(=*Scheloribates barbatulus* Mihelčič, 1957, *nom. praeoc.* por Mihelčič, 1956)
(=*Scheloribates penicillatus* Mihelčič, 1957)
(=*Scheloribates subsimilis* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Méjico.
- *Scheloribates (S.) barbatus* (Choi *et* Kim, 2002) (*Lauritzenia (Incabates)*)
(=*Scheloribates bunaensis* Fujikawa, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Scheloribates (S.) bhadurii* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Scheloribates (S.) bhutanensis* Sanyal, 1988
DISTRIBUCIÓN: Bután.
- *Scheloribates (S.) biarcualis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Scheloribates (S.) bicornis* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
- *Scheloribates (S.) bicuspidatus* Kardar, 1977
DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).
- *Scheloribates (S.) bilineatus* Balogh, 1958 *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Scheloribates (S.) brachypterus* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (S.) brasilocompressus* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Scheloribates (S.) brasilosphericus* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Scheloribates (S.) brevipodus* Lee *et* Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) callipus* (Berlese, 1908) (*Protoribates (S.)*)
(=*Protoschelobates seghetti* Runkel *et* Kates, 1947)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Neártica (U.S.A. nororiental) y Paleártica (Bosnia- Herzegovina).
- *Scheloribates (S.) camtschaticus* Subbotina, 1989
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Scheloribates (S.) caprai* Bernini, 1973
(=*Scheloribates baloghi* Pérez-Íñigo, 1982, *nom. praeoc.* por Kardar, 1976)
(=*Scheloribates subsimilis* Balogh, 1962, *nom. praeoc.* por Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y tropical: Etiópica (Tanzania) y Oriental (India: Tripura).
- *Scheloribates (S.) carneus* (Hull, 1916) (*Oribatula*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Scheloribates (S.) castlei* (Jacot, 1934) (*Protoschelobates*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scheloribates (S.) chauhani* Baker, 1945
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Uttar Pradesh) y Taiwán [Formosa].
- *Scheloribates (S.) clavilanceolatus* (Ewing, 1907) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Sur).
- *Scheloribates (S.) concentricus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) confusius* Coetzer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) corpusculum* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Scheloribates (S.) costaricensis* Ermilov, Alvarado-Rodríguez, Tolstikov *et* Retana-Salazar, 2015
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Scheloribates (S.) crassipodus* Lee *et* Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) crassus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (S.) crimicus* Subbotina, 1989
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Scheloribates (S.) cruciseta* Vũ *et* Jeleva, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scheloribates (S.) curvialatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India.
- *Scheloribates (S.) curviprolamellatus* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2021
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) cuyi* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (S.) danaus* Subbotina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Scheloribates (S.) daoensis* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scheloribates (S.) decarinatus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental e India (Kerala).
- *Scheloribates (S.) dentatus* Katsumata, 1988
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) diforamenatus* Lee *et* Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) discifer* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Scheloribates (S.) distinctus* Mihelčič, 1964
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa meridional y Asia centrooccidental).
- *Scheloribates (S.) diversidactylus* (Hammer, 1961) (*Andeszetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile) e India (Tripura).
- *Scheloribates (S.) elegans* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical, Oriental y Hawái.
- *Scheloribates (S.) elongatus* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Scheloribates (S.) elsi* Pletzen, 1965
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Uganda).
- *Scheloribates (S.) eusetosus* Lee *et* Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) ewingi* Subías, 2019
(=*Oribata badia* Ewing, 1908, *nom. praeoc.* por Koch, 1839)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Scheloribates (S.) exiguus* Mahunka, 1992

DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Scheloribates (S.) feideri* Călugăr *et* Vasiliu, 1983
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Scheloribates (S.) femoratus* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Scheloribates (S.) fijiensis* Hammer, 1971 (*S. praeincisus f.*)
DISTRIBUCIÓN: Islas de Pacífico y Filipinas.
- *Scheloribates (S.) fimbriatoides* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) e India (Tripura).
Scheloribates (S.) fimbriatus Thor, 1930
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Scheloribates (S.) fimbriatus fimbriatus* Thor, 1930
(?=*Protoribates (Scheloribates) artifex* Berlese, 1916 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Scheloribates (S.) fimbriatus africanus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Chad, Suroeste de Paleártica oriental y Vietnam.
- *Scheloribates (S.) fimbriatus calcaratus* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scheloribates (S.) fimbriatus javensis* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Oriental e Islas del Pacífico.
- *Scheloribates (S.) fimbriatus whitteni* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Scheloribates (S.) flagellatus* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Scheloribates (S.) flagellisetosus* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scheloribates (S.) fuscosensillus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (S.) grandiporosus* (Hammer, 1973) (*Neoscheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga) y Méjico.
- *Scheloribates (S.) guhitanus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas) y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Scheloribates (S.) gunini* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Scheloribates (S.) helenensis* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (S.) heterosetosus* Lee *et* Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) heterotrichus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) huancayensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India.
- *Scheloribates (S.) humeratus* (Hull, 1916) (*Oribatula*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Scheloribates (S.) hygrophilus* Ivan *et* A. Călugăr, 2005
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Scheloribates (S.) ibericus* Weigmann, 2010
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Scheloribates (S.) imperfectus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
Scheloribates (S.) indicus (Oudemans, 1915) (*Murcia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] e India (Rajastán), e Islas del Pacífico.
- *Scheloribates (S.) indicus indicus* (Oudemans, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] e India, y Hawái.
- *Scheloribates (S.) indicus marquesalis* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Scheloribates (S.) iteratus* Subías, 2004
(=*Scheloribates microclava* Balogh, 1962, *nom. praeoc.* por Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) jucundior* (Berlese, 1923) (*Protoribates (S.) parvulus j.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Scheloribates (S.) kraepelini* (Berlese, 1908) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
Scheloribates (S.) labyrinthicus Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Scheloribates (S.) labyrinthicus labyrinthicus* Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Scheloribates (S.) labyrinthicus oscensis* Pérez-Íñigo jr., Herrero *et* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: España.
Scheloribates (S.) laevigatus (Koch, 1835) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Paleotropical).
- *Scheloribates (S.) laevigatus laevigatus* (Koch, 1835)
(=*Zetes dorsatus* Koch, 1841: juvenil)
(=*Zetes fuscomaculatus* Koch, 1841)
(=*Oribata lucasi* Nicolet, 1855)
(=*Oribata michaeli* Hull, 1914)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Paleotropical y Neotropical: Argentina y Bolivia).
- *Scheloribates (S.) laevigatus angustirostris* Mihelčič, 1957 (*S. a.*)
(=*Scheloribates robustus* Mihelčič, 1969, *nom. praeoc.* por Pletzen, 1963)
(=*Scheloribates sine* Kulijev, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Scheloribates (S.) laevigatus quintus* Wunderle, Beck *et* Woas, 1990 (*S. q.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Scheloribates (S.) laminatus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Scheloribates (S.) lanceoliger* (Berlese, 1908) (*Protoribates (S.)*) *sp. inq.*
(=*Oribata helvina* Ewing, 1909)
(=*Galumna sylvicola* Banks, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Scheloribates (S.) latoincisus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Polinesia (I. Tonga), Oriental (China suroriental e India), I. Galápagos y Costa de Marfil.
- *Scheloribates (S.) leleupi* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Scheloribates (S.) litoralis* Weigmann, 2010
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Scheloribates (S.) longior* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia y Vietnam.
- *Scheloribates (S.) longisensilus* Ivan *et* A. Călugăr, 2005
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Scheloribates (S.) longisetosus* Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1973
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Scheloribates (S.) longus* Kulijev, 1968
(=*Scheloribates lencoranicus* Subbotina, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Mediterránea oriental y Paleártica oriental (excepto Oeste).
Scheloribates (S.) louwi Pletzen, 1965
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) louwi louwi* Pletzen, 1965
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) louwi nimirumi* Coetzer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) lucasiformis* (Trägårdh, 1905) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Sudán.
- *Scheloribates (S.) luchili* Wharton, 1938
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scheloribates (S.) luciensis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Brasil.
- *Scheloribates (S.) luteomarginatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina e I. Galápagos).
- *Scheloribates (S.) maculatus* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (S.) magnus* Abd-el-Hamid, Al-Assiuty *et* Trrad, 1983
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Scheloribates (S.) mahnerti* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Scheloribates (S.) manoai* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scheloribates (S.) maoriensis* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (S.) marginedentatus* (Trägårdh, 1931) (*Chamobates*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).
- *Scheloribates (S.) matulisus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Scheloribates (S.) maximus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Scheloribates (S.) megalonyx* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scheloribates (S.) milleri* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental y Pequeñas Antillas.
- *Scheloribates (S.) minifimbriatus* Mínguez, Subías *et* Ruiz, 1986
(?=*Protoribates (Scheloribates) exilior* Berlese, 1916 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Guinea Ecuatorial y Panamá, y subtropical: Holártica meridional (Mediterránea y U.S.A.: Carolina del Norte).
- *Scheloribates (S.) mochlosimilaris* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) moestus* (Banks, 1895) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Scheloribates (S.) muiri* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Scheloribates (S.) muiricius* Jacot, 1937 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Scheloribates (S.) multiiteratus* Subías, 2004 *sp. inq.*
(=*Oribata simplex* Štorkán, 1925, *nom. praeoc.* por Gervais, 1849)

DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Scheloribates (S.) multirepetitus* Subías, 2004
(=*Incabates striatus* Corpuz-Raros, 1980, *nom. praeoc.* por Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
Scheloribates (S.) mumfordi Jacot, 1934 (*S. (Paraschelobates)*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Scheloribates (S.) mumfordi mumfordi* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Scheloribates (S.) mumfordi uapoui* Jacot, 1934 (*S. (Paraschelobates)*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Scheloribates (S.) nanus* Lee *et* Pajak, 1980
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) natmaensis* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Myanmar [Birmania].
- *Scheloribates (S.) neonominatus* Subías, 2004
(=*Scheloribates baloghi* Călugăr *et* Vasiliu, 1983, *nom. praeoc.* por Kardar, 1976)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Scheloribates (S.) nigeriocompressus* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) nigeriosphericus* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) nudus* Woodring, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).
- *Scheloribates (S.) oahuensis* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scheloribates (S.) obesus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Scheloribates (S.) obsessus* Subías, 2004
(=*Scheloribates indicus* Sanyal, 1992, *nom. praeoc.* por Oudemans, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Norte de India.
- *Scheloribates (S.) obtusus* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.
- *Scheloribates (S.) ornatus* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Scheloribates (S.) oryzae* Lan, Xin *et* Aoki, 1986
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Scheloribates (S.) oumensis* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Scheloribates (S.) pacificus* (Sellnick, 1959) (*Styloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai].
- *Scheloribates (S.) pahabaeus* (Corpuz-Raros, 1980) (*Incabates*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (S.) pajaki* (Balogh *et* P. Balogh, 2002) (*Megascheloribates*)
(=*Megascheloribates microsetosus* Lee *et* Pajak, 1990, *nom. praeoc.* por Wallwork, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) palawanus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
Scheloribates (S.) pallidulus (Koch, 1841) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Scheloribates (S.) pallidulus pallidulus* (Koch, 1841)
(=*Oribata agilis* Nicolet, 1855)
(=*Scheloribates ponticus* Subbotina, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica; frecuente en Holártica).
- *Scheloribates (S.) pallidulus latipes* (Koch, 1844) (*Zetes l.*)
(=*Scheloribates campestris* Mihelčič, 1966)
(=*Oribata clavipectinata* Ewing, 1907)
(=*Oribata femoralis* Nicolet, 1855)
(=*Protoribates (Scheloribates) frigidus* Berlese, 1908)
(=*Scheloribates grandis* Subbotina, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental y Etiopía.
- *Scheloribates (S.) papillaris* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).
- *Scheloribates (S.) parabilis* Woodring, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).
- *Scheloribates (S.) parabrevipodus* Lee *et* Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) parananus* Lee *et* Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) parvialatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scheloribates (S.) parvulus* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
Scheloribates (S.) parvus Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental.
- *Scheloribates (S.) parvus parvus* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía) y Oriental.

- *Scheloribates (S.) parvus conglobatus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Scheloribates (S.) pauliensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Scheloribates (S.) peracutus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) perforatus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Scheloribates (S.) perisi* Pérez-Íñigo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Scheloribates (S.) philippinensis* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Scheloribates (S.) pilosus* Sellnick, 1943 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Scheloribates (S.) pinnatus* (Gervais, 1849) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Scheloribates (S.) polygonatus* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Ecuador).
- *Scheloribates (S.) ponticuliger* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Scheloribates (S.) potchefstroomensis* Ermilov, Hugo-Coetzee, Khaustov *et* Theron, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Scheloribates (S.) praeincisus (Berlese, 1910) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Scheloribates (S.) praeincisus praeincisus* (Berlese, 1910)
(=*Scheloribates praeincisus cubanus* Scull, Jeleva *et* Cruz, 1984)
(=*Murcia insularis* Oudemans, 1915)
(=*Scheloribates translamellaris* Kardar, 1977)
(=*Scheloribates zaherii* Abd-el-Hamid, Al-Assiuty *et* Trrad, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Oriental (frecuente), Australiana (Islas del Pacífico: frecuente, y Nueva Caledonia), Etiópica y Neotropical, y Holártica meridional (Egipto y U.S.A.: Tejas).
- *Scheloribates (S.) praeincisus acuticlava* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Filipinas.
- *Scheloribates (S.) praeincisus atlanticus* Pérez-Íñigo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], y Uganda).
- *Scheloribates (S.) praeincisus interruptus* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
(=*Protoschelobates insularis sandvicensis* Jacot, 1934)
(=*Scheloribates praeincisus rotundiclava* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (frecuente), Australiana: Islas del Pacífico (frecuente) y Nueva Caledonia, y Neotropical, y Holártica meridional (Irán y U.S.A.: Tejas).
- *Scheloribates (S.) praeincisus rectus* Hammer, 1958 (*S. r.*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: Bolivia y Brasil, Sudáfrica y Noreste de India).
- *Scheloribates (S.) praeincisus tenuiseta* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) e India (Bengala Occidental).
- *Scheloribates (S.) praelineatus* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán e India (Tripura).
- *Scheloribates (S.) praeoccupatissimus* Subías, 2004
(=*Scheloribates minutus* Mahunka, 1984, *nom. praeoc.* por Pletzen, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Megascheloribates calcaratus* Lee *et* Pajak, 1990, *nom. praeoc.* por Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Scheloribates (S.) praestantissimus (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Scheloribates (S.) praestantissimus praestantissimus* (Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Scheloribates (S.) praestantissimus major* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Scheloribates (S.) primoricus* (Subbotina, 1987) (*Semischeloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Scheloribates (S.) processus* Nakamura, Y.- N. Nakamura *et* Fujikawa, 2013
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) pseudomochlosimilaris* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) pseudoprincipalis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) pubescens* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) rakhali* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Scheloribates (S.) repetitivus* Subías, 2004
(=*Scheloribates pacificus* Hammer, 1967, *nom. praeoc.* por Sellnick, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (S.) repetitus* Subías, 2004
(=*Scheloribates crassus* Kulijev, 1979, *nom. praeoc.* por Hammer, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Scheloribates (S.) reticulatus* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008) (*Semischeloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Scheloribates (S.) rigidisetosus* Willmann, 1951
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa central y Paleártica oriental meridional).
- *Scheloribates (S.) riyadhiensis* Kardar, 1988 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Scheloribates (S.) robustus* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) rostrodentatus* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Scheloribates (S.) rotundatus* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Scheloribates (S.) rugiceps* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) rugosus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Venezuela).
- *Scheloribates (S.) sacculipunctatus* Mahunka, 2009
DISTRIBICIÓN: Emiratos Árabes.
- *Scheloribates (S.) sacsahuamanensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú y Noreste de India.
- *Scheloribates (S.) salebrosus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Albania.
- *Scheloribates (S.) samirani* Sanyal, Saha *et* Chakraborty, 2006
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Scheloribates (S.) saswatii* Dhali *et* Bhaduri, 1981
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Scheloribates (S.) saudicus* Bayoumi *et* Al-Khalifa, 1985
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Scheloribates (S.) saudiensis* Kardar, 1988 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Scheloribates (S.) saxicola* (Halbert, 1920) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Scheloribates (S.) schauenbergi* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Scheloribates (S.) semidesertus* Bulanova-Zachvatkina *et* Mahmudova, 1991
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Scheloribates (S.) sergienkoae* Subbotina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Scheloribates (S.) shigeruus* Fujikawa, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) sikkimensis* Dhali *et* Bhaduri, 1981
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Scheloribates (S.) sphaeroides* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa) e I. Galápagos.
- *Scheloribates (S.) striatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia e I. Galápagos) e India (Tripura).
- *Scheloribates (S.) striolatus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Scheloribates (S.) sudafricanus* Subías, 2018
(=*Urubambates calcaratus* Mahunka, 1984, *nom. praeoc.* por Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) teldanicus* Vasiliu *et* Ivan, 1995
DISTRIBUCIÓN: Israel.

Scheloribates (S.) thermophilus Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Perú, India, e Islas del Pacífico).
  - *Scheloribates (S.) thermophilus thermophilus* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Perú e India.
  - *Scheloribates (S.) thermophilus corolevuensis* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Scheloribates (S.) transplicatus* Abd-el-Hamid, Al-Assiuty *et* Trrad, 1983
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Scheloribates (S.) tricarinus* Coetzer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) tuberculatus* Pérez-Íñigo jr., Herrero *et* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Scheloribates (S.) tubuaiensis* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Polinesia y Nueva Caledonia) y Paleártica occidental (Cáucaso).
- *Scheloribates (S.) turcmensis* Subbotina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Scheloribates (S.) uluguruensis* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) unisetosus* Lee *et* Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) urenicus* Subbotina, 1978
DISTRIBUCIÓN: Centro de Rusia europea.
- *Scheloribates (S.) vanzwaluwenburgi* (Jacot, 1934) (*Protoschelobates*)

DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scheloribates (S.) variabilis* Pletzen, 1965
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) viguerasis* Scull, Jeleva *et* Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Scheloribates (S.) volcanensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Centroamérica).
- *Scheloribates (S.) vulgaris* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (Vietnam).
- *Scheloribates (S.) xylobatoides* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Scheloribates (S.) yamaeensis* Y.- N. Nakamura, Hashimoto, Nishi, Nakamura *et* Fujikawa, 2015
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) yezoensis* Fujita *et* Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) yorubaensis* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) zealandicus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Andhra Pradesh).

Scheloribates (Bischeloribates) Mahunka, 1988 (9 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Bischeloribates heterodactylus* Mahunka, 1988, *nom. praeoc.* por Pletzen, 1963) =*Scheloribates (Bischeloribates) mahunkai* Subías, 2010
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Scheloribates (Bischeloribates) bidactylus* Hammer, 1961 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (Bischeloribates) biunguis* (Berlese, 1920) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Scheloribates (Bischeloribates) conirostris* Corpuz-Raros, 1980 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Bischeloribates) dalawaeus* Corpuz-Raros, 1980 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Scheloribates (Bischeloribates) elegantulus* Hammer, 1961 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (Bischeloribates) lizelhugoae* Ermilov *et* Rybalov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Uganda).
- *Scheloribates (Bischeloribates) mahunkai* Subías, 2010
(=*Bischeloribates heterodactylus* Mahunka, 1988, *nom. praeoc.* por Pletzen, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Scheloribates (Bischeloribates) munesaensis* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Uganda).
- *Scheloribates (Bischeloribates) wachteli* Ermilov *et* Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.

Scheloribates (Grandjeanobates) Hammer, 1967 (7 spp.)
(=***Aellenobates*** Mahunka, 1978)
ESPECIE TIPO: *Grandjeanobates novazealandicus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Scheloribates (Grandjeanobates) cryptacus* (Mahunka, 1978) (*Aellenobates*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Scheloribates (Grandjeanobates) giganteus* Hammer, 1961 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Perú e India (Maharastra).
- *Scheloribates (Grandjeanobates) laticlava* Hammer, 1961 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Bután.
- *Scheloribates (Grandjeanobates) novazealandicus* (Hammer, 1967) (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (Grandjeanobates) tobagoensis* Ermilov, 2018 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Scheloribates (Grandjeanobates) willmanni* Hammer, 1961 (*S.*)
(=*Scheloribates angulatus* Hammer, 1958, *nom. praeoc.* por Willmann, 1932)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Scheloribates (Makischeloribates) Corpuz-Raros, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Makischeloribates tripartitus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Scheloribates (Makischeloribates) tripartitus* (Corpuz-Raros, 1980) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Scheloribates (Oxyscheloribates) Balogh *et* P. Balogh, 1990 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Scheloribates aculeatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.
- *Scheloribates (Oxyscheloribates) aculeatus* Hammer, 1961 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico).
- *Scheloribates (Oxyscheloribates) curiosus* (Ermilov, 2016) (*Perscheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Scheloribates (Oxyscheloribates) paracuriosus* (Ermilov *et* OConnor, 2020) (*Perscheloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Scheloribates (Perscheloribates) Hammer, 1973 (49 spp. y 1 ssp.)
(=***Ischeloribates*** Corpuz-Raros, 1980)
(=***Scheloribatella*** Mahunka, 1984)
ESPECIE TIPO: *Perscheloribates clavatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y Neártica septentrional.

- *Scheloribates (Perscheloribates) abbreviatus* Wallwork, 1977 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (Perscheloribates) agusanensis* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) albialatus* Hammer, 1961 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Perú y Oriental.
- *Scheloribates (Perscheloribates) algarvensis* Weigmann, 2009 (*S. (Euscheloribates)*)
  DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Scheloribates (Perscheloribates) baluktotus* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) benguetensis* (Corpuz-Raros, 1980) (*Ischeloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: Filipinas e India (Andhra Pradesh) y Australiana: Micronesia (Palau).
- *Scheloribates (Perscheloribates) brevialatus* Hammer, 1961 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico).
- *Scheloribates (Perscheloribates) brevipterus* Hammer, 1962 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scheloribates (Perscheloribates) cavernicolus* (Corpuz-Raros, 1980) (*Ischeloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Scheloribates (Perscheloribates) clavatus (Hammer, 1973) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Filipinas y Taiwán [Formosa], Australiana: Polinesia, y Paleártica meridional: Japón.

- *Scheloribates (Perscheloribates) clavatus clavatus* (Hammer, 1973)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) clavatus torquatus* (Aoki, 1984) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].

- *Scheloribates (Perscheloribates) conjuges* Hammer, 1967 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Assam).
- *Scheloribates (Perscheloribates) crassisetosus* (Ermilov, Rybalov *et* Franke, 2011) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Scheloribates (Perscheloribates) crassus* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) curvirhynchus* Wallwork, 1977 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (Perscheloribates) ethiopicus* (Mahunka, 1986) (*Ischeloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (Perscheloribates) evanescens* Wallwork, 1977 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (Perscheloribates) fissuratus* Hammer, 1961 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).
- *Scheloribates (Perscheloribates) hanoiensis* (Ermilov *et* Starý, 2018) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scheloribates (Perscheloribates) interlamellaris* (Ermilov, Chatterjee *et* D. Marshall, 2013) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Scheloribates (Perscheloribates) keriensis* Hammer, 1967 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (Perscheloribates) kontumensis* (Ermilov *et* Frolov, 2019) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scheloribates (Perscheloribates) lanceolatus* (Aoki, 1984) (*Ischeloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
- *Scheloribates (Perscheloribates) latus* Hammer, 1958 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).
- *Scheloribates (Perscheloribates) luminosus* Hammer, 1961 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical, Oriental (Vietnam e India) y Etiópica.
- *Scheloribates (Perscheloribates) lumotus* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) luteus* Hammer, 1962 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Venezuela) y Vietnam.
- *Scheloribates (Perscheloribates) luzonensis* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) minimus* (Mahunka, 1992) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Scheloribates (Perscheloribates) minusculus* Hammer, 1961 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Scheloribates (Perscheloribates) minutus* Pletzen, 1965 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental (Filipinas e India: Arunachal Pradesh).
- *Scheloribates (Perscheloribates) monodactylus* Morell, 1987 (*S.*)
  (=*Scheloribates elongatus* Mihelčič, 1963, *nom. praeoc.* por Warburton, 1912)
  DISTRIBUCIÓN: España.
- *Scheloribates (Perscheloribates) monttensis* Hammer, 1962 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Scheloribates (Perscheloribates) nepalensis* (Ermilov *et* Martens, 2014) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Scheloribates (Perscheloribates) nodosus* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: Filipinas y Taiwán [Formosa].
- *Scheloribates (Perscheloribates) parakontumensis* (Ermilov *et* OConnor, 2020) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Míchigan).
- *Scheloribates (Perscheloribates) paraluminosus* (Ermilov, Alvarado-Rodríguez, Tolstikov *et* Retana-Salazar, 2015) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Scheloribates (Perscheloribates) paratranslamellatus* (Ermilov *et* Rybalov, 2014) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Scheloribates (Perscheloribates) paratzitzikamaensis* (Ermilov, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Scheloribates (Perscheloribates) quezonensis* (Corpuz-Raros, 1980) (*Ischeloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas y Méjico.
- *Scheloribates (Perscheloribates) reiteratus* (Subías, 2004) (*P.*)
  (=*Scheloribates calcaratus* Wallwork, 1977, *nom. praeoc.* por Jacot, 1934)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (Perscheloribates) rostratus* Hammer, 1958 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (Perscheloribates) rustenburgensis* Pletzen, 1963 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (Perscheloribates) setiger* (P. Balogh, 1988) (*Ischeloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Scheloribates (Perscheloribates) shiraensis* (Evans, 1953) (*Protoribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (Perscheloribates) subtropicus* Hammer, 1961 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (Perscheloribates) surigaoensis* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) tenuis* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) translamellatus* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991) (*Monoschelobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Scheloribates (Perscheloribates) tzitzikamaensis* Pletzen, 1963 (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Scheloribatoides Mahunka, 1988 (1sp.)
ESPECIE TIPO: *Scheloribatoides lamellatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Scheloribatoides lamellatus* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Similobates Mahunka, 1982 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Similobates demetororum* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Similobates deficiens* (Wallwork, 1977) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Similobates demetororum* Mahunka, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Similobates staryi* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.

Striatobates Hammer, 1973 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Striatobates tuberculatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Striatobates tuberculatus* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

Topobates Grandjean, 1958 (26 spp.)
(=***Berndia*** Mahunka, 1988)
(=***Flagellobates*** Mahunka, 1978)
(=***Setobates*** Balogh, 1961)
ESPECIE TIPO: *Topobates granifer* Grandjean, 1958
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Antártica).

- *Topobates alisanicus* (Tseng, 1984) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Topobates berndhauseri* (Mahunka, 1978) (*Flagellobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Topobates carpathicus* (Weigmann *et* Miko, 1998) (*Scheloribates (T.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
- *Topobates circumcarinatus* (Weigmann *et* Miko, 1998) (*Scheloribates (T.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Topobates comatus* (Pérez-Íñigo jr., Herrero *et* Pérez-Íñigo, 1987) (*Setobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Topobates coronopubes* (Lee *et* Pajak, 1988) (*Setobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Topobates granifer* Grandjean, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa e “India”.
- *Topobates helveticus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Topobates heterodactylus* (Pletzen, 1963) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Topobates holsaticus* Weigmann, 1969
  (=*Scheloribates alvaradoi* Pérez-Íñigo, 1969)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Topobates humeralis* Subbotina, 1976 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Europa oriental.
- *Topobates lanceolatus* (Wallwork, 1977) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Topobates magnus* (Balogh, 1962) (*Setobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Egipto.
- *Topobates medius* (Hammer, 1967) (*Setobates*)
  (=*Setobates discors* Hammer, 1967)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Topobates microsetosus* (Wallwork, 1977) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Topobates multiplisetus* (Mahunka, 1977) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Topobates multisetosus* (Balogh, 1970) (*Tuberemaeus*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Topobates panamaensis* (Ermilov, 2020) (*Scheloribates (T.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Panamá.
- *Topobates quindecim* (Ermilov *et* Minor, 2016) (*Scheloribates (T.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Topobates scheloribatoides* (Ramsay, 1966) (*Multoribates*)
  (=*Setobates minor* Hammer, 1967)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Topobates setosus* (Mahunka, 1988) (*Berndia*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Topobates sphaeroides* Subbotina, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Centro de Rusia europea.
- *Topobates tanzanicus* Mahunka, 1993
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Topobates ultraforaminosus* (Lee *et* Pajak, 1988) (*Setobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Topobates umbraili* (Schweizer, 1956) (*Hemileius*)
  DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Topobates vasiliui* (Ivan *et* A. Călugăr, 2005) (*Scheloribates (T.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

Oripodidae Jacot, 1925 (19 gen., 1 subgen., 114 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Anoripoda Sellnick, 1959 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Anoripoda nasalis* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Anoripoda nasalis* Sellnick, 1959
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Sociedad).

Benoibates Balogh, 1958 (17 spp.)
(=***Exoripoda*** Woolley, 1961)
(=***Haploripoda*** Balogh *et* Mahunka, 1967)
(=***Reductoripoda*** Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996)
ESPECIE TIPO: *Benoibates flagellifer* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).
- *Benoibates absolutus* (Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996) (*Reductoripoda*)
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Benoibates amazonicus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Benoibates antiguaensis* Ermilov, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Benoibates bolivianus* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Benoibates borhidii* Balogh *et* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Benoibates chacoensis* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Benoibates crinitus* (Berlese, 1910) (*Protoribates (Scheloribates)*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Benoibates excavatus* (Woolley, 1961) (*Exoripoda*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical (frecuente).
- *Benoibates flagellifer* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Benoibates juglans* (Jacot, 1938) (*Exoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Benoibates marginatus* (Hammer, 1973) (*Exoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Benoibates minimus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Norte de Neotropical y Ecuador).
- *Benoibates muscicola* Baranek, 1981
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Benoibates olszanowskii* (Ermilov, 2020) (*Exoripoda*)
DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.
- *Benoibates plurisetus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Benoibates reductus* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Haploripoda*)
DISTRIBUCIÓN: Congo y Méjico.
- *Benoibates rugosus* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Benoibates suramericanus* (Mahunka, 1983) (*Exoripoda*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).

Birobates Balogh, 1970 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Birobates reductus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.
- *Birobates ahumeralis* Bayartogtokh *et* Shimano, 2020
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Birobates hepaticolus* Colloff *et* Cairns, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Birobates makinisus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Birobates nasutus* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Birobates reductus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India (Tripura).

Brachyoripoda Balogh, 1970 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Brachyoripoda foveolata* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.
- *Brachyoripoda foveolata* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka] y Vietnam) y Méjico.
- *Brachyoripoda minima* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Brachyoripoda punctata* Ohkubo, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Campbellobates Wallwork, 1964 (5 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Campbellobates acanthus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Australiana y Antártica.
Campbellobates acanthus Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell) y Hawái.
- *Campbellobates acanthus acanthus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Campbellobates acanthus hawaiiensis* P. Balogh, 1985 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Campbellobates aureus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Campbellobates latohumeralis* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Campbellobates occultus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Campbellobates philippinensis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Cosmopirnodus Balogh, 1970 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmopirnodus pulcherrimus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.
- *Cosmopirnodus angulatus* Ichisawa *et* Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Cosmopirnodus pulcherrimus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Japón.
- *Cosmopirnodus tridactylus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Cryptoribatula Jacot, 1934 (2 spp.)
(=***Euaella*** Hammer, 1973)
ESPECIE TIPO: *Cryptoribatula taishanensis* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Australiana y Paleártica meridional.

- *Cryptoribatula euaensis* Hammer, 1973
(=*Euaella gitteae* Hammer, 1973)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Cryptoribatula taishanensis* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Gymnobates Banks, 1902 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Gymnobates glaber* Banks, 1902
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Gymnobates glaber* Banks, 1902
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).

Gymnobatoides Woolley, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Gymnobates longus* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Gymnobatoides longus* (Ewing, 1909) (*Gymnobates*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).

Monstroripoda Mahunka, 2006 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Monstroripoda tubulifera* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Monstroripoda tubulifera* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Filipinas.

Oripoda Banks, 1904 (39 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oripoda elongata* Banks *et* Pergande, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Oripoda alata* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Gymnobates*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Oripoda angolensis* (Balogh, 1963) (*Truncopes*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Oripoda anguina* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Truncopes*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Oripoda anomala* Baranek, 1982
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oripoda araucariae* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1993
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Oripoda attenuata* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oripoda auriculata* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oripoda australis* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Ecuador).
- *Oripoda benegasi* Fernández, 1999
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oripoda brasiliensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Oripoda canagaratnami* (Balogh, 1970) (*Truncopes*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Oripoda clavata* Woolley, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oripoda cordobensis* Balogh *et* P. Balogh, 1990
(=*Truncopes australis* Balogh *et* Mahunka, 1968, *nom. praeoc.* por Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oripoda corticola* Baranek, 1981
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oripoda cubana* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Truncopes*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Oripoda divergens* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Truncopes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).
- *Oripoda elongata* Banks *et* Pergande, 1904
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. y Méjico.
- *Oripoda excavata* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oripoda humerata* (Balogh, 1959) (*Benoibates*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Oripoda josephineae* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Oripoda lenkoi* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Oripoda lobata* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oripoda longiseta* Woolley, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oripoda luminosa* (Hammer, 1979) (*Truncopes*)
DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Oripoda magna* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Truncopes*)
  DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Oripoda maxensis* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oripoda minuscula* Bayartogtokh *et* Shimano, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia: Palau.
- *Oripoda moderata* Berlese, 1916 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Oripoda montana* (Hammer, 1961) (*Gymnobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Centroamérica).
- *Oripoda obliqua* Aoki *et* Yamamoto, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oripoda parajosephineae* Ermilov, Khaustov *et* Joharchi, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Oripoda philippinensis* Corpuz-Raros, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Oripoda pinicola* Aoki *et* Ohkubo, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Vietnam.
- *Oripoda prominens* P. Balogh, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Oripoda punctata* Baranek, 1982
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oripoda sacculifera* Mahunka, 2001
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Oripoda scissurata* (Balogh *et* Mahunka, 1980) (*Truncopes*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Oripoda sumonyii* Mahunka, 1985
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oripoda trilabiata* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Centroamérica) y Corea.

Parapirnodus Balogh *et* Mahunka, 1968 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Parapirnodus longus* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Neártica.

- *Parapirnodus longus* Balogh *et* Mahunka, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Parapirnodus prosopis* Martínez, Fernández *et* Monetti, 1996
  DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Pirnodus Grandjean, 1956 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pirnodus detectidens* Grandjean, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Neotropical.

- *Pirnodus detectidens* Grandjean, 1956
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Pirnodus imitans* Balogh *et* Mahunka, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina e I. Galápagos).
- *Pirnodus soyeri* Travé, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (I. Salvajes).

Protoripoda Balogh, 1970 (12 spp.)
ESPECIE TIPO: *Protoripoda woolleyi* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.

Protoripoda (Protoripoda) Balogh, 1970 (8 spp.)
(?=***Frischia*** Oudemans, 1915 *gen. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Paleártica meridional.

- *Protoripoda (P.) bureensis* Rjabinin, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Protoripoda (P.) elongata* (Oudemans, 1915) (*Frischia*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Protoripoda (P.) flagellata* Choi, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Protoripoda (P.) incurva* (Berlese, 1916) (*Oripoda*)
  DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Protoripoda (P.) insularis* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka]) y Australiana (Micronesia: Palau).
- *Protoripoda (P.) lineata* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Protoripoda (P.) nasuta* Mahunka, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Protoripoda (P.) woolleyi* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Protoripoda (Baloghates) Özdikmen, 2008 (4 spp.)
(=***Calobates*** Balogh, 1961, *nom. praeoc.* por Kaup, 1829)
ESPECIE TIPO: *Oripoda ornatissima* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Protoripoda (Baloghates) antichthon* (Higgins, 1966) (*Calobates*)
DISTRIBUCIÓN: Guyana [Guayana Británica].
- *Protoripoda (Baloghates) ornata* Mahunka, 1986 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Protoripoda (Baloghates) ornatissima* (Balogh, 1959) (*Oripoda*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Protoripoda (Baloghates) tuberculata* Mahunka, 1988 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

Pseudopirnodus Baranek, 1985 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pseudopirnodus persetosus* Baranek, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).
- *Pseudopirnodus domrowi* (Balogh *et* Mahunka, 1978) (*Pirnodus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudopirnodus madegassus* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pseudopirnodus persetosus* Baranek, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).

Pteroripoda Balogh *et* Mahunka, 1974 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pteroripoda minutissima* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).
- *Pteroripoda minutissima* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Pteroripoda perennis* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Scriptoripoda P. Balogh, 1985 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Scriptoripoda excellens* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Scriptoripoda excellens* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scriptoripoda tenorioae* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Hawái.

Subpirnodus Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Subpirnodus mirabilis* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Subpirnodus mirabilis* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Truncopes Grandjean, 1956 (11 spp. y 2 sspp.)
(=***Huarpescopes*** Fernández, Monetti *et* Martínez, 1995)
ESPECIE TIPO: *Truncopes optatus* Grandjean, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental y Neotropical.
- *Truncopes andinus* (Baranek, 1985) (*Pirnodus*)
(=*Pirnodus cryophilus* Fernández, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Truncopes fujikawae* Aoki *et* Ohkubo, 1974
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Truncopes gozeensis* Y.-N. Nakamura, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Truncopes makilingensis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
Truncopes moderatus Aoki *et* Ohkubo, 1974
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.
  - *Truncopes moderatus moderatus* Aoki *et* Ohkubo, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
  - *Truncopes moderatus variabilis* Aoki *et* Yamamoto, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Truncopes montanus* Wen *et* Chen, 1992
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
Truncopes optatus Grandjean, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental y Este de Paleártica oriental) y Oriental (India: Bengala Occidental).
  - *Truncopes optatus optatus* Grandjean, 1956
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea occidental y Este de Rusia asiática (I. Kuriles) y Oriental (India: Bengala Occidental).
  - *Truncopes optatus asiaticus* Aoki *et* Ohkubo, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Truncopes orientalis* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Truncopes pyriformis* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Truncopes sinaraja* Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Truncopes yoshidai* Aoki *et* Ohkubo, 1974
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Protoribatidae Balogh *et* P. Balogh, 1984 (10 gen., 8 subgen., 141 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Cribrozetes Balogh, 1970 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cribrozetes multiareolatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Cribrozetes multiareolatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] y Filipinas.

Perxylobates Hammer, 1972 (16 spp.)
ESPECIE TIPO: *Xylobates vermiseta* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Perxylobates (Perxylobates) Hammer, 1972 (14 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Perxylobates (P.) barbatus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) y Java.
- *Perxylobates (P.) brevisetus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Perxylobates (P.) crassisetosus* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Perxylobates (P.) guehoi* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache y Vietnam.
- *Perxylobates (P.) hakkai* Ermilov *et* Liao, 2020
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Perxylobates (P.) longissimus* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Perxylobates (P.) mayuloeus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Perxylobates (P.) obesus* Bayoumi, 1977
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Perxylobates (P.) paravermiseta* Mahunka, 1976
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Perxylobates (P.) sinlimes* (Hammer, 1971) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Pequeñas Antillas.
- *Perxylobates (P.) taidinchani* Mahunka, 1976
DISTRIBUCIÓN: Oriental: China (Hong-Kong) y Vietnam.
- *Perxylobates (P.) thanhoaensis* Ermilov, Vũ, Trinh *et* Dao, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Perxylobates (P.) vermiseta* (Balogh *et* Mahunka, 1968) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (Malgache, Oriental, Islas del Pacífico y Norte de Neotropical).
- *Perxylobates (P.) vietnamensis* (Jeleva *et* Vũ, 1987) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Perxylobates (Neoperxylobates) Subías, 2020 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Perxylobates sinensis* Wen, Aoki *et* X. Wang, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Perxylobates (Neoperxylobates) sinensis* Wen, Aoki *et* X. Wang, 1984 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Perxylobates (Tetraperxylobates) Subías, 2021 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Perxylobates coreanus* Choi *et* Aoki, 1993
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Perxylobates (Tetraperxylobates) coreanus* Choi *et* Aoki, 1993 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Corea y Taiwán [Formosa].

Polillozetes Corpuz-Raros, 2009 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Polillozetes aggenitalis* Corpuz-Raros, 2009
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Polillozetes aggenitalis* Corpuz-Raros, 2009
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Protoribates Berlese, 1908 (93 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata dentata* Berlese, 1883
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Protoribates (Protoribates) Berlese, 1908 (52 spp. y 3 sspp.)
(=***Alloribates*** Banks, 1947)
(=***Octodurozetes*** Mahunka, 1993)
(=***Styloribates*** Jacot, 1934)
(=***Xylobates*** Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Protoribates (P.) angulatus* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Protoribates (P.) antillensis* (Mahunka, 1985) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Irán.
- *Protoribates (P.) baloghi* (Kardar, 1977) (*Scheloribates*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).
- *Protoribates (P.) bayanicus* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Protoribates (P.) berndhauseri* (Mahunka, 1993) (*Octodurozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Protoribates (P.) brevisetosus* (Fujita, 1989) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Protoribates (P.) capucinus Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Protoribates (P.) capucinus capucinus* Berlese, 1908
(=*Xylobates capucinus angustior* Jacot, 1937)
(?=*Oribata monodactyla* Haller, 1884 *sp. inq.*)
(=*Alloribates singularis* Banks, 1947)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente en tropical y subtropical.
- *Protoribates (P.) capucinus bonairensis* Willmann, 1936 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Protoribates (P.) capucinus tentaculus* Mihelčič, 1958 *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Protoribates (P.) cattienensis* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Protoribates (P.) crassisetiger Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Protoribates (P.) crassisetiger crassisetiger* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Protoribates (P.) crassisetiger nipponicus* Fujita, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.

- *Protoribates (P.) curvicarinatus* Ermilov *et* Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Protoribates (P.) dentatus* (Berlese, 1883) (*Oribata*)
(=*Peloribates vastus* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Australiana: Melanesia (I. Fiji).
- *Protoribates (P.) diani* (Mahunka, 1986) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Protoribates (P.) ecuadoriensis* Ermilov, Bayartogtokh, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Protoribates (P.) epimeralis* (Corpuz-Raros, 2009) (*Octodurozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (P.) geonjiensis* Choi, 1994
DISTRIBUCIÓN: Corea y China suroriental.
- *Protoribates (P.) gracilis* (Aoki, 1982) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
- *Protoribates (P.) hakonensis* Aoki, 1994
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Japón e Ibérica) y Vietnam.
- *Protoribates (P.) halleri* (Michael, 1898) (*Oribata*) *sp. inq.*
(=*Oribata simplex* Haller, 1884, *nom. praeoc.* por Gervais, 1849)
DISTRIBUCIÓN: “Neotropical”.
- *Protoribates (P.) heinrichi* Ermilov, Sandmann *et* Scheu, 2019
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Protoribates (P.) hirokous* Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Protoribates (P.) imperfectus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Protoribates (P.) iracemae* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).
- *Protoribates (P.) kargilensis* (Kardar *et* Mattu, 1999) (*Scheloribates*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Protoribates (P.) kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Protoribates (P.) lankaensis* Ermilov, Khaustov *et* Joharchi, 2019
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Protoribates (P.) longiusculus* (Koch, 1841) (*Zetes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Protoribates (P.) lophothrichus* (Berlese, 1904) (*Oribata*)
(=*Styloribates pectinatus* Jacot, 1934)
(=*Xylobates prionotus* Woolley, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Etiópica, Oriental: Vietnam y China suroriental, y Hawái).
- *Protoribates (P.) mahunkai* (Bayoumi, 1980) (*Perxylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Protoribates (P.) maurensis* (Scull, 1985) (*Pilobatella*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Protoribates (P.) myrmecophilus* Aoki *et* Ito, 1997

DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Protoribates (P.) naganoensis* (Fujita, 1989) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Protoribates (P.) natalensis* (Pletzen, 1963) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica, India y Melanesia (I. Fiji).
- *Protoribates (P.) oblongus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
(=*Oribata longa* Ewing, 1909)
(=*Xylobates longisetae* Jacot, 1937)
(=*Oribata parvilamellata* Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Neártica (excepto Oeste) y China (Tíbet), y Pequeñas Antillas.
- *Protoribates (P.) osunensis* Badejo, Woas *et* Beck, 2003
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Protoribates (P.) paracapucinus* (Mahunka, 1988) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental, Etiópica, Neotropical y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]), y subtropical: Paleártica oriental (Irán).
- *Protoribates (P.) paraecuadoriensis* Ermilov *et* Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Protoribates (P.) pembertoni* (Jacot, 1934) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Protoribates (P.) prolamellatus* Ermilov, Sandmann *et* Scheu, 2019
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Protoribates (P.) rioensis* Badejo, Woas *et* Beck, 2003
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Protoribates (P.) robustior* (Jacot, 1937) (*Xylobates oblongus r.*)
(=*Xylobates capucinus robustior* Jacot, 1937, *nom. praeoc.* por Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Este de U.S.A. y Canadá).
- *Protoribates (P.) rodriguezi* (Mahunka, 1988) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Protoribates (P.) rotundus* (Aoki, 2002) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Protoribates (P.) rufafulvus* (Kardar, 1977) (*Scheloribates*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Norte de India.
- *Protoribates (P.) shirakamiensis* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Protoribates (P.) shvanderovi* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Protoribates (P.) souchnaiensis* Abd-el-Hamid, 1965
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Protoribates (P.) taira* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Protoribates (P.) tenuis* (Wen, Aoki *et* X. Wang, 1984) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Protoribates (P.) tibetensis* Xu, Y. Chen *et* Chen, 2020
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Protoribates (P.) tohokuensis* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Japón y Portugal).
- *Protoribates (P.) triangularis* (Hammer, 1971) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico e India (Bengala Occidental).
- *Protoribates (P.) varisetiger* (Wen, Aoki *et* X. Wang, 1984) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Protoribates (P.) yezoensis* (Fujikawa, 1983) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Protoribates (Biunguis) Subías, 2018 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Protoribates heterodactylus* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Etiópica.
- *Protoribates (Biunguis) aethiopicus* Ermilov *et* Rybalov, 2013 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Costa de Marfil).
- *Protoribates (Biunguis) heterodactylus* Ermilov *et* Anichkin, 2011 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Protoribates (Biunguis) luteus* (Hammer, 1979) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).

Protoribates (Lignobates) Mahunka, 2006 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: (*Lignobates berndhauseri* Mahunka, 2006) =*Protoribates mahunkasandori* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Etiopica).
- *Protoribates (Lignobates) mahunkasandori* Ermilov, 2020 (*P.*)
(=*Lignobates berndhauseri* Mahunka, 2006, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Protoribates (Lignobates) mollicoma* (Hammer, 1973) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico e India (Bengala Occidental).
- *Protoribates (Lignobates) tetrasetosus* Ermilov, 2016 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Protoribates (Triaunguis) Kulijev, 1978 (36 spp.)
(=***Brasilobates*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)

(=***Glaberoribates*** Tseng, 1984)
ESPECIE TIPO: (*Scheloribates fallax* Kulijev, 1968) =*Peloribates obtusus* Mihelčič, 1956
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Protoribates (Triaunguis) acutus* (Hammer, 1979) (*Xylobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Java).
- *Protoribates (Triaunguis) bipilis* (Hammer, 1972) (*Xylobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Protoribates (Triaunguis) bisculpturatus* (Mahunka, 1988) (*Xylobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Protoribates (Triaunguis) chistyakovi* Ermilov *et* Starý, 2017 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Protoribates (Triaunguis) cuyi* Corpuz-Raros, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) duoseta* (Hammer, 1979) (*Xylobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Protoribates (Triaunguis) durbanensis* (Pletzen, 1963) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Protoribates (Triaunguis) genitalis* Corpuz-Raros, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Protoribates (Triaunguis) gruezoi* Corpuz-Raros, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) haughlandae* Walter *et* Latonas, 2013 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Protoribates (Triaunguis) lemensis* Ermilov *et* Tolstikov, 2015 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Protoribates (Triaunguis) longilamellatus* Berlese, 1916 (*P. (Scheloribates)*)
  DISTRIBUCIÓN: "África oriental" y Java.
- *Protoribates (Triaunguis) lutosisetosus* Bayartogtokh *et* Shimano, 2020 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia: Palau.
- *Protoribates (Triaunguis) magniporosus* Corpuz-Raros, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) magnus* (Aoki, 1982) (*Xylobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental e India.
- *Protoribates (Triaunguis) maigsius* (Corpuz-Raros, 1979) (*Xylobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) maximus* (Mahunka, 1988) (*Brasilobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental e Irán.
- *Protoribates (Triaunguis) obtusus* (Mihelčič, 1956) (*Peloribates*)
  (=*Scheloribates fallax* Kulijev, 1968)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Protoribates (Triaunguis) paramadagascarensis* Ermilov, 2016 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Protoribates (Triaunguis) paramaigsius* Corpuz-Raros, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) praeoccupatus* Subías, 2004
  (=*Brasilobates bipilis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980, *nom. praeoc.* por Hammer, 1972)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Paleártica oriental (Irán).
- *Protoribates (Triaunguis) punctatus* (Grobler, 1991) (*Brasilobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Noreste de India.
- *Protoribates (Triaunguis) putinglupaensis* Corpuz-Raros, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) rhomboides* (Hammer, 1972) (*Xylobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Protoribates (Triaunguis) rigidus* Corpuz-Raros *et* Lit, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) sangumburiensis* (Choi, 1996) (*Brasilobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Protoribates (Triaunguis) seminudus* (Hammer, 1971) (*Xylobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Australiana: Islas del Pacífico, y Oriental: Noreste de India (frecuente) y Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) shaldybinae* Ermilov *et* Starý, 2017 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y China suroriental).
- *Protoribates (Triaunguis) sichuanensis* Xu, Y. Chen *et* Chen, 2020 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Protoribates (Triaunguis) spinosus* (Fujita, 1989) (*Brasilobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Protoribates (Triaunguis) urbanlus* (Tseng, 1984) (*Glaberoribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Protoribates (Triaunguis) varisculptus* Corpuz-Raros, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) vulgaris* Corpuz-Raros, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) ziemowiti* Ermilov *et* Starý, 2020 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Setoxylobates Balogh *et* Mahunka, 1967 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Setoxylobates foveolatus* Balogh *et* Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Setoxylobates (Setoxylobates) Balogh *et* Mahunka, 1967 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Neotropical.
- *Setoxylobates (S.) foveolatus* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Norte de India) y Méjico.
- *Setoxylobates (S.) taigangensis* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Setoxylobates (Plenoxylobates) Hammer, 1979 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Plenoxylobates ramosus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Setoxylobates (Plenoxylobates) curtiseta* (Hammer, 1979) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Java e India (Tripura).
- *Setoxylobates (Plenoxylobates) ramosus* (Hammer, 1979) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.

Setoxylobates (Polyxylobates) Hammer, 1973 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Polyxylobates diversiporosus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Setoxylobates (Polyxylobates) diversiporosus* (Hammer, 1973) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Polinesia (I. Tonga), Norte de Neotropical y Vietnam.
- *Setoxylobates (Polyxylobates) principalis* (Berlese, 1916) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.

Sicaxylobates Luxton, 1985 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Xylobates sicafer* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Sicaxylobates pseudovermiseta* (Corpuz-Raros, 1979) (*Pilobatella*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Sicaxylobates sicafer* (Hammer, 1968) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Transoribates Pérez-Íñigo, 1992 (5 spp.)
(=***Edaphoribates*** Nakamura *et* Nakai, 2009)
ESPECIE TIPO: *Protoribates latus* Mihelčič, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Tropical (excepto Neotropical).
- *Transoribates agricola* (Nakamura *et* Aoki, 1989) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Vietnam y Sudáfrica.
- *Transoribates boraboraensis* (Sellnick, 1959) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Sociedad).
- *Transoribates clavatus* (Willmann, 1932) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Transoribates latus* (Mihelčič, 1965) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Transoribates parvulus* (Willmann, 1932) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

Trixylobates Balogh *et* Mahunka, 1978 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trixylobates bidactylus* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Trixylobates bidactylus* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Tuxenia Hammer, 1958 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tuxenia complicata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica.
- *Tuxenia brevis* Covarrubias, 1967
(=*Tuxenia brevisetosa* Mahunka, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Tuxenia complicata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Tuxenia manantialis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

Vilhenabates Balogh, 1963 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Peloribates minutus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Vilhenabates (Vilhenabates) Balogh, 1963 (8 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Vilhenabates (V.) ambohitra* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Vilhenabates (V.) dissecatus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Vilhenabates (V.) giganteus* Ermilov *et* Rybalov, 2012

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Vilhenabates (V.) hyalinus* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Vilhenabates (V.) minutus* (Balogh, 1958) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Vilhenabates (V.) reductus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Vilhenabates (V.) schawalleri* Ermilov *et* Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Vilhenabates (V.) simplex* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Vilhenabates (Phalacrozetes) Aoki, 1965 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Phalacrozetes sinatus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Vilhenabates (Phalacrozetes) similis* (Mahunka, 1988) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Vilhenabates (Phalacrozetes) sinatus* (Aoki, 1965) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Haplozetidae Grandjean, 1936 (19 gen., 14 subgen., 251 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Acutozetes Balogh, 1970 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Acutozetes rostratus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Acutozetes bornemisszai* Balogh *et* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Acutozetes chibai* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Acutozetes izumiensis* Fujikawa, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Acutozetes javensis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Acutozetes nadchatrami* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Acutozetes rostratus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Vietnam.

Baloghia Mahunka, 1994 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Baloghia juditae* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Baloghia juditae* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Baloghia spinifera* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

Baloghiella Bulanova-Zachvatkina, 1972 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Baloghiella prima* Bulanova-Zachvatkina, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Baloghiella foveolata* Akrami *et* Ebrahimi, 2013
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Baloghiella granulata* Bayartogtokh *et* Akrami, 2000
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Baloghiella prima* Bulanova-Zachvatkina, 1972
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Berlesiella Hammer, 1979 (2 spp.)
(=***Comororibula*** Mahunka, 1994)
ESPECIE TIPO: *Berlesiella scutata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Berlesiella scutata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Berlesiella truncata* (Mahunka, 1994) (*Comororibula*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

Borneozetes Mahunka, 1997 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Borneozetes lanceolatus* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Borneozetes lanceolatus* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Cantharozetes Hammer, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cantharozetes lucens* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cantharozetes lucens* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Perú.

Conozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Conozetes arcualis* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Conozetes arcualis* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Indoribates Jacot, 1929 (37 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Protoribates punctulatus* Sellnick, 1925
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Indoribates (Indoribates) Jacot, 1929 (18 spp.)
(=***Bolkiah*** Mahunka, 1997)
(=***Nixozetes*** Mahunka, 1977)
(=***Sundazetes*** Hammer, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Indoribates (I.) bicarinatus* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Indoribates (I.) brevisetus* (Balogh, 1970) (*Cosmobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Indoribates (I.) carneus* (Tseng, 1984) (*Lauritzenia*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Indoribates (I.) crassisetiger* (Fukuyama *et* Aoki, 2000) (*Nixozetes*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Indoribates (I.) cuticulatus* (Tseng, 1984) (*Muliercula*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Indoribates (I.) gregoryi* (Balogh, 1970) (*Cosmobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Indoribates (I.) hauseri* (Mahunka, 1997) (*Bolkiah*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Península Malaya).
- *Indoribates (I.) irumbuzhiensis* Safeer *et* Ramani, 2021
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Indoribates (I.) japonicus* (Aoki, 1988) (*Sundazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Indoribates (I.) javanus* (Mahunka, 1977) (*Nixozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Filipinas).
- *Indoribates (I.) microsetosus* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).
- *Indoribates (I.) minutus* (Tseng, 1984) (*Lauritzenia*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Neotropical.
- *Indoribates (I.) nobilis* (Golosova, 1984) (*Cosmobates*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Indoribates (I.) nudus* (Hammer, 1958) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Indoribates (I.) olszanowskii* Ermilov *et* Starý, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Indoribates (I.) paraminimicoma* (Ermilov, Bayartogtokh, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013) (*Haplozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Indoribates (I.) punctulatus* (Sellnick, 1925) (*Protoribates*)
(=*Nixozetes apoensis* Corpuz-Raros, 1979)
(=*Sundazetes crispus* Hammer, 1979)
(=*Cosmobates panabokkei* Balogh, 1970)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Indoribates (I.) samarensis* (Corpuz-Raros *et* Gruèzo, 2005) (*Nixozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Indoribates (Bihaplozetes) Subías, 2020 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Haplozetes bayartogtokhi* Ermilov, Sandmann *et* Scheu, 2019
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Indoribates (Bihaplozetes) bayartogtokhi* (Ermilov, Sandmann *et* Scheu, 2019) (*Haplozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

Indoribates (Haplozetes) Willmann, 1935 (17 spp. y 1 ssp.)
(=***Minasbates*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996)
(=***Mixobates*** Gil *et* Subías, 1993 *nom. praeoc.* por Thor, 1905)
(=***Philippizetes*** Corpuz-Raros, 1979)
(=***Propeschelobates*** Jacot, 1936)
(=***Triungulozetes*** Subías, 2001)
ESPECIE TIPO: *Peloribates vindobonensis* Willmann, 1935
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Indoribates (Haplozetes) acutirostrum* (Hammer, 1968) (*Lauritzenia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Indoribates (Haplozetes) albidus* (Ewing, 1908) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Indoribates (Haplozetes) clavatus* (Bayartogtokh, 2000) (*H.*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Indoribates (Haplozetes) corpuzrarosae* (Mahunka, 1987) (*Nixozetes (Philippizetes)*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Indoribates (Haplozetes) differens* (Weigmann, 2010) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Indoribates (Haplozetes) fusifer* (Berlese, 1908) (*Protoribates (Scheloribates)*)
(=*Haplozetes (Mixobates) insularis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) e India (Tripura).
- *Indoribates (Haplozetes) glaber* (Beck, 1965) (*Rostrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Indoribates (Haplozetes) iranicus* Mortazavi, Akrami *et* Hajizadeh, 2011 (*I. (Mancoribates)*)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Indoribates (Haplozetes) longisacculus* Murvanidze *et* Weigmann, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Indoribates (Haplozetes) madagascarensis* (Balogh, 1961) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Indoribates (Haplozetes) philippinensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Nixozetes (Philippizetes)*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Indoribates (Haplozetes) quadripilus* (Berlese, 1916) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas) y Australiana (Islas del Pacífico).
- *Indoribates (Haplozetes) rotundirostrum* (Hammer, 1968) (*Lauritzenia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Indoribates (Haplozetes) sphaeroclava* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996) (*Minasbates*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Indoribates (Haplozetes) triungulatus* (Beck, 1964) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Indoribates (Haplozetes) ulykpani* (Bayartogtokh *et* Aoki, 1998) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Indoribates (Haplozetes) vindobonensis (Willmann, 1935) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Etiópica, Méjico y Vietnam.
- *Indoribates (Haplozetes) vindobonensis vindobonensis* (Willmann, 1935)
(=*Scheloribates longiporosus* Kulijev, 1968)
(=*Ceratozetes problematicus* Mahunka, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Etiópica, Méjico y Vietnam.
- *Indoribates (Haplozetes) vindobonensis curtipilis* (Kunst, 1977) (*Haplozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.

Indoribates (Mancoribates) Hammer, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Mancoribates rostropilosus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Indoribates (Mancoribates) rostropilosus* (Hammer, 1961) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Indoribates (Neoindoribates) Subías, 2020 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sundazetes multisetus* Wen *et* Zhao, 1994
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Indoribates (Neoindoribates) multisetus* (Wen *et* Zhao, 1994) (*Sundazetes*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Lauritzenia Hammer, 1958 (28 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lauritzenia longipluma* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Lauritzenis (Lauritzenia) Hammer, 1958 (6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Lauritzenia (L.) furtadoi* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Haplozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Lauritzenia (L.) glabra* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Lauritzenia (L.) insignis* (Balogh *et* Mahunka, 1966) (*Haplozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Lauritzenia (L.) longipluma* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Bengala Occidental).
- *Lauritzenia (L.) loongchiensis* (Tseng, 1984) (*Haplozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Lauritzenia (L.) minimicoma* (Beck, 1964) (*Haplozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Tripura).

Lauritzenia (Incabates) Hammer, 1961 (19 spp.)
(=***Canaribates*** Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994)
ESPECIE TIPO: *Incabates nudus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Lauritzenia (Incabates) aokii* (Choi, 1985) (*Incabates*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Lauritzenia (Incabates) atlantica* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Lauritzenia (Incabates) brevisetosa* (Bayartogtokh, 2000) (*H.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Lauritzenia (Incabates) canariensis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Lauritzenia (Incabates) depilis* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996
  DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Lauritzenia (Incabates) elegans* (Kunst, 1977) (*Haplozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Europa centromeridional y U.S.A. suroriental).
- *Lauritzenia (Incabates) elongata* (Lee *et* Shepherd, 1990) (*Magnobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lauritzenia (Incabates) globula* (Lee *et* Shepherd, 1990) (*Magnobates*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lauritzenia (Incabates) hispanica* Morell, 1991 (*L.*)
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Lauritzenia (Incabates) macronuda* (Lee, 1993) (*I.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lauritzenia (Incabates) major* (Aoki, 1970) (*I.*)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental: Taiwán [Formosa] y Vietnam.
- *Lauritzenia (Incabates) makii* (Y.-N. Nakamura, Fukumori *et* Fujikawa, 2010) (*Haplozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Lauritzenia (Incabates) nuda* (Hammer, 1961) (*I.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Centroamérica) y Oriental (Filipinas e India: Bengala Occidental).
- *Lauritzenia (Incabates) pallida* (Mihelčič, 1956) (*Peloribates*)
  (=*Protoribates meridionalis* Mihelčič, 1965)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Lauritzenia (Incabates) punctata* (Lee, 1993) (*I.*)
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lauritzenia (Incabates) similis* Subías *et* Gil-Martín, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Lauritzenia (Incabates) sinuata* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Haplozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Lauritzenia (Incabates) tenuifusus* (Berlese, 1916) (*Protoribates (Scheloribates)*)
  (=*Canaribates chamobatoides* Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Lauritzenia (Incabates) valbehanae* (Ermilov, 2016) (*Haplozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

Lauritzenia (Bilauritzenia) Subías, 2020 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Haplozetes biheterodactylus* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Lauritzenia (Bilauritzenia) biheterodactyla* (Ermilov *et* Tolstikov, 2015) (*Haplozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Lauritzenia (Magnobates) Hammer, 1967 (2 spp.)
(=***Gymnozetes*** Călugăr *et* Vasiliu, 1983)
ESPECIE TIPO: *Magnobates flagellifer* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).
- *Lauritzenia (Magnobates) flagellifer* (Hammer, 1967) (*M.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Lauritzenia (Magnobates) orghidani* (Călugăr *et* Vasiliu, 1983) (*Gymnozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Magyaria Balogh, 1963 (16 spp.)
ESPECIE TIPO: *Scheloribates reticulatus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).

Magyaria (Magyaria) Balogh, 1963 (9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Magyaria* (*M.*) *annobonica* Pérez-Íñigo, 1982
  DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.
- *Magyaria* (*M.*) *atlantica* Pérez-Íñigo, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], y Uganda).
- *Magyaria* (*M.*) *breviseta* Mahunka, 1978
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Magyaria* (*M.*) *cancellata* (Beck, 1964) (*Haplozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudán e India (Bengala Occidental).
- *Magyaria* (*M.*) *fenestrata* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Magyaria* (*M.*) *incisa* Balogh *et* Mahunka, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Magyaria* (*M.*) *krisztinae* Mahunka, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Magyaria* (*M.*) *paracancellata* (Ermilov *et* Starý, 2018) (*Haplozetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Magyaria* (*M.*) *reticulata* (Balogh, 1958) (*Scheloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Congo.

Magyaria (Bimagyaria) Subías, 2020 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Magyaria javensis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Magyaria (Bimagyaria) javensis* Hammer, 1979 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Magyaria (Bimagyaria) leonilae* Ermilov, Sandmann *et* Scheu, 2019 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

Magyaria (Pentamagyaria) Subías, 2020 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Magyaria mindanensis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Magyaria (Pentamagyaria) agusana* Corpuz-Raros, 1991 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Magyaria (Pentamagyaria) luzonica* Corpuz-Raros, 1991 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Magyaria (Pentamagyaria) mindanensis* Corpuz-Raros, 1979 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Magyaria (Pentamagyaria) ornata* Balogh, 1963 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.
- *Magyaria (Pentamagyaria) strinovichi* Balogh, 1970 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Mahnertozetes Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Mahnertozetes perreti* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Mahnertozetes perreti* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Nasobates Woolley, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nasobates spinosus* Woolley, 1966
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Nasobates mirabilis* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Nasobates spinosus* Woolley, 1966
(=*Nasobates paraguayensis* Mahunka, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Honduras y Paraguay.

Paraxylobates Balogh *et* Mahunka, 1969 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Paraxylobates imitans* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Paraxylobates burii* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Paraxylobates imitans* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico) e India (Rajastán).
- *Paraxylobates lowmanae* (Ermilov, Winchester *et* Wassie, 2012) (*Pilobatella*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

Peloribates Berlese, 1908 (94 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata peloptoides* Berlese, 1888
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Peloribates (Peloribates) Berlese, 1908 (86 spp. y 2 sspp.)
(=***Capillozetes*** Balogh, 1943)
(=***Euryparazetes*** Radford, 1950)
(=***Indobates*** Pandit *et* Bhattacharya, 1999)
(=***Parazetes*** Willmann, 1930, *nom. praeoc.* por Sclater, 1879)
(=***Setincabates*** Lee, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Peloribates (P.) ababaeus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
Peloribates (P.) acutus Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (Tailandia y China suroriental).
- *Peloribates (P.) acutus acutus* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Peloribates (P.) acutus curvisacculatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Peloribates (P.) alaskensis* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- *Peloribates (P.) americanus* Jacot, 1939 (*P. europaeus a.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Peloribates (P.) angulatus* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Peloribates (P.) asejugalis* (Pandit *et* Bhattacharya, 1999) (*Indobates*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Peloribates (P.) barbatus* Aoki, 1977

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Vietnam.
- *Peloribates (P.) buntotanus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) canadensis* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional (frecuente).
- *Peloribates (P.) clavatus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ilinois).
- *Peloribates (P.) consectionus* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Peloribates (P.) curtipilus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Peloribates (P.) decumanus* (Berlese, 1908) (*Protoribates (Scheloribates)*)
(=*Peloribates anomalus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Peloribates (P.) dispersus* Beck, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Peloribates (P.) floridensis* Nevin, 1975
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Peloribates (P.) formosus* Nakatamari, 1985
DISTRIBUCIÓN: Japón e Irán.
- *Peloribates (P.) fragilis* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Peloribates (P.) fumotoensis* Fujikawa, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) fuscosetosus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) genavensium* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Peloribates (P.) glaber* Mihelčič, 1956
(=*Peloribates alatus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Peloribates (P.) gotoensis* Shirosaki, Nakamura *et* Fujikawa, 2017
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) grandis* (Willmann, 1930) (*Parazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Japón.
- *Peloribates (P.) gressitti* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Peloribates (P.) guttatoides* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Vietnam).
- *Peloribates (P.) guttatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Peloribates (P.) haramachiensis* Aoki, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) hirsutus* (Banks, 1895) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Peloribates (P.) hubbardi* (Banks, 1904) (*Galumna*)
(=*Peloribates histricinus* Berlese, 1910)
(=*Peloribates tillandsius* Nevin, 1975)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Peloribates (P.) hungaricus* (Balogh, 1943) (*Capillozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Nepal.
- *Peloribates (P.) hypersetosus* (Lee, 1993) (*Setincabates*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Peloribates (P.) hystrix* (Berlese, 1916) (*Protoribates (Scheloribates)*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Peloribates (P.) intermedius* Mondal, 1984
DISTRIBUCIÓN: India.
- *Peloribates (P.) iowaensis* Ewing, 1917
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Iowa).
- *Peloribates (P.) juniperi* (Ewing, 1913) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Peloribates (P.) kalboprodorsalis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) kaszabi* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Peloribates (P.) latus* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) levipunctatus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) lineatus* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) longicoma* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Brasil).
- *Peloribates (P.) longipilosus* Csiszár, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Peloribates (P.) longisetosus* (Willmann, 1930) (*Parazetes*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Este de Paleártica oriental e India.
- *Peloribates (P.) magkakaibaeus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) magnisetosus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Caledonia).
- *Peloribates (P.) moderatus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) muscicola* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú y Japón.
- *Peloribates (P.) neonominatus* Subías, 2004
(=*Peloribates hirsutus* Mahunka, 1983, *nom. praeoc.* por Banks, 1895)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Peloribates (P.) nigeriensis* Badejo, Woas *et* Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Peloribates (P.) nishinoi* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) ominei* Nakatamari, 1985
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) pakistanensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional (Paquistán) y Oriental.
- *Peloribates (P.) palawanus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) paraguayensis* Balogh *et* Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay) y Oriental (India: Bengala Occidental, y Vietnam).
- *Peloribates (P.) peloptoides* (Berlese, 1888) (*Oribata*)
(=*Oribata banksi* Ewing,1909)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil), China suroriental y U.S.A. (Ilinois).
- *Peloribates (P.) perreti* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Peloribates (P.) pilipinus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) pilosus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Peloribates (P.) pinguisetus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas y U.S.A. (Tejas).
- *Peloribates (P.) plumosus* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Peloribates (P.) pocsi* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Peloribates (P.) porosus* Beck, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Peloribates (P.) prominens* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) pseudoporosus* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
Peloribates (P.) rangiroaensis Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Oriental y Polinesia.
  - *Peloribates (P.) rangiroaensis rangiroaensis* Hammer, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Oriental (Vietnam e India: Kerala).
  - *Peloribates (P.) rangiroaensis asiaticus* Aoki *et* Nakatamari, 1974
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Peloribates (P.) ratubakensis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Nepal).
- *Peloribates (P.) repetitus* Subías, 2004
(=*Peloribates minutus* Aoki, 1967, *nom. praeoc.* por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia y Este de Rusia asiática.
- *Peloribates (P.) reticulatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Peloribates (P.) rigidicoma* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Peloribates (P.) robustus* Grishina, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y Méjico.
- *Peloribates (P.) ryukyuensis* Aoki *et* Nakatamari, 1974
DISTRIBUCIÓN: Japón e India (Kerala).
- *Peloribates (P.) serratoseta* (Ewing, 1907) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. central.
- *Peloribates (P.) sierramadrensis* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) spiniformis* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Peloribates (P.) stellatus* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Peloribates (P.) szirakii* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Peloribates (P.) tatyanae* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Peloribates (P.) tredecemsetosus* Corpuz-Raros, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) tripuraensis* Sanyal *et* Saha, 1996
  DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Peloribates (P.) tsengi* Wang, Wen *et* Chen, 2003
  (=*Peloribates longisetosus* Tseng, 1984, *nom. praeoc.* por Willmann, 1930)
  (=*Peloribates praeoccupatus* Subías, 2004)
  DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Peloribates (P.) tunisiensis* Mahunka, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Peloribates (P.) turgidus* Wen *et* Zhao, 1994
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Peloribates (P.) uracasensis* Aoki, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Peloribates (P.) varisculptus* Corpuz-Raros, 1981
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) yatsushiroensis* Fujikawa, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) yezoensis* Fujikawa, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) yunnanensis* Wen, 1985
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Peloribates (Aokibates) Mahunka, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Aokibates yoshii* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Neotropical.
- *Peloribates (Aokibates) yoshii* (Mahunka, 1988) (*A.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam) y Méjico.

Peloribates (Peloribatodes) Mahunka, 2011 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Peloribates (Peloribatodes) incompatibilis* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Holártica y Neotropical.
- *Peloribates (Peloribatodes) europaeus* Willmann, 1935 (*Peloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Nuevo Méjico) y Méjico.
- *Peloribates (Peloribatodes) incompatibilis* Mahunka, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Peloribates (Peloribatodes) montagnensis* Ermilov *et* Starý, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Peloribates (Peloribatodes) perezinigoi* Shtanchaeva, Grikurova *et* Subías, 2011 (*Peloribates*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Peloribates (Peloribatodes) roynortoni* Ermilov, Shtanchaeva *et* Subías, 2019
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).

Peloribates (Tentaculozetes) Balogh, 1970 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tentaculozetes loksai* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Peloribates (Tentaculozetes) loksai* (Balogh, 1970) (*T.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Pilobatella Balogh *et* Mahunka, 1967 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pilobatella punctulata* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Pilobatella (Pilobatella) Balogh *et* Mahunka, 1967 (9 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Pilobatella (P.) berlesei* Bhattacharya *et* Banerjee, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Pilobatella (P.) brevipila* Mahunka, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pilobatella (P.) dhatiensis* Ermilov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Pilobatella (P.) kovaci* Ermilov *et* Starý, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pilobatella (P.) mikoi* Ermilov *et* Starý, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pilobatella (P.) monstruosa* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Pilobatella (P.) punctulata* Balogh *et* Mahunka, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica e India: Bengala Occidental.
- *Pilobatella (P.) schauenbergi* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pilobatella (P.) xena* Mahunka, 1977
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.

Pilobatella (Tripilobatella) Subías, 2017 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pilobatella baloghi* Mahunka, 2003

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pilobatella (Tripilobatella) baloghi* Mahunka, 2003 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Pilobates Balogh, 1960 (7 spp.)
ESPECIE TIPO: *Protoribates pilosellus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

Pilobates (Pilobates) Balogh, 1960 (6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.
- *Pilobates (P.) africanus* Ermilov *et* Starý, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pilobates (P.) carpetanus* Pérez-Íñigo, 1969
(?=*Protoribates elongatus* Mihelčič, 1956 *sp. inq.*)
(?=*Protoribates longior* Mihelčič, 1957 *sp. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Pilobates (P.) longiprocessus* Ermilov *et* Starý, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pilobates (P.) parastaryi* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pilobates (P.) pilosellus* (Balogh, 1958) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Angola y Cáucaso.
- *Pilobates (P.) staryi* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Pilobates (Italobates) Mahunka, 1994 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Protoribates (Scheloribates) incisura* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pilobates (Italobates) incisura* (Berlese, 1916) (*Protoribates (Scheloribates)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.

Rostrozetella Mahunka, 2006 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Rostrozetes (Rostrozetella) decorus* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rostrozetella decorus* (Mahunka, 2006) (*Rostrozetes (Rostrozetella)*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Rostrozetella pinguis* (Balogh *et* Mahunka, 1978) (*Rostrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetella schalleri* (Beck, 1965) (*Rostrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Rostrozetes Sellnick, 1925 (29 spp. y 1 sspp.)
(=***Carabozetes*** Mihelčič, 1957)
(=***Zaherizetes*** Yousef *et* Nasr, 1976)
ESPECIE TIPO: (*Rostrozetes foveolatus* Sellnick, 1925) =*Trachyoribates ovulum* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Rostrozetes aegypticus* (Yousef *et* Nasr, 1976) (*Zaherizetes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Rostrozetes africanus* (Yousef *et* Nasr, 1976) (*Zaherizetes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Rostrozetes angulifer* Balogh *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Rostrozetes baloghi* Subías, 2020
(=*Magyaria pulcherrima* Balogh, 1970, *nom. praeoc.* por Balogh, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Rostrozetes bothulifer* Balogh *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Brasil).
- *Rostrozetes carinatus* Beck, 1965
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rostrozetes cristatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Rostrozetes cubanus* Balogh *et* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Rostrozetes dimorphochaites* Higgins, 1996
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Guyana [Guayana Británica] y Venezuela.
- *Rostrozetes dispar* (Balogh, 1958) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Rostrozetes florens* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Rostrozetes geminosetosus* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes heterotrichus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Rostrozetes inornatus* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes irregularis* Balogh *et* Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Bolivia y Vietnam.
- *Rostrozetes komodensis* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Indonesia (Komodo), y Oriental: India (Tripura).
- *Rostrozetes mammillatus* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Rostrozetes monstruosus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Rostrozetes nagaii* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Rostrozetes ovulum (Berlese, 1908) (*Trachyoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Rostrozetes ovulum ovulum* (Berlese, 1908)
(=*Peloribates areolatus* Balogh, 1958)
(=*Trachyoribates dorsalis* Balogh, 1958)
(=*Rostrozetes flavus* Woodring, 1965)
(=*Rostrozetes foveolatus* Sellnick, 1925)
(=*Rostrozetes geneuxi* Mahunka, 1985)
(=*Trachyoribates nodosus* Hammer, 1958)
(=*Peloribates punctulatus* Balogh, 1958)
(=*Rostrozetes punctulifer* Balogh *et* Mahunka, 1979)
(=*Rostrozetes trimorphus* Balogh *et* Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Rostrozetes ovulum appalachicola* Jacot, 1938 (*R. foveolatus a.*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Rostrozetes poensis* (Mihelčič, 1957) (*Carabozetes p.*)
(=*Rostrozetes foveolatus nebulosus* Beck, 1965)
(=*Rostrozetes pulcherrimus* Balogh, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Guinea Ecuatorial: I. Bioco [Fernando Poo], y Madagascar), Neotropical, Melanesia (I. Fiji) y Corea.
- *Rostrozetes perezinigoi* P. Balogh, 1995
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes persiangulfi* (Akrami, Majidi *et* Behmanesh, 2011) (*Trachyoribates (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Rostrozetes polygonatus* Balogh *et* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes pseudofurcatus* Balogh *et* Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rostrozetes punctatus* Karppinen, 1966
DISTRIBUCIÓN: Guinea e India (Bengala Occidental).
- *Rostrozetes rimachensis* Beck, 1965
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Rostrozetes sexclavatus* Sellnick, 1925 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes shibai* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Trachyoribates Berlese, 1908 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata ampulla* Berlese, 1905
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Trachyoribates ampulla* (Berlese, 1905) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Nueva Guinea.
- *Trachyoribates chinensis* Fukuyama *et* Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Trachyoribates filipinus* (Corpuz-Raros, 1979) (*Magyaria*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Trachyoribates triungulatus* (Mahunka, 1988) (*Magyaria*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Trachyoribates viktortsoii* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Tubulozetidae P. Balogh, 1989 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Tubulozetes P. Balogh, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Tubulozetes rostratus* P. Balogh, 1989
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Tubulozetes rostratus* P. Balogh, 1989
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Parakalummidae Grandjean, 1936 (2 gen., 3 subgen., 70 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Neoribates Berlese, 1914 (66 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata roubali* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Neoribates (Neoribates) Berlese, 1914 (55 spp.)
(=***Protokalumma*** Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Neoribates (N.) africanus* Ermilov *et* Starý, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Neoribates (N.) aurantiacus* (Oudemans, 1914) (*Galumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur) y Oriental.
- *Neoribates (N.) barbatus* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neoribates (N.) borealis* Vladimirova, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Eurosiberiana.
- *Neoribates (N.) bulanovae* Grishina, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Neoribates (N.) cheni* Liang *et* Yang, 2013
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Neoribates (N.) cupulatus* Liang, Yang *et* Tang, 2014
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Neoribates (N.) depressus* (Banks, 1895) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental (frecuente) y U.S.A. (Florida).
- *Neoribates (N.) elongatus* Aoki, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoribates (N.) erectus* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Protokalumma*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Neoribates (N.) flagellum* (Balogh, 1970) (*Protokalumma*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Neoribates (N.) formaminiferus* Sellnick, 1923
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Neoribates (N.) fulvus* Sellnick, 1923 (*N. foraminiferus f.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Neoribates (N.) gracilis* Travé, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Europa meridional y Oriental.
- *Neoribates (N.) granulatus* Akrami *et* Behmanesh, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Neoribates (N.) incisus* Hagino, Shimano *et* Aoki, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoribates (N.) insignificans* (Mahunka, 1995) (*Parakalumma*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Neoribates (N.) isabelaensis* Bayartogtokh, Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Neoribates (N.) jacoti* (Balogh *et* Mahunka, 1967) (*Protokalumma*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Neoribates (N.) krivolutskyi* Grishina, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Neoribates (N.) macrosacculatus* Aoki, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Neoribates (N.) madagascarensis* Ermilov *et* Starý, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Neoribates (N.) monodactylus* Ermilov *et* Anichkin, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) neglectus* Willmann, 1953
  DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Neoribates (N.) neonominatus* Subías, 2004 (*N. (Protokalumma)*)
  (=*Protokalumma jacoti* Norton *et* Kethley, 1989, *nom. praeoc.* por Balogh *et* Mahunka, 1967)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Neoribates (N.) oceanicus* (Oudemans, 1915) (*Galumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Neoribates (N.) ornamentus* Ermilov *et* Kalúz, 2013
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Neoribates (N.) pallidus* Aoki, 1988
  (=*Neoribates alius* Fujikawa, 2007)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Nepal.
- *Neoribates (N.) parabarbatus* Ermilov *et* Kalúz, 2013
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Neoribates (N.) parabulanovae* Ermilov *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Neoribates (N.) paragracilis* Ermilov *et* Starý, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) paramacrosacculatus* Ermilov *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Neoribates (N.) pararotundus* Ermilov *et* Martens, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Neoribates (N.) paratuberculatus* Ermilov, Shtanchaeva *et* Subías, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) particula* Liang *et* Yang, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Neoribates (N.) parvisetigerum* (Aoki, 1965) (*Protokalumma*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente).
- *Neoribates (N.) peruensis* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).
- *Neoribates (N.) pterotus* (Banks, 1910) (*Galumna*)
(=*Oribata (Neoribates) fissuratus* Berlese, 1914)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Neoribates (N.) protrusus* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) pseudojacoti* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) punctulatus* (Balogh, 1970) (*Protokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Neoribates (N.) pyramidalis* (Tseng, 1984) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Neoribates (N.) quadrisetosus* (Ewing, 1917) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental (frecuente).
- *Neoribates (N.) rimosus* Suzuki, 1978
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoribates (N.) rotundus* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Neoribates (N.) roubali* (Berlese, 1910) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Noreste de Oriental.
- *Neoribates (N.) salicis* (Ewing, 1913) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Míchigan).
- *Neoribates (N.) setiger* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Neoribates (N.) sibiricus* Vladimirova, 2009
DISTRIBUCIÓN: Siberia.
- *Neoribates (N.) similis* Fujikawa, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoribates (N.) spindleformis* Ermilov *et* Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) striatissimus* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) szabadosi* (Balogh, 1970) (*Protokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Neoribates (N.) tuberculatus* Willmann, 1956
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Neoribates (N.) yangensis* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Neoribates (Parakalumma) Jacot, 1929 (5 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Neoribates lydia* Jacot, 1923
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.
- *Neoribates (Parakalumma) corticis* (Ewing, 1913) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Míchigan).
- *Neoribates (Parakalumma) headlandi* (Starý, 1997) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Neoribates (Parakalumma) koshiensis* Y.-N. Nakamura, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoribates (Parakalumma) lydia* Jacot, 1923 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
Neoribates (Parakalumma) robustus (Banks, 1895) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental y Japón).
- *Neoribates (Parakalumma) robustus robustus* (Banks, 1895)
(=*Oribata centropterus* Berlese,1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental: frecuente, y Japón).
- *Neoribates (Parakalumma) robustus floridanus* (Jacot, 1935) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

Neoribates (Perezinigokalumma) Subías, 2004 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Protokalumma afrum* Pérez-Íñigo, 1969
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Neoribates (Perezinigokalumma) afrum* (Pérez-Íñigo, 1969) (*Protokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], y Costa de Marfil).
- *Neoribates (Perezinigokalumma) foveolata* (Balogh *et* Mahunka, 1969) (*Parakalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Surinám).
- *Neoribates (Perezinigokalumma) munizi* (Balogh *et* Mahunka, 1974) (*Parakalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Neoribates (Perezinigokalumma) piton* (Mahunka, 1998) (*Parakalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Neoribates (Pseudoneoribates) Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Neoribates (Pseudoneoribates) negrosensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Neoribates (Pseudoneoribates) kontschani* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Neoribates (Pseudoneoribates) negrosensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Sandenia Oudemans, 1917 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Galumna georgiae* Oudemans, 1914
DISTRIBUCIÓN: Antártica, Oriental y Paleártica.

Sandenia (Sandenia) Oudemans, 1917 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Sandenia (S.) georgiae* (Oudemans, 1914) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).

Sandenia (Porokalumma) Wallwork, 1966 (3 spp.)
(=***Neokalumma*** Tseng, 1984)
ESPECIE TIPO: *Sandenia rotunda* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Antártica, Oriental y Paleártica.
- *Sandenia (Porokalumma) elongata* Liu *et* Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Sandenia (Porokalumma) laiae* (Tseng, 1984) (*Neokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Sandenia (Porokalumma) rotunda* Wallwork, 1963 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Galumnoidea Jacot, 1925

Galumnidae Jacot, 1925 (28 gen., 15 subgen., 603 spp. y 29 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Africogalumna Starý, 2005 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Africogalumna krivolutskyi* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Africogalumna krivolutskyi* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Allogalumna Grandjean, 1936 (54 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Galumna alamellae* Jacot, 1935
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Allogalumna (Allogalumna) Grandjean, 1936 (32 spp.)
(=***Ctenogalumna*** Balogh, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Antártica).
- *Allogalumna (A.) alpha* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Allogalumna (A.) asetosa* Ermilov *et* Kalúz, 2014
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Allogalumna (A.) borhidii* Balogh *et* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Allogalumna (A.) confluens* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Allogalumna (A.) dilatata* Balogh *et* P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia y Oriental (Filipinas y Península Malaya).
- *Allogalumna (A.) exigua* Popp, 1960
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Allogalumna (A.) filiger* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Panamá).
- *Allogalumna (A.) incompleta* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Allogalumna (A.) insolita* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna (A.) iranica* Akrami, 2015
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Allogalumna (A.) integer* (Berlese, 1904) (*Oribata alata i.*)
(=*Allogalumna alata transversa* Mihelčič, 1957)
(=*Galumna (Pergalumna) diversiareata* Mihelčič, 1956)
(=*Allogalumna neerlandica* Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Allogalumna (A.) leleupi* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Allogalumna (A.) madagascarensis* (Balogh, 1961) (*Ctenogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna (A.) margaritifera* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Allogalumna (A.) microporosa* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Allogalumna (A.) monodactyla* Ermilov *et* Anichkin, 2014

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Allogalumna (A.) multesima* Grandjean, 1957
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Vietnam.
- *Allogalumna (A.) novazealandica* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Allogalumna (A.) paramachadoi* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Allogalumna (A.) paramadagascarensis* Ermilov *et* Starý, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna (A.) paranovazealandica* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Allogalumna (A.) paravojnitsi* Ermilov *et* Starý, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna (A.) parva* (Berlese, 1916) (*Oribata*)
(=*Galumna alamellae* Jacot, 1935)
(=*Galumna alamellae italicum* Jacot, 1935)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Allogalumna (A.) pellucida* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Allogalumna (A.) pocsi* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna (A.) quadrimaculata* (Mahunka, 1988) (*Pergalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Allogalumna (A.) rotundiceps* Aoki, 1996
DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
- *Allogalumna (A.) sinornata* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Allogalumna (A.) triangulata* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Allogalumna (A.) turkeyensis* Grobler, Bayram *et* Cobanoglu, 2004
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Allogalumna (A.) upoluensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa) y Vietnam.
- *Allogalumna (A.) vojnitsi* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Allogalumna (Acrogalumna) Grandjean, 1956 (22 spp. y 1 ssp.)
(=***Xenogalumna*** Balogh, 1961)
ESPECIE TIPO: *Oribata elimata longipluma* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Allogalumna (Acrogalumna) abrupta* (Hammer, 1972) (*Acr.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Allogalumna (Acrogalumna) ampla* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Allogalumna (Acrogalumna) antillensis* (Mahunka, 1998) (*Pilogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Perú).
- *Allogalumna (Acrogalumna) bipartita* (Aoki *et* Hu, 1993) (*Acr.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Allogalumna (Acrogalumna) bochkovi* Ermilov *et* Starý, 2018 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Allogalumna (Acrogalumna) brevisetosa* (Bayartogtokh *et* Weigmann, 2005) (*Acr.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia y China suroriental.
- *Allogalumna (Acrogalumna) costata* Mahunka, 1996 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.
- *Allogalumna (Acrogalumna) cubana* Balogh *et* Mahunka, 1979 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Allogalumna (Acrogalumna) gedaii* Mahunka, 1995 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Allogalumna (Acrogalumna) hungarica* Willmann, 1938 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Allogalumna (Acrogalumna) indonesiensis* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Península Malaya).
Allogalumna (Acrogalumna) longipluma (Berlese, 1904) (*Oribata elimata l.*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Etiópica, Oriental (India: Kerala y China suroriental), Nueva Zelanda y Argentina.
- *Allogalumna (Acrogalumna) longipluma longipluma* (Berlese, 1904)
(=*Galumna decipiens* Mihelčič, 1956)
(=*Galumna filata* Oudemans, 1914)
(=*Galumna latipluma* Mihelčič, 1952)
(=*Galumna longiporus* Mihelčič, 1952)
(=*Oribata setiformis* Hall, 1911)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Europa), Etiópica, Oriental (India: Kerala, y China suroriental), Nueva Zelanda y Argentina.
- *Allogalumna (Acrogalumna) longipluma adjarica* (Murvanidze *et* Weigmann, 2003) (*Acr.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Allogalumna (Acrogalumna longula* (Balogh, 1961) (*Xenogalumna*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna (Acrogalumna) machadoi* (Balogh, 1960) (*Acr.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental.
- *Allogalumna (Acrogalumna) monttensis* (Hammer, 1962) (*Acr.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Méjico).
- *Allogalumna (Acrogalumna) oromiaensis* Ermilov, 2019 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Allogalumna (Acrogalumna) pacifica* (Trägårdh, 1931) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juán Fernández).
- *Allogalumna (Acrogalumna) pectinata* (Jacot, 1937) (*Zetes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Allogalumna (Acrogalumna) plowmanae* Balogh *et* P. Balogh, 1983 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Allogalumna (Acrogalumna rugata* Liang *et* Yang, 2015 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Allogalumna (Acrogalumna) shogranensis* (Hammer, 1977) (*Acr.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán y China suroriental.
- *Allogalumna (Acrogalumna) superporosa* Mahunka, 1996 (*All.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Carinogalumna Engelbrecht, 1973 (6 spp.)
(=***Paracarinogalumna*** Mahunka, 1998)
(=***Pseudogalumna*** Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994)
ESPECIE TIPO: *Carinogalumna montana* Engelbrecht, 1973
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Carinogalumna alineata* Ermilov *et* Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Carinogalumna clericata* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Carinogalumna genavensium* (Mahunka, 1998) (*Paracarinogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Brasil).
- *Carinogalumna heros* (Canestrini, 1897) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Carinogalumna montana* Engelbrecht, 1973
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Carinogalumna philippinensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Centroribates Berlese, 1915 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata mucronata* Canestrini *et* R. Canestrini, 1882
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Centroribates mucronatus* (Canestrini *et* R. Canestrini, 1882) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

Cryptogalumna Grandjean, 1957 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cryptogalumna cryptodonta* Grandjean, 1957
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.
- *Cryptogalumna cryptodonta* Grandjean, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Cryptogalumna grandjeani* Balakrishnan *et* Haq, 1985
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Dicatozetes Grandjean, 1956 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Centroribates uropygium* Grandjean, 1928
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Dicatozetes numidicus* Bernini, 1984
DISTRIBUCIÓN: Argelia.
- *Dicatozetes uropygium* (Grandjean, 1928) (*Centroribates*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Dimidiogalumna Engelbrecht, 1972 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dimidiogalumna villiersensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.
- *Dimidiogalumna azumai* Aoki, 1996
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Vietnam y China suroriental).
- *Dimidiogalumna comoroensis* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Dimidiogalumna grandjeani* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dimidiogalumna ilhaverdeensis* Ermilov, 2018
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Dimidiogalumna mauritii* (Mahunka, 1978) *(Galumna)*
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Dimidiogalumna villiersensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Flagellozetes Balogh, 1970 (17 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Flagellozetes porosus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Neotropical y Paleártica meridional.

Flagellozetes (Flagellozetes) Balogh, 1970 (1 sp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
Flagellozetes (F.) porosus Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] e India (Kerala).
- *Flagellozetes (F.) porosus porosus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Flagellozetes (F.) porosus indicus* Balakrishnan *et* Haq, 1985
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Flagellozetes (Cosmogalumna) Aoki, 1988 (16 spp.)
(=***Variogalumna*** Mahunka, 1995)
ESPECIE TIPO: *Cosmogalumna ornata* Aoki, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Neotropical y Paleártica meridional.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) areticulatus* (Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) centroclathrata* (Hagino *et* Shimano, 2017) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) dongnaiensis* (Ermilov *et* Anichkin, 2013) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) ekaterinae* (Ermilov *et* Friedrich, 2016) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) hiroyoshii* (Nakamura *et* Fujikawa, 2004) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) imperfecta* (Aoki *et* Hu, 1993) (*C.*)
(=*Galumna (Cosmogalumna) praeoccupata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) kirishimaensis* (Hagino *et* Shimano, 2017) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) macroporosus* Liang, Yang *et* Ren, 2018
DISTRIBUCIÓN: China.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) ornatus* (Aoki, 1988) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) sandori* Ermilov *et* Kalúz, 2019
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) sanqingi* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) singularis* (Mahunka, 1995) (*Variogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Península Malaya).
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) sumatrensis* (Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) tenensis* (Ermilov, Vu *et* Nguyen, 2011) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) vladopesici* (Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) yonaguniensis* (Aoki, 2009) (*Galumna (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Galumna Heyden, 1826 (203 spp. y 6 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis alatus* Hermann, 1804
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Galumna (Galumna) Heyden, 1826 (189 spp. y 6 sspp.)
(=***Holokalumma*** Jacot, 1929)
(=***Holozetes*** Jacot, 1929)
(=***Kinezogalumna*** Aoki *et* Hu, 1993)
(=***Zetes*** Koch, 1835)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Galumna (G.) aba* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) acutifrons* Banks, 1915 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Galumna (G.) acutirostrum* Ermilov *et* Anichkin, 2010
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Nueva Caledonia.
- *Galumna (G.) aegyptica* Abd-el-Hamid, Al-Assiuty *et* Trrad, 1982
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Galumna (G.) agueroi* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
Galumna (G.) alata (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica occidental, Mongolia, U.S.A., I. Seychelles, Hawái, Argentina, Oriental (India: Kerala, y Taiwán [Formosa]) y Antártica (I. Georgia del Sur).
- *Galumna (G.) alata alata* (Hermann, 1804)
(=*Galumna coleoptratrum occidentale* Jacot, 1929)

(=*Oribata octopunctata* Ewing, 1909)
(=*Zetes satellitius* Koch, 1841: juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte), Mongolia, U.S.A. (frecuente), I. Seychelles, Hawái, Argentina, Oriental (India: Kerala, y Taiwán [Formosa]) y Antártica (I. Georgia del Sur).
- *Galumna (G.) alata maxima* Willmann, 1939 (*G. m.*)
(=*Galumna alata multiiterata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
- *Galumna (G.) angularis* Jeleva, Scull *et* Cruz, 1984
(=*Galumna hamifer* Mahunka, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) ankaratra* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Galumna (G.) antalata* Banks, 1916 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Galumna (G.) antiguaensis* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Galumna (G.) antonioberlesei* Subías, 2010 *sp. inq.*
(=*Oribata ovata* Berlese, 1916 *nom. praeoc.* por Koch, 1839)
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Galumna (G.) anuakensis* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Galumna (G.) appressala* (Ewing, 1910) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Galumna (G.) arabica* Bayoumi *et* Al-Khalifa, 1984
DISTRIBUCIÓN: Arbia Saudita.
- *Galumna (G.) armatifera* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Galumna (G.) arrugata* Jeleva, Scull *et* Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Galumna (G.) atomaria* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
Galumna (G.) australis (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australiana: Hawái.
- *Galumna (G.) australis australis* (Berlese, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) australis pembertoni* (Jacot, 1934) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Galumna (G.) azoreana* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Galumna (G.) baloghi* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Galumna (G.) banksi* Jacot, 1929
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Galumna (G.) barnardi* (Jacot, 1940) (*Holozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Congo).
- *Galumna (G.) basilewskyi* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Galumna (G.) berlesei* Oudemans, 1919
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Galumna (G.) betzaida* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Israel.
- *Galumna (G.) bidentatirostris* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Galumna (G.) bimorpha* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Galumna (G.) bradleyi* (Jacot, 1935) (*Zetes*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) breviseta* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Uganda).
- *Galumna (G.) calcicola* (Aoki *et* Hu, 1993) (*Kinezogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Galumna (G.) californica* (Hall, 1911) (*Oribata alata c.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Galumna (G.) calva* Starý, 1997
DISTRIBUCIÓN: Australia y Sumatra.
- *Galumna (G.) cameroonica* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Galumna (G.) capensis* Engelbrecht, 1969
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Congo).
- *Galumna (G.) castanea* (Canestrini, 1898) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Galumna (G.) cavernalis* Fujikawa, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Galumna (G.) changchunensis* Wen, 1987
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Galumna (G.) chujoi* Aoki, 1966

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental e India (Kerala).
- *Galumna (G.) circularis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) cirripilis* (Canestrini, 1898) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Galumna (G.) colombiana* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Galumna (G.) coloradensis* (Jacot, 1929) (*Holokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centromeridional.
- *Galumna (G.) colossus* Oudemans, 1915
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Galumna (G.) comparabilis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) coreana* Choi, 1997
(=*Galumna longiporosa* Choi, 1986, *nom. praeoc.* por Fujikawa, 1972)
(=*Galumna reiterata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Galumna (G.) coronata* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Senegal y Vietnam.
- *Galumna (G.) costata* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
Galumna (G.) crenata Deb *et* Raychaudhuri, 1975
DISTRIBUCIÓN: Oriental (India: frecuente, y Filipinas).
- *Galumna (G.) crenata crenata* Deb *et* Raychaudhuri, 1975
DISTRIBUCIÓN: Oriental (India: frecuente, y Filipinas).
- *Galumna (G.) crenata indica* Sh. Sarkar, Sanyal *et* Chakrabarti, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Maharastra).
- *Galumna (G.) crenata uttarkashii* Sh. Sarkar, Sanyal *et* Chakrabarti, 2007
DISTRIBUCIÓN: India (Uttarakhand).
- *Galumna (G.) cubana* Jeleva, Scull *et* Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Pequeñas Antillas).
- *Galumna (G.) cuneata* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Galumna (G.) curvifamulus* Ermilov, Hugo-Coetzee, Khaustov *et* Theron, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) delectum* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) difficilis* (Berlese, 1916) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Galumna (G.) dimidiata* Engelbrecht, 1969
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e Irán.
- *Galumna (G.) dimorpha* Krivolutskaja, 1952
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (excepto Este).
- *Galumna (G.) discifera* Balogh, 1960
(=*Galumna engelbrechti* Balogh *et* P. Balogh, 2002, *nom. praeoc.* por Mahunka, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Sudáfrica), Oriental (Vietnam e India: Kerala) e Irán.
- *Galumna (G.) dispar* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Galumna (G.) divergens* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo e Irán.
- *Galumna (G.) dkrivolutskyi* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) duplex* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Galumna (G.) egregia* Sellnick, 1923
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
- *Galumna (G.) elegantula* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) elimata* (Koch, 1841) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Galumna (G.) engelbrechti* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Galumna (G.) ephippiata* (Koch, 1835) (*Zetes*) *sp. inq.* (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Galumna (G.) euaensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Galumna (G.) europaea* (Berlese, 1914) (*Oribata emarginatus e.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- *Galumna (G.) exigua* Sellnick, 1925
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas).
- *Galumna (G.) fijiensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
Galumna (G.) flabellifera Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Galumna (G.) flabellifera flabellifera* Hammer, 1958
(=*Galumna flabellifera orientalis* Aoki, 1965)

(=*Galumna nuda* Engelbrecht, 1972)
(=*Pergalumna pyri* Elbadry *et* Nasr, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Galumna (G.) flagellata* Willmann, 1925
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (excepto Este).
- *Galumna (G.) fordi* (Jacot, 1934) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Islas del Pacífico, Etiópica y "Neotropical").
- *Galumna (G.) fuscata* Kishida, 1921 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Galumna (G.) gambelaensis* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Galumna (G.) gharbiensis* Bayoumi, Al-Assiuty, Abd-el-Hamid *et* El-Shereef, 1983
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Galumna (G.) gibbula* Grandjean, 1956 (*G. tarsipennata g.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Galumna (G.) glabra* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) globuloides* (Tafner, 1905) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Galumna (G.) granalata* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Galumna (G.) grandjeani* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Galumna (G.) granulimorpha* Bayartogtokh *et* Akrami, 2014
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Galumna (G.) hammerae* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia y Méjico.
- *Galumna (G.) homodactyla* (Karpelles, 1893) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Galumna (G.) hudsoni* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Galumna (G.) humida* (Hall, 1911) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Galumna (G.) incerta* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) incisa* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Sudáfrica).
- *Galumna (G.) indonesica* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Tailandia).
- *Galumna (G.) innexa* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) inquirenda* Subías 2018 *sp. inq.*
(=*Oribata maxima* Berlese, 1916, *nom. praeoc.* por Ewing, 1908)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Galumna (G.) iranensis* Mahunka *et* Akrami, 2001
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Galumna (G.) irazu* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Galumna (G.) iterata* Subías, 2004 *sp. inq.*
(=*Zetes banksi* Jacot, 1929, *nom. praeoc.* por Jacot, 1929)
(=*Galumna jacoti* Marshall, Reeves *et* Norton, 1987, *nom. praeoc.* por Wharton, 1938)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
- *Galumna (G.) ithacensis* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental (frecuente).
- *Galumna (G.) jacoti* Wharton, 1938 *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Galumna (G.) karajica* Mahunka *et* Akrami, 2001
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Irán y Cáucaso).
- *Galumna (G.) kazakhstani* Krivolutskaja, 1952 (*G. lanceata k.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Rusia asiática meridional).
- *Galumna (G.) kebangica* Ermilov *et* Vũ, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) khoii* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Galumna (G.) korupensis* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Galumna (G.) lanceata* (Oudemans, 1900) (*Notaspis*)
(?=*Zetes dorsalis* Koch, 1835 *sp. inq.*)
(=*Galumna dubia* Mihelčič, 1953)
(=*Galumna exiguoareata* Mihelčič, 1953)
(=*Galumna maxima* Mihelčič, 1956, *nom. praeoc.* por Willmann, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Vietnam.
- *Galumna (G.) lanceosensilla* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Uganda).
- *Galumna (G.) laselvae* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Galumna (G.) lawrencei* Jacot, 1940 (*G. maxima l.*)
(=*Galumna capensis dissimilis* Engelbrecht, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) lejeunei* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Galumna (G.) levisensilla* Ermilov *et* Anichkin, 2010
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Noreste de India).
- *Galumna (G.) longiclava* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) longiporosa* Fujikawa, 1972
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Galumna (G.) longisensilla* Liang, Yang *et* Ren, 2018
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Galumna (G.) lunaris* Jeleva, Scull *et* Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Galumna (G.) lyrica* (Jacot, 1935) (*Holokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
Galumna (G.) macroptera (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
  - *Galumna (G.) macroptera macroptera* (Ewing, 1909)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
  - *Galumna (G.) macroptera matecumbei* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) major* (Pearce, 1906) (*Oribata alata m.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Galumna (G.) makilingensis* Ermilov, Corpuz-Raros *et* Tolstikov, 2014
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Galumna (G.) mariae* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Congo) y Macaronésica (Cabo Verde).
- *Galumna (G.) media* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Galumna (G.) microfissum* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Galumna (G.) mikoi* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Galumna (G.) miniporosa* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Galumna (G.) minuta* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental (frecuente).
- *Galumna (G.) mollis* Kunst, 1958
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Galumna (G.) monteithi* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) monticola* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Galumna (G.) mystax* Pérez-Íñigo *et* Pérez-Íñigo jr., 1993
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) napoensis* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Galumna (G.) natalensis* Jacot, 1940 (*G. maxima n.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) naturalisi* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Colombia y Nueva Caledonia.
- *Galumna (G.) nigra* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica nororiental (frecuente).
- *Galumna (G.) nilgiria* (Ewing, 1910) (*Oribata*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Galumna (G.) niliaca* Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif *et* El-Deeb, 1985
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Galumna (G.) nodula* Nevin, 1974
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) nonoensis* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Galumna (G.) nortoni* Subías, 2017 *sp. inq.*
(=*Oribata alata* Packard, 1888, *nom. praeoc.* por Hermann, 1804)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: Kentucky.
- *Galumna (G.) pallida* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) paracalcicola* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) paracapensis* Ermilov, 2020
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Galumna (G.) paragibbula* Weigmann, 2011
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Galumna (G.) parakazakhstani* Ermilov *et* Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Galumna (G.) paralawrencei* Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) paramastigophora* Ermilov, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) paraoctopunctata* Ermilov, Alvarado-Rodríguez *et* Retana-Salazar, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Galumna (G.) parascaber* Deb *et* Raychaudhuri, 1975
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Galumna (G.) paratetraporosa* Ermilov, Khaustov *et* Joharchi, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Galumna (G.) paraweni* Ermilov *et* Kalúz, 2014
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Galumna (G.) parva* Woodring, 1965
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).
- *Galumna (G.) parviporosa* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) perakensis* Ermilov *et* Kalúz, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Galumna (G.) perezi* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Galumna (G.) planiclava Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga) y Japón.
  - *Galumna (G.) planiclava planiclava* Hammer, 1973
    DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
  - *Galumna (G.) planiclava ishigakiensis* Aoki, 1982
    DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Galumna (G.) polyporus* Mihelčič, 1952 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Galumna (G.) pseudokhoii* Ermilov *et* Anichkin, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).
- *Galumna (G.) pseudotriquetra* Ermilov, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) pusilla* Sellnick, 1923
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) rossica* Sellnick, 1926
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Oeste): frecuente.
- *Galumna (G.) rostrata* Sellnick, 1922 *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: I. Célebes [Sulawesi].
- *Galumna (G.) rugosa* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Caledonia).
- *Galumna (G.) sabahna* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Sumatra).
- *Galumna (G.) samoaensis* Jacot, 1924
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Galumna (G.) sandormahunkai* Ermilov *et* Starý, 2020
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Galumna (G.) scaber* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Galumna (G.) scripta* Balogh *et* Mahunka, 1966
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Galumna (G.) sequoiae* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Galumna (G.) setigera* Mihelčič, 1956
  (=*Galumna (Pergalumna) crassicostata* Mihelčič, 1956)
  (=*Galumna distincta* Mihelčič, 1956)
  (=*Galumna (Pergalumna) fusigera* Mihelčič, 1956)
  (=*Galumna sicca* Mihelčič, 1957)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Galumna (G.) similis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical y U.S.A. (Tejas).
- *Galumna (G.) sinuofrons* Jacot, 1922
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Galumna (G.) sphagni* Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Theron, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) strinovichi* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) swezeyi* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
  DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Galumna (G.) szentivanyorum* Balogh *et* P. Balogh, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) tarsipennata* Oudemans, 1914
  (=*Galumna (Pergalumna) lata* Mihelčič, 1956)
  (=*Galumna nova* Mihelčič, 1957)
  (=*Galumna parvula* Mihelčič, 1956)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica occidental: frecuente en el Sur, y Asia centrooccidental) y Brasil.
- *Galumna (G.) tessellata* (Ewing, 1910) (*Oribata*) *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Galumna (G.) tetraporosa* Ermilov, Martens *et* Tolstikov, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Galumna (G.) teuri* Ermilov *et* Klimov, 2017
(=*Galumna imperfecta* Hammer, 1972, *nom. praeoc.* por Banks, 1906)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Galumna (G.) texana* Banks, 1906
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Galumna (G.) tokyoensis* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Galumna (G.) triangulata* Bayartogtokh *et* Akrami, 2014
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Galumna (G.) tricuspidata* Engelbrecht, 1969
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) triops* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Galumna (G.) triquetra* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam) y Australiana (Australia y Nueva Caledonia).
- *Galumna (G.) tsengi* Ermilov *et* Liao, 2017
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Galumna (G.) tuberculata* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Galumna (G.) unica* Sellnick, 1923
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) valida* Aoki, 1994
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico y Nueva Caledonia).
- *Galumna (G.) varia* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Galumna (G.) virginiensis* Jacot, 1929
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental (frecuente) y China suroriental.
- *Galumna (G.) weni* Aoki *et* Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Galumna (G.) wojciechniedbalai* Ermilov, 2012
DISTRIBUCIÓN: Zambia.
- *Galumna (G.) wuzhishanensis* Liang, Yang *et* Ren, 2018
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Galumna (G.) zachvatkini* Grishina, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).

Galumna (Angulogalumna) Grishina, 1981 (3 spp.)
(=***Cuspidogalumna*** Starý, 2005)
ESPECIE TIPO: *Angulogalumna asiatica* Grishina, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.
- *Galumna (Angulogalumna) asiatica* (Girshina, 1981) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Galumna (Angulogalumna) grishinae* (Ermilov *et* Starý, 2020) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Galumna (Angulogalumna) staryi* Subías, 2010
(=*Cuspidogalumna areolata* Starý, 2005, *nom. praeoc.* por Willmann, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Galumna (Atypicogalumna) Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Atypicogalumna corpuzrarosae* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Galumna (Atypicogalumna) corpuzrarosae* (Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015) (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

Galumna (Erogalumna) Grandjean, 1966 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Erogalumna zeucta* Grandjean, 1966
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Australiana y subtropical (Paleártica meridional).
- *Galumna (Erogalumna) neonominata* Subías, 2004 (*G. (Indogalumna)*)
(=*Galumna clavata* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991, *nom. praeoc.* por Sellnick, 1931 [†])
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (Erogalumna) pterolineata* Hammer, 1972 (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Galumna (Erogalumna) rasilis* Pérez-Íñigo, 1987 (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Galumna (Erogalumna) reticulata* Hammer, 1958 (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (Erogalumna) zeucta* (Grandjean, 1966) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Panamá).

Galumna (Indogalumna) Balakrishnan, 1985 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Indogalumna microsulcata* Balakrishnan, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).
- *Galumna (Indogalumna) balakrishnani* Subías, 2010

(=*Indogalumna monticola* Balakrishnan, 1985, *nom. praeoc.* por Hammer, 1977)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Galumna (Indogalumna) microsulcata* (Balakrishnan, 1985) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Galumna (Indogalumna) parazeucta* Ermilov *et* Friedrich, 2016 (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Galumna (Indogalumna) sanctaehelenae* Balogh *et* P. Balogh, 2002 (*G.*)
(=*Galumna rugosa* Wallwork, 1977, *nom. praeoc.* por Hammer, 1968)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Galumna (Indogalumna) undulata* (Balakrishnan, 1985) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Galumna (Kabylogalumna) Bernini, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Kabylogalumna rhinoceros* Bernini, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Galumna (Kabylogalumna) rhinoceros* (Bernini, 1984) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Argelia.

Galumna (Rostrogalumna) Engelbrecht, 1973 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: (*Galumna rostrata* Engelbrecht, 1969) = *Galumna chrisengelbrechti* Ermilov *et* Klimov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
- *Galumna (Rostrogalumna) chrisengelbrechti* Ermilov *et* Klimov, 2017 (*G.*)
(=*Galumna rostrata* Engelbrecht, 1969, *nom. praeoc.* por Sellnick, 1922)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Méjico.

Globogalumna Balogh *et* P. Balogh, 1990 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Allogalumna globulifera* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.
- *Globogalumna biporosa* Ermilov *et* Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Globogalumna globulifera* (Balogh *et* Mahunka, 1978) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Heterogalumna Balogh, 1960 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Heterogalumna lineolata* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Heterogalumna lineolata* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Etiopía).
- *Heterogalumna minima* Ermilov *et* Kalúz, 2014
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Heterogalumna monticola* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Heterogalumna pygmaea* (Balogh, 1958) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.

Kunstogalumna Starý, 2005 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Kunstogalumna unica* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Kunstogalumna unica* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Leptogalumna Balogh, 1960 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Leptogalumna ciliata* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Leptogalumna (Leptogalumna) Balogh, 1960 (4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Leptogalumna (L.) ciliata* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Etiópica, Polinesia (Tahití), Cuba y Vietnam.
- *Leptogalumna (L.) dengi* Wang *et* Z. Wang, 1994
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Leptogalumna (L.) lanceolata* (Bayartogtokh *et* Akrami, 2014) (*Acrogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Leptogalumna (L.) reducta* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Leptogalumna (Aegyptogalumna) Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif *et* El-Deeb, 1985 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Aegyptogalumna mastigophora* Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif *et* El-Deeb, 1985
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Leptogalumna (Aegyptogalumna) mastigophora* (Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif *et* El-Deeb, 1985) (*A.*)
(=*Pilogalumna saboorii* Mahunka *et* Akrami, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Egipto y España) e Irán.

Neoctenogalumna Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Ctenogalumna moresonensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Neoctenogalumna (Neoctenogalumna) Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Neoctenogalumna (N.) congoensis* (Starý, 2005) (*Ctenogalumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Neoctenogalumna (N.) moresonensis* (Engelbrecht, 1972) (*Ctenogalumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Neoctenogalumna (Paractenogalumna) Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Neoctenogalumna (Paractenogalumna) longiciliata* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Neoctenogalumna (Paractenogalumna) longiciliata* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Neogalumna Hammer, 1973 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Neogalumna antenniger* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Neogalumna aethiopica* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Neogalumna antenniger* Hammer, 1973
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Neogalumna araujoi* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994) (*Galumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Bolivia).
- *Neogalumna curviporosa* Balakrishnan, 1986
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Neogalumna harrysmiti* (Ermilov, 2016) (*Galumna (N.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Neogalumna longilineata* (Ermilov *et* Anichkin, 2014) (*Galumna (N.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neogalumna longiporosa* Liang, Yang *et* Tang, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Neogalumna seniczaki* Ermilov *et* Anichkin, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neogalumna specifica* (Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015) (*Galumna (N.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Neogalumna tolstikovi* (Ermilov *et* Anichkin, 2014) (*Galumna (N.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Neogalumna tongliaoensis* (Pan *et* Liu, 2020) (*Galumna (N.)*)
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Notogalumna Sellnick, 1959 (8 spp.)
ESPECIE TIPO: *Notogalumna praetiosa* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Notogalumna africana* Mahunka, 1988
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Méjico.
- *Notogalumna floridae* (Jacot, 1929) (*Holokalumma*)
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Notogalumna foveolata* Balakrishnan, 1989
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Kerala) y Vietnam.
- *Notogalumna hexagona* (Balogh, 1960) (*Galumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Notogalumna lagunaensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Notogalumna nortoni* Ramani *et* Haq, 1990
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Notogalumna praetiosa* Sellnick, 1959
  DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai], y Borneo.
- *Notogalumna truncata* (Warburton, 1912) (*Oribata*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

Orthogalumna Balogh, 1961 (4 spp.)
(=***Mirogalumna*** Mahunka, 1993)
ESPECIE TIPO: *Orthogalumna saeva* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Orthogalumna leytensis* (Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015) (*Mirogalumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Orthogalumna saeva* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Oriental: India (Tripura) y Chnina susroriental, Japón y Pequeñas Antillas.
- *Orthogalumna terebrantis* Wallwork, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Uruguay y U.S.A. (Florida), y Etiópica: Zambia y Sudáfrica.
- *Orthogalumna xena* (Mahunka, 1993) (*Mirogalumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Ruanda.

Pergalumna Grandjean, 1936 (173 spp. y 14 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata nervosa* Berlese, 1914
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Pergalumna (Pergalumna) Grandjean, 1936 (172 spp. y 14 sspp.)
(?=***Neorizetes*** Jacot, 1933 *gen. inq.*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Pergalumna (P.) aegra* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil) y Oriental (Sur de India).
- *Pergalumna (P.) aequalis* (Sellnick, 1923) (*Stictozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) aequiporosa* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Etiopía).
- *Pergalumna (P.) akitaensis* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Pergalumna (P.) altera* (Oudemans, 1915) (*Galumna*)
(=*Galumna (Pergalumna) diversa* Mihelčič, 1956)
(=*Pergalumna harunaensis* Aoki, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Europa), Etiópica (Sudáfrica y Camerún), Oriental y Australiana (Micronesia: I. Marianas, y Nueva Caledonia).
- *Pergalumna (P.) amamiensis* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) amatholensis* Eermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2021
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pergalumna (P.) amorpha* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y China suroriental).
- *Pergalumna (P.) andasibe* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pergalumna (P.) andhraense* Raju, Appalanaidu *et* Rao, 1981
DISTRIBUCIÓN: India (Andhra Pradesh).
- *Pergalumna (P.) andicola* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) e India (Bengala Occidental).
- *Pergalumna (P.) anellata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pergalumna (P.) annulata* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Pergalumna (P.) aokii* Nakatamari, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) arborea* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Connecticut).
- *Pergalumna (P.) asetosa* Ermilov, Shtanchaeva, Kalúz *et* Subías, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Pergalumna (P.) australis* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) bellesii* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pergalumna (P.) bhaskari* Sh. Sarkar, Sanyal *et* Chakrabarti, 2012
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Pergalumna (P.) bicristata* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pergalumna (P.) bifissurata* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) y Neotropical.
- *Pergalumna (P.) bimaculata* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia (I. Tonga) y Nueva Caledonia, y Oriental.
- *Pergalumna (P.) boliviana* Ermilov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Pergalumna (P.) brasiliensis* (Sellnick, 1923) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
Pergalumna (P.) bryani (Jacot, 1934) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Neotropical.
- *Pergalumna (P.) bryani bryani* (Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Neotropical.
- *Pergalumna (P.) bryani marquesi* (Jacot, 1934) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Pergalumna (P.) bryani uapoui* (Jacot, 1934) (*Zetes*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Pergalumna (P.) caledonica* Ermilov *et* Mary, 2020
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Pergalumna (P.) californiae* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Pergalumna (P.) capualensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2016
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Pergalumna (P.) cardosensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).
- *Pergalumna (P.) cattienica* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y China suroriental).
- *Pergalumna (P.) chiyukiae* Fujikawa, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) circula* (Jacot, 1935) (*Galumna flagellifera c.*) *sp. inq.*

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Pergalumna (P.) comparandus* (Berlese, 1920) (*Oribata emarginatus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pergalumna (P.) complicata* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pergalumna (P.) confluentina* (Willmann, 1953) (*Allogalumna longipluma c.*) *sp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Pergalumna (P.) conspicua* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Congo).
- *Pergalumna (P.) corniculata* (Berlese, 1905) (*Oribata elimatus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Pergalumna (P.) corolevuensis* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico e India (Tripura).
Pergalumna (P.) corrugis (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Pergalumna (P.) corrugis corrugis* (Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Masachuset).
- *Pergalumna (P.) corrugis milleri* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Pergalumna (P.) crassipora* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Pergalumna (P.) cribriger* (Berlese, 1916) (*Oribata*)
(=*Galumna flagelliferum* Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. y Norte de Neotropical.
- *Pergalumna (P.) cubaensis* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Pergalumna (P.) cucheae* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Pergalumna (P.) dactylaris* Palacios-Vargas *et* Villagómez, 2017
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Pergalumna (P.) decorata* Balogh *et* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) decoratissima* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) dentirostrata* (Bayartogtokh *et* Akrami, 2014) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Pergalumna (P.) distincta* Liu *et* Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Pergalumna (P.) dodsoni* Nevin, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Pergalumna (P.) dubitanda* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Pergalumna (P.) ecuadorensis* Ermilov *et* Kalúz, 2012
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Pergalumna (P.) ekaterinae* Páez, Villagómez *et* Palacios-Vargas, 2019
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Pergalumna (P.) elongata* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pergalumna (P.) elongatiporosa* Ermilov, Alvarado-Rodríguez *et* Retana-Salazar, 2014
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
Pergalumna (P.) emarginata (Banks, 1895) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica y centro de Paleártica) y norte de Neotropical.
- *Pergalumna (P.) emarginata emarginata* (Banks, 1895)
(=*Zetes emarginatus bidens* Jacot, 1935)
(=*Oribata emarginatus columbianus* Berlese, 1916)
(=*Pergalumna omniphagous* Rockett *et* Woodring, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica: frecuente y Centro de Paleártica) y Norte de Neotropical.
- *Pergalumna (P.) emarginata coscobensis* (Jacot, 1935) (*Zetes*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Conéticut).
- *Pergalumna (P.) emarginata laevis* (Jacot, 1935) (*Zetes*) *ssp. inq.*
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Pergalumna (P.) enricoi* Ermilov *et* Friedrich, 2019
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Pergalumna (P.) fastigata* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pergalumna (P.) filifera* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio) y Australia.
- *Pergalumna (P.) filiformis* Fujikawa, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) finnamorei* Ermilov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Pergalumna (P.) formicaria* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental y Neártica septentrional).
- *Pergalumna (P.) foveolata* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental: Polinesia (I. Tonga) e India, y Neotropical: Brasil.
- *Pergalumna (P.) frater* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental y Japón.
- *Pergalumna (P.) fusca* (Berlese, 1916) (*Oribata (Stictozetes)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Pergalumna (P.) graminetum* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Pergalumna (P.) granulata* Balogh *et* Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Japón.
- *Pergalumna (P.) grebennikovi* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Pergalumna (P.) hastata* Aoki, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental: Filipinas e India (Bengala Occidental).
- *Pergalumna (P.) hauseri* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Pergalumna (P.) hawaiiensis (Jacot, 1934) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Pergalumna (P.) hawaiiensis hawaiiensis* (Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico y Nueva Caledonia) y Oriental (Sumatra y Vietnam).
- *Pergalumna (P.) hawaiiensis marquesana* (Jacot, 1934) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.

- *Pergalumna (P.) heroica* (Willmann, 1932) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Pergalumna (P.) horvathorum* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Pergalumna (P.) hugocoetzeeae* Ermilov *et* Khaustov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pergalumna (P.) hydrophila* (Hammer, 1962) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Pergalumna (P.) hypergranulosa* Palacios-Vargas *et* Villagómez, 2017
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Pergalumna (P.) imadatei* Aoki *et* Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Nepal).
- *Pergalumna (P.) incomperta* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Sudáfrica, y Oriental: India (Uttarakhand).
- *Pergalumna (P.) indistincta* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pergalumna (P.) indivisa* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).
- *Pergalumna (P.) infinita* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Pergalumna (P.) intermedia Aoki, 1963
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Grecia y Paleártica oriental meridional) y Norte de Oriental.
- *Pergalumna (P.) intermedia intermedia* Aoki, 1963
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Grecia y Paleártica oriental meridional) y Noreste de Oriental.
- *Pergalumna (P.) intermedia retroversa* Aoki *et* Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Norte de India).

- *Pergalumna (P.) irregularis* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Pergalumna (P.) janosbaloghi* Ermilov *et* Starý, 2020
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pergalumna (P.) jenoi* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Pergalumna (P.) jongkyui* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental.
- *Pergalumna (P.) kotschyi* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pergalumna (P.) krisperi* Ermilov *et* Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pergalumna (P.) kunsti* Ermilov *et* Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y China suroriental).
- *Pergalumna (P.) lenticulata* Ermilov *et* Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pergalumna (P.) longiporosa* Fujita *et* Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental: India (I. Andamán).
- *Pergalumna (P.) longisetosa* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Neotropical: Méjico, y Oriental: Vietnam e India (Maharastra).
- *Pergalumna (P.) louisianae* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
(=*Galumna confusa* Woodring, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.

Pergalumna (P.) magnipora (Hammer, 1961) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical, Sudáfrica y Oriental) y subtropical (Sureste de Paleártica oriental).
- *Pergalumna (P.) magnipora magnipora* (Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico).
- *Pergalumna (P.) magnipora capensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Tripura).
- *Pergalumna (P.) magnipora capillaris* Aoki, 1961 (*P. c.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.

- *Pergalumna (P.) magnipora xishuangbanna* Aoki *et* Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Pergalumna (P.) mahunkai* Ermilov, Shtanchaeva, Kalúz *et* Subías, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Pergalumna (P.) makarovae* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Pergalumna (P.) margaritata* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pergalumna (P.) mauritii* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio), Micronesia (I. Marianas) y Vietnam.
- *Pergalumna (P.) medialis* (Sellnick, 1925) (*Stictozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Pergalumna (P.) melloi* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pergalumna (P.) menglunensis* Aoki *et* Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Pergalumna (P.) microtuberculata* Bayartogtokh *et* Akrami, 2014
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Pergalumna (P.) minipora* Ermilov, Chatterjee, Kumar Das *et* Bordoloi, 2014
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Pergalumna (P.) minituberculata* Ermilov *et* Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Pergalumna (P.) minor* (Willmann, 1928) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional y U.S.A.: Nueva York).
- *Pergalumna (P.) minoricana* Pérez-Íñigo jr., 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Pergalumna (P.) montana* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Venezuela).
- *Pergalumna (P.) myrmophila* (Berlese, 1914) (*Oribata longiplumus m.*)
(=*Pergalumna iunctiporosa* Bayartogtokh *et* Akrami, 2014)
(=*Galumna linata* Oudemans, 1914)
(=*Galumna longior* Willmann, 1928)
(=*Galumna sexareata* Mihelčič, 1956)
(=*Allogalumna subaequalis* Mihelčič, 1956)
(=*Allogalumna subaequelis fusca* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica occidental: frecuente en Mediterránea, y Paquistán) y Etiópica.
- *Pergalumna (P.) nasica* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) nasifera* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Madagascar y Costa de Marfil).

Pergalumna (P.) nervosa (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.) y Sudáfrica.
- *Pergalumna (P.) nervosa nervosa* (Berlese, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.) y Sudáfrica.
- *Pergalumna (P.) nervosa retalata* (Oudemans, 1915) (*Galumna r.*)
(=*Galumna (Pergalumna) nervosa punctata* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Pergalumna (P.) nuda* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Angola y Vietnam.
- *Pergalumna (P.) numerosa* (Sellnick, 1923) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pergalumna (P.) obsessa* Subías, 2004
(=*Galumna pallida* Tseng, 1984, *nom. praeoc.* por Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Pergalumna (P.) obsidiana* Palacios-Vargas *et* Villagómez, 2017
DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Pergalumna (P.) obvia (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: California, Etiópica: Sudáfrica e I. Santa Helena, Vietnam, Hawái y Neotropical).
- *Pergalumna (P.) obvia obvia* (Berlese, 1914)
(=*Oribata obvius norvegicus* Berlese, 1914)
(=*Dimidiogalumna wallworki* Balogh *et* P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: California, Etiópica: Sudáfrica e I. Santa Helena, Vietnam, Hawái y Neotropical).
- *Pergalumna (P.) obvia sinensis* (Jacot, 1922) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Pergalumna (P.) operata* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Pergalumna (P.) ornamenta* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Pergalumna (P.) panayensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Sumatra).
- *Pergalumna (P.) paraboliviana* Ermilov *et* Gwiazdowicz, 2015
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pergalumna (P.) paracattienica* Ermilov, Chatterjee, Kumar Das *et* Bordoloi, 2014
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).

- *Pergalumna (P.) paraclericata* Ermilov, Chatterjee, Kumar Das *et* Bordoloi, 2014
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Pergalumna (P.) paradecoratissima* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Pergalumna (P.) paraelongata* Ermilov *et* Anichkin, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (Vietnam y China suroriental), Costa de Marfil y Nueva Caledonia.
- *Pergalumna (P.) paraindistincta* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Península Malaya).
- *Pergalumna (P.) paralongisetosa* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Pergalumna (P.) parapassimpunctata* Ermilov *et* Friedrich, 2016
  DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pergalumna (P.) paratsurusakii* Ermilov, Shtanchaeva, Kalúz *et* Subías, 2013
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Pergalumna (P.) parva* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) passimpunctata* Balogh *et* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Pergalumna (P.) paucisetosa* (Jacot, 1929) (*Galumna*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: "China".
- *Pergalumna (P.) pauliensis* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1991
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pergalumna (P.) persica* Akrami *et* Ebrahimi, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Pergalumna (P.) pertrichosa* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pergalumna (P.) pietertheroni* Ermilov *et* Khaustov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pergalumna (P.) plumata* Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) pocsi* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pergalumna (P.) pseudomargaritata* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Pergalumna (P.) pseudosejugalis* Ermilov *et* Anichkin, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pergalumna (P.) pterinervis* (Canestrini, 1898) (*Oribata*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Indonesia).
- *Pergalumna (P.) punctulata* Balogh *et* Mahunka, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pergalumna (P.) remota* (Hammer, 1968) (*Allogalumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Oriental (Noreste de India y Vietnam).
- *Pergalumna (P.) reniformis* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pergalumna (P.) rima* Fujikawa, 2007
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) rotunda* Starý, 2005
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) rugosala* (Ewing, 1909) (*Oribata*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Pergalumna (P.) sabitai* Sh. Sarkar, Sanyal *et* Chakrabarti, 2012
  DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Pergalumna (P.) seminervosa* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2008
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental meridional (Rumanía y Cáucaso).

Pergalumna (P.) semistriata Pérez-Íñigo jr., 1990
  DISTRIBUCIÓN: España.
  - *Pergalumna (P.) semistriata semistriata* Pérez-Íñigo jr., 1990
    DISTRIBUCIÓN: España.
  - *Pergalumna (P.) semistriata matritensis* Arillo *et* Subías, 1993
    DISTRIBUCIÓN: España.

- *Pergalumna (P.) sidorchukae* Q. Zheng, Liang, Ren *et* Yang, 2019
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Pergalumna (P.) silvatica* Hammer, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) silvestris* Hammer, 1968
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pergalumna (P.) sistanbaluchestanica* Akrami, 2021
  DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Pergalumna (P.) somalica* (Berlese, 1916) (*Oribata ovata s.*)
  DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Pergalumna (P.) storkani* Ermilov *et* Starý, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Taiwán [Formosa]).
- *Pergalumna (P.) striata* (Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980) (*Allogalumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Pequeñas Antillas).
- *Pergalumna (P.) striatiprodorsum* Ermilov, Alvarado-Rodríguez *et* Retana-Salazar, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Pergalumna (P.) strigulata* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Pergalumna (P.) sulcatomarginata* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Camerún).
- *Pergalumna (P.) sura* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) tahitiensis* Balogh *et* P. Balogh, 2002
(=*Pergalumna montana* Hammer, 1972, *nom. praeoc.* por Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Pergalumna (P.) tanzanica* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Costa de Marfil).
- *Pergalumna (P.) taprobanica* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka] e India (Bengala Occidental).
- *Pergalumna (P.) thailandensis* Ermilov *et* Khaustov, 2019
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Pergalumna (P.) titiwangsaensis* Ermilov *et* Kalúz, 2019
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Pergalumna (P.) tsavoensis* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pergalumna (P.) tsurusakii* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) tuberclesejugalis* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Pergalumna (P.) variosculpturata* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Pergalumna (P.) ventralis* (Willmann, 1932) (*Galumna*)
(=*Galumna duplicata* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Polinesia y Neotropical) y Holártica (“U.S.A.” y Paleártica: Mediterránea oriental y Este de Paleártica oriental).
- *Pergalumna (P.) virga* Fujikawa, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Pergalumna (P.) weberi (Jacot, 1935) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida) y Nueva Caledonia.
- *Pergalumna (P.) weberi weberi* (Jacot, 1935)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida) y Nueva Caledonia.
- *Pergalumna (P.) weberi plumalae* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Pergalumna (P.) willmanni* (Zachvatkin, 1953) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europea: menos frecuente en el Norte, y Suroeste de Siberia).
- *Pergalumna (P.) yurtaevi* Ermilov *et* Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam) y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).

Pergalumna (Bigalumna) Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Galuman (Bigalumna) rimosa* Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pergalumna (Bigalumna) rimosa* (Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009) (*Galumna (B.)*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Pilizetes Sellnick, 1937 (23 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pilizetes africanus* Sellnick, 1937
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Pilizetes (Pilizetes) Sellnick, 1937 (16 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Pilizetes (P.) africanus* Sellnick, 1937
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pilizetes (P.) anufrievi* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Pilizetes (P.) australis* Balogh *et* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pilizetes (P.) basilewskyi* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pilizetes (P.) brevisetus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pilizetes (P.) csoengeyi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pilizetes (P.) curtipilus* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Pilizetes (P.) denticulatus* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Pilizetes (P.) dudichi* Balogh, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Costa de Marfil).
- *Pilizetes (P.) paradudichi* Ermilov, Starý *et* Kontschán, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Pilizetes (P.) parasellnicki* Ermilov, Starý *et* Kontschán, 2018
DISTRIBUCIÓN: Camerún.

- *Pilizetes (P.) saskai* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pilizetes (P.) sellnicki* Balogh, 1958
  DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Pilizetes (P.) subglaber* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pilizetes (P.) subsimilis* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Pilizetes (P.) tuberculatus* Mahunka, 1994
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

Pilizetes (Neopilizetes) Balogh *et* P. Balogh, 1990 (6 spp.)
(?=***Kratzensteinia*** Oudemans, 1919 *gen. inq.*)
ESPECIE TIPO: *Pilizetes neotropicus* Balogh *et* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Pilizetes (Neopilizetes) neotropicus* Balogh *et* Mahunka, 1978 (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).
- *Pilizetes (Neopilizetes) rugifrons* (Stoll, 1891) (*Oribata*) *sp. inq.*
  DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Pilizetes (Neopilizetes) thoracicus* (Amorim, Norton *et* Oliveira, 2018) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pilizetes (Neopilizetes) tigris* (Amorim, Norton *et* Oliveira, 2018) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pilizetes (Neopilizetes) triumnasus* (Amorim, Norton *et* Oliveira, 2018) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pilizetes (Neopilizetes) unumnasus* (Amorim, Norton *et* Oliveira, 2018) (*N.*)
  DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Pilizetes (Pseudopilizetes) Ermilov, 2017 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pilizetes (Pseudopilizetes) camerunensis* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Pilizetes (Pseudopilizetes) camerunensis* Ermilov, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Camerún y Tanzania).

Pilogalumna Grandjean, 1956 (15 spp. y 6 sspp.)
(=***Disparagalumna*** Hammer, 1973)
ESPECIE TIPO: *Pilogalumna ornatula* Grandjean, 1956
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Pilogalumna arabica* Bayoumi *et* Al-Khalifa, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Península Arábiga.
- *Pilogalumna binadalares* (Jacot, 1929) (*Galumna areolata b.*)
  DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Pilogalumna bloemfonteinensis* Engelbrecht, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Pilogalumna cozadensis* Nevin, 1976
  DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nebraska).

Pilogalumna crassiclava (Berlese, 1914) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.

- *Pilogalumna crassiclava crassiclava* (Berlese, 1914)
  (=*Galumna adareata* Mihelčič, 1957)
  (=*Galumna allifera* Oudemans, 1915)
  (=*Allogalumna molensis* Mihelčič, 1957)
  DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (frecuente).
- *Pilogalumna crassiclava longiareata* Pérez-Íñigo, 1976 (*P. allifera l.*)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Pilogalumna crassiclava montana* Grishina *et* Sergienko, 1978 (*P. allifera m.*)
  DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.

- *Pilogalumna hogsbackensis* Eermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2021
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pilogalumna kimberleyensis* Engelbrecht, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pilogalumna minima* Liu *et* Wu, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Pilogalumna ornatula Grandjean, 1956
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Méjico y Etiopía.

- *Pilogalumna ornatula ornatula* Grandjean, 1956
  (=*Allogalumna pterata* Mihelčič, 1957)
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Méjico y Etiopía.
- *Pilogalumna ornatula fayoumensis* Abd-el-Hamid, 1965
  DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Pilogalumna rosauraruizae* Villagómez *et* Palacios-Vargas, 2015
  DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Pilogalumna rostrata* (Fujikawa, 2008) (*Disparagalumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pilogalumna steinmanni* Aoki, 1975
  DISTRIBUCIÓN: Corea.

Pilogalumna tenuiclava (Berlese, 1908) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
-*Pilogalumna tenuiclava tenuiclava* (Berlese, 1908)
(?=*Acarus alatus* Schrank, 1803 *sp. inq.*)
(?=*Acarus aquaticus marginatus* De Geer, 1778 *sp. inq.*)
(=*Galumna areolata* Willmann, 1923)
(=*Allogalumna atra* Mihelčič, 1957)
(=*Allogalumna boevi* Krivolutskaja, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Europa).
- *Pilogalumna tenuiclava halli* (Jacot, 1929) (*Galumna areolata h.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Pilogalumna tenuiclava hispida* (Jacot, 1935) (*Galumna alata h.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Pilogalumna tenuiclava recta* (Mihelčič, 1957) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Pilogalumna tongaensis* (Hammer, 1973) (*Disparagalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Pilogalumna variabilis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Tripura).

Psammogalumna Balogh, 1943 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Stictozetes hungaricus* Sellnick, 1925
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Psammogalumna hungarica* (Sellnick, 1925) (*Stictozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (excepto extremos Este y Oeste).
- *Psammogalumna iranica* Akrami, Irani-Nejad *et* Mirzaie, 2011
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Irán y Cáucaso).
- *Psammogalumna thysanura* (Krivolutskaja, 1952) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

Sacculogalumna Engelbrecht, 1973 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Sacculogalumna saccularis* Engelbrecht, 1973
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.
- *Sacculogalumna hexasacculata* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Sacculogalumna saccularis* Engelbrecht, 1973
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Sacculogalumna samarensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Sacculogalumna suiyangensis* Liang, Yang *et* Huang, 2012
DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Cáucaso.

Setogalumna P. Balogh, 1985 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Setogalumna excellens* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Paleártica meridional.
- *Setogalumna ambigua* (Wallwork, 1977) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Setogalumna diminuta* Arillo *et* Subías, 1993
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Setogalumna excellens* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Setogalumna luzonica* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Setogalumna minisetosa* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2016
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Sphaerogalumna Balogh, 1961 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Pergalumna index* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Sphaerogalumna index* (Balogh, 1960) (*Pergalumna*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.

Stictozetes Berlese, 1916 (6 spp.)
(=***Strabogalumna*** Mahunka, 1995)
(=***Trachygalumna*** Balogh, 1960)
ESPECIE TIPO: *Oribata (Stictozetes) scaber* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
- *Stictozetes bisulcatus* (Balogh, 1960) (*Trachygalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Stictozetes ihaguensis* Eermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2021
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Stictozetes margaritae* (Mahunka, 1993) (*Trachygalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Stictozetes microporosa* (Mahunka, 1986) (*Trachygalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Stictozetes psadilliferus* (Mahunka, 1995) (*Strabogalumna*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Stictozetes scaber* (Berlese, 1916) (*Oribata (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.

Taeniogalumna Balogh, 1962 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Taeniogalumna sphaerula* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Taeniogalumna behanae* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Taeniogalumna sphaerula* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Taeniogalumna tanzanica* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Trichogalumna Balogh, 1960 (34 spp.)
ESPECIE TIPO: *Pilogalumna lunai* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Trichogalumna (Trichogalumna) Balogh, 1960 (31 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Trichogalumna (T.) africana* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Zambia).
- *Trichogalumna (T.) albomaculata* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Trichogalumna (T.) arborea* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) atypica* Ermilov *et* Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Trichogalumna (T.) boninensis* Hagino, Bayartogtokh *et* Shimano, 2017
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) chimaera* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) chitralensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán e India: Bengala Occidental.
- *Trichogalumna (T.) curva* (Ewing, 1907) (*Oribata*)
(=*Oribata tantillus* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. centrooriental: frecuente, y Este de Paleártica oriental).
- *Trichogalumna (T.) duoporosa* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Trichogalumna (T.) ekaterinae* Bayartogtokh *et* Shimano, 2019
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (Palau).
- *Trichogalumna (T.) gotoensis* Shirosaki, Nakamura *et* Fujikawa, 2017
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) granuliala* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) hygrophila* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) imperfecta* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) interlamellaris* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2016
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Trichogalumna (T.) lineata* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) lunai* (Balogh, 1958) (*Pilogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Chad) y Japón.
- *Trichogalumna (T.) madagassica* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Trichogalumna (T.) mexicana* Villagómez *et* Palacios-Vargas, 2013
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Trichogalumna (T.) microseta* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Trichogalumna (T.) mironovi* Ermilov *et* Starý, 2018
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Trichogalumna (T.) montana* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: África central.
- *Trichogalumna (T.) nabhitabhatai* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Trichogalumna (T.) nipponica* (Aoki, 1966) (*Pergalumna duplicata n.*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica meridional (Cáucaso y Sureste de Paleártica oriental: frecuente), Paleotropical y Neotropical (Ecuador).
- *Trichogalumna (T.) ohkuboi* Hagino, Bayartogtokh *et* Shimano, 2017
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) pumularis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Trichogalumna (T.) punctata* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Trichogalumna (T.) seminuda* Balogh, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo) e India (Tripura).
- *Trichogalumna (T.) subnuda* Balogh *et* Mahunka, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Trichogalumna (T.) taeniata* Hammer, 1971
  DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Trichogalumna (T.) trowella* Nakamura, Y.- N. Nakamura *et* Fujikawa, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) vietnamica* Mahunka, 1987
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Trichogalumna (Sarawakiella) Mahunka, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sarawakiella longipilosa* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Trichogalumna (Sarawakiella) longipilosa* (Mahunka, 1966) (*S.*)
  DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Trichogalumna (Tanzanycha) Koçak *et* Kemal, 2008 (1 sp.)
(=***Didymonycha*** Mahunka, 1984, *nom. praeoc.* por Aurivillius, 1922)
ESPECIE TIPO: *Didymonycha hesperis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Trichogalumna (Tanzanycha) hesperis* (Mahunka, 1984) (*Didymonycha*)
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Vaghia Oudemans, 1919 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata (Stictozetes) stupendus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica, Oriental y Neotropical).
- *Vaghia blascoi* Travé, 1981
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Vaghia carinata* (Travé, 1956) (*Galumna*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa y Méjico.
- *Vaghia simplex* Travé, 1957
  DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Vaghia stupenda* (Berlese, 1916) (*Oribata (Stictozetes)*)
  DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Vaghia uniporosa* Arillo *et* Subías, 1993
  DISTRIBUCIÓN: España.

Galumnellidae Balogh, 1960 (5 gen., 3 subgen. y 49 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Galumnella Berlese, 1916 (29 spp.)
ESPECIE TIPO: *Galumnella paradoxa* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

Gallumnella (Galumnella) Berlese, 1916 (28 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Galumnella (G.) apiculata* Mahunka, 1992
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Galumnella (G.) areolata* Balogh, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Galumnella (G.) baleensis* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2010
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Galumnella (G.) cellularis* Balogh *et* Mahunka, 1967
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumnella (G.) geographica* Mahunka, 1995
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).
- *Galumnella (G.) indica* Balakrishnan, 1989
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Galumnella (G.) junichiaokii* Ermilov, Corpuz-Raros *et* Shimano, 2014
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Galumnella (G.) microporosa* Ermilov *et* Anichkin, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Nepal).
- *Galumnella (G.) nipponica* Suzuki *et* Aoki, 1970
  (=*Galumnella angustifrons* Aoki, 1970)
  DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.
- *Galumnella (G.) nonporosa* Liang, Yang, Ren *et* Q. Zheng, 2019
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Galumnella (G.) okinawana* Aoki, 2009
  DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Galumnella (G.) paracellularis* Ermilov *et* Starý, 2018
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumnella (G.) paradoxa* Berlese, 1916
  DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Galumnella (G.) parageographica* Ermilov *et* Kalúz, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Arunachal Pradesh) y China suroriental.

- *Galumnella (G.) paraokinawana* Ermilov *et* Khaustov, 2019
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Galumnella (G.) pauliani* Balogh, 1961
  DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.
- *Galumnella (G.) pilosa* Engelbrecht, 1972
  DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumnella (G.) processa* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Galumnella (G.) pulchella* (Aoki *et* Hu, 1993) (*Porogalumnella*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Galumnella (G.) punctipennis* Balogh, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Galumnella (G.) quezonensis* Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017
  DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Galumnella (G.) rugosa* Balogh, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Congo e Irán.
- *Galumnella (G.) rugosula* Balogh, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Galumnella (G.) sidorchukae* Liang, Yang, Ren *et* Q. Zheng, 2019
  DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Galumnella (G.) subareolata* Mahunka, 1969
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Galumnella (G.) tanzanica* Mahunka, 1984
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Galumnella (G.) tiunovi* Ermilov *et* Anichkin, 2013
  DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumnella (G.) woschitzi* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Galumnella (Bigalumnella) Mahunka, 1994 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Bigalumnella csavasorum* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Galumnella (Bigalumnella) csavasorum* (Mahunka, 1994) (*B.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).

Galumnopsis Grandjean, 1931 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Galumnopsis holoscripta* Grandejan, 1931
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Galumnopsis (Galumnopsis) Grandjean, 1931 (11 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).

- *Galumnopsis (G.) africana* (Mahunka, 1978) (*Porogalumnella.*)
  DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Galumnopsis (G.) clavata* Mahunka, 1983
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Galumnopsis (G.) giganteus* Ermilov, Sidorchuk *et* Rybalov, 2011
  DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Galumnopsis (G.) holoscripta* Grandjean, 1931
  DISTRIBUCIÓN: Panamá.
- *Galumnopsis (G.) lanceosensilla* Ermilov *et* Kalúz, 2012
  DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Galumnopsis (G.) longisetus* Mahunka, 1986
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Galumnopsis (G.) rostrata* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Galumnopsis (G.) ruginervis* Balogh, 1962
  DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Galumnopsis (G.) sagitta* Balogh, 1970
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Galumnopsis (G.) secunda* (Sellnick, 1923) (*Galumnella*)
  DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumnopsis (G.) sellnicki* Balogh, 1960
  DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Galumnopsis (Porogalumnella) Balogh, 1968 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Porogalumnella quadriporosa* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).

- *Galumnopsis (Porogalumnella) microsetosa* (Ermilov *et* Kalúz, 2013) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Galumnopsis (Porogalumnella) quadriporosa* (Balogh, 1968) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea, Filipinas y Méjico.
- *Galumnopsis (Porogalumnella) reducta* (Mahunka, 1995) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Galumnopsis (Porogalumnella) setosa* (Balakrishnan *et* Haq, 1982) (*P.*)
  DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Iberogalumnella Arillo *et* Subías, 1993 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Iberogalumnella alandalusica* Arillo *et* Subías, 1993
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Iberogalumnella alandalusica* Arillo *et* Subías, 1993
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Monogalumnella Mahunka, 1986 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Monogalumnella neotricha* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Monogalumnella (Monogalumnella) Mahunka, 1986 (1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Monogalumnella (M.) neotricha* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Monogalumnella (Trichogalumnella) Mahunka, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trichogalumnella hauseri* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Monogalumnella (Trichogalumnella) hauseri* (Mahunka, 1992) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.

Trypogalumnella Mahunka, 1995 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Trypogalumnella poronota* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Trypogalumnella densoporosa* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Trypogalumnella poronota* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

INDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS
(Cuando se trata de un subgénero, entre paréntesis figura el género al que pertenece)

Abchasiella Gordeeva *et* Tarba, 1990 (=***Lauroppia***)
Acanthobelba Enami *et* Aoki, 1993
Acanthozetes Balogh, 1958
Acaroceras Grandjean, 1936
Acaronychus Grandjean, 1932
Achiperia Berlese, 1885
Achipterina Berlese, 1916
Aciculoppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Oxyoppia***)
Acrogalumna Grandjean, 1956 (***Allogalumna***)
Acronothrus Berlese, 1916 (=***Crotonia***)
Acroppia Balogh, 1983
Acrotocepheus Aoki, 1965 (***Otocepheus***)
Acrotritia Jacot, 1923
Acupedicellus Hunt *et* Lee, 1995 (=***Pedrocortesella***)
Acutoppia Balogh, 1983
Acutozetes Balogh, 1970
Adamaeus Norton, 1977 (***Damaeus***)
Adelphacarus Grandjean, 1932
Adhaesozetes Hammer, 1966
Adoribatella Woolley, 1967
Adoristes Hull, 1916
Adrodamaeus Paschoal, 1984
Aedoplophora Grandjean, 1932 (=***Prototritia***)
Aegyptogalumna Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif *et* El-Deeb, 1985 (***Leptogalumna***)
Aellenobates Mahunka, 1978 (=***Grandjeanobates***)
Aeroppia Hammer, 1961
Aethioppia Balogh, 1983
Afreremella Mahunka, 1974 (=***Licnocepheus***)
Afrhypochthonius Balogh, 1958 (=***Eohypochthonius***)
Africacarus Wallwork, 1965 (=***Farchacarus***)
Africogalumna Starý, 2005
Africoribates Evans, 1953
Afroleius Mahunka, 1984
Afroliochthonius Mahunka, 1995 (***Liochthonius***)
Afronothrus Wallwork, 1961
Afroppia Koçak *et* Kemal, 2008
Afrotocepheus Mahunka, 1985
Afrotritia Mahunka, 1988 (***Indotritia***)
Afrozetes Engelbrecht, 1972
Afticarabodes Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
Akansilvanus Fujikawa, 1993
Akrodamaeus Norton, 1979 (=***Parabelbella***)
Alaskozetes Hammer, 1955
Albonothrus Tseng, 1982 (=***Trhypochthonius***)
Alcioppia Balogh, 1983 (=***Ramusella***)
Aleurodamaeus Grandjean, 1954
Alismobates Luxton, 1992
Allobelba Kunst, 1961
Allodamaeus Banks, 1947
Allogalumna Grandjean, 1936
Allomycobates Aoki, 1976
Allonothrus Hammen, 1953
Allopelops Hammer, 1952 (=***Eupelops***)
Alloribates Banks, 1947 (=***Protoribates***)
Allosuctobelba Moritz, 1970
Allozetes Berlese, 1913
Allozetes Higgins, 1965 (=***Kalyptrazetes***)
Allozetes Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1971 (=***Feiderzetes***)
Alphypochthonius Schweizer, 1956 (=***Melanozetes***)
Alpizetes Mahunka, 2001 (***Zachvatkinibates***)
Altrhypochthonius Weigmann, 1997 (=***Mainothrus***)
Amazoppia Balogh *et* Mahunka, 1969
Ambrobates Mahunka, 2009 (=***Euscheloribates***)
Ameriglobopppia Subías, 1989 (***Neoamerioppia***)
Amerioppia Hammer, 1961
Amerobelba Berlese, 1908
Ameronothrus Berlese, 1896
Amerus Berlese, 1896
Ametroproctus Higgins *et* Woolley, 1968
Amiracarus Miko, 2013
Amnemochthonius Grandjean, 1949
Amolops Hull, 1916 (=***Ramusella***)
Ampullobates Grandjean, 1962
Amuracarus Lange, 1975 (=***Stomacarus***)
Anachipteria Grandjean, 1932
Anakingia Hammer, 1961
Anarea Dalenius, 1958 (=***Halozetes***)
Ancestroppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Neotrichoppia***)
Andacarus Grandjean, 1958 (=***Stomacarus***)
Anderemaeus Hammer, 1958
Andesamerus Hammer, 1962
Andesperuviella Paschoal, 1989 (=***Pheroliodes***)
Andeszetes Hammer, 1961 (=***Scheloribates***)
Anellozetes Hammer, 1962 (=***Antarctozetes***)
Angelia Berlese, 1885 (=***Nothrus***)
Angullozetes Hammer, 1967
Angulogalumna Grishina, 1981 (***Galumna***)
Anisochthodes Newell, 1957 (=***Tuberemaeus***)
Annectacarus Grandjean, 1950
Annobonzetes Pérez-Íñigo, 1983
Anomaloppia Subías, 1978
Anoplozetes Lee *et* Pajak, 1987
Anoribatella Kunst, 1962 (=***Tectoribates***)
Anoripoda Sellnick, 1959
Antarcticola Wallwork, 1967
Antarctoplophora Mahunka, 1980 (=***Austrophthiracarus***)
Antarctozetes Balogh, 1961 (=***Antarctozetes***)
Antennoppia Mahunka, 1983 (***Lasiobelba***)
Antillobodes Mahunka, 1985 (=***Phyllocarabodes***)
Antilloppia Mahunka, 1985 (=***Neoppia***)
Antongilibodes Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014
Aokibates Mahunka, 1988 (***Peloribates***)
Aokibelba Subías *et* Shtanchaeva, 2013 (***Ctenobelba***)
Aokiella Balogh *et* Mahunka, 1967
Aphelacarus Grandjean, 1932
Apograptoppia Subías *et* Rodríguez, 1985 (***Graptoppia***)
Apolohmannia Aoki, 1960 (***Perlohmannia***)
Apoplophora Aoki, 1980
Apotomocepheus Aoki, 1965
Apotritia Norton *et* Lions, 1992
Aquanothrus Engelbrecht, 1975
Arborichthonius Norton, 1982
Arceremaeus Hammer, 1961
Archegocepheus Aoki, 1965
Archegotocepheus Mahunka, 1988 (***Megalotocepheus***)
Archegozetes Grandjean, 1931
Archeonothrus Trägårdh, 1906
Archeremella Balogh *et* Mahunka, 1974
Archiphthiracarella Mahunka, 1996 (=***Archiphthiracarus***)
Archiphthiracarus Balogh *et* Mahunka, 1979 (***Phthiracarus***)
Archoplophora Hammen, 1959
Arcoppia Hammer, 1977
Arcozetes Hammer, 1958
Arenozetes Krivolutsky, 1971
Areozetes Hammer, 1961
Argentinobates Fernández, 1984 (=***Hydrozetes)***
Argentinovertex Fernández *et* Cleva, 2002 (=***Arthrovertex***)
Aribates Aoki, Takaku *et* Ito, 1994
Arotrobates Luxton, 1992
Arphthicarus Niedbała, 1994 (=***Notophthiracarus***)
Arthrhoplophora Berlese, 1910
Arthrochthonius Ewing, 1917 (=***Hypochthoniella***)
Arthrodamaeus Grandjean, 1954
Arthronothrus Trägårdh, 1910 (=***Eulohmannia***)
Arthrovertex Balogh, 1970
Asiacarus Krivolutsky, 1971 (=***Thamnacarus***)
Asperemaeus Behan-Pelletier, 1982
Astegistes Hull, 1916
Atalotegaeus Luxton, 1988
Atopochthonius Grandjean, 1949
Atropacarus Ewing, 1917
Atypicogalumna Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti *et* Scheu, 2015 (***Galumna***)

Ausoribula Lee, 1992 (***Phauloppiella***)
Austracarus Balogh *et* P. Balogh, 1983 (=***Ozacarus***)
Austracarus Mahunka, 1984 (=***Ululohmannia***)
Austrachipteria Balogh *et* Mahunka, 1966
Austrocarabodes Hammer, 1966
Austroceratobates Mahunka, 1985 (=***Limnozetella***)
Austroceratoppia Hammer, 1979
Austrodamaeus Balogh *et* Mahunka, 1981
Austroeremulus Mahunka, 1985
Austroflexa Subías, 2019 (***Austrocarabodes***)
Austrogneta Balogh *et* Csiszár, 1963
Austronothrus Hammer, 1966
Austrophthiracarus Balogh *et* Mahunka, 1978 (=***Austrophthiracarus***)
Austroppia Balogh, 1983
Austrotritia Sellnick, 1959
Austrozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (=***Rhopalozetes***)
Autogneta Hull, 1916
Autoppia Golosova *et* Karppinen, 1983 (=***Tripiloppia***)
Baioppia Luxton, 1985 (***Lanceoppia***)
Bakobodes Mahunka, 1996 (=***Pseudocarabodes***)
Balazsella Mahunka, 1983 (=***Phylloribatula***)
Baloghacarus Mahunka, 1983
Baloghates Özdikmen, 2008 (***Protoripoda***)
Balogheremaeus Arillo *et* Subías, 2006
Baloghia Mahunka, 1994
Baloghiella Bulanova-Zachvatkina, 1972
Baloghobates Hammer, 1967 (=***Humerobates***)
Baloghodes Mahunka, 1986 (***Austrocarabodes***)
Baloghoizetes Mahunka, 2003
Baloghoppia Mahunka, 1983
Balzania Jacot, 1929 (=***Conoppia***)
Banksia Oudemans *et* Voigts, 1905 (=***Xenillus***)
Banksinoma Oudemans, 1930
Banksinus Jacot, 1938 (=***Humerobates***)
Baobabula Mahunka, 1975 (***Gerloubia***)
Basiceramerus Corpuz-Raros, 1979
Basidoppia Mahunka, 1983
Basilobelba Balogh, 1958
Basiloppia Balogh, 1983
Bathocepheus Aoki, 1978
Beckiella Grandjean, 1964
Bedoslohmannia Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
Behanpseudoppia Subías, 2017
Beklemishevia Zachvatkin, 1945
Belba Heyden, 1826
Belbodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1967
Belemacarus Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1997 (=***Guaranozetes***)
Belloppia Hammer, 1968
Belorchestes Grandjean, 1951
Benoibates Balogh, 1958
Berlesezetes Mahunka, 1980
Berlesiella Hammer, 1979
Berndamerus Mahunka, 1977 (***Ctenobelba***)
Berndbella Mahunka, 1985 (=***Caveremulus***)
Berndia Mahunka, 1988 (=***Topobates***)
Berndibula Mahunka, 2000 (=***Trischeloribates***)
Berndobodes Mahunka, 1986 (***Yoshiobodes***)
Berndotritia Mahunka, 1987 (=***Oribotritia***)
Berniniella Balogh, 1983
Berniniella Özdikmen, 2008 (=***Fberninia***)
Besuchetacarus Mahunka, 1985 (***Hoplophthiracarus***)
Bicristoppia Subías, 1989 (***Lanceoppia***)
Bicyrthermannia Hammer, 1979
Biethiovertex Subías, 2020 (***Ethiovertex***)
Bifurcobelba Subías *et* Shtanchaeva, 2010 (***Ctenobelba***)
Bigalumna Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009 (***Pergalumna***)
Bigalumnella Mahunka, 1994 (***Galumnella***)
Bihaplozetes Subías, 2020 (***Indoribates***)
Bilauritzenia Subías, 2020 (***Lauritzenia***)
Bimagyaria Subías, 2020 (***Magyaria***)
Bioppia Mahunka *et* Paoletti, 1984 (=***Ramusella***)
Bioribatella Subías, 2017 (***Oribatella***)
Bipassalozetes Mihelčič, 1957
Bipectinoppia Subías *et* Shtanchaeva, 2011 (=***Paramedioppia***)
Birobates Balogh, 1970
Birotegaeus Luxton, 1988
Birsteinius Krivolutsky, 1965
Bischeloribates Mahunka, 1988 (***Scheloribates***)
Biunguis Subías, 2018 (***Protoribates***)
Bolkiah Mahunka, 1997 (=***Indoribates***)
Boreozetes Hammer, 1955 (=***Neogymnobates***)
Borhidia Balogh *et* Mahunka, 1974
Bornebuschia Hammer, 1966
Bornemiszaella P. Balogh, 1994 (***Hammerella***)
Borneozetes Mahunka, 1997
Borneremaeus Mahunka, 1991
Bovicarabodes Fernández, Theron *et* Rollard, 2013
Brachioppia Hammer, 1961
Brachioppiella Hammer, 1962
Brachychochthonius Jacot, 1938 (=***Brachychthonius***)
Brachychthonius Berlese, 1910
Brachyoripoda Balogh, 1970
Brasiliotritia Märkel, 1964 (=***Euphthiracarus***)
Brasilobates Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980 (=***Triaunguis***)
Brazilobates Koçak *et* Kemal, 2008 (=***Salvus***)
Brasiloppia Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1986 (***Leoppia***)
Brassiella Balogh, 1970
Brassoppia Balogh, 1983
Brazilozetes Balogh *et* Mahunka, 1969
Bruneibelba Mahunka, 2001 (=***Ussuribata***)
Bruneiella Mahunka, 1997 (=***Sacculobates***)
Bukitritia Mahunka, 1990
Bulbocepheus Mahunka, 1988
Bulleremaeus Hammer, 1966
Bullibates Subías *et* Shtanchaeva, 2012
Bunabodes Fujikawa, 2004
Bursoplophora Subías *et* Pérez-Íñigo, 1978
Caenobelba Norton, 1980 (***Belba***)
Caenosamerus Higgins *et* Woolley, 1969
Caleremaeus Berlese, 1910
Calhoplophora Berlese, 1923 (=***Tropacarus***)
Calipteremaeus Paschoal, 1987
Calobates Balogh, 1961 (=***Baloghates***)
Caloppia Balogh, 1958 (=***Zetorchella***)
Calozetes Balogh *et* Mahunka, 1969
Calugarella Balogh *et* P. Balogh, 1992 (***Unguizetes***)
Calvoppia Jacot, 1934 (=***Phauloppia***)
Calyptophthiracarus Aoki, 1980 (***Hoplophthiracarus***)
Calyptozetes Thor, 1930 (***Mycobates***)
Camisia Heyden, 1826
Campachipteria Aoki, 1995
Campbellobates Wallwork, 1964
Campbelloppia Luxton, 1985 (***Solenoppia***)
Canaloppia Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998 (***Berniniella***)
Canaribates Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994 (=***Incabates***)
Cantharozetes Hammer, 1961
Capillibates Hammer, 1966
Capillonothrus Kunst, 1971 (***Heminothrus***)
Capilloppia Balogh *et* Mahunka, 1966
Capillozetes Balogh, 1943 (=***Peloribates***)
Carabocepheus Berlese, 1910
Carabodella Mahunka, 1986 (=***Hardybodes***)
Carabodes Koch, 1835
Carabodoides Jacot, 1937 (=***Epieremulus***)
Carabozetes Mihelčič, 1957 (=***Rostrozetes***)
Cardioribates Jacot, 1934 (=***Podoribates***)
Carinabella Hammer, 1977
Carinogalumna Engelbrecht, 1973
Carinozetes Pfingstl *et* Schuster, 2012
Carolohmannia Norton, Metz *et* Sharma, 1978 (***Lohmannia***)
Cassioppia Poltavskaya, 1994 (=***Lalmoppia***)
Caucaseremaeus Subías *et* Shtanchaeva, 2006
Caucasiobelba Subías *et* Shtanchaeva, 2010 (***Ctenobelba***)
Caucasiozetes Shtanchaeva, 1984
Caudamaeolus P. Balogh, 1988
Cavaecarabodes Fernández, Theron, Rollard *et* Castillo, 2014
Caveremulus Mahunka, 1983
Cavernella Bernini, 1975 (=***Fberninia***)
Cavernocarabodes Mahunka, 1974
Cavernocepheus Balogh *et* Mahunka, 1969
Cavernozetes Mahunka, 1984

Celaeno Koch, 1835 (=***Eupelops***)
Centroribates Berlese, 1914
Cepheus Koch, 1835
Cerachipteria Grandjean, 1935
Ceratobates Balogh *et* Mahunka, 1969
Ceratokalumma Balogh, 1970 (=***Achipterina***)
Ceratoppia Berlese, 1908
Ceratoppiella Hammer, 1977
Ceratorchestes Balogh *et* Mahunka, 1969
Ceratotenuiala Aoki *et* Maruyama, 1983
Ceratozetella Shaldybina, 1966
Ceratozetes Berlese, 1908
Ceratozetoides Shaldybina, 1966 (=***Ceratozetella***)
Ceresella Pavlichenko, 1993 (=***Ceratozetella***)
Cerocepheus Trägårdh, 1931
Ceroribatula Lee *et* Birchby, 1989 (=***Oribatula***)
Cerostocepheus Mahunka, 1973
Ceylobodes Balogh *et* P. Balogh, 1992
Chamobates Hull, 1916
Chamozetes Sellnick, 1974 (=***Ocesobates***)
Charassobates Grandjean, 1929
Chaunoproctellus Mahunka, 1992 (=***Zetorchella***)
Chaunoproctus Pearce, 1906 (=***Zetorchella***)
Chavinia Hammer, 1961
Cheloppia Hammer, 1971
Chistyakovella Ermilov, Aoki *et* Anichkin, 2013
Choixenillus Subías, 2016
Christovizetes Krivolutsky, 1975
Chudalupia Wallwork, 1981
Chuoppia Tseng, 1982 (=***Arcoppia***)
Cilioppia Balogh, 1983 (=***Lasiobelba***)
Circellobates Luxton, 1992
Clavazetes Hammer, 1966 (=***Papillocepheus***)
Claviceps Canestrini *et* Fanzago, 1877 (?=***Trichoribates***)
Coartobelba Mahunka, 2001
Coetzeella Ermilov, Hugo-Coetzee *et* Khaustov, 2107
Coggiella Berlese, 1916 (=***Joelia***)
Collohmannia Sellnick, 1922
Comeremaeus Hammer, 1962
Comororibula Mahunka, 1994 (=***Berlesiella***)
Comorozetes Mahunka, 1994
Compactozetes Hammer, 1966
Conchogneta (***Autogneta***) Grandjean, 1963
Condylobelba Mahunka, 2001
Condyloppia Balogh, 1983
Confinoppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Neotrichoppia***)
Congocepheus Balogh, 1958
Congoppia Balogh, 1983
Conoppia Berlese, 1908
Conozetes Balogh *et* Mahunka, 1969
Constrictobates Balogh *et* Mahunka, 1966
Constrictocepheus Grobler, 1998 (=***Pseudotocepheus***)
Convergoppia Balogh, 1983 (***Lanceoppia***)
Cordiozetes Mahunka, 1983
Cordylobates Luxton, 1995 (=***Humerobates***)
Coronibatula Mahunka, 1988
Coronoquadroppia Ohkubo, 1995 (***Quadroppia***)
Coropoculia Aoki *et* Fujikawa, 1972 (***Ametroproctus***)
Corynobates Balogh *et* P. Balogh, 1992 (=***Euscheloribates***)
Corynoppia Balogh, 1983
Cosmobates Balogh, 1959
Cosmochthonius Berlese, 1910
Cosmogalumna Aoki, 1988 (***Flagellozetes***)
Cosmogneta Grandjean, 1960
Cosmohermannia Aoki *et* Yoshida, 1970
Cosmopirnodus Balogh, 1970
Cosmoppia Balogh, 1983 (=***Dissorhina***)
Cosmozetes Balogh *et* Mahunka, 1969
Costacarabodes Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2018
Costeremus Aoki, 1970
Crassoribatula Hammer, 1967
Cretoppia Mahunka, 1986 (=***Teratoppia***)
Cribrozetes Balogh, 1970
Cristamerus Hammer, 1977 (=***Gymnodampia***)
Cristeremaeus Balogh *et* Csiszár, 1963
Cristonothrus Subías, 2004 (***Tyrphonothrus***)
Crotonia Thorell, 1876
Cryptacarus Grandjean, 1950
Cryptobothria Wallwork, 1963
Cryptogalumna Grandjean, 1957
Cryptoplophora Grandjean, 1932
Cryptoppia Csiszár, 1961
Cryptoribatula Jacot, 1934
Cryptozetes Hammer, 1962 (=***Dometorina***)
Csibiplophora Mahunka, 1984 (=***Bursoplophora***)
Ctenacarus Grandjean, 1939
Ctenamerus Balogh *et* P. Balogh, 1992
Ctenobelba Balogh, 1943
Ctenogalumna Balogh, 1961 (=***Allogalumna***)
Ctenoppia Balogh, 1983
Ctenoppiella Gordeeva *et* Karppinen, 1988 (=***Lauroppia***)
Cubabodes Balogh *et* Mahunka, 1974
Cubacepheus Balogh *et* Mahunka,1979 (=***Reticulocepheus***)
Cubachipteria Balogh *et* Mahunka, 1979
Cubaoppia Balogh, 1983
Cultrobates Willmann, 1930
Cultroribella Mahunka, 1985
Cultroribula Berlese, 1908
Cultrozetes Sellnick, 1922 (=***Astegistes***)
Cuneoppia Balogh *et* Mahunka, 1969
Cuspidogalumna Starý, 2005 (=***Angulogalumna***)
Cuspidozetes Hammer, 1962
Cuspitegula Hammer, 1966
Cycloppia Balogh, 1983
Cylindroppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Discoppia***)
Cymbaeremaeus Berlese, 1896
Cyranozetes Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2003 (=***Naiazetes***)
Cyrthermannia Balogh, 1958
Cyrtozetes Behan-Pelletier, 1985 (***Ceratozetella***)
Daedaloppia Balogh, 1983 (=***Antennoppia***)
Damaeolus Paoli, 1908
Damaeoppia Ohkubo, 1995 (=***Quinquoppia***)
Damaeus Koch, 1835
Dameobelba Sellnick, 1928
Dameosoma Berlese, 1892 (=***Oppia***)
Dampfiella Sellnick, 1931
Danobates Gjelstrup, 1978 (=***Ocesobates***)
Darthvaderum Hunt, 1996 (=***Novazelandiella***)
Dasybelba Woolley *et* Higgins, 1979 (***Nododamaeus***)
Decoribatula Lee *et* Birchby, 1989 (=***Reticuloppia***)
Decoroppia Mahunka, 2009
Defectamerus Aoki, 1984 (=***Gymnodampia***)
Demisalto Coetzee, 1993
Dendracarus Balogh, 1961
Dendroeremaeus Behan-Pelletier, Eamer *et* Clayton, 2005
Dendrohermannia P. Balogh, 1985
Dendrozetes Aoki, 1970
Dentachipteria Nevin, 1974
Dentizetes Hammer, 1952
Dentoppia Gordeeva, 2001 (=***Moritzoppia***)
Desertozetes Khanbekyan, 1990
Diapterobates Grandjean, 1936
Dicastribates Balogh *et* P. Balogh, 1988 (=***Sacculobates***)
Dicatozetes Grandjean, 1956
Dicondyla Aoki, 1965 (***Megalotocepheus***)
Dicrotegaeus Luxton, 1988
Didierotocepheus Mahunka, 1994 (***Afrotocepheus***)
Didymonycha Mahunka, 1984 (=***Tanzanycha***)
Dimidiogalumna Engelbrecht, 1972
Dinoxenillus Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980 (=***Xenillus***)
Dinozetes Balogh, 1962
Diodontocepheus Mihelčič, 1958 (=***Eupterotegaeus***)
Diorchestes Grandjean, 1951 (=***Microzetorchestes***)
Diphauloppia Balogh *et* P. Balogh, 1984 (***Subphauloppia***)
Diplobodes Aoki, 1958 (***Gibbicepheus***)
Discoppia Balogh, 1983
Discosuctobelba Hammer, 1979 (=***Ussuribata***)
Disparagalumna Hammer, 1973 (=***Galumna***)
Dissorhina Hull, 1916
Dividoppia Mahunka, 1987 (***Subiasella***)
Dolicheremaeus Jacot, 1938
Dometorina Grandjean, 1951

Donjohnstonella Walter, 2009 (=***Gymnodamaeus***)
Dorycranosus Woolley, 1969 (***Liacarus***)
Dosangoppia Ermilov *et* Frolov, 2019 (***Ramusella***)
Drepanoppia Balogh, 1983
Drukoppia Gordeeva, 2001 (=***Moritzoppia***)
Drymobates Grandjean, 1930
Drymobatoides Jacot, 1936
Dudichella Balogh, 1970
Dudichoplophora Mahunka, 1982
Dynatozetes Grandjean, 1960
Dyobelba Norton, 1979 (***Allobelba***)
Dysarcoppia Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998 (***Mimoppia***)
Dzarogneta Kulijev, 1978 (***Oxyoppia***)
Ecuadoribates Ermilov *et* Kalúz, 2012
Edaphoribates Nakamura *et* Nakai, 2009 (=***Transoribates***)
Edwardzetes Berlese, 1913
Elapheremaeus Grandjean, 1943 (=***Ctenobelba***)
Elaphoppia Balogh, 1983
Ellipsozetes Bernini, 1980
Elliptochthonius Norton, 1975
Enantioppia Balogh *et* Mahunka, 1969
Eniochthonius Grandjean, 1933 (=***Hypochthoniella***)
Enisella Ayyildiz *et* Luxton, 1989
Ensicamisia Kunst, 1971 (***Camisia***)
Entomotritia Märkel, 1964 (=***Mesotritia***)
Eobrachychthonius Jacot, 1936
Eohypochthonius Jacot, 1938
Epactozetes Grandjean, 1930
Epidamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 (***Damaeus***)
Epieremulus Berlese, 1916
Epilohmannia Berlese, 1910
Epilohmannoides Jacot, 1936
Epimerella Kulijev, 1967
Eporibatula Sellnick, 1928 (=***Phauloppia***)
Eremaeozetes Berlese, 1913
Eremaeus Koch, 1835
Eremella Berlese, 1913
Eremobelba Berlese, 1908
Eremobodes Jacot, 1937
Eremulus Berlese, 1908
Erioppia Balogh, 1983
Ermilovia Subías, 2017 (***Paraphauloppia***)
Erogalumna Grandjean, 1966 (***Galumna***)
Ethiovertex Mahunka, 1982
Euaella Hammer, 1973 (=***Cryptoribatula***)
Eudamaeus Pérez-Íñigo, 1987 (***Damaeus***)
Eueremaeus Mihelčič, 1963
Eulohmannia Berlese, 1910
Eupelops Ewing, 1917
Euphthiracarus Ewing, 1917
Eupterotegaeus Berlese, 1916
Eupunctoribates Hammer, 1977 (=***Zachvatkinibates***)
Eurhynchoribates Miko, 2016
Eurostocepheus Aoki, 1965
Euryacarus Woolley, 1966 (***Javacarus***)
Euryparazetes Radford, 1948 (=***Peloribates***)
Euscheloribates Kunst, 1958
Eutegaeus Berlese, 1916
Euzetes Berlese, 1908
Ewingozetes Hammer, 1952 (=***Pelopsis***)
Exanthoppia Balogh *et* P. Balogh, 1983
Exochocepheus Woolley *et* Higgins, 1968
Exoribatula Jacot, 1936
Exoripoda Woolley, 1961 (=***Benoibates***)
Falsolobozetes Tseng, 1984 (=***Podoribates***)
Farchacarus Wallwork, 1967
Fberninia Özdikmen, 2008
Feiderzetes Subías, 1977
Fenestrella Mahunka, 1987 (=***Mahunkana***)
Fenestrobates Balogh *et* Mahunka, 1969 (***Oribatella***)
Fenestrobelba Balogh, 1970
Fenichelia Balogh, 1970
Fernandezbodes Subías, 2018 (=***Tanzaniacepheus***)
Fernandocepheus Mahunka, 1982
Ferolocella Grabowski, 1971
Fijibates Hammer, 1971
Fijirella Hammer, 1971 (=***Gressittolus***)
Fineoppia Khanbekyan *et* Gordeeva, 1991 (=***Dzarogneta***)
Fissicepheus Balogh *et* Mahunka, 1967
Fissurobates Balogh *et* Mahunka, 1969
Flabellobelba Pérez-Íñigo, 1995
Flagellobates Mahunka, 1978 (=***Topobates***)
Flagellocepheus P. Balogh, 1984
Flagellozetes Balogh, 1970
Flagrosuctobelba Hammer, 1979 (***Suctobelbella***)
Flammaeremaeus Balogh, 1968
Flexa Kulijev, 1977 (***Carabodes***)
Floribates Norton *et* Kethley, 1989 (=***Dometorina***)
Floritrichus Coetzee, 2003
Foraminoppia Subías *et* Arillo, 1998
Fortuynia Hammen, 1960
Fosseremus Grandjean, 1954
Fossonothrus Hammer, 1962 (***Tyrphonothrus***)
Fossoppia Mahunka, 1994
Foveolatoppia Mahunka, 1988
Fovoribatula Lee *et* Birchby, 1989 (=***Zygoribatula***)
Frischia Oudemans, 1915 (?=***Protoripoda***)
Frondoppia Mahunka, 1983 (=***Graptoppia***)
Fuegoplophora Mahunka, 1980 (=***Austrophthiracarus***)
Fuerteventuria Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996 (=***Monophauloppia***)
Furcobates Sellnick, 1959
Furcodamaeus Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1980
Furcoppia Balogh *et* Mahunka, 1966
Furcoribula Balogh, 1943
Furculoppia Balogh, 1983 (***Multioppia***)
Fuscozetes Sellnick, 1928
Fusozetes Balogh, 1972
Fusuloppia Balogh, 1983
Galapagacarus P. Balogh, 1985
Galumna Heyden, 1826
Galumnella Berlese, 1916
Galumnopsis Grandjean, 1931
Gamerozetes Balogh *et* P. Balogh, 1990 (***Edwardzetes***)
Gehypochthonius Jacot, 1936
Geminoppia Balogh *et* P. Balogh, 1983
Geminozetes Balogh *et* Csiszár, 1963
Gemmazetes Fujikawa, 1979 (=***Oribellopsis***)
Genavensia Mahunka, 1983
Gendzella Kulijev, 1977 (=***Ferolocella***)
Geocepheus Sitnikova, 1979 (=***Reticulocepheus***)
Gephyrazetes Hirauchi, 1999
Gerdia Miko *et* Norton, 2010 (=***Weigmannia***)
Gerloubia Coetzer, 1968
Ghilarovizetes Shaldybina, 1969
Ghilarovus Krivolutsky, 1966
Gibbibodes Mahunka, 1986 (***Gibbicepheus***)
Gibbicepheus Balogh, 1958
Gigantoppia Mahunka, 2008
Gilarovella Lange, 1974
Ginglymacarus Ewing, 1917 (=***Phthiracarus***)
Gittella Hammer, 1961
Glaberoribates Tseng, 1984 (=***Triaunguis***)
Glabroppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Karenella***)
Glanderemaeus Balogh *et* Csiszár, 1963
Globogalumna Balogh *et* P. Balogh, 1990
Globonothrus Tseng, 1982 (=***Eupelops***)
Globoppia Hammer, 1962
Globozetes Sellnick, 1928
Gobiella Balogh *et* Mahunka, 1965 (=***Kaszabobates***)
Gordeeviella Shtanchaeva, Subías *et* Arillo, 2010 (***Adoristes***)
Goyoppia Balogh, 1983
Gozmanyina Balogh *et* Mahunka, 1983
Gradjeanacarus Zachvatkin, 1958 (=***Ctenacarus***)
Gradjeanella Balogh, 1961 (=***Grandjeania***)
Grandjeania Balogh, 1963
Grandjeanobates Hammer, 1967 (***Scheloribates***)
Grandjeanoplophora Balogh *et* Mahunka, 1979
Granizetes Hammer, 1961
Granuloppia Balogh, 1958
Granuloteratoppia P. Balogh, 1988
Graptoppia Balogh, 1983
Gredosella Gil-Martín, Arillo *et* Subías, 2000

Gressittolus Balogh, 1970
Gressittoppia Balogh, 1983 (***Brachioppiella***)
Grypoceramerus Suzuki *et* Aoki, 1970
Guaranozetes Balogh *et* Mahunka, 1981
Guatemalozetes Mahunka, 1980 (***Scotiazetes***)
Guineobodes Mahunka, 1987 (***Pasocepheus***)
Gustavia Kramer, 1879
Gymnobates Banks, 1902
Gymnobatoides Woolley, 1966
Gymnobodes Balogh, 1965
Gymnodamaeus Kulczynski, 1902
Gymnodampia Jacot, 1937
Gymnonothrus Ewing, 1917 (=***Nothrus***)
Gymnozetes Călugăr *et* Vasiliu, 1983 (=***Magnobates***)
Gymnozetes P. Balogh, 1984 (=***Sturmozetes***)
Hafenferrefia Jacot, 1939
Hafenrefferia Oudemans, 1906
Hafenrefferiella Sellnick, 1952 (=***Hafenferrefia***)
Haloribatula Schuster, 1957
Halozetes Berlese, 1916
Hamacarus Hammer, 1977 (=***Mixacarus***)
Hammation Grandjean, 1959 (=***Basilobelba***)
Hammerabates Balogh, 1970
Hammerella Balogh, 1983
Hammeria Sellnick, 1944 (=***Propelops***)
Hammeriella Paschoal, 1989 (=***Pheroliodes***)
Hammeroppia Vasiliu *et* Ivan, 2009 (***Multioppia***)
Hamobates Hammer, 1962 (=***Zetomimus***)
Hamoppia Hammer, 1968 (***Lanceoppia***)
Hamotegeus Balogh *et* Mahunka, 1969 (=***Sadocepheus***)
Hanoiella Ermilov *et* Starý, 2018 (***Niloppia***)
Haplacarus Wallwork, 1962
Haplamerus Balogh *et* P. Balogh, 1992
Haplobelba Balogh *et* Mahunka, 1969
Haplochthonius Willmann, 1930
Haploripoda Balogh *et* Mahunka, 1967 (=***Benoibates***)
Haplozetes Willmann, 1935 (***Indoribates***)
Hardybodes Balogh, 1970
Hauseroceratoppia Mahunka, 1980 (=***Pseudoceratoppia***)
Hauserophthiracarus Mahunka, 1982 (=***Calyptophthiracarus***)
Hauseroplophora Mahunka, 1977
Hauserozetes Mahunka, 1980
Helioppia Balogh, 1983
Hellenamerus Mahunka, 1974
Heloribates Grandjean, 1966 (=***Hydrozetes***)
Helvetacarus Mahunka, 1993 (=***Atropacarus***)
Helvetobelba Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999 (***Allosuctobelba***)
Hemileius Berlese, 1916
Heminothrus Berlese, 1913
Heptacarus Piffl, 1963
Hermannia Nicolet, 1855
Hermanniella Berlese, 1908
Hermannobates Hammer, 1961
Heterobelba Berlese, 1913
Heterochthonius Berlese, 1910
Heterodamaeus Ewing, 1917 (=***Gymnodamaeus***)
Heterodamaeus Woolley, 1957 (=***Adrodamaeus***)
Heterodamaeus Mihelčič, 1964 (=***Dyobelba***)
Heterogalumna Balogh, 1960
Heterohermannia Woas, 1992 (***Hermannia***)
Heteroleius Balogh *et* Mahunka, 1966
Heteroppia Balogh, 1970
Heterozetes Willmann, 1917
Hexachaetoniella Paschoal, 1987
Hexatocepheus Wen, 1993 (***Otocepheus***)
Hexoppia Balogh, 1958
Himalacarus Sheals, 1965 (=***Zachvatkinella***)
Hispanozetes Subías *et* Shtanchaeva, 2011
Hoffmanacarus Mahunka, 1995 (***Anachipteria***)
Hokkachipteria Balogh *et* Mahunka, 1979 (=***Izuachipteria***)
Holokalumma Jacot, 1929 (=***Galumna***)
Hololohmannia Kubota *et* Aoki, 1998
Holonothrus Wallwork, 1963
Holozetes Jacot, 1929 (=***Galumna***)
Hoploderma Michael, 1898 (=***Phthiracarus***)
Hoplophora Koch, 1835 (=***Phthiracarus***)
Hoplophorella Berlese, 1923
Hoplophthiracarus Jacot, 1933
Huarpescopes Fernández, Monetti *et* Martínez, 1995 (=***Truncopes***)
Huilicheremaeus Fernández, Marcangeli *et* Eguaras, 1997
Humerobates Sellnick, 1928
Hummelia Oudemans, 1916 (?=***Euphthiracarus***)
Hungarobelba Balogh, 1943
Hungaromotrichus Mahunka, 1993 (=***Mabulatrichus***)
Hydroecocepheus Corpuz-Raros, 1979
Hydronothrus Aoki, 1964 (=***Trhypochthoniellus***)
Hydrozetes Berlese, 1902
Hygroribates Jacot, 1934 (=***Ameronothrus***)
Hymenobelba Balogh, 1962
Hymenozetes Balogh, 1964
Hypocepheus Krivolusky, 1971
Hypochthoniella Berlese, 1910
Hypochthonius Koch, 1835
Hypodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 (=***Damaeus***)
Hypogeoppia Subías, 1981
Hypovertex Krivolutsky, 1969
Hypozetes Balogh, 1959
Iberogalumnella Arillo *et* Subías, 1993
Iberoppia Pérez-Íñigo, 1986
Idiodamaeus Paschoal, 1984 (=***Austrodamaeus***)
Idiozetes Aoki, 1976
Ikarotocepheus Mahunka, 1988
Imaparatoppia Jacot, 1934 (=***Phauloppia***)
Incabates Hammer, 1961 (***Lauritzenia***)
Incudozetes Balogh *et* P. Balogh, 2002 (=***Sphaerozetes***)
Indobates Pandit *et* Bhattacharya, 1999 (=***Peloribates***)
Indogalumna Balakrishnan, 1985 (***Galumna***)
Indopacifica Pfingstl, Shimano *et* Lienhard, 2018
Indoribates Jacot, 1929
Indotocepheus Mondal *et* Kundu,1999 (***Odontocepheus***)
Indotritia Jacot, 1929
Infernobates Karppinen *et* Poltavskaja, 1990 (=***Oribella***)
Ingella Hammer, 1967 (=***Reductobates***)
Inigozetes Subías, 2000 (***Minunthozetes***)
Insculptoppia Subías, 1980 (***Ramusella***)
Insculptoppiella Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Ramusella***)
Interbelba Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2012
Intermedioppia Subías *et* Rodríguez, 1987
Interoppia Mahunka, 1987 (***Hammerella***)
Irinobates Krivolutsky *et* Christov, 1970 (=***Liebstadia***)
Ischeloribates Corpuz-Raros, 1980 (=***Perscheloribates***)
Issaniella Grandjean, 1962
Italobates Mahunka, 1994 (***Pilobates***)
Iugoribates Sellnick, 1944
Ivarsia Karppinen *et* Krivolutsky, 1987 (=***Ensicamisia***)
Izuachipteria Balogh *et* Mahunka, 1979 (***Achipteria***)
Jacotella Banks, 1947
Javacarus Balogh, 1961
Javalohmannia Hammer, 1979 (=***Meristacarus***)
Javieroppia Mínguez *et* Subías, 1986
Jeannelia Dalenius, 1958 (=***Humerobates***)
Jermyia Mahunka, 2002 (=***Gressittoppia***)
Joboppia Ruiz, Mínguez *et* Subías, 1988
Joelia Oudemans, 1906
Johnstonella Paschoal, 1983 (=***Gymnodamaeus***)
Jornadia Wallwork *et* Weems, 1984
Joshuella Wallwork, 1972
Jugatala Ewing, 1913
Jurabates Jacot, 1929 (=***Minunthozetes***)
Kabylogalumna Bernini, 1984 (***Galumna***)
Kaibacepheus Corpuz-Raros, 2004 (***Samarocepheus***)
Kakophthiracarus Mahunka, 1992 (***Hoplophorella***)
Kalayaan Corpuz-Raros, 1998
Kalloia Mahunka, 1985 (***Gibbicepheus***)
Kalyptrazetes Balogh, 1972
Karenella Hammer, 1962
Kartoeremaeus Higgins, 1979 (=***Eueremaeus***)
Kaszabobates Balogh, 1972
Kaszabozetes Mahunka, 1988
Kathetosuctobelba Chinone, 2003 (=***Sucteremaeus***)
Keralotrichus Mahunka, 1985 (***Zetomotrichus***)

Kilimabates Mahunka, 1984 (=***Antarctozetes***)
Kinabaluella Mahunka, 1996 (=***Nasozetes***)
Kinezogalumna Aoki *et* Hu, 1993 (=***Galumna***)
Klapperiches Mahunka, 1979 (***Carabodes***)
Kochia Oudemans, 1900 (=***Xenillus***)
Kodiakella Hammer, 1967
Kokoppia Balogh, 1983 (***Brachioppia***)
Koreoribates Choi, 1994 (=***Scutoribates***)
Koreozetes Aoki, 1974 (=***Ghilarovizetes***)
Kratzensteinia Oudemans, 1919 (?=***Neopilizetes***)
Krivolutskiella Gordeeva, 1980
Kuklosuctobelba Chinone, 2003
Kulievia Vasiliu *et* Ivan, 1999
Kunoppia Mahunka, 1987 (=***Rhinoppia***)
Kunstella Krivolutsky, 1974 (=***Scutoribates***)
Kunstidamaeus Miko, 2006 (***Damaeus***)
Kunstogalumna Starý, 2005
Labiogena Hunt, 1996 (=***Novazelandiella***)
Lagenobates Weigmann *et* Miko, 2002 (***Liebstadia***)
Lalmoppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Subiasella***)
Lamellarea Kok, 1968
Lamellobates Hammer, 1958
Lamellocepheus Balogh, 1961
Lamellovertex Bernini, 1976
Lamellozetes Covarrubias, 1967
Laminizetes Behan-Pelletier, 1986 (***Trichoribates***)
Laminoppia Hammer, 1968
Lancelalmoppia Subías, 1989 (***Lanceoppia***)
Lanceoppia Hammer, 1962
Lanibelba Norton, 1980 (***Belbodamaeus***)
Laroppia Subías, 1989
Lasiobelba Aoki, 1959
Latilamellobates Shaldybina, 1971 (***Trichoribates***)
Latovertex Mahunka, 1987 (=***Exochocepheus***)
Lauritzenia Hammer, 1958
Lauroppia Subías *et* Mínguez, 1986
Lawrencoppia Jacot, 1936 (=***Phyllhermannia***)
Leebates Balogh *et* Mahunka, 1996 (=***Viracochiella***)
Leiosoma Nicolet, 1855 (=***Liacarus***)
Lemurobates Mahunka, 1997
Lemuroppia Mahunka, 1994
Leobodes Aoki, 1965
Leoppia Pérez-Íñigo, 1983
Lepidacarus Csiszár, 1961
Lepidoribates Sellnick, 1920 (=***Tegoribates***)
Lepidozetes Berlese, 1910
Leptogalumna Balogh, 1960
Leptoppia Mahunka, 1997
Leptorchistis Canestrini *et* Berlese, 1885 (?=***Zetorchestes***)
Leptosuctobelba Chinone, 2003 (***Novosuctobelba***)
Leptotocepheus Balogh, 1961
Lesseria Oudemans, 1917 (=***Epilohmannia***)
Leuroxenillus Woolley *et* Higgins, 1966 (=***Liacarus***)
Liacaroppia Subías *et* Rodríguez, 1986
Liacarus Michael, 1898
Licneremaeus Paoli, 1908
Licnobelba Grandjean, 1931
Licnocepheus Woolley, 1969
Licnodamaeolus Covarrubias, 1998
Licnodamaeus Grandjean, 1931
Licnoliodes Grandjean, 1931
Licnozetes Balogh *et* Mahunka, 1969
Liebstadia Oudemans, 1906
Lignobates Mahunka, 2006 (***Protoribates***)
Limnozetella Willmann, 1932
Limnozetes Hull, 1916
Lineoppia Balogh *et* P. Balogh, 1983
Linothrus Tseng, 1982 (=***Cyrthermannia***)
Liochthonius Hammen, 1959
Liodes Heyden, 1826 (=***Neoliodes***)
Litholestes Grandjean, 1951
Litoribates Pfingstl *et* Schatz, 2017
Loboppia Balogh, 1983
Lobozetes Hammer, 1958
Loftacarus Lee, 1981
Lohmannia Michael, 1898
Longocepheus Balogh *et* Mahunka, 1966 (***Leptotocepheus***)
Lopheremaeus Paschoal, 1988
Lopholiodes Passchoal, 1987
Lophotocepheus Balogh *et* P. Balogh, 1983
Lophozetes P. Balogh, 1985 (=***Macrogena***)
Lucioppia Mahunka, 1985 (***Subiasella***)
Lucoppia Berlese, 1908
Luissubiasia Ermilov, 2016
Lunoribatula Mahunka, 1982
Luxtoneremaeus Balogh *et* P. Balogh, 1992
Luxtonia Mahunka, 2001
Lyrifissiella Paschoal, 1989
Lyroppia Balogh, 1961
Mabulatrichus Coetzee, 1993
Macarotritia Pérez-Íñigo, 1986 (=***Austrotritia***)
Machadobelba Balogh, 1958
Machadocepheus Balogh, 1958
Machuella Hammer, 1961
Macquariella Wallwork, 1963 (=***Macquarioppia***)
Macquarioppia Wallwork, 1964
Macrogena Wallwork, 1966
Macrosoma Hammer, 1979 (=***Senectoppia***)
Maculobates Hammer, 1962 (=***Totobates***)
Madabelba Mahunka, 2009 (=***Leptosuctobelba***)
Maerkelotritia Hammer, 1967
Magellozetes Hammer, 1962
Magnobates Hammer, 1967 (***Lauritzenia***)
Magoebazetes Engelbrecht, 1972 (***Cosmozetes***)
Magyaria Balogh, 1963
Mahnertella Mahunka, 1997 (=***Rugoppia***)
Mahnertozetes Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
Mahunkaceras Balogh *et* P. Balogh, 2002 (=***Schalleriella***)
Mahunkaia Schatz, 2002
Mahunkana Koçak *et* Kemal, 2008
Mahunkazetes Balogh *et* P. Balogh, 1992
Mahunkella Balogh, 1983
Mahunkobates Călugăr, 1989
Mahuntritia Niedbała *et* Liu, 2018 (***Oribotritia***)
Mainothrus Choi, 1996
Makischeloribates Corpuz-Raros,1980 (***Scheloribates***)
Malacoangelia Berlese, 1913
Malaconothrus Berlese, 1904
Malgachebates Fernández, Cleva *et* Theron, 2011
Malgacheliodes Fernández *et* Cleva, 2010
Malgasodes Mahunka, 2000
Malgoceras Mahunka, 1993 (***Acaroceras***)
Mancoribates Hammer, 1961 (***Indoribates***)
Mangabebodes Fernández, Theron, Leiva, Rollard *et* Tiedt, 2014 (***Tuberocepheus***)
Mantigueracarus Balogh *et* Mahunka, 1992 (***Hoplophorella***)
Maorizetes Hammer, 1966
Marshallia Gordeeva, 1980 (=***Gozmanyina***)
Masthermannia Berlese, 1913
Maudheimia Dalenius, 1958
Mauribodes Balogh *et* P. Balogh, 1992 (=***Diplobodes***)
Medioppia Subías *et* Mínguez, 1985 (=***Rhinoppia***)
Medioxyoppia Subías, 1989
Megalotocepheus Aoki, 1965
Megascheloribates Lee *et* Pajak, 1990 (=***Scheloribates***)
Megatrichobates Grobler, 2000
Megazetes Balogh, 1959 (***Microzetes***)
Megazetes Mahunka, 1993 (=***Schalleriella***)
Megeremaeus Higgins *et* Woolley, 1965
Melanozetes Hull, 1916
Membranoppia Hammer, 1968
Meriocepheus Aoki, 1973
Meristacarus Grandjean, 1934
Meristolohmannia Balogh *et* Mahunka, 1966
Mesoplophora Berlese, 1904
Mesotritia Forsslund, 1963
Metabelba Grandjean, 1936
Metabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1967 (=***Allobelba***)
Metaleius Travé, 1960 (***Paraleius***)
Metaphthiracarus Aoki, 1980 (***Phthiracarus***)
Metapyroppia Woolley, 1969
Metrioppia Grandjean, 1931

Mexiceremus Balogh *et* P. Balogh, 1998
Mexicoppia Mahunka, 1983 (***Furcoppia***)
Michaelia Haller, 1884 (=***Lohmannia***)
Micreremus Berlese, 1908
Microchthonius Kahwash, Subías *et* Ruiz, 1989 (=***Nanochthonius***)
Microlamellarea Coetzee, 1987
Microphthiracarus Mahunka, 1982 (=***Phthiracarus***)
Micropirnodus Weigmann, 2009 (=***Pseudoppia***)
Microppia Balogh, 1983
Microtegeus Berlese, 1916
Microtritia Märkel, 1964
Microzetes Berlese, 1913
Microzetorchestes Balogh, 1943
Mikizetes Hammer, 1958
Millotacarus Balogh, 1961 (***Paulianacarus***)
Mimoppia Balogh, 1983
Minasbates Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1996 (=***Haplozetes***)
Minguezetes Subías, Kahwash *et* Ruiz, 1990 (***Punctoribates***)
Minoricoppia Pérez-Íñigo Jr., 1991 (=***Pseudoamerioppia***)
Minunthozetes Hull, 1916
Mirabilozetes Mahunka, 1977
Miracarus Kunst, 1959
Mirobelba Pérez-Íñigo *et* Peña, 1994 (=***Dyobelba***)
Mirogalumna Mahunka, 1993 (=***Orthogalumna***)
Miroppia Hammer, 1968
Mirus Kulijev, 1967 (=***Spinozetes***)
Mixacarus Balogh, 1958
Mixobates Gil *et* Subías, 1993 (=***Haplozetes***)
Mixochthonius Niedbała, 1972
Mixoribatula Mahunka, 1987 (=***Cordiozetes***)
Mixozetes Balogh *et* P. Balogh, 1990 (***Ceratozetes***)
Mochlobates Norton, 1984
Mochloribatula Mahunka, 1979
Mochlozetes Grandjean, 1930
Mongaillardia Grandjean, 1961
Monofurcoppia Pérez-Íñigo *et* Sarasola, 1995
Monogalumnella Mahunka, 1986
Monophauloppia P. Balogh, 1988 (***Gerloubia***)
Monophysobates Balogh *et* P. Balogh, 1992 (=***Paraphysobates***)
Monoribatella Subías, 2017 (***Oribatella***)
Monoschelobates Balogh *et* Mahunka, 1969 (***Hemileius***)
Monstroripoda Mahunka, 2006
Montizetes Kunst, 1971 (***Pantelozetes***)
Moritzichthonius Pereda *et* Iturrondobeitia, 1990 (=***Neoliochthonius***)
Moritziella Balogh, 1983 (=***Moritzoppia***)
Moritzoppia Subías *et* Rodríguez, 1988
Moritzoppiella Gordeeva, 2000 (***Oppiella***)
Mucrobates Balogh *et* Mahunka, 1979
Mucronothrus Trägårdh, 1931
Muliercula Coetzer, 1968
Multieremella Subías, 2020
Multifossoppia Subías, 2017 (***Fossoppia***)
Multilanceoppia Subías, 1989 (***Multioppia***)
Multimaudheimia Subías, 2004
Multimedioppia Subías, 1991
Multioppia Hammer, 1961
Multipulchroppia Subías, 1989
Multoribatella Subías, 2004 (***Oribatella***)
Multoribates Hammer, 1961 (***Exoribatula***)
Multoribula Balogh *et* Mahunka, 1966
Murcia Koch, 1835 (?=***Trichoribates***)
Mycobates Hull, 1916
Mycozetes Spain, 1968
Mystacozetes Balogh, 1962
Mysterozetes Hammer, 1961
Mystroppia Balogh, 1959
Nacunansella Fernández *et* Cleva,1998 (***Licnodamaeolus***)
Naiazetes Behan-Pelletier, 1996
Nanhermannia Berlese, 1913
Nannerlia Coetzer, 1968
Nanobates Balogh *et* P. Balogh, 1984 (=***Trischeloribates***)
Nanochthonius Subías *et* Gil-Martín, 1995 (***Cosmochthonius***)
Nanohystrix Norton *et* Fuangarworn, 2015
Nasobates Woolley, 1966
Nasobelba Mahunka, 2005 (=***Leptosuctobelba***)
Nasozetes Sellnick, 1930
Neamerus Willmann, 1939 (***Amerus***)
Negroppia Vasiliu *et* Călugăr, 1977
Nehypochthonius Norton *et* Metz, 1980
Nellacaroides Mahunka, 1998 (=***Microzetes***)
Nellacarus Grandjean, 1936 (=***Microzetes***)
Nemacepheus Aoki, 1968
Neoamerioppia Subías, 1989
Neoatrichosus Fernández, 1984 (***Eohypochthonius***)
Neobelba Bulanova-Zachvatkina, 1967 (***Metabelba***)
Neobrachychthonius Moritz, 1976
Neocarabodes Balogh *et* Mahunka, 1969 (***Gibbicepheus***)
Neocepheus Willmann, 1936 (=***Carabodes***)
Neochthonius Karppinen, 1984 (=***Neovochthonius***)
Neoctenacarus Moritz, 1974
Neoctenogalumna Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013
Neoepilohmannia McDaniel *et* Bolen, 1989 (***Epilohmannia***)
Neoepilohmannoides Subías, 2020 (***Epilohmannoides***)
Neoeutegaeus Aoki, 1965
Neogalumna Hammer, 1973
Neogymnobates Ewing, 1917
Neohermannia Bayoumi *et* Mahunka, 1979
Neoindoribates Subías, 2020 (***Indoribates***)
Neokakophthiracarus Balogh *et* P. Balogh, 2002 (=***Besuchetacarus***)
Neokalumma Tseng, 1984 (=***Porokalumma***)
Neolepidozetes Hammer, 1977 (=***Scutozetes***)
Neoliochthonius Lee, 1982
Neoliodes Berlese, 1888
Neolohmannia Bulanova-Zachvatkina, 1960 (=***Apolohmannia***)
Neolucoppia Tseng, 1984
Neomycobates Wallwork, 1963
Neonooliodes Hunt, 1996 (=***Pheroliodes***)
Neonothrus Forsslund, 1955 (=***Platynothrus***)
Neoperxylobates Subías, 2020 (***Perxylobates***)
Neophthiracarus Balogh *et* Csiszár, 1963 (***Phthiracarus***)
Neophysobates Luxton, 1987
Neopilizetes Balogh *et* P. Balogh, 1990 (***Pilizetes***)
Neoppia Bhattacharya *et* Banerjee, 1981
Neoprotophthiracarus Mahunka, 1980 (=***Neophthiracarus***)
Neoprototritia Shereef, 1978 (=***Arthrhoplophora***)
Neoribates Berlese, 1914
Neoribatula Ewing, 1917 (=***Zygoribatula***)
Neorizetes Jacot, 1933 (?=***Pergalumna***)
Neoscheloribates Hammer, 1973 (=***Scheloribates***)
Neoscutovertex Mihelčič, 1957 (=***Scutovertex***)
Neosteganacarus Balogh *et* Mahunka, 1992 (=***Rafacarus***)
Neostrinatina Mahunka, 1980
Neosuctobelba Balogh *et* Mahunka, 1969
Neotocepheus Hammer, 1966 (***Plenotocepheus***)
Neotrichacarus Hammer, 1973 (=***Heptacarus***)
Neotrichocepheus Hammer, 1973
Neotrichoppia Subías *et* Iturrondobeitia, 1980
Neotrichozetes Travé, 1961
Neovochthonius Judson, 2009
Neoxenillus Fujikawa, 2004
Neozetes Berlese, 1885 (=***Gustavia***)
Neseutegaeus Woolley, 1965
Nesiacarus Csiszár, 1961
Nesiotizetes Jacot, 1934
Nesopelops Hammer, 1973
Nesoppia Luxton, 1985 (=***Membranoppia***)
Nesoribatula Aoki, 1964 (=***Exoribatula***)
Nesotocepheus Hammer, 1972 (=***Pseudotocepheus***)
Nesozetes Hammer, 1971
Ngorongobodes Balogh *et* P. Balogh, 1992 (=***Uluguroides***)
Niedbalacarus Balogh *et* P. Balogh, 2002 (=***Steganacarus***)
Niedbalaia Mahunka, 1999 (=***Euphthiracarus***)
Niloppia Balogh, 1983
Niosuctobelba Chinone, 2003 (***Kuklosuctobelba***)
Niphocepheus Balogh, 1943
Nippobodes Aoki, 1959
Nippohermannia P. Balogh, 1985 (***Nanhermannia***)
Nipponiella Gordeeva, 1980

Nixozetes Mahunka, 1977 (=***Indoribates***)
Nodocepheus Hammer, 1958
Nododamaeus Hammer, 1977
Nooliodes Paschoal, 1989
Nortonacarus Balogh *et* Mahunka, 1992 (=***Rafacarus***)
Nortonbelba Bernini, 1980
Nortonchthonius Jorrín, 2014 (***Cosmochthonius***)
Nortonella Paschoal, 1982 (=***Joshuella***)
Nosybea Mahunka, 1993 (=***Lamellocepheus***)
Nosybelba Mahunka, 1994
Notaspis Hermann, 1804 (?=***Ceratoppia***)
Nothrolohmannia Balogh, 1968
Nothrus Koch, 1835
Notogalumna Sellnick, 1959
Notohermannia P. Balogh, 1985
Notophthiracarus Ramsay, 1966 (***Hoplophthiracarus***)
Notophthiracarus Balogh *et* Mahunka, 1967 (=***Protophthiracarus***)
Notoppia Balogh *et* Mahunka, 1966
Novazelandiella Paschoal, 1989
Novonothrus Hammer, 1966
Novoribatella Engelbrecht, 1986
Novosuctobelba Hammer, 1977
Nuhivabates Niemi *et* Behan-Pelletier, 2004
Ocellotocepheus Mahunka, 1989
Ocesobates Aoki, 1965
Octodurozetes Mahunka, 1993 (=***Protoribates***)
Octoliodes Paschoal, 1987 (=***Lopholiodes***)
Octoppia Balogh *et* Mahunka, 1969
Odontocepheus Berlese, 1913
Odontodamaeus Paschoal, 1982 (=***Gymnodamaeus***)
Oglasacarus Bernini, 1979 (***Mikizetes***)
Ojaithrus Habeeb, 1982 (=***Hydrozetes***)
Oligogephyrazetes Subías, 2019 (***Gephyrazetes***)
Oligoppia Balogh, 1983
Ommatocepheus Berlese, 1913
Onazetes Bugrov, 1991 (=***Lepidozetes***)
Onychobates Hammer, 1967
Operculoppia Hammer, 1968
Ophidiotrichus Grandjean, 1953
Opisthocepheus Aoki, 1976 (=***Pasocepheus***)
Oppia Koch, 1835
Oppiella Jacot, 1937
Opsioristes Woolley, 1967
Orbiculobates Grandjean, 1961
Oribata Latreille, 1802 (?=***Phauloppia***)
Oribatella Banks, 1895
Oribatodes Banks, 1895
Oribatula Berlese, 1896
Oribella Berlese, 1908
Oribellopsis Kunst, 1971 (***Pantelozetes***)
Oribotritia Jacot, 1924
Orinchobates Miko, Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2017 (***Eurhynchoribates***)
Oripoda Banks, 1904
Oromurcia Thor, 1930
Orthogalumna Balogh, 1961
Orthozetes Balogh, 1962
Otaheitea Hammer, 1972 (=***Hammerabates***)
Otocepheus Berlese, 1905
Otopentacepheus Corpuz-Raros, 2007
Otoppia Balogh, 1983
Ovobates Mahunka, 1994
Ovochthonius Rjabinin, 1977
Ovonothrus Kunst, 1971 (=***Capillonothrus***)
Oxyamerus Aoki, 1965
Oxybrachioppia Subías, 1989
Oxymystroppia Subías *et* Shtanchaeva, 2011
Oxyoppia Balogh *et* Mahunka, 1969
Oxyoppiella Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Oxyoppia***)
Oxyoppioides Subías *et* Mínguez, 1985
Oxyscheloribates Balogh *et* P. Balogh, 1990 (***Scheloribates***)
Oxyzetes Balogh, 1958
Ozacarus Colloff *et* Halliday, 1998
Pabulozetes Tseng, 1982 (=***Zetorchella***)
Pachygena Hammer, 1972
Paenoppia Woolley *et* Higgins, 1965
Palaeacaroides Lange, 1972
Palaeacarus Trägårdh, 1932
Pallidacarus Krivolutsky, 1975
Palmitalia Pérez-Íñigo *et* Peña, 1997
Pantelozetes Grandjean, 1953
Papillacarus Kunst, 1959
Papillocepheus Balogh *et* Mahunka, 1966
Papillochthonius Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 1992
Papillonotus Wallwork, 1961
Papuacepheus Balogh, 1968
Papuazetes Balogh, 1968
Parabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1967 (***Allobelba***)
Paracamisia Olszanowski *et* Norton, 2002 (=***Capillonothrus***)
Paracarinogalumna Mahunka, 1998 (=***Carinogalumna***)
Paracavernocepheus Ermilov *et* Starý, 2018 (***Cavernocepheus***)
Paraceratoppia Rjabinin, 1982
Paraceratorchestes Ermilov *et* Kalúz, 2012 (***Ceratorchestes***)
Parachipteria Hammen, 1952
Paractenogalumna Ermilov, Starý, Sandmann, Marian *et* Maraun, 2013 (***Neoctenogalumna***)
Paradamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 (***Damaeus***)
Paradolicheremaeus Tseng, 1982
Paradyobelba Miko *et* Ermilov, 2021 (***Allobelba***)
Paraeroppia Sanyal, 2009 (=***Aeroppia***)
Parafurcobates Hammer, 1967 (***Furcobates***)
Paragloboppia Subías, 1989 (***Taiwanoppia***)
Parahypozetes Hammer, 1967 (=***Austrachipteria***)
Parakalumma Jacot, 1929 (***Neoribates***)
Paralalmoppia Subías *et* Shtanchaeva, 2012 (***Subiasella***)
Paralamellobates Bhaduri *et* Raychaudhuri, 1968 (***Lamellobates***)
Paraleius Travé, 1960
Paraliochthonius Moritz, 1976 (=***Neoliochthonius***)
Paraliodes Hall, 1911 (=***Phauloppia***)
Parallonothrus Badejo, Woas *et* Beck, 2002 (=***Allonothrus***)
Paralobozetes Tseng, 1984 (=***Macrogena***)
Paralopheremaeus Paschoal, 1987
Paralycus Womersley, 1944
Paramedioppia Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2000 (***Rhinoppia***)
Parapelops Jacot, 1938 (=***Pelopsis***)
Paraphauloppia Hammer, 1967
Paraphthiracarus Aoki, 1980 (=***Archiphthiracarus***)
Paraphysobates Mahunka, 1985
Paraphysobates Luxton, 1985 (=***Neophysobates***)
Parapirnodus Balogh *et* Mahunka, 1968
Parapocsia Niedbała, 2014 (=***Euphthiracarus***)
Parapyroppia Pérez-Íñigo *et* Subías, 1979
Paraquanothrus Norton *et* Franklin, 2018
Pararamusella Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1998
Pararectoppia Mahunka, 1987 (=***Lalmoppia***)
Paraschelobates Jacot, 1934 (=***Scheloribates***)
Parasuctobelba Hammer, 1977
Parasynoppia Aoki, 1983 (=***Elaphoppia***)
Paratritia Moritz, 1966
Parauracrobates Ermilov *et* Martens, 2015 (***Uracrobates***)
Parautogneta Golosova, 1974
Parawoasella Ermilov, Shtanchaeva, Subías *et* Anichkin, 2012 (***Hammerella***)
Paraxylobates Balogh *et* Mahunka, 1969
Parazetes Willmann, 1930 (=***Peloribates***)
Pareutegaeus Woolley, 1965
Parhynchoribates Miko, 2016 (***Rhynchoribates***)
Parhypochthonius Berlese, 1904
Parisuctobelba Higgins *et* Woolley, 1976
Paroppia Hammer, 1968
Parplophora Niedbała, 1985 (***Mesoplophora***)
Paschoalia Subías, 2004 (=***Pheroliodes***)
Paschoalia Özdikmen, 2008 (=***Joshuella***)
Pasocepheus Aoki, 1976
Passalobates Pérez-Íñigo *et* Peña, 1996 (***Bipassalozetes***)
Passalomonia Mahunka, 1987
Passalozetes Grandjean, 1932
Patagonozetes Balogh *et* P. Balogh, 1990
Pateribelba Mourek, Miko *et* Bernini, 2011 (=***Neobelba***)
Paternoppia Gil-Martín, Subías *et* Arillo, 2000
Paulianacarus Balogh, 1961

Paulonothrus Kunst, 1971 (=***Heminothrus***)
Pectinoppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (=***Dzarogneta***)
Pediculochelus Lavoipierre, 1946 (=**Paralycus**)
Pedrocortesella Hammer, 1961
Pedrocortesia Hammer, 1958 (=***Pheroliodes***)
Pedunculozetes Hammer, 1962
Pelokylla Adolph *et* Haq, 1982 (=***Drymobatoides***)
Pelonia Grube, 1859 (=***Cepheus***)
Peloppia Sellnick, 1931 (=***Metrioppia***)
Pelops Koch, 1835 (=***Eupelops***)
Pelopsis Hall, 1911
Peloptoribula Mahunka, 1984
Peloptulus Berlese, 1908
Peloribates Berlese, 1908
Peloribatodes Mahunka, 2011 (***Peloribates***)
Peltenuiala Norton, 1983
Pentabodes P. Balogh, 1984 (=***Phyllocarabodes***)
Pentacepheus Corpuz-Raros, 2004
Pentamagyaria Subías, 2020 (***Magyaria***)
Pentazetes Balogh *et* P. Balogh, 1983
Pentoppia Subías, 2020 (***Moritzoppia***)
Perezinigokalumma Subías, 2004 (***Neoribates***)
Pergalumna Grandjean, 1936
Peridromotritia Jacot, 1923 (=***Phthiracarus***)
Perlohmannia Berlese, 1916
Permycobates Strenzke, 1954 (=***Calyptozetes***)
Perscheloribates Hammer, 1973 (***Scheloribates***)
Perspicuoppia Pérez-Íñigo, 1971 (***Oppiella***)
Persuctobelba Mahunka, 2000
Pertorgunia Dalenius, 1958 (=***Halozetes***)
Perutritia Märkel, 1964 (***Mesotritia***)
Perxylobates Hammer, 1972
Petrozetes Sitnikova, 1968 (=***Antarcticola***)
Phalacrozetes Aoki, 1965 (***Vilhenabates***)
Phauloppia Berlese, 1908
Phauloppiella Subías, 1977
Phenopelops Petrunkevitch, 1955 (=***Eupelops***)
Pheroliodes Grandjean, 1931
Philippizetes Corpuz-Raros, 1979 (=***Haplozetes***)
Philippobodes Balogh *et* P. Balogh, 1992 (=***Bathocepheus***)
Philippotocepheus Balogh *et* P. Balogh, 1992
Philoribates Corpuz-Raros, 1980 (***Hammerabates***)
Philotritia Mahunka, 1988 (=***Oribotritia***)
Phrathicarus Niedbała, 1994 (=***Calyptophthiracarus***)
Phthiracaroides Štorkán, 1923 (=***Collohmannia***)
Phthiracarulus Berlese, 1920 (=***Mesoplophora***)
Phthiracarus Perty, 1841
Phthirarica Mahunka, 1982 (***Hoplophthiracarus***)
Phylacozetes Grandjean, 1936
Phylleremus Behan-Pelletier *et* Walter, 2007
Phyllhermannia Berlese, 1916
Phyllocarabodes Balogh *et* Mahunka, 1969
Phyllochthonius Travé, 1967
Phyllolohmannia Balogh *et* P. Balogh, 1987 (***Mixacarus***)
Phyllonothrus Sellnick, 1959 (=***Masthermannia***)
Phyllorchestes Mahunka, 1983 (=***Zetorchestes***)
Phylloribatula Balogh *et* Mahunka, 1978
Phyllotegeus Berlese, 1913 (=***Conoppia***)
Phyllozetes Gordeeva, 1978
Physobates Hammer, 1962
Physozetes Mahunka, 2008
Piffliella Hammer, 1979
Pilizetes Sellnick, 1937
Pilobatella Balogh *et* Mahunka, 1967
Pilobates Balogh, 1960
Pilocepheus Pérez-Íñigo, 1992
Pilogalumna Grandjean, 1956
Pirnodus Grandjean, 1956
Plaesioppia Balogh, 1983 (***Brassoppia***)
Plakoribates Popp, 1960
Planobates Hammer, 1973
Planoristes Iturrondobeitia *et* Subías, 1978
Plasmobates Grandjean, 1929
Plateremaeus Berlese, 1908
Platyamerus Balogh *et* P. Balogh, 1983
Platyliodes Berlese, 1916
Platynothrus Berlese, 1913 (***Heminothrus***)
Plenotocepheus Hammer, 1966
Plenoxylobates Hammer, 1979 (***Setoxylobates***)
Pleodamaeus Paschoal, 1983 (=***Gymnodamaeus***)
Plesiodamaeus Grandjean, 1954
Plesiotritia Walker, 1965 (=***Oribotritia***)
Pletzenoppia Balogh, 1983
Plonaphacarus Niedbała, 1986 (=***Rhacaplacarus***)
Plumobates Balogh *et* Mahunka, 1966
Plumozetes Balogh, 1972
Pluristeganacarus Subías, 2019 (***Steganacarus***)
Pluritrichoppia Subías *et* Arillo, 1989
Pocsia Mahunka, 1983 (***Euphthiracarus***)
Pocsoppia Mahunka, 1984 (=***Granuloppia***)
Podacarus Grandjean, 1955
Podopterotegaeus Aoki, 1969
Podoribates Berlese, 1908
Poecilochthonius Balogh, 1943
Polillozetes Corpuz-Raros, 2009
Polyoppia Hammer, 1968
Polypterozetes Berlese, 1916
Polyxylobates Hammer, 1973 (***Setoxylobates***)
Pontiobates Luxton, 1989
Porallozetes Balogh *et* P. Balogh, 1992 (***Pentazetes***)
Porobelba Grandjean, 1936
Porofenichelia Mahunka, 1985 (=***Fenichelia***)
Porogalumnella Balogh, 1968 (***Galumnopsis***)
Porokalumma Wallwork, 1966 (***Sandenia***)
Poroliodes Grandjean, 1934
Poroscheloribates Arillo, Gil-Martín *et* Subías, 1994
Porozetes Hammer, 1962 (=***Sphaerozetes***)
Porrhoppia Balogh, 1970
Porrhotegaeus Balogh *et* Mahunka, 1966
Posthermannia Grandjean, 1954 (=***Masthermannia***)
Pravoppia Luxton, 1985 (***Membranoppia***)
Prionoribatella Aoki, 1975
Processoppia Balogh, 1983
Procorynetes Woolley, 1967 (***Liacarus***)
Propelops Jacot, 1937
Propeschelobates Jacot, 1936 (=***Haplozetes***)
Protectoribates Behan-Pelletier, 2017
Proteremaeus Piffl, 1965
Proteremella Balogh, 1959 (=***Eremella***)
Protobelba Norton, 1979 (***Belbodamaeus***)
Protocepheus Jacot, 1928
Protodamaeus Subías, 2019
Protokalumma Jacot, 1929 (=***Neoribates***)
Protophthiracarus Balogh, 1972 (***Hoplophthiracarus***)
Protoplophora Berlese, 1910
Protoribates Berlese, 1908
Protoribotritia Jacot, 1938
Protoripoda Balogh, 1970
Protoschelobates Jacot, 1934 (=***Scheloribates***)
Prototritia Berlese, 1910
Protozetes Balogh, 1962
Protozetomimus Pérez-Íñigo, 1990 (***Zetomimus***)
Provertex Mihelčič, 1959
Psammocepheus Aoki, 1970 (***Fissicepheus***)
Psammochthonius Fuangarworn *et* Norton, 2013
Psammogalumna Balogh, 1943
Psednobates Luxton, 1992
Pseudachipteria Travé, 1960 (=***Parachipteria***)
Pseudantarcticola Balogh, 1970
Pseuderemulus Balogh *et* Mahunka, 1968
Pseudoamerioppia Subías, 1989
Pseudobrachioppiella Tseng, 1982
Pseudocarabodes Mahunka, 1991
Pseudocepheus Jacot, 1928 (=***Xenillus***)
Pseudoceratoppia Hammer, 1967
Pseudocryptacarus McDaniel, Norton *et* Bolen, 1979 (=***Heptacarus***)
Pseudogalumna Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1994 (=***Carinogalumna***)
Pseudogeminozetes Tseng, 1984 (***Furcobates***)
Pseudomultioppia Subías, 2018
Pseudoneoribates Ermilov *et* Corpuz-Raros, 2015 (***Neoribates***)
Pseudonothrus Balogh, 1958 (=***Allonothrus***)

Pseudophysobates Fujikawa, 1991 (=***Neophysobates***)
Pseudopilizetes Ermilov, 2017 (***Pilizetes***)
Pseudopirnodus Baranek, 1985
Pseudoppia Pérez-Íñigo, 1966
Pseudoprotoribates Weigmann *et* Monson, 2004 (=***Lagenobates***)
Pseudopyroppia Rjabinin, 1987
Pseudotectoribates Subías, 1977
Pseudotocepheus Balogh, 1961
Pseudotritia Willmann, 1919 (=***Euphthiracarus***)
Pteramerus Balogh, 1964
Pterobates Balogh *et* Mahunka, 1977 (=***Salvus***)
Pterochthonius Berlese, 1913
Pteroripoda Balogh *et* Mahunka, 1974
Pterozetes Hammer, 1966
Ptiloppia Balogh, 1983
Pulchroppia Hammer, 1979
Pulchroppiella Balogh, 1983
Punctizetes Hammer, 1971
Punctoribates Berlese, 1908
Pustuloppia Mahunka, 1994
Pyroppia Hammer, 1955
Quadroppia Jacot, 1939
Quadroribula Balogh *et* P. Balogh, 1992
Quatrobelba Norton, 1980 (=***Dasybelba***)
Quattoppiella Hugo-Coetzee, 2014
Quinquoppia Tseng, 1982
Radamoppia Mahunka, 1994 (=***Lancelalmoppia***)
Rafacarus Niedbała, 1981 (***Steganacarus***)
Rajskibates Balogh *et* P. Balogh, 1984 (=***Liebstadia***)
Ramogneta Karppinen, 1966
Ramonoppia Morell, 1990
Ramsayellus Spain *et* Luxton, 1970
Ramuloppia Balogh, 1961
Ramusella Hammer, 1962
Ramuselloppia Subías *et* Rodríguez, 1986
Rastellobata Grandjean, 1961
Rectoppia Subías, 1980 (***Ramusella***)
Reductobates Balogh *et* Mahunka, 1966
Reductoppia P. Balogh, 1984 (***Similoppia***)
Reductoripoda Mahunka *et* Palacios-Vargas, 1996 (=***Benoibates***)
Rekharibatula Bose, Mathur, Jain *et* Dogra, 1996 (=***Zygoribatula***)
Reptacarus Pérez-Íñigo *et* Peña, 1995
Reteremuloides Mahunka, 1989
Reteremulus Balogh *et* Mahunka, 1966
Reticobella Hammer, 1962 (=***Suctobelbila***)
Reticulocepheus Vasiliu *et* Călugăr, 1977
Reticuloppia Balogh *et* Mahunka, 1966
Retrozetes Colloff, 2012
Rhabdoribates Aoki, 1967
Rhabdozetes Hammer, 1962
Rhacaplacarus Niedbała, 1986 (***Hoplophorella***)
Rhaphidosus Woolley, 1969 (***Liacarus***)
Rhaphigneta Grandjean, 1960 (***Autogneta***)
Rhaphoppia Balogh, 1983 (=***Processoppia***)
Rhinoppia Balogh, 1983
Rhinosuctobelba Woolley *et* Higgins, 1969 (=***Rhynchobelba***)
Rhizophobates Karasawa *et* Aoki, 2005 (=***Thalassozetes***)
Rhopalozetes Balogh, 1964
Rhynchobelba Willmann, 1953
Rhynchobella Hammer, 1961 (=***Suctobelbila***)
Rhynchoppia Balogh, 1968
Rhynchoribates Grandjean, 1929
Rhynchoribatodes Miko, 2016 (***Rhynchoribates***)
Rhysotritia Märkel *et* Meyer, 1959 (=***Acrotritia***)
Rimandocepheus Corpuz-Raros, 1998 (***Kalayaan***)
Rioppia Balogh *et* Mahunka, 1977
Rogerzetes Fernández, Theron *et* Cleva, 2011
Rohria Balogh *et* Mahunka, 1977
Romanobates Feider, Vasiliu *et* Călugăr, 1970 (=***Lucoppia***)
Rostrogalumna Engelbrecht, 1973 (***Galumna***)
Rostrozetella Mahunka, 2006
Rostrozetes Sellnick, 1925
Roynortonella Walter, 2009 (=***Joshuella***)
Roynortonia Ermilov, 2011
Rugocepheus Mahunka, 2009
Rugoppia Mahunka, 1986
Rugozetes Balogh, 1960
Rwandabodes Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2019 (=***Synkrotima***)
Rykella Balogh, 1962 (***Drymobatoides***)
Sabacarus Ramsay *et* Sheals, 1969
Sabahoppia Mahunka, 1987 (***Ramusella***)
Sabahtritia Mahunka, 1987
Sacculobates Grandjean, 1962
Sacculogalumna Engelbrecht, 1973
Sacculoppia Balogh *et* Mahunka, 1968
Sacculoptulus Subías, 2017 (***Peloptulus***)
Sacculoribatella Shtanchaeva *et* Subías, 2012 (***Oribatella***)
Sacculoribates Subías, 2021 (***Trichoribates***)
Sacculozetes Behan-Pelletier *et* Rjabinin, 1991
Sadocepheus Aoki, 1965
Safrobates Mahunka, 1989 (***Macrogena***)
Sagittabodes Balogh *et* P. Balogh, 1992 (***Machadocepheus***)
Sagittazetes Balogh *et* P. Balogh, 1983
Salpasozetes Mahunka, 1977 (=***Bipassalozetes***)
Saltatrichus Coetzee, 1993 (***Demisalto***)
Salvus Özdikmen, 2008
Samarocepheus Corpuz-Raros, 1990
Samoabates Hammer, 1973
Sandenia Oudemans, 1917
Sarawakiella Mahunka, 1996 (***Trichogalumna***)
Saxicolestes Grandjean, 1951
Scapheremaeus Berlese, 1910
Scapuleremaeus Behan-Pelletier, 1989
Scarabacarus Shtanchaeva *et* Subías, 2010
Sceletoppia Mahunka *et* Mahunka-Papp, 2009
Schalleria Balogh, 1962
Schalleriella Engelbrecht, 1972
Scheloribatella Mahunka, 1984 (=***Perscheloribates***)
Scheloribates Berlese, 1908
Scheloribatoides Mahunka, 1988
Schizozetes Balogh, 1962
Schusteria Grandjean, 1968
Schweizerzetes Mahunka, 2001 (=***Alpizetes***)
Scotiazetes Wallwork, 1966
Scriptoripoda P. Balogh, 1985
Sculpteremaeus Behan-Pelletier *et* Ermilov, 2020
Sculptozetes Mahunka, 1984 (=***Melanozetes***)
Scutoribates Sellnick, 1918
Scutovertex Michael, 1879
Scutoverticosus Kok, 1968
Scutozetes Hammer, 1952
Seboetocepheus Mahunka, 1985
Selenoribates Strenzke, 1961
Sellnickia Oudemans, 1927
Sellnickochthonius Krivolutsky, 1964
Selvazetes Behan-Pelletier, 1998
Semipunctoribates Mahunka, 1987 (***Punctoribates***)
Semischeloribates Hammer, 1973 (=***Scheloribates***)
Senectoppia Aoki, 1976
Senilochthonius Mahunka, 1992 (***Haplochthonius***)
Senoribula Mahunka, 1975
Separachipteria Subías, 2019
Separatoppia Mahunka, 1983
Separatoribates Matsushima, Y.-N. Nakamura *et* Nakamura, 2009
Serrarius Michael, 1883 (=***Gustavia***)
Serratobelba Mahunka, 1984
Serratoppia Subías *et* Mínguez, 1985
Seteremaeozetes P. Balogh, 1988
Seteremaeus Hammer, 1971
Setincabates Lee, 1993 (=***Peloribates***)
Setobates Balogh, 1961 (=***Topobates***)
Setogalumna P. Balogh, 1985
Setoppia Balogh, 1983
Setoxylobates Balogh *et* Mahunka, 1967
Setulobates Mahunka, 1984 (=***Multoribates***)
Setuloppia Balogh, 1983
Seychellozetes Mahunka, 1984 (=***Drymobatoides***)
Shtanchaeviella Subías, 2020 (***Provertex***)
Sibiremaeus Rjabinin *et* Krivolutsky, 1975 (=***Proteremaeus***)

Sicaxylobates Luxton, 1985
Siciliophora Bernini, 1983 (***Prototritia***)
Siciliotrichus Bernini, 1973
Siculobata Grandjean, 1953 (***Dometorina***)
Sigmonothrus Chakrabarti *et* Kundu, 1978 (=***Platynothrus***)
Similobates Mahunka, 1982
Similochthonius Mahunka, 1985
Similoppia Mahunka, 1983
Simkinia Krivolutsky, 1966 (***Hemileius***)
Singabodes Mahunka, 1998
Sinolohmannia Balogh *et* Mahunka, 1979 (=***Epilohmannia***)
Sinozetes Mahunka, 2000 (=***Kaszabozetes***)
Solenoppia Hammer, 1968
Solenozetes Grandjean, 1931
Spathulocepheus Balogh *et* Mahunka, 1969
Spatiodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 (***Damaeus***)
Sphaerobates Sellnick, 1928 (=***Podoribates***)
Sphaerochochthonius Mahunka, 1985 (=***Similochthonius***)
Sphaerochthoniella Mahunka, 1985 (=***Sphaerochthonius***)
Sphaerochthonius Berlese, 1910
Sphaerogalumna Balogh, 1961
Sphaerozetella Jacot, 1929 (=***Sphaerozetes***)
Sphaerozetes Berlese, 1885
Sphagnoppia Balogh *et* P. Balogh, 1986
Sphodrocepheus Woolley *et* Higgins, 1963
Spineremaeus Colloff, 2011
Spinoppia Higgins *et* Woolley, 1966
Spinotocepheus Hammer, 1981
Spinozetes Piffl, 1966
Stachyoppia Balogh, 1961
Stakarenoppia Subías *et* Rodríguez, 1986 (***Karenella***)
Staurobates Grandjean, 1966
Stauroma Grandjean, 1966
Steganacarellus Mahunka, 1986 (***Hoplophthiracarus***)
Steganacarus Ewing, 1917
Stelechobates Grandjean, 1965
Stenoppia Balogh, 1983 (***Graptoppia***)
Stenoxenillus Woolley *et* Higgins, 1966 (=***Liacarus***)
Sternoppia Balogh *et* Mahunka, 1968
Stictozetes Berlese, 1916
Stomacarus Grandjean, 1952
Stonyxenillus Woolley *et* Higgins, 1966 (***Xenillus***)
Storkania Jacot, 1929 (=***Scheloribates***)
Strabogalumna Mahunka, 1995 (=***Stictozetes***)
Strenzkea Travé, 1967
Striatobates Hammer, 1973
Striatoppia Balogh, 1958
Strinatacarus Mahunka, 1974
Sturmacarus P. Balogh, 1984 (=***Neophthiracarus***)
Sturmozetes Balogh *et* P. Balogh, 1992
Styloribates Jacot, 1934 (=***Protoribates***)
Stylozetes Balogh *et* Mahunka, 1969
Subbelba Bulanova-Zachvatkina, 1967
Subiasella Balogh, 1983
Subphauloppia Hammer, 1967
Subpirnodus Mahunka, 1988
Subulobates Hammer, 1972 (=***Totobates***)
Sucteremaeus Golosova *et* Krivolutsky, 1975
Suctobelba Paoli, 1908
Suctobelbata Gordeeva, 1991
Suctobelbella Jacot, 1937
Suctobelbila Jacot, 1937
Suctobelbiloides Mahunka, 1988
Suctobelboides Pankov, 1997 (***Novosuctobelba***)
Suctoppia Balogh, 1958 (=***Suctobelbila***)
Suctoribates Balogh, 1963
Suctotegeus Mahunka, 1987
Sulcoribula Hammer, 1971
Sumatrotritia Mahunka, 1989
Sundazetes Hammer, 1979 (=***Indoribates***)
Svalbardia Thor, 1930
Symbioribates Aoki, 1966
Symphauloppia Balogh, 1972 (=***Pseudoppia***)
Synchthonius Hammen, 1952
Synichotritia Walker, 1965
Synkrotima Fernández, Theron, Leiva *et* Tiedt, 2017 (***Austrocarabodes***)
Synoppia Balogh *et* Mahunka, 1969 (=***Sternoppia***)
Szentivanyella Balogh *et* Mahunka, 1969
Taeniogalumna Balogh, 1962
Tainsculptoppia Subías *et* Shtanchaeva, 2011
Taiwanoppia Tseng, 1982
Tamdamaeus Miko *et* Ermilov, 2017 (***Tectodamaeus***)
Tansocepheus Mahunka, 1983
Tanzaniacepheus Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2017 (***Congocepheus***)
Tanzanycha Koçak *et* Kemal, 2008 (***Trichogalumna***)
Tanzoppia Mahunka, 1988 (***Heteroppia***)
Tauroplophora Gordeeva, Niemi *et* Petrova-Nikitina, 1998 (***Grandjeanoplophora***)
Tecteremaeus Hammer, 1961
Tectocarabodes Mahunka, 1988
Tectocepheus Berlese, 1896
Tectodamaeus Aoki, 1984
Tectopelops Jacot, 1929 (=***Eupelops***)
Tectoppia Wallwork, 1961
Tectoppiella Mahunka, 1984 (=***Setoppia***)
Tectorhynchoribates Miko, 2016 (***Rhynchoribates***)
Tectoribates Berlese, 1910
Tegeocranellus Berlese, 1913
Tegeocranus Nicolet, 1855 (=***Cepheus***)
Tegeozetes Berlese, 1913
Tegoribates Ewing, 1917
Teleioliodes Grandjean, 1934
Temburongia Mahunka, 1990
Tentaculozetes Balogh, 1970 (***Peloribates***)
Tenuelamellarea Subías *et* Iturrondobeitia, 1978
Tenuiala Ewing, 1913
Tenuialoides Woolley *et* Higgins, 1966
Tenuileius Lee, 1989 (=***Turcibates***)
Teraja Mahunka, 1995 (=***Microzetes***)
Teratoppia Balogh, 1959
Teratoppiella Balogh, 1983 (***Teratoppia***)
Tereticepheus S. Bernini *et* Bernini, 1990
Terratritia Ramsay *et* Sheals, 1969
Terrazetes Jacot, 1929 (=***Unguizetes***)
Tessacarus Grandjean, 1962 (=***Lamellocepheus***)
Tetracondyla Newell, 1956 (=***Dolicheremaeus***)
Tetraperxylobates Subías, 2021 (***Perxylobates***)
Tetrochthonius Hammer, 1958 (=***Haplochthonius***)
Tetroppia Gordeeva, 1999 (=***Moritzoppia***)
Thalassozetes Schuster, 1963
Thamnacarus Grandjean, 1950
Thasecazetes Pfingstl, Baumann, Lienhard *et* Schatz, 2017
Thyrisoma Grandjean, 1953 (=***Banksinoma***)
Tikizetes Hammer, 1967
Tokukobelba Lamos, 2016
Tokunocepheus Aoki, 1966
Tongacarus Hammer, 1973 (=***Javacarus***)
Topalia Balogh *et* Csiszár, 1963
Topobates Grandjean, 1958
Torpacarus Grandjean, 1950
Totobates Hammer, 1961
Trachygalumna Balogh, 1960 (=***Stictozetes***)
Trachyhoplophora Berlese, 1923 (=***Steganacarus***)
Trachyoribates Berlese, 1908
Traegardhacarus Zachvatkin, 1945 (=***Palaeacarus***)
Transoribates Pérez-Íñigo, 1992
Trapezoppia Balogh *et* Mahunka, 1969
Trematoppia Balogh, 1964
Trhypochthoniellus Willmann, 1928
Trhypochthonius Berlese, 1904
Triachipteria Subías, 2017 (***Campachipteria***)
Triaunguis Kulijev, 1978 (***Protoribates***)
Triautogneta Fujikawa, 2009
Tribates Mahunka, 1978 (=***Euscheloribates***)
Trichacaroceras Mahunka, 1991 (***Acaroceras***)
Tricheremaeus Berlese, 1908
Trichocarabodes Balogh, 1961
Trichocepheus Balogh *et* Mahunka, 1966
Trichocondyla Balogh *et* P. Balogh, 1986
Trichodamaeus Mahunka, 1984 (=***Aleurodamaeus***)

Trichogalumna Balogh, 1960
Trichogalumnella Mahunka, 1992
Trichonothrus Mahunka, 1986
Trichoppia Balogh, 1961
Trichoribatella Mahunka, 1983 (=***Latilamellobates***)
Trichoribates Berlese, 1910
Trichoribatula Balogh, 1961 (=***Phauloppia***)
Trichotocepheus Aoki, 1965
Trichozetes Balogh *et* Mahunka, 1980
Trichthonius Hammer, 1961
Trihumerozetes Sellnick, 1959 (=***Humerobates***)
Trilohmannia Willmann, 1923 (=***Trhypochthonius***)
Trimalaconothrus Berlese, 1916 (***Malaconothrus***)
Tripilobatella Subías, 2017 (***Pilobatella***)
Tripiloppia Hammer, 1968
Triplophora Mahunka, 1977 (=***Arthrhoplophora***)
Trischeloribates Hammer, 1971 (***Euscheloribates***)
Tritegeus Berlese, 1913
Triteremella Kunst, 1971 (=***Licnocepheus***)
Tritia Berlese, 1883 (=***Oribotritia***)
Triungulozetes Subías, 2001 (=***Haplozetes***)
Trixylobates Balogh *et* Mahunka, 1978
Trizetes Berlese, 1904
Tropacarus Ewing, 1917 (***Steganacarus***)
Truncopes Grandjean, 1956
Truncozetes Balogh *et* Mahunka, 1969
Trypogalumnella Mahunka, 1995
Tuberemaeus Sellnick, 1930 (***Hemileius***)
Tuberocepheus Balogh *et* Mahunka, 1969
Tuberoppia Golosova, 1974
Tubulozetes P. Balogh, 1989
Tumerozetes Hammer, 1966
Tumidalvus Ewing, 1908 (=***Trhypochthonius***)
Tuparezetes Spain, 1969
Turcibates Ayyildiz *et* Luxton, 1989 (=***Simkinia***)
Turkmenitrichus Krivolutsky *et* Karppinen, 2006
Tutorozetes Hammer, 1967
Tuxenia Hammer, 1958
Tyrphonothrus Knülle, 1957
Udetaliodes Jacot, 1929 (=***Neoliodes***)
Ugandoppia Mahunka, 1988 (=***Brachioppiella***)
Uluguroides Mahunka, 1983 (***Austrocarabodes***)
Ulugurozetes Mahunka, 1984 (=***Ramsayellus***)
Ululohmannia Mahunka, 1987
Umashtanchaeviella Ermilov, Anichkin *et* Tolstikov, 2014
Umbellozetes Krivolutsky, 1969
Unduloribates Balogh, 1943
Undulozetes Balogh *et* Mahunka, 1969 (***Licnozetes***)
Unguizetes Sellnick, 1925
Unicobelba Mahunka *et* Mahunka-Papp, 1999 (=***Suctobelbata***)
Uracrobates Balogh *et* Mahunka, 1967
Urobates Hammer, 1973 (=***Uracrobates***)
Uronothrus Berlese, 1913 (=***Camisia***)
Uroppia Balogh, 1983
Urubambates Hammer, 1961 (***Hemileius***)
Ussuribata Rjabinin, 1975 (***Suctobelbella***)
Vaghia Oudemans, 1919
Valbehanella Ermilov *et* Hugo-Coetzee, 2012
Variogalumna Mahunka, 1995 (=***Cosmogalumna***)
Varioppia Mahunka, 1985 (***Hammerella***)
Veloppia Hammer, 1955
Vepracarus Aoki, 1965 (***Papillacarus***)
Verachthonius Moritz, 1976
Vermacarus Balogh *et* Mahunka, 1980
Vesiculobates Hammer, 1979 (***Siculobata***)
Vicinebates Pavlichenko, 1991 (=***Latilamellobates***)
Vietobates Mahunka, 1987 (=***Limnozetes***)
Vietoppia Mahunka, 1988 (=***Taiwanoppia***)
Vigilomicrozetes Tseng, 1982 (=***Nothrus***)
Vilhenabates Balogh, 1963
Viracochiella Hammer, 1961 (***Trichoribates***)
Wallworkella Balogh, 1983 (=***Wallworkoppia***)
Wallworkiella Hammer, 1979 (***Paraleius***)
Wallworkodes Subías, 2021
Wallworkoppia Subías, 1989
Weigmannia Miko *et* Norton, 2010
Weigmanniella Subías, 2010 (***Anachipteria***)
Westwoodia Cambridge, 1875 (=***Crotonia***)
Williamsia Hammer, 1958 (=***Williamszetes***)
Williamszetes Hammer, 1961
Woasella Balogh *et* P. Balogh, 2002 (=***Varioppia***)
Woolleybates Balogh *et* P. Balogh, 1984 (=***Jornadia***)
Xenilloides Pérez-Íñigo *et* Baggio, 1989
Xenillus Robineau-Desvoidy, 1839
Xenogalumna Balogh, 1961 (=***Acrogalumna***)
Xenolohmannia Balogh *et* Mahunka, 1969
Xenoppia Mahunka, 1982 (=***Afroppia***)
Xiphobates Pavlichenko, 1994 (***Chamobates***)
Xiphobelba Csiszár, 1961
Xylobates Jacot, 1929 (=***Protoribates***)
Yambaramerus Aoki, 1996
Yemenobodes Mahunka, 2000 (=***Pseudocarabodes***)
Yoronoribates Aoki, 1987 (=***Hammerabates***)
Yoshiobodes Mahunka, 1986
Yungaseremaeus Balogh *et* Mahunka, 1969
Zachvatkinella Lange, 1954
Zachvatkinibates Shaldybina, 1973
Zaherizetes Yousef *et* Nasr, 1976 (=***Rostrozetes***)
Zealandobates Hammer, 1967 (=***Ramsayellus***)
Zealandozetes Ermilov, Minor *et* Behan-Pelletier, 2015
Zeanothrus Hammer, 1966 (=***Trimalaconothrus***)
Zeaotritia Mahunka, 1988 (***Indotritia***)
Zeascheloribates Luxton, 1982
Zeasuctobelba Hammer, 1966
Zetes Koch, 1835 (=***Galumna***)
Zetobelba Hull, 1916 (=***Zygoribatula***)
Zetomimus Hull, 1916
Zetomotrichus Grandjean, 1934
Zetorchella Berlese, 1916
Zetorchestes Berlese, 1888
Zimbabweae Fernández, Theron *et* Leiva, 2016 (=***Sagittabodes***)
Zimbabwecepheus Fernández, Theron, Leiva *et* Jordaan, 2017 (=***Synkrotima***)
Zygachipteria Mihelčič, 1956 (=***Cerachipteria***)
Zygoribatula Berlese, 1916 (***Oribatula***)

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ESPECIES Y SUBESPECIES

aba (Galumna)
ababa [H. (Phyllhermannia)]
abacus [H. (Besuchetacarus)]
ababaeus (Peloribates)
abalai (Zetorchella)
abarkouhiensis [R. (Insculptoppia)] (=elliptica)
abbreviata (Macrogena)
abbreviata (Meristolohmannia)
abbreviatus [S. (Perscheloribates)]
abchasica [L. (Antennoppia)]
abchasica (Ceratoppia)
abchasica [Q. (Coronoquadroppia)]
abchasicus [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
abchasicus [P. (Vepracarus)]
abdita (Aeroppia)
abditus (Paraphysobates)
abdominalis [L. (Dorycranosus)]
abdosensilla (Camisia)
abdurachmanovi (Oribatella)
abeloosi (Amiracarus) (=similis)
aberrans (Belba) (=sculpta)
aberrans (Protoribotritia)
aberrata (Rhinoppia) (=subpectinata)
abhorrens (Oribatella)
abmi (Oribatella)
abnobensis (Tricheremaeus)
aborigensis [D. (Epidamaeus)]
aborigensis (Niphocepheus)
abraensis (Scheloribates)
abresi (Stomacarus)
abrupta [A. (Acrogalumna)]
absalom (Eupelops) sp. inq.
abscondita (Cryptoplophora)
abscondita [M. (Parplophora)]
absidatus [S. (Pluristeganacarus)]
absimilis (Atropacarus)
absolon (Dolicheremaeus)
absolutus (Benoibates)
abstemius [H. (Notophthiracarus)]
abstemius (Phthiracarus)
abulensis [P. (Montizetes)]
acaciensis [P. (Vepracarus)]
acalepha [H. (Phyllhermannia)]
acanthophora (Indotritia) (=krakatauensis)
acanthus (Campbellobates)
acarinus (Aphelacarus)
acaroides (Trichoribates) sp. inq.
achalensis (Pheroliodes)
achipteroides (Anachipteria)
achmedovi (Atropacarus)
acicularis [D. (Epidamaeus)]
aciculatus (Papillacarus)
aciculatus (Reteremulus)
acostulatus (Eueremaeus)
acromios (Eupelops)
acruciata (Eremaeus) (=hepaticus)
actirostrata (Medioxyoppia)
aculeata (Allobelba)
aculeata (Crotonia)
aculeatisetae (Neoliodes) hawaiiensis
aculeatus [H. (Austrophthiracarus)]
aculeatus [H. (Calyptophthiracarus)] (=bruneiensis)
aculeatus [H. (Notophthiracarus)]
aculeatus [S. (Oxyscheloribates)]
acuminata (Ceratoppia) Koch, 1841 *(=bipilis)*
acuminata (Ceratoppia) Gol., 1981
acuminata (Lauroppia) maritima
acuminata (Oribatula)
acuminatus [P. (Archiphthiracarus)]
acuminatus [L. (Rhaphidosus)]
acuspidatus (Mycobates)
acuspidatus (Planoristes)
acuta (Achipteria)
acuta (Anachipteria)
acuta (Beckiella)
acuta (Graptoppia) sundensis
acuta (Gymnodampia)
acuta (Hafenrefferia)
acuta (Karenella)
acuta (Medioxyoppia)
acuta (Moritzoppia)
acuta (Suctobelbella)
acuticlava (Scheloribates) praeincisus
acutidens [L. (Dorycranosus)]
acutidens (Suctobelbella)
acutifrons (Galumna)
acutinotata (Paraphauloppia)
acutipes (Separatoppia)
acutirostris [Z. (Protozetomimus)]
acutirostris (Rhinoppia) (=ordunensis)
acutirostris (Scheloribates)
acutirostris (Unguizetes)
acutirostrum (Galumna)
acutirostrum [I. (Haplozetes)]
acutirostrum (Lepidozetes)
acutirostrum (Orbiculobates)
acutirostrum (Samoabates)
acutirostrum (Scheloribates)
acutisetosa (Nanhermannia)
acutissima [S. (Flagrosuctobelba)] sp. inq.
acutissimus (Totobates)
acutodentata [S. (Ussuribata)]
acutus (Cavernocepheus)
acutus [L. (Dorycranosus)]
acutus (Eremaeozetes)
acutus (Eurhynchoribates)
acutus (Grypoceramerus)
acutus (Peloribates)
acutus (Tectocepheus)
acutus [P. (Triaunguis)]
acutus [E. (Trischeloribates)]
adami (Eremulus)
adamsoni (Nesiotizetes)
adanata [N. (Confinoppia)]
adansoni (Microzetes)
adareata (Pilogalumna) (=crassiclava)
adauriculata (Oppiella) (=nova)
adelae (Xenillus)
adelaidae (Oribella)
adelaidae [S. (Tropacarus)]
adilatatus [T. (Cristonothrus)]
adjacens (Aeroppia)
adjacentis (Arthrhoplophora)
adjarica [A. (Acrogalumna)] longipluma
adjecta (Phauloppia)
adjuncta (Lanceoppia)
adminensis (Licnoliodes)
admirabilis [H. (Protophthiracarus)]
admirabilis [H. (Steganacarellus)] (=obsessus)
adpressus (Gymnodamaeus)
aduncata [H. (Mantigueracarus)]
aduncus (Hoplophthiracarus)
aegra (Pergalumna)
aegrota (Belba)
aegyptiaca (Anachipteria)
aegyptiaca (Oppiella) (=nova)
aegyptiacus (Eobrachychthonius)
aegyptica (Epilohmannia) minuta
aegyptica (Galumna)
aegyptica [O. (Zygoribatula)]
aegypticus (Acaroceras)
aegypticus [P. (Archiphthiracarus)]
aegypticus (Berlesezetes)
aegypticus (Lamellobates) molecula
aegypticus (Rostrozetes) sp. inq.
aelleni (Ceratozetes) (=mediocris)

aelleni (Fijibates)
aelleni [S. (Guatemalozetes)]
aelleni (Neoamerioppia)
aelleni (Strinatacarus)
aenigmaticus (Xenilloides)
aenus [H. (Austrophthiracarus)]
aeoliana (Berniniella)
aeoliana (Mongaillardia)
aepyornis [R. (Insculptoppiella)]
aequalis (Euphthiracarus)
aequalis (Melanozetes) sp. inq.
aequalis (Mesotritia)
aequalis (Papillacarus)
aequalis (Pergalumna)
aequalis (Scheloribates)
aequalis [O. (Zygoribatula)] (?=gozmanyi)
aequidentatus (Liacarus)
aequiporosa (Pergalumna)
aequipunctatus (Euphthiracarus) (=monodactylus)
aequiseta (Ramonoppia)
aequivoca (Arcoppia)
aequivoca (Berniniella) sp. inq.
aethes [P. (Archiphthiracarus)]
aethes (Hoplophorella)
aethes [H. (Steganacarellus)]
aethiopica (Basilobelba)
aethiopica (Gustavia)
aethiopica (Neogalumna)
aethiopicus [P. (Biunguis)]
aethiopicus (Dolicheremaeus)
aethiopicus (Scheloribates)
aethiopicus [A. (Uluguroides)]
affinis (Acrotritia) (=americana)
affinis (Carabodes)
affinis [D. (Epidamaeus)]
affinis (Eupelops) (=ureaceus)
affinis [S. (Flagrosuctobelba)]
affinis (Mochlobates)
affinis (Oribatula) (=tibialis)
affinis (Phthiracarus)
affinis (Sphaerozetes) sp. inq.
africana (Archeremella)
africana (Basilobelba)
africana (Beckiella)
africana (Beklemishevia)
africana (Eremella)
africana (Galumnopsis)
africana (Heterobelba)
africana (Hoplophorella) (=vitrina)
africana (Indotritia)
africana (Lasiobelba) (=arabica)
africana (Lyrifissiella)
africana (Machuella) (=draconis)
africana (Mesoplophora)
africana (Neoamerioppia)
africana (Notogalumna)
africana (Oribotritia)
africana [H. (Phyllhermannia)]
africana (Protoribotritia)
africana (Prototritia) (=armadillo)
africana (Senoribula)
africana (Separatoppia)
africana [G. (Stenoppia)]
africana (Szentivanyella)
africana (Topalia)
africana (Trichogalumna)
africanus (Aleurodamaeus)
africanus (Allozetes)
africanus (Annectacarus)
africanus (Berlesezetes) (=ornatissimus)
africanus (Brachychthonius) sp. inq.
africanus [G. (Diplobodes)]
africanus (Dolicheremaeus)
africanus (Eohypochthonius)
africanus (Eremulus) sp. inq.
africanus (Ethiovertex)
africanus (Fosseremus) (=laciniatus)
africanus (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
africanus (Humerobates)
africanus (Liochthonius)
africanus (Mahunkazetes)
africanus (Melanozetes)
africanus (Meristacarus)
africanus (Micreremus)
africanus (Neoeutegaeus)
africanus (Neoribates)
africanus (Parhypochcthonius) sp. inq.
africanus (Passalozetes)
africanus (Pheroliodes)
africanus (Pilizetes)
africanus (Pilobates)
africanus (Plakoribates)
africanus (Plasmobates) sp. inq.
africanus (Plenotocepheus)
africanus [E. (Pocsia)]
africanus (Podoribates) javensis
africanus (Rostrozetes) sp. inq.
africanus (Scheloribates) fimbriatus
africanus (Tegeocranellus) (=knysnaensis)
africanus (Trhypochthonius) sp. inq.
africanus [A. (Trichacaroceras)]
africanus [M. (Trimalaconothrus)] sp. inq.
africanus (Uracrobates)
afrominusculus [C. (Klapperiches)]
afromontanensis (Oribotritia)
afrum [N. (Perezinigokalumma)]
agalawatta (Austrocarabodes)
agartalensis (Cosmochthonius)
agathis (Condylobelba)
agathis [N. (Leptosuctobelba)]
agaveae [O. (Zygoribatula)]
agenjoi [C. (Klapperiches)]
agenjoi (Parachipteria)
agerus (Spinotocepheus)
aggenitalis (Euphthiracarus)
aggenitalis (Polillozetes)
agilis (Scheloribates) (=pallidulus)
agressor [A. (Austroflexa)]
agressor (Sagittazetes)
agricola [D. (Cylindroppia)] (=cylindrica)
agricola (Passalozetes)
agricola (Transoribates)
agricolus (Scheloribates)
agrosticula (Joshuella)
agueroi (Galumna)
agulhasensis [H. (Notophthiracarus)]
agusana [M. (Pentamagyaria)]
agusanensis [M. (Cristonothrus)]
agusanensis [S. (Perscheloribates)]
agusanus (Dolicheremaeus)
ahumeralis (Birobates)
ahumerata [G. (Monophauloppia)] (=hispanica)
ainu (Damaeus)
aitu [P. (Archiphthiracarus)]
akhtyamovi (Banksinoma)
akidosus [X. (Stonyxenillus)]
akimovi [P. (Vepracarus)]
akitaensis (Nothrus)
akitaensis (Pergalumna)
akkeshi [L. (Dorycranosus)] chiebunensis
akramii [A. (Rhaphigneta)]
akusiensis (Uroppia)
alachua [D. (Epidamaeus)] (=floridus)
alajuela (Oribotritia)
alamellae (Allogalumna) (=parva)
alamellata (Ramusella) (=clavipectinata)
alami [O. (Multoribatella)]
alandalusica (Iberogalumnella)
alas (Allozetes)
alas (Tegeocranellus)
alaskensis (Hololohmannia)
alaskensis (Maerkelotritia) (=kishidai)

alaskensis (Peloribates)
alaskensis (Propelops)
alata (Galumna)
alata [R. (Insculptoppia)]
alata (Liebstadia) (?=microptera)
alata (Oribatula) (=caliptera)
alata (Oripoda)
alata (Pilogalumna) (?=tenuiclava)
alatus [L. (Dorycranosus)] (=splendens)
alatus (Ikarotocepheus)
alatus (Neoliodes)
alatus (Peloribates) (=glaber)
alatus (Phyllozetes)
alatus (Tectocepheus)
alazon (Euphthiracarus)
albialatus [S. (Perscheloribates)]
albidus (Austrocarabodes)
albidus [I. (Haplozetes)]
albomaculata (Trichogalumna)
alborzi (Anomaloppia)
albulus (Totobates)
albulus [M. (Trimalaconothrus)] (=obsessus)
albulus (Tyrphonothrus)
alcecampestris (Tectoribates)
alces (Berlesezetes)
alces (Ramusella) (=clavipectinata)
aldretei (Phyllozetes)
aleinikovae [D. (Epidamaeus)]
alejnicovae [R. (Insculptoppia)]
alestensis (Licnobelba) (=latiflabellata)
alexanderkhaustovi (Allosuctobelba)
alexandrinae (Scheloribates)
alfonsii [R. (Insculptoppiella)]
algarvensis [T. (Latilamellobates)]
algarvensis [S. (Perscheloribates)]
algicola (Tripiloppia)
alidagiensis (Rhinoppia)
aliena (Suctobelba)
alienus (Damaeus) (=riparius)
alienus [H. (Notophthiracarus)] Niedb., 1989
alienus [H. (Notophthiracarus)] Niedb., 2017
aligarhiensis (Lauroppia) (=fallax)
alineata (Carinogalumna)
aliquantus [P. (Archipththiracarus)]
alisanicus (Topobates)
alisonae (Scapheremaeus)
alius (Hoplophorella)
alius (Liochthonius)
alius (Neoribates) (=pallidus)
alius [H. (Rhacaplacarus)]
aliverdievae (Hermanniella)
alleganiensis [B. (Caenobelba)]
allifera (Oribatula) tibialis (=caliptera)
allifera (Pilogalumna) (=crassiclava)
allmani (Scapheremaeus)
allocota (Oribotritia)
allocotos (Indotritia)
allocotos [P. (Neophthiracarus)]
allocotos [H. (Notophthiracarus)]
alloenasuta [S. (Flagrosuctobelba)]
alluaudi (Crotonia)
almagrensis [M. (Trimalaconothrus)]
almagulae (Cultroribula)
almeriensis (Flabellobelba)
almerodai (Dolicheremaeus)
alpestris [A. (Izuachipteria)]
alpestris (Liochthonius)
alpestris [P. (Montizetes)]
alpha (Allogalumna)
alpina (Anachipteria) (=shtanchaevae)
alpina (Crotonia)
alpina (Oribatula) (=amblyptera)
alpina (Suctobelbella)
alpina (Tripiloppia)
alpinus [M. (Calyptozetes)]
alpinus (Chamobates) (=birulai)
alpinus (Damaeus)
alpinus (Euphthiracarus) reticulatus
alpinus (Melanozetes) Halb., 15 *(=stagnatilis)*
alpinus (Melanozetes) Schweiz., 56 *(=mollicomus)*
alpinus [H. (Notophthiracarus)] (=sinuosus)
alpinus (Scutovertex)
alpinus (Trichoribates)
altaica [F. (Mexicoppia)]
altaica (Moritzoppia) myrmophila
altaica (Perlohmannia)
altaica (Rhynchobelba)
altaicus (Diapterobates)
altaicus (Ghilarovizetes)
altaicus [L. (Procorynetes)]
altaicus (Trhypochthonius)
altera (Paraceratoppia)
altera (Pergalumna)
alticola (Dolicheremaeus)
alticola [D. (Epidamaeus)]
alticola (Protozetes) digitifer
alticola [L. (Rhaphidosus)]
altimontana (Paraphauloppia)
altimontanoides (Jornadia)
altimontanus (Areozetes)
altimontanus (Diapterobates)
altimontanus [H. (Platynothrus)]
altimonticola (Liochthonius)
altimonticola (Podopterotegaeus)
altiplanicus (Licneremaeus)
altissima (Microtritia) (=hauseri)
altissimus (Diapterobates) variabilis
altissimus (Tyrphonothrus)
altitudinis (Litholestes)
altitudinis [S. (Tropacarus)] (=desmeti)
altus [M. (Calyptozetes)]
altus (Liochthonius)
alumbrensis (Passalozetes)
altvateri (Suctobelba)
alvaradoi (Topobates) (=holsaticus)
alvarezi (Intermedioppia)
alvarezi (Microtegeus)
alvarezius (Scapheremaeus)
alveolatus (Austrocarabodes)
alveolatus (Dolicheremaeus)
alveolatus (Scapheremaeus)
alviolai (Dolicheremaeus)
alvordensis (Eueremaeus)
alzanii (Tegoribates) (=latirostris)
alzueti (Graptoppia)
amabilis [F. (Psammocepheus)]
amamiensis (Dolicheremaeus) infrequens
amamiensis (Pergalumna)
amamiensis (Trichotocepheus)
amarpurensis (Zetorchella)
amatholensis (Pergalumna)
amazonensis [M. (Perutritia)]
amazonensis (Xenillus)
amazonica (Acroppia)
amazonica (Multipulchroppia)
amazonicus (Benoibates)
amazonicus (Dolicheremaeus)
amazonicus (Guaranozetes)
amazonicus (Rhynchoribates)
amazonicus (Spathulocepheus)
amazonicus (Xenillus)
ambigua (Dampfiella)
ambigua [H. (Rhacaplacarus)]
ambigua (Setogalumna)
ambiguus [Z. (Protozetomimus)]
ambitus (Lamellocepheus) (=personatus)
amblyptera (Oribatula) tibialis
ambohitra (Vilhenabates)
amboroensis [P. (Neophthiracarus)]
americana (Acrotritia) ardua
americana (Cheloppia)
americana (Crotonia) sp. inq.

americana (Epilohmannia) (=minuta)
americana (Furcoppia)
americana (Joelia) sp. inq.
americana (Lamellarea)
americanus (Fosseremus) sp. inq.
americanus (Kalyptrazetes)
americanus (Paraleius)
americanus (Peloptulus)
americanus (Peloribates) sp. inq.
americanus (Sellnickochthonius)
americanus (Tectocepheus)
americanus (Tegoribates)
americanus (Trhypochthonius) tectorum
amica (Autogneta)
amicabilis (Brachychthonius)
amicorum (Xenillus)
amictus (Camisia) sp. inq.
amicus [P. (Archiphthiracarus)] (=anonymus)
amicus (Camisia) biurus ssp. inq.
amieae (Afroleius)
ammonoosuci (Adoristes)
amnicus (Limnozetes)
amoena [H. (Rhacaplacarus)]
amonstruosus (Pseudotocepheus)
amorpha (Pergalumna)
amorphus (Africoribates)
amparoae (Ramonoppia)
ampla [A. (Acrogalumna)]
ampla (Oribotritia)
ampliata (Oribotritia)
amplus (Dynatozetes)
ampulla (Trachyoribates)
amudariensis (Hydrozetes)
amurica (Suctobelbella)
amus (Hoplophorella)
amygdaliformis (Epilohmannia)
anakolos [H. (Steganacarellus)]
anakolosus [X. (Stonyxenillus)]
ananthakrishni [R. (Insculptoppia)]
anareensis (Austroppia) (=crozetensis)
anareensis (Totobates)
anareolata (Lyroppia)
anasillus (Xenillus)
anauniensis (Nothrus)
anceps [H. (Notophthiracarus)]
anceps (Oribotritia)
anchiseta (Acrotritia) (=vestita)
ancorhina [S. (Flagrosuctobelba)]
andalusicabulensis (Paternoppia)
andamanensis [H. (Notophthiracarus)]
andasibe [C. (Klapperiches)]
andasibe (Pergalumna)
andasibensis [P. (Archiphthiracarus)]
andhraense (Pergalumna)
andicola (Edwardzetes)
andicola (Epieremulus) granulatus
andicola (Pergalumna)
andina (Borhidia)
andinus (Liochthonius)
andinus (Pedunculozetes)
andinus (Pirnodus)
andinus [L. (Procorynetes)]
andinus [H. (Protophthiracarus)]
andinus (Pseudotocepheus)
andrassyi [N. (Leptosuctobelba)]
andrei (Hoplophorella)
andrei (Licnoliodes)
andreii (Hypozetes)
andrewi (Liochthonius)
andrianovae [O. (Zygoribatula)]
andulau (Corynoppia)
andulauensis (Dolicheremaeus)
anellata (Pergalumna)
angarensis (Proteremaeus)
angelae (Aleurodamaeus)
angelus (Pterochthonius)
anglica (Achipteria) (=acuta)
angolensis (Basidoppia)
angolensis (Hoplophorella)
angolensis (Lamellobates) (=molecula)
angolensis [M. (Neobelba)] (?=glabriseta)
angolensis (Nothrus) sp. inq.
angolensis (Oripoda)
angolensis (Phthiracarus) (=lentulus)
angolensis (Tegeozetes) sp. inq.
anguina (Oripoda)
angularis (Galumna)
angulata (Camisia) (=amictus)
angulata (Cultroribula)
angulata (Jugatala)
angulata (Nanhermannia)
angulata [H. (Phyllhermannia)]
angulata (Suctobelbella)
angulata [O. (Zygoribatula)] (=glabra)
angulatus (Austrocarabodes) sp. inq.
angulatus (Chamobates) (?=confusus)
angulatus (Cosmopirnodus)
angulatus [D. (Epidamaeus)]
angulatus [S. (Grandjeanobates)] (=willmanni)
angulatus (Malaconothrus)
angulatus (Papillacarus)
angulatus (Peloribates)
angulatus (Protoribates)
angulatus (Punctoribates)
angulatus [A. (Rafacarus)]
angulatus (Scheloribates)
angulatus (Tectocepheus) (=sarekensis)
angulatus (Tyrphonothrus)
angulatus [M. (Trimalaconothrus)]
angulifer (Rostrozetes)
angulosa (Oribatella)
angusi (Scapheremaeus)
angusta (Dampfiella)
angusta (Oribotritia)
angusta [G. (Stenoppia)]
angustatus [L. (Dorycranosus)]
angustatus (Hoplophthiracarus)
angustatus (Trichoribates)
angustifrons (Galumnella) (=nipponica)
angustior (Protoribates) (=capucinus)
angustipes (Damaeus)
angustirostratus [D. (Epidamaeus)]
angustirostris (Scheloribates) laevigatus
angustirostrum (Tyrphonothrus)
angustissimus [T. (Latilamellobates)] (=latilamellatus)
angustolamellata (Oribatula)
angustopili (Setoppia)
angustus [H. (Besuchetacarus)]
angustus (Ceratozetes)
angustus (Fuscozetes)
angustus (Leptotocepheus)
angustus (Neseutegaeus)
angustus (Scheloribates)
anica (Pedrocortesella)
anichkini (Eremaeus)
anjavidilavai (Afticarabodes)
ankae (Pseudoamerioppia)
ankaraensis (Epimerella)
ankaratra (Galumna)
annamariae (Tereticepheus)
anneae (Bedoslohmannia)
annobonensis (Meristacarus) africanus
annobonica (Magyaria)
annulata (Fenestrobelba)
annulata (Granuloteratoppia)
annulata (Pergalumna)
annulus (Haplamerus)
anomala (Liebstadia) (=similis)
anomala (Oripoda)
anomala (Ramuselloppia)
anomaloides (Steganacarus) (=magnus)
anomalus (Peloribates) (= decumanus)

anomalus (Steganacarus) magnus
anomia (Camisia) (=horrida)
anomola (Oribatella)
anonymus [P. (Archiphthiracarus)]
anonymus (Sellnickochthonius)
anoporosus (Tecteremaeus)
anoporosus (Zachvatkinibates)
anosculpturata (Hoplophorella)
anouchkae (Cavaecarabodes)
ansata (Camisia) (=spinifer)
ansifera (Geminoppia)
antalata (Galumna) sp. inq.
antarcticus (Alaskozetes)
antarcticus (Haplochthonius)
antarcticus (Magellozetes)
antarcticus (Totobates)
antennata (Setoppia)
antennatus (Steganacarus)
antenniger (Neogalumna)
anteriorugosus (Scapheremaeus)
anteriosetosus (Plateremaeus)
anterostratus (Fijibates)
antetriheterodactyla (Acrotritia) (=ardua)
anthelionus (Sphodrocepheus)
antichthon [P. (Baloghates)]
antiguaensis (Benoibates)
antiguaensis (Galumna)
antillensis [A. (Acrogalumna)]
antillensis (Acroppia)
antillensis (Licneremaeus) (=discoidalis)
antillensis [O. (Oxyoppiella)]
antillensis (Protoribates)
antipai (Euphthiracarus)
antis (Eremulus)
antonii (Eulohmannia) sp. inq.
antonioberlesei (Galumna) sp. inq.
antrosus (Atropacarus)
antsiranana (Lemurobates)
anuakensis (Galumna)
anufrievi (Pilizetes)
anulatus (Leobodes)
anuncata [R. (Insculptoppia)]
anzacensis (Scheloribates)
aokii (Acrotritia) (=sinensis)
aokii (Annectacarus)
aokii (Apoplophora)
aokii (Autogneta)
aokii (Ceratozetella)
aokii [G. (Diplobodes)]
aokii (Dolicheremaeus)
aokii [D. (Epidamaeus)]
aokii (Eremaeozetes)
aokii (Fissicepheus)
aokii [S. (Flagrosuctobelba)]
aokii [L. (Incabates)]
aokii (Megalotocepheus)
aokii [H. (Notophthiracarus)]
aokii (Oribotritia)
aokii (Oxyamerus)
aokii (Pergalumna)
aokii [H. (Protophthiracarus)]
aokii (Pseudotocepheus)
aokii (Sellnickochthonius)
aokii (Symbioribates)
aokii (Trichoribates)
aokii (Tripiloppia)
aokii (Yoshiobodes) (=irmayi)
aokii (Zetorchestes)
aominensis (Gustavia)
aomoriensis (Suctobelbata)
aotearoana [I. (Zeaotritia)]
aoutii (Phyllochthonius)
apathyi (Chamobates) sp. inq.
apatomorpha (Ctenobelba)
apenninicus [T. (Latilamellobates)] (=incisellus)
aperta [S. (Dividoppia)]
aphelesa (Nododamaeus)
aphidinus (Parhypochthonius)
apicalis (Epieremulus) sp. inq.
apicalis (Eupelops)
apicalis (Oppiella) (=nova)
apiculata (Galumnella)
apiculatus (Phthiracarus) (=longulus)
apletosa (Lucoppia) (=burrowsi)
apoensis (Indoribates) (=punctulatus)
apophysiger (Heminothrus)
appalachia (Joelia)
appalachicola (Berlesezetes) ornatissimus
appalachicola (Rostrozetes) ovulum ssp. inq.
appalachicus (Damaeus)
appalachicus (Eremaeus)
appalachicus (Palaeacarus) (=hystricinus)
applicatus (Steganacarus)
appressala (Galumna)
approximata (Suctobelbila)
approximatus (Eupelops) (=plicatus)
approximatus (Liochthonius)
aprofundata (Jacotella) (?=glabra)
apuanicus (Carabodes)
apunctatus (Licnoliodes)
aquariorum (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
aquatica (Pseudantarcticola)
aquaticus (Heterozetes)
aquaticus (Mainothrus)
aquatilis (Tyrphonothrus)
aquilinus (Eurostocepheus)
aquilus [H. (Notophthiracarus)]
arabia (Oribatella) sp. inq.
arabica (Fortuynia)
arabica (Galumna)
arabica (Lasiobelba)
arabica (Pilogalumna)
arabicus (Eremulus)
aragonensis (Hispanozetes)
araios [H. (Notophthiracarus)]
araneola (Ctenacarus)
araucanus (Eremaeozetes)
araucariae (Oripoda)
araujoi (Neogalumna)
arborea (Arcoppia)
arborea (Pergalumna)
arborea (Trichogalumna)
arboreus (Afronothrus)
arboreus (Eremaeozetes)
arboreus (Humerobates) (?=rostrolamellatus)
arboreus (Scapheremaeus)
arboreus [A. (Uluguroides)]
arboricola (Brassiella)
arboricola (Oribatula)
arboricolus (Caleremaeus)
arboriseta [P. (Vepracarus)] (=hirsutus)
arcana (Suctobelbella)
arcanus (Scutoverticosus)
archicostulata [L. (Bicristoppia)]
arcidiaconoae (Lasiobelba)
arcta (Beckiella)
arctata (Acrotritia) (=ardua)
arctica (Ceratoppia) (=quadridentata)
arctica (Cultroribula)
arctica (Oribatella)
arctica [A. (Parabelbella)]
arctica (Pyroppia)
arcticola [D. (Epidamaeus)]
arcticus [L. (Dorycranosus)] Banks, 1898 *sp. inq.*
arcticus [L. (Dorycranosus)] Gri., 1984 *(=neonominatus)*
arcticus [P. (Montizetes)]
arcticus (Sellnickochthonius) (=immaculatus)
arcticus (Sphaerozetes)
arctosus (Cosmochthonius) (=lanatus)
arcualis (Arcoppia)
arcualis (Conozetes)
arcualis (Ethiovertex)

arcuata (Anomaloppia)
arcuata (Banksinoma)
arcuata (Camisia)
arcuata [S. (Flagrosuctobelba)]
arcuata (Microppia)
arcuata (Ramusella)
arcuata (Suctobelbata)
arcuata [O. (Zygoribatula)]
arcuatissima [O. (Zygoribatula)]
arcuatus (Scapheremaeus)
arcuatus (Yambaramerus)
arcuatus (Yoshiobodes)
ardala (Crotonia)
ardua (Acrotritia)
ardua (Lamellarea)
ardua [T. (Teratoppiella)]
arduinii (Carabodes)
arduus [L. (Dorycranosus)]
arenaria (Graptoppia)
arenarius (Berlesezetes)
arenocolus (Scutovertex)
areolata [G. (Angulogalumna)] (=staryi)
areolata (Epilohmannia) minuta
areolata (Galumnella)
areolata (Nanhermannia) (=elegantula)
areolata [H. Phyllhermannia)]
areolata (Pilogalumna) (=tenuiclava)
areolatus (Carabodes)
areolatus (Eueremaeus)
areolatus (Papillocepheus)
areolatus (Reticulocepheus)
areolatus (Rostrozetes) (=ovulum)
areolatus [H. (Tuberemaeus)]
areticulatus [F. (Cosmogalumna)]
argentinensis (Cultroribula)
argentinensis (Eobrachychthonius) (=oudemansi)
argentinensis (Lamellobates)
argentinensis (Membranoppia)
argentinensis (Scapheremaeus)
argentinensis (Tenuelamellarea)
argentinensis (Xenillus)
argentinensis (Zetomimus) (=furcatus)
aridulus (Eueremaeus)
aridus (Ametroproctus)
arifi (Paralopheremaeus) hispanicus
arilloi (Angullozetes)
arilloi (Euphthiracarus)
arilloi [S. (Flagrosuctobelba)] diversosetosa
arilloi (Rhinoppia)
arilloi (Xenillus)
aristosa (Hermanniella)
armadillo (Prototritia)
armata (Achipteria)
armata [A. (Dyobelba)]
armata [N. (Leptosuctobelba)]
armatifera (Galumna)
armata (Hoplophorella)
armatus [A. (Austroflexa)]
armatus (Ceratozetes)
armatus (Cuspidozetes)
armatus (Edwardzetes)
armatus (Eupterotegaeus)
armatus (Suctobelbiloides)
armatus (Tectodamaeus)
armatus (Vermacarus)
armazi (Scutovertex)
armenicus (Ghilarovus)
armipes [P. (Minguezetes)] (=palustris)
arnoldii (Diapterobates)
arnoldii (Thamnacarus) sp. inq.
arotroventer (Selenoribates)
arrecta (Hermanniella) (=picea)
arrogans (Austrocarabodes)
arrugata (Galumna)
articristata (Lauroppia)
artifex (Scheloribates) (?=fimbriatus)
artigasi (Scheloribates)
artilamellatus (Podoribates)
artiodactylus (Atopochthonius)
artus (Holonothrus)
artvinensis (Rhinoppia)
arvernensis (Damaeus)
asagiriensis (Eremobelba)
ascendens (Scheloribates)
ascissuratus (Scapheremaeus)
asculpturatus (Mochlozetes)
asejugalis (Peloribates)
asensillata [M. (Perutritia)]
aseta (Pletzenoppia)
asetosa (Allogalumna)
asetosa (Cycloppia)
asetosa (Pergalumna)
asetosa (Pseucoceratoppia)
asetosus [L. (Nacunansella)]
ashizuriensis (Malaconothrus)
ashoroensis (Nothrus)
ashoroensis (Trhypochthoniellus)
asiatica [G. (Angulogalumna)]
asiatica (Collohmannia)
asiatica (Crytoplophora) (=abscondita)
asiatica (Neoamerioppia)
asiatica (Oribatella)
asiatica (Oribotritia)
asiatica (Paraceratoppia)
asiatica [D. (Rykella)]
asiatica (Striatoppia)
asiaticus (Cosmochthonius)
asiaticus [T. (Cristonothrus)]
asiaticus (Eohypochthonius)
asiaticus (Microtegeus)
asiaticus (Microzetes)
asiaticus (Neogymnobates) luteus
asiaticus (Nothrus)
asiaticus (Parhypochthonius)
asiaticus (Peloribates) rangiroaensis
asiaticus (Plakoribates)
asiaticus (Plasmobates)
asiaticus (Truncopes) optatus
asiaticus [H. (Tuberemaeus)]
asiaticus (Unguizetes)
asinus [K. (Niosuctobelba)]
askewi (Terratritia)
asmodaeus (Selenoribates)
asotthalomensis (Liochthonius) (=evansi)
asper (Liochthonius)
asper [B. (Passalobates)]
aspera (Indotritia) (=undulata)
asperatus (Damaeolus)
aspergillus [A. (Rafacarus)]
asperula (Phauloppia) (=lucorum)
asperula (Zetorchella) sp. inq.
asperulus (Gymnodamaeus) (=bicostatus)
aspidioti (Scapheremaeus) (=ovivorus)
assamensis (Cosmochthonius)
assamensis [T. (Cristonothrus)]
assamica (Malacoangelia)
assimilis [P. (Archiphthiracarus)] (=montanus)
assimilis (Ramusella) (=clavipectinata)
assimiloides (Ramusella)
astatus (Papillochthonius)
astrachanicus [P. (Semipunctoribates)]
asymmetrica (Aeroppia)
asymmetricus (Microzetes)
asymmetricus (Pseudotocepheus)
atahualpensis (Scheloribates)
atavisticus (Comorozetes)
ater [H. (Notophthiracarus)]
aterrimus (Euzetes) (?=globulus)
athesis (Xenillus)
atimonensis (Basilobelba)
atlantica (Fortuynia)
atlantica [L. (Incabates)]

atlantica (Magyaria)
atlantica (Metrioppia) sp. inq.
atlanticus [P. (Archiphthiracarus)]
atlanticus (Damaeus) (=australis)
atlanticus (Scheloribates) praeincisus
atmetos (Limnozetes)
atolanaro (Pseudotocepheus)
atomaria (Galumna)
atomaria (Suctobelba)
atomus (Minunthozetes) (?=tarmani)
atra (Pilogalumna) (=tenuiclava)
atractos (Mesotritia)
atraktus (Liacarus)
atratus [H. (Steganacarellus)]
atrichosus [C. (Klapperiches)]
attenuata (Oribotritia)
attenuata (Oripoda)
attenuatus (Dolicheremaeus)
attenuatus (Liochthonius)
atuelanus [T. (Cristonothrus)]
atypica (Hoplophorella) (=inelegans)
atypica (Ramuloppia) ramiseta
atypica (Trichogalumna)
atypicus [S. (Guatemalozetes)]
atypicus (Huilicheremaeus)
atypicus (Mochlozetes)
auberti (Podacarus)
auburnensis (Tyrphonothrus)
augusta (Pedrocortesella)
aulicis [H. (Notophthiracarus)]
aurantiacus (Neoribates)
aurata (Belba)
auratus (Saxicolestes)
aureonotata [G. (Tauroplophora)]
aureopunctatus (Malaconothrus)
aureus (Campbellobates)
aureus [P. (Neophthiracarus)]
auriculata (Oripoda)
auriculatus (Antarctozetes)
auriculatus (Carabodes)
auriculus (Trichocepheus)
aurita (Hafenrefferia) (=gilvipes)
auritus (Damaeus)
auritus [M. (Dicondyla)]
auritus (Eupelops) (=plicatus)
australianicus [H. (Austrophthiracarus)]
australica (Epilohmannia) minuta ssp. inq.
australicus (Cosmochthonius)
australiensis (Anderemaeus)
australis (Africoribates)
australis (Aleurodamaeus)
australis (Anachipteria) (=signata)
australis [P. (Archiphthiracarus)]
australis (Austrocarabodes)
australis (Baloghacarus)
australis (Camisia)
australis [L. (Convergoppia)]
australis (Damaeus)
australis (Edwardzetes)
australis (Eremulus)
australis (Galumna)
australis (Gymnodampia)
australis (Liochthonius)
australis [L. (Longocepheus)]
australis (Mesotritia)
australis (Multioppia)
australis (Nesiacarus)
australis [H. (Notophthiracarus)]
australis (Oripoda) Berl., 16
australis (Oripoda) B. *et* M., 68 *(=cordobensis)*
australis (Paraphauloppia)
australis (Pergalumna)
australis (Pheroliodes)
australis (Pilizetes)
australis (Pseudotocepheus)
australis (Similochthonius)
australis (Solenozetes)
australis (Tyrphonothrus)
australoides (Anachipteria) achipteroides ssp. inq.
austriaca (Jacotella)
austriaca (Liebstadia) (=pannonica)
austroafricanus [H. (Notophthiracarus)]
austroafricanus (Trichonothrus)
austroamericana (Monofurcoppia)
austroamericanus [M. (Calyptozetes)]
austroamericanus (Gibbicepheus)
austroamericanus (Trichoribates)
auxiliaris (Berlesezetes) (=ornatissimus)
avachai (Melanozetes)
aveiroensis (Punctoribates)
avenifer (Eremulus)
aveniferus (Zetomimus) (?=furcartus)
avicula (Oribatella)
aviger (Hypozetes)
aysenensis (Eutegaeus)
aysineep (Eueremaeus)
ayyildizi (Ctenobelba)
azaisi (Rhynchoppia)
azaleos [M. (Calyptozetes)]
azarbaijaniensis (Arborichthonius)
azerbeidjanica (Berniniella) (?=silvatica)
azerbeidjanica (Oribatula) (=tibialis)
azizia (Oribatella) sp. inq.
azoreana (Galumna)
azorensis (Nothrus) palustris
azorensis (Steganacarus) hirsutus
azorensis (Xenillus) discrepans
azoricus (Carabodes)
azoricus (Melanozetes)
azoricus (Pilocepheus)
azovicus (Scheloribates)
azumaensis (Scheloribates)
azumaensis [M. (Trimalaconothrus)]
azumai (Dimidiogalumna)
babalus (Basiceramerus)
babeldaobensis (Anomaloppia)
baburini (Oppiella)
baccanensis (Gibbicepheus)
baccettii (Licnodamaeus)
bacilla (Mesoplophora)
bacillatus [P. (Metaphthiracarus)] (=setosus)
bacillatus [L. (Rhaphidosus)]
bacillifera (Schalleria)
bacilliformis [H. (Calyptophthiracarus)]
bacilliger (Austrocarabodes)
bacilliger (Pseudotocepheus)
bacilligera (Aethioppia)
bacilligera (Arcoppia)
bacilliseta [M. (Hammeroppia)]
bacilliseta (Nothrus)
bacillum [D. (Epidamaeus)] (=fujikawae)
bacillum [D. (Spatiodamaeus)]
backstroemi (Neoliodes)
bacula (Acrotritia) (=gracile)
bacula [M. (Parplophora)]
baculifera [N. (Leptosuctobelba)]
baculus (Hoplophthiracarus)
baculus [H. (Notophthiracarus)]
badamdorji [P. (Porallozetes)]
badensis [N. (Ameriglobopppia)]
badensis (Liebstadia) (=longior)
baderi [B. (Gressittoppia)]
baderi (Suctobelbila)
baderi (Xenillus) (=discrepans)
badghysi [L. (Rhaphidosus)]
badia (Ceratoppia) (=bipilis)
badius (Mainothrus)
badius (Scheloribates) (=ewingi)
badzhalensis (Eueremaeus)
baetica (Lauroppia)
baggioi [H. (Mantigueracarus)]
baggioi (Xenillus)

bagnalli (Oribotritia) sp. inq.
bagnalli (Rhinoppia) sp. inq.
baguioensis (Dolicheremaeus)
bah [H. (Notophthiracarus)]
bahamensis [D. (Epidamaeus)]
bahamensis (Mochloribatula)
baicalica (Zachvatkinella)
baichengensis (Ramusella)
baikalica (Oribotritia)
bajartogtokhi (Hypovertex)
bajau [O. (Acrotocepheus)]
bakeri [D. (Epidamaeus)]
bako (Pasocepheus)
balakrishnani [G. (Indogalumna)]
balazsi (Eremobelba)
balazsi [H. (Kakophthiracarus)]
balazsi (Scapheremaeus)
balboa (Thalassozetes)
balcanicus [S. (Tropacarus)]
balearica (Pseudoamerioppia)
balearicus [S. (Tropacarus)]
baleensis (Achipteria)
baleensis (Ceratozetes)
baleensis (Galumnella)
baliensis (Eremulus)
baliensis [O. (Oxyoppiella)]
baliensis [S. (Ussuribata)]
balikous (Dolicheremaeus)
baloghi [P. (Archiphthiracarus)] F. *et* S., 57
baloghi [P. (Archiphthiracarus)] Mah., 82 *(=bulbiferus)*
baloghi (Arcoppia) (=robustia)
baloghi (Arthrovertex)
baloghi [H. (Austrophthiracarus)]
baloghi (Berlesezetes)
baloghi (Ceratorchestes)
baloghi [E. (Cerostocepheus)]
baloghi (Dolicheremaesu)
baloghi [S. (Flagrosuctobelba)]
baloghi (Galumna)
baloghi (Hoplophorella) Nied., 04
baloghi (Hoplophorella) Nied., 04 (*Not.*) *(=janosbaloghi)*
baloghi (Hungarobelba)
baloghi [H. (Kakophthiracarus)] (=clavatosensillus)
baloghi [T. (Latilamellobates)] (=incisellus)
baloghi (Mabulatrichus)
baloghi (Machadobelba)
baloghi (Microzetes)
baloghi (Niphocepheus) nivalis
baloghi (Nodocepheus)
baloghi (Nothrolohmannia)
baloghi (Paratritia)
baloghi (Pelopsis)
baloghi (Polyoppia)
baloghi [H. (Protophthiracarus)] (=paraandinus)
baloghi (Protoribates) sp. inq.
baloghi (Rostrozetes)
baloghi (Scheloribates) P. - Í., 82 *(=caprai)*
baloghi (Scheloribates) C. *et* V., 83 *(=neonominatus)*
baloghi (Striatoppia)
baloghi [T. (Teratoppiella)] (=pluripectinata)
baloghi [P. (Tripilobatella)]
baloghi [O. (Zygoribatula)]
baloghius (Scapheremaeus)
baloghorum (Cyrthermannia)
baloghorum [P. (Archiphthiracarus)] (=bulbiferus)
baltazarae (Basilobelba)
baluktotus [S. (Perscheloribates)]
banahawensis [O. (Acrotocepheus)]
bandabanda [H. (Phyllhermannia)]
bandae (Odontocepheus)
bangladeshensis (Basiceramerus)
banksi [P. (Archiphthiracarus)]
banksi [L. (Dorycranosus)]
banksi (Galumna) Jac., 29
banksi (Galumna) Jac., 29 (*Zet.*) *(=iterata)*
banksi [L. (Lancelalmoppia)]
banksi (Lohmannia)
banksi (Lucoppia) (=burrowsi)
banksi (Oribatella)
banksi (Oribotritia)
banksi (Peloribates) (=peloptoides)
banksi [H. (Platynothrus)]
bannisteri (Pedrocortesella)
baobab [H. (Senilochthonius)]
baranae [O. (Dzarogneta)]
barbara (Thalassozetes)
barbarae (Adhaesozetes)
barbarae (Tegeocranellus)
barbarossa, Gymnodamaeus
barbata (Basilobelba)
barbata (Beklemishevia)
barbata (Hermanniella) (=septentrionalis)
barbata (Heterobelba)
barbata (Machadobelba)
barbata (Oribatella)
barbata (Oxybrachioppia)
barbata (Tokukobelba)
barbata (Xiphobelba)
barbatis (Multioppia) (?=wilsoni)
barbatula (Dolicheremaeus) vilhenarum
barbatula (Epilohmannia) sp. inq.
barbatulus [D. (Epidamaeus)]
barbatulus (Scheloribates) Mih., 56
barbatulus (Scheloribates) Mih., 57 *(=barbatulus* Mih., 56*)*
barbatus (Neoribates)
barbatus (Nodocepheus) dentatus
barbatus (Peloribates)
barbatus (Perxylobates)
barbatus (Protodamaeus)
barbatus (Scheloribates)
barbatus (Tyrphonothrus)
barborae (Steganacarus) (=spinosus)
barbulata [S. (Paralalmoppia)]
barguzini [C. (Triachipteria)]
barlowi (Paulianacarus)
barnardi (Galumna)
barrancensis (Pseudoamerioppia)
barrancensis (Tyrphonothrus)
barringtonensis (Novonothrus)
barringtonensis (Pheroliodes)
bartkei (Dolicheremaeus)
bartlae [A. (Multieremella)]
bartosi (Belba) (=patelloides)
baseyensis (Dolicheremaeus)
basidii (Basidoppia)
basilewskyi (Carabodes) sp. inq.
basilewskyi (Galumna)
basilewskyi (Nothrus) sp. inq.
basilewskyi (Pilizetes)
basilewskyi (Zetorchella)
batarazaensis (Dolicheremaeus)
bataviensis (Neoliodes)
bathamae (Halozetes)
baudi (Charassobates)
bavaricus (Lepidozetes)
baviensis (Nothrus)
bawanglingensis (Tectodamaeus)
bayanicus (Protoribates)
bayartogtokhi [I. (Bihaplozetes)]
bayartogtokhi [D. (Epidamaeus)]
bayartogtokhi (Pantelozetes)
bayartogtokhi [H. (Parawoasella)]
baylyi (Scapheremaeus)
bayoumii (Lasiobelba) (=arcidiaconoae)
bayoumii (Neoppia)
beccus (Oribatula) (=caliptera)
becki (Acaroceras)
becki (Eohypochthonius)
becki [L. (Lancelalmoppia)]
becki (Nothrus)
becki [H. (Phyllhermannia)]
beecroftensis[T. (Cristonothrus)]

beemanensis (Belloppia)
behanae [Z. (Alpizetes)]
behanae (Ceratozetella)
behanae [B. (Lanibelba)]
behanae [Z. (Protozetomimus)]
behanae (Taeniogalumna)
behanpelletierae (Hydrozetes)
beijingensis (Odontocepheus)
belbiformes (Zachvatkinella)
belgicae (Dissorhina)
belgicae (Halozetes)
bella (Belloppia)
bella (Eremobelba)
bella [S. (Flagrosuctobelba)] (?=nasalis)
bella [C. (Triachipteria)]
bellesii (Pergalumna)
bellicosa (Eremobelba)
bellicosus (Austrocarabodes)
bellingeri (Indotritia)
bellissimus [H. (Tuberemaeus)]
bellula [Q. (Coronoquadroppia)] (=galaica)
bellus (Carabodes)
bellus (Pseudotectoribates) (=subsimilis)
beloniensis [O. (Zygoribatula)]
benacensis (Eohypochthonius)
benegasi (Oripoda)
benenensis (Papillacarus)
bengalensis [M. (Archegotocepheus)]
bengalensis (Cosmochthonius)
bengalensis (Dolicheremaeus)
bengalensis (Haplacarus) foliatus
bengalensis (Hoplophthiracarus)
bengalensis [L. (Paralamellobates)]
bengalensis (Sphaerochthonius)
benguetana [H. (Phyllhermannia)]
benguetensis [S. (Perscheloribates)]
benoiti (Drymobatoides)
benoiti (Hoplophorella) (=stilifera)
benoiti (Metabelba) sp. inq.
benoiti (Phthiracarus) sp. inq.
bentonensis (Achipteria)
bentoni [H. (Notophthiracarus)]
benyovszkyi (Leptoppia)
bercziki [N. (Leptosuctobelba)]
beresi [N. (Confinoppia)]
beringiana (Suctobelba)
beringianus [M. (Calyptozetes)]
beringianus [A. (Coropoculia)]
berlesei (Arthrhoplophora) (=vulpes)
berlesei (Brachychthonius)
berlesei (Camisia) (=biverrucata)
berlesei (Dolicheremaeus) (=damoeoides)
berlesei [D. (Epidamaeus)]
berlesei (Eremulus)
berlesei (Eupelops) sp. inq.
berlesei (Galumna)
berlesei (Hoplophthiracarus)
berlesei [L. (Lancelalmoppia)]
berlesei (Nothrus)
berlesei (Oribatella)
berlesei (Oribotritia)
berlesei (Pantelozetes)
berlesei (Phauloppia) (=lucorum)
berlesei [H. (Phyllhermannia)]
berlesei (Pilobatella)
berlesei (Plateremaeus)
berlesei (Steganacarus) (=applicatus)
berlesei (Trichoribates)
bermudensis (Carinozetes)
berndhauseri [O. (Acrotocepheus)]
berndhauseri [P. (Lignobates)] (=mahunkasandori)
berndhauseri (Multipulchroppia)
berndhauseri [B. (Passalobates)]
berndhauseri (Protoribates)
berndhauseri (Topobates)
berndi (Didierotocepheus)
berninii [N. (Ancestroppia)]
berninii (Berniniella)
berninii (Carabodes)
berninii (Eohypochthonius)
berninii (Hoplophorella)
berninii [R. (Insculptoppia)]
berninii (Oribatella)
berolina (Cultroribula)
bertheti (Lanceoppia)
berzosai (Rhinoppia)
beskidyensis (Lauroppia)
besucheti [O. (Acrotocepheus)]
besucheti [S. (Flagrosuctobelba)] (=moritzi)
besucheti (Oppiella)
besuchetianus (Phthiracarus) (=laevigatus)
betschi (Rogerzetes)
betzaida (Galumna)
bhadurii (Haplacarus)
bhadurii (Scheloribates)
bhaskari (Pergalumna)
bhutanensis (Cosmochthonius)
bhutanensis (Scheloribates)
bhutanicus (Euphthiracarus)
biangulata (Suctobelbella)
biangulatus [H. (Capillonothrus)]
biarcualis (Scheloribates)
biarcuata [S. (Flagrosuctobelba)]
biarea (Trichoribates)
bicarinata (Achipteria)
bicarinata (Berniniella)
bicarinata (Camisia) (=segnis)
bicarinata (Ctenobelba) (=pectinigera)
bicarinata (Mesotritia)
bicarinata (Microtritia)
bicarinata (Oribotritia) (=africana)
bicarinatus [P. (Archiphthiracarus)]
bicarinatus [H. (Besuchetacarus)]
bicarinatus (Hispanozetes)
bicarinatus (Hoplophthiracarus)
bicarinatus (Indoribates)
bicarinatus [P. (Metaphthiracarus)]
bicarinatus [H. (Capillonothrus)] sp. inq.
bicarinatus [E. (Pocsia)]
bicarinatus [S. (Tropacarus)]
bicaudata (Grandjeania)
bicentenaria (Joshuella)
bichei (Atropacarus)
biciliata (Multioppia)
biciliatus (Nothrus) (?=anauniensis)
bicillata [R. (Insculptoppiella)]
biclavatus [B. (Lanibelba)]
biclavulus (Hemileius)
bicolor (Carabodes) sp. inq.
bicolor (Nothrus) (=palustris)
bicolor (Reductobates)
biconcavus [Y. (Dongnaibodes)]
bicornicula (Bicyrthermannia)
bicorniculatus (Hispanozetes)
bicornis (Astegistes) (=pilosus)
bicornis [M. (Calyptozetes)]
bicornis (Gustavia) (=fusifer)
bicornis (Minunthozetes) (=semirufus)
bicornis (Scheloribates)
bicornis (Zetomimus)
bicornuta (Bicyrthermannia)
bicornutus (Scapheremaeus)
bicostata [C. (Berndamerus)]
bicostatus (Gymnodamaeus)
bicristata [L. (Bicristoppia)]
bicristata (Pergalumna)
bicristatus (Arthrodamaeus)
bicristatus [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
bicultrata (Cultroribula)
bicuspidata (Allosuctobelba)
bicuspidata (Cultroribula)
bicuspidata (Furcoribula) (=furcillata)

bicuspidata [G. (Monophauloppia)]
bicuspidata (Oromurcia)
bicuspidatus (Antarctozetes)
bicuspidatus (Arcozetes)
bicuspidatus (Scheloribates)
bidactyla (Austrachipteria)
bidactylus (Bipassalozetes)
bidactylus [S. (Bischeloribates)]
bidactylus (Ethiovertex) (=mahunkai)
bidactylus (Trixylobates)
bidens [C. (Flexa)]
bidens (Pergalumna) (=emarginata)
bidens (Scotiazetes)
bidentata (Allosuctobelba)
bidentata (Arcoppia)
bidentata (Austrachipteria)
bidentatirostris (Galumna)
bidentatus (Fuscozetes)
bidentatus (Liacarus)
bidentatus (Orthozetes)
bidentatus (Pelopsis)
bidentatus (Zetomotrichus)
bidupensis (Epieremulus)
bifida [D. (Cylindroppia)] (=casuarina)
bifidatus (Tritegeus) (?=bisulcatus)
bifidus (Dolicheremaeus)
bifilis (Arcoppia) sp. inq.
bifissurata (Pergalumna)
biflagellata (Arcoppia)
biflagellata (Sphagnoppia)
bifoliata (Lohmannia)
bifoveolata (Coartobelba)
bifurca (Austrotritia)
bifurcata (Acrotritia) (=vestita)
bifurcata (Banksinoma) lanceolata
bifurcata (Brachioppiella)
bifurcata (Cyrthermannia)
bifurcata (Eulohmannia) ribagai
bifurcata (Indotritia)
bifurcata (Machadobelba)
bifurcata (Mahunkana)
bifurcata (Nanhermannia)
bifurcatus (Furcodamaeus)
bifurcatus (Hermannobates)
bifurcatus (Kalyptrazetes)
bifurcatus (Liochthonius) sp. inq.
bifurcatus (Pelopsis)
bifurcatus (Reteremuloides)
bifurcatus (Tumerozetes)
biheterodactyla [L. (Bilauritzenia)]
bilamellata (Furcoribula)
bilaminae (Oribotritia)
bilineata (Machuella) ventrisetosa
bilineata (Muliercula)
bilineatus (Ameronothrus)
bilineatus (Scheloribates) sp. inq.
bilobatus (Lobozetes)
bilobus (Eupelops) (=sulcatus)
bilongisetosus (Nothrus)
bilunatifer (Eremaeozetes)
bimaculata (Pergalumna)
bimaculata [H. (Phyllhermannia)]
bimaculatus (Brachychthonius)
bimaculatus (Diapterobates) (=notatus)
bimorpha (Galumna)
binadalares (Pilogalumna)
binodosa [L. (Bicristoppia)]
binodosa (Borenbuschia)
binodulus (Tyrphonothrus)
biobioensis (Crassoribatula)
biovatus (Eutegaeus)
bipartita [A. (Acrogalumna)]
bipartita (Acrotritia)
bipartita (Oribotritia)
bipectinata [R. (Paramedioppia)]
bipilis (Ceratoppia)
bipilis (Nothrus) palustris ssp. inq.
bipilis [P. (Triaunguis)] Ham., 72
bipilis [P. (Triaunguis)] P.-I. *et* B., 80 *(=praeoccupatus)*
biporosa (Globogalumna)
biporosus (Ceratozetes)
biputeus [H. (Besuchetacarus)]
biramula (Mesotritia)
biroi (Birotegaeus)
biroi (Fenichelia)
biroi (Meristacarus)
birulai (Chamobates)
bisculpturatus (Rhopalozetes)
bisculpturatus (Scapheremaeus)
bisculpturatus [P. (Triaunguis)]
bisculpturatus [E. (Trischeloribates)]
biseriata (Brachioppiella)
bisetus (Podopterotegaeus)
bisignata [O. (Zygoribatula)] (?=excavata)
bisignatus (Tectocepheus) (=minor)
bispina (Cubachipteria)
bispinatus (Arthrovertex)
bispinosa (Camisia) (=biurus)
bispinosus [C. (Xiphobates)]
bistilus (Nothrus) silvestris
bistriatus [H. (Capillonothrus)]
bistriatus [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
bisulcata (Eremobelba) sp. inq.
bisulcatus (Stictozetes)
bisulcatus (Tritegeus)
bisulcus (Hoplophthiracarus)
bithongabela (Pedrocortesella)
bituberculata (Mahunkaia)
bituberculata (Neosuctobelba)
bituberculata [O. (Oxyoppiella)]
bituberculatus (Austrocarabodes)
bituberculatus [D. (Epidamaeus)]
bituberculatus (Scapheremaeus)
biundata (Exoribatula)
biunguiculata (Eulohmannia) (=ribagai)
biunguis [S. (Bischeloribates)]
biurus (Camisia)
bivaginata (Bursoplophora)
biverrucata (Camisia)
bivittata [S. (Ussuribata)]
bizygata [O. (Zygoribatula)]
blacki (Crotonia)
blancharti (Austrocarabodes)
blancus (Tyrphonothrus)
blascoi (Vaghia)
blaszaki (Crotonia)
blattarum [R. (Sabahoppia)]
blocki (Laminoppia)
blocki (Oribatella)
bloemfonteinensis [P. (Ausoribula)]
bloemfonteinensis (Pilogalumna)
bloszyki (Beckiella)
bloszyki [H. (Notophthiracarus)]
blythedalensis [P. (Archiphthiracarus)]
bochkovi [A. (Acrogalumna)]
bochkovi [R. (Dosangoppia)]
bochkovi (Meristacarus)
boedvarssoni (Ocesobates)
boevi (Pilogalumna) (=tenuiclava)
bogduulensis (Diapterobates)
bogorensis (Meristacarus)
bogorensis (Tecteremaeus)
bolei (Dissorhina) (=ornata)
boletorum (Phauloppia)
boletorum (Trichoribates) (?=berlesei)
bolivari (Mesoplophora)
boliviana (Pergalumna)
boliviana (Sternoppia)
bolivianus (Benoibates)
bolivianus (Dolicheremaeus)
bolivianus (Tegeocranellus)
bolivianus (Xenillus)

bombretensis (Nannerlia)
bombuscaroensis (Euphthiracarus)
bomeensis [D. (Spatiodamaeus)]
bonairensis (Litoribates)
bonairensis (Protoribates) capucinus ssp. inq.
bonairensis [O. (Zygoribatula)]
bonangensis [H. (Notophthiracarus)]
bonifacioi (Kalayaan)
boninensis (Austrocarabodes)
boninensis [S. (Lalmoppia)]
boninensis (Scapheremaeus)
boninensis (Trichogalumna)
boothianus (Zetomimus)
boraboraensis (Transoribates)
boraha (Brachioppiella)
borbolai (Dolicheremaeus)
borbora (Crotonia)
borealis (Achipteria) Banks, 1898 *sp. inq.*
borealis (Achipteria) Ewing, 1918 *(=bentonensis)*
borealis [P. (Archiphthiracarus)]
borealis (Banksinoma)
borealis (Camisia)
borealis (Ceratozetes)
borealis (Chamobates) (=pusillus)
borealis (Eobrachychthonius)
borealis (Eremaeus) Strenz., 52 *(=translamellatus)*
borealis (Eremaeus) Wen, 88 *(=neonominatus)*
borealis (Hypochthoniella) (=crosbyi)
borealis (Hypovertex)
borealis (Liacarus)
borealis (Limnozetes)
borealis (Neoribates)
borealis (Phthiracarus)] (=longulus)
borealis (Sellnickochthonius)
borealis (Tectoribates)
boreomontanus (Eremaeus)
boresetosus (Phthiracarus)
boreus [D. (Spatiodamaeus)]
borgesi (Peloptulus)
borhidii (Allogalumna)
borhidii (Beckiella)
borhidii (Benoibates)
borhidii [B. (Canaloppia)]
borhidii (Eurhynchoribates)
borhidii [C. (Klapperiches)]
borhidii (Microtegeus)
borneensis (Anakingia)
bornemisszai (Acutozetes)
bornemisszai (Setoppia)
bornemisszai [T. (Viracochiella)]
boronganensis (Drymobatoides)
borussicus (Nothrus)
borussicus (Ophidiotrichus) (=tectus)
boschmai (Synchthonius) (=crenulatus)
bosniae (Tegeocranellus) sp. inq.
bostocki (Eutegaeus)
botari (Lamellobates)
bothulifer (Rostrozetes)
botschi (Trichoribates) sp. inq.
botulus (Kaszabozetes)
boulfekhari [S. (Tropacarus)]
bouvetoyaensis (Alaskozetes)
brachiatus (Cepheus)
brachistos [H. (Notophthiracarus)]
brachyodon (Suctobelbella) (=duplex)
brachypterus (Scheloribates)
brachyramosa (Arcoppia)
brachyrostrum (Crotonia) (=cophinaria)
brachys (Hoplophorella)
brachys [H. (Steganacarellus)]
brachysetosa (Mesoplophora)
brachythrix (Mesotritia) (=nuda)
brachytrichina (Oppia) nitens ssp. inq.
bradleyi (Galumna) sp. inq.
brasilensis (Cultroribula)
brasilensis (Nothrus)
brasilensis (Trhypochthoniellus) longisetus
brasiliana (Acrotritia)
brasiliana (Acrotritia)
brasiliana (Dometorina) plantivaga
brasiliana (Mesoplophora) sp. inq.
brasilianus (Dolicheremaeus)
brasilianus (Xenillus)
brasiliensis (Acaroceras)
brasiliensis (Allonothrus)
brasiliensis [A. (Austroflexa)]
brasiliensis (Eremulus)
brasiliensis (Euphthiracarus)
brasiliensis (Galumna)
brasiliensis (Hoplophorella)
brasiliensis [H. (Mantigueracarus)]
brasiliensis (Mesotritia)
brasiliensis (Oripoda)
brasiliensis [R. (Rhynchoribatodes)]
brasiliensis (Sternoppia)
brasiliensis (Teratoppia)
brasiliensis (Unguizetes) (=setiger)
brasilocompressus (Scheloribates)
brasilosphericus (Scheloribates)
brassi (Brassoppia)
brassi (Reductobates)
brassicae (Crotonia)
brauni [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)
brazilianus (Rhopalozetes)
brazilianus (Stelechobates)
braziliensis (Epieremulus)
braziliensis (Licneremaeus)
braziliensis (Mucronothrus)
brazilozetoides (Berlesezetes)
bregetovae (Ceratozetella)
bregetovae (Damaeolus)
bregetovae (Ocesobates) (=boedvarssoni)
brevialatus [S. (Perscheloribates)]
brevicarinata [M. (Parplophora)]
brevicarinatus (Phthiracarus)
breviclava [C. (Flexa)]
breviclava (Mainothrus)
breviclava (Membranoppia)
breviclava (Striatoppia)
breviclava (Tegeozetes) tunicatus
breviclavata [F. (Mexicoppia)]
breviclavatus [L. (Procorynetes)]
brevicornuta (Crotonia)
brevicornuta (Oribatella)
brevicostulata [N. (Confinoppia)]
breviculus (Euphthiracarus)
brevicuspidata (Oribatella)
brevicuspidatus (Punctoribates)
brevicuspidis [O. (Monoribatella)]
brevicuspis (Ceratoppia) (=spinipes)
brevicuspis (Eupelops) (=occultus)
brevicuspis (Trichoribates)
brevidentatus (Diapterobates)
brevifer (Eueremaeus)
brevilamellaris (Trichoribates)
brevilamellata (Oribatella) sp. inq.
brevilamellatus [M. (Calyptozetes)]
brevilamellatus (Hemileius)
brevilamellatus (Liacarus)
brevipectinata [B. (Gressittoppia)] pepitensis
brevipectinata [M. (Multilanceoppia)]
brevipectinata [T. (Teratoppiella)]
brevipes (Ameronothrus) (=nigrofemoratus)
brevipes (Micreremus)
brevipes (Mixacarus)
brevipila (Afroppia)
brevipila (Oribatella) (=foliata)
brevipila (Pilobatella)
brevipilis (Halozetes) belgicae
brevipilis (Hoplophorella)
brevipilosa (Ctenobelba)
brevipilosa [H. (Kakophthiracarus)]

brevipilosa [I. (Zeaotritia)]
brevipilus (Eupelops) sp. inq.
brevipilus [S. (Tropacarus)]
brevipodus (Scheloribates)
breviporosus (Totobates)
brevipterus [S. (Perscheloribates)]
brevirostris (Nothrus) sp. inq.
brevis (Berlesezetes)
brevis (Carabodes)
brevis (Liochthonius)
brevis (Oribotritia)
brevis (Tuxenia)
brevis (Zetomimus)
brevisensilla (Macrogena)
brevisensillatus (Eurhynchoribates)
breviseta (Austrachipteria)
breviseta (Eremobelba)
breviseta (Galumna)
breviseta (Indotritia)
breviseta (Lauroppia)
breviseta (Liochthonius)
breviseta (Magyaria)
breviseta (Mesostritia)
breviseta (Oribotritia)
breviseta (Paroppia)
breviseta [H. (Rhacaplacarus)]
breviseta (Sadocepheus)
breviseta [I. (Zeaotritia)] (=brevisetosa)
brevisetae [P. (Metaphthiracarus)]
brevisetiger [O. (Acrotocepheus)]
brevisetiger (Cryptoppia)
brevisetiger [M. (Trimalaconothrus)]
brevisetiger (Nippobodes)
brevisetigera (Brassiella)
brevisetosa [A. (Acrogalumna)]
brevisetosa (Campachipteria)
brevisetosa [L. (Incabates)]
brevisetosa [H. (Kakophthiracarus)]
brevisetosa (Oribotritia)
brevisetosa (Schalleria)
brevisetosa (Tuxenia) (=brevis)
brevisetosa [I. (Zeaotritia)]
brevisetosa [O. (Zygoribatula)] Ewing, 09
brevisetosa [O. (Zygoribatula)] L. *et* B., 91 *(=obsessa)*
brevisetosus [D. (Epidamaeus)]
brevisetosus (Hypochthonius) (=rufulus)
brevisetosus [H. (Platynothrus)]
brevisetosus (Protoribates)
brevisetosus [K. (Rimandocepheus)]
brevisetosus (Unduloribates)
brevisetosus (Xenillus)
brevisetus [M. (Archegotocepheus)]
brevisetus (Hypozetes)
brevisetus (Indoribates)
brevisetus (Perxylobates)
brevisetus (Pilizetes)
brevisetus (Tectodamaeus)
brevisetus (Trhypochthoniellus)
brevisetus (Tritegeus)
brevisimile (Lauroppia)
brevispathulata (Eremobelba)
brevispinus (Hoplophthiracarus)
brevitarsus (Eremaeus)
brevitibialis [D. (Epidamaeus)]
brevitutorium [E. (Gamerozetes)]
brinoni (Globoppia)
brisbanensis (Crotonia)
brissago (Ceratozetella)
bromeliarum [O. (Multoribatella)]
bruneiana (Karenella)
bruneiensis [H. (Calyptophthiracarus)]
bruneiensis (Condylobelba)
bruneiensis (Dolicheremaeus)
bruneiensis (Totobates)
bryani (Austrotritia)
bryani (Pergalumna)
bryani (Phauloppia)
bryobius [P. (Archiphthiracarus)]
bryophilus (Tegoribates)
bucephala (Beckiella)
bucephalus [O. (Acrotocepheus)]
buffaloensis (Hoplophorella) Nied.,06
buffaloensis (Hoplophorella) Nied., 06 (*Not.*) *(=diversisetosa)*
bugiamapensis [C. (Berndamerus)]
bugiamapensis (Dolicheremaeus)
bugiamapensis (Hermanniella)
bugiamapensis (Sphaerozetes)
bulanovae (Belba)
bulanovae (Lauroppia) (=zachvatkini)
bulanovae [O. (Monoribatella)]
bulanovae (Neoribates)
bulanovae (Oribatula) (=interrupta)
bulanovae [Z. (Protozetomimus)] (=acutirostris)
bulanovae (Ptiloppia)
bulbifer (Oribotritia)
bulbiferus [P. (Archiphthiracarus)]
bulbipedata (Damaeus) sp. inq.
bulbipes (Belba) (=corynopus)
bulbofemoralis (Damaeus)
bulbosensillatus (Scapheremaeus)
bulbosus [H. (Notophthiracarus)]
bulbus (Notophthiracarus)
bulganensis (Dissorhina)
bulgarica (Furculoppia) (=furcata)
bulgaricus (Hypozetes)
bulgaricus (Scutovertex)
bullager (Reductobates)
bullocki (Suctobelbella)
bunaensis (Scheloribates)
buntotanus (Peloribates)
bunya (Hexachaetoniella)
burckhardti [O. (Acrotocepheus)]
burckhardti (Pulchroppia)
bureensis (Protoripoda)
buresi [T. (Tyrphonothrus)]
burii (Paraxylobates)
burrowsi (Lucoppia)
butantaniensis (Xenillus)
butiae (Austrocarabodes)
byzovae (Heterochthonius)
byzovae (Oribatella)
cacainus (Hoplophthiracarus)
cachoeirensis (Tecteremaeus)
cadeti (Austrocarabodes)
cadizi (Phthiracarus)
caelatus (Lamellovertex)
caelestis (Litoribates)
caelestis (Steganacarus)
caesarea (Licnobelba)
cagayana (Bicyrtermannia)
cajamarcensis (Brachioppia)
cajamarcensis (Tyrphonothrus)
cajanumaensis [H. (Protophthiracarus)]
calcarata (Fossoppia)
calcarata [M. (Hammeroppia)] (=trembleyi)
calcarata (Nothrolohmannia)
calcarata (Oribatella)
calcarata (Teratoppia)
calcaratus (Farchacarus)
calcaratus (Hardybodes)
calcaratus [S. (Perscheloribates)] (=reiteratus)
calcaratus [C. (Phyllocarabodes)]
calcaratus (Scheloribates) fimbriatus Jac., 34
calcaratus (Scheloribates) Mah., 84 *(=sudafricanus)*
calcaratus (Scheloribates) L. *et* P., 90 *(=praeoccupatus)*
calcehtokensis (Malaconothrus)
calcicola (Galumna)
caledonica (Pergalumna)
california [C. (Klapperiches)]
californiae (Pergalumna)
californica (Galumna)
californica (Protobelba)

californicus (Bipassalozetes)
californiensis (Eremaeus)
californiensis (Hydrozetes)
caliginosa (Topalia)
caliginosus [H. (Notophthiracarus)] (=australis)
caliptera (Oribatula)
callainii [S. (Tropacarus)]
callatisiana (Multioppia)
callipus (Scheloribates)
callipygis [C. (Xiphobates)]
callipygus (Torpacarus)
callitarsus (Pedrocortesella)
callitoca (Mongaillardia)
callosa (Pedrocortesella)
calmorum (Pedrocortesella)
calotropica (Hoplophorella)
calugarae (Kulievia) (=paradecipiens)
calugarae [H. (Notophthiracarus)]
calva (Galumna)
calva [T. (Paragloboppia)] sp. inq.
calycifera (Mochloribatula) (=bahamensis)
cambricus (Mycobates)
camelus (Crotonia)
cameroni (Crotonia)
cameroonica (Galumna)
camerunensis (Congocepheus)
camerunensis [P. (Pseudopilizetes)]
camerunensis (Yoshiobodes)
camerunica (Lasiobelba)
camillae (Crotonia)
campbellensis [M. (Pravoppia)]
campbellensis (Stomacarus)
campestris (Ceratozetes)
campestris (Coartobelba)
campestris (Scheloribates) (=latipes)
campestris (Tectoribates)
campinaranensis (Arcoppia)
camtschaticus (Damaeus) sp. inq.
camtschaticus (Scheloribates)
canadaris (Protoribotritia)
canadensis (Banksinoma) lanceolata
canadensis (Ceratoppia) (=spinipes)
canadensis [D. (Epidamaeus)]
canadensis (Limnozetes) (=ciliatus)
canadensis (Oribatella)
canadensis (Peloribates)
canadensis (Propelops)
canadensis (Trhypochthoniellus) longisetus
canagaratnami (Oripoda)
canagaratnami (Rhopalozetes)
canaliculatus (Neoliodes) sp. inq.
canariensis (Anomaloppia)
canariensis [H. (Calyptophthiracarus)] (=heterotrichus)
canariensis [M. (Hammeroppia)]
canariensis (Hermannia)
canariensis [L. (Incabates)]
canariensis (Oribella)
canariensis (Poroscheloribates)
canariensis (Thalassozetes)
canariensis (Xenillus) discrepans
canariensis [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)
cancellata (Magyaria)
cancellata (Zetorchella)
candidulus [H. (Calyptophthiracarus)]
canestrinii (Acrotritia) (=ardua)
canestrinii (Hermannia) sp. inq.
caneteae (Dolicheremaeus)
cangioensis (Ceratobates)
canlaonensis [H. (Phyllhermannia)]
canningsi [A. (Coropoculia)]
canopeus (Tyrphonothrus)
capense (Oppia)
capensis (Afrozetes) magoebaensis
capensis [L. (Bicristoppia)]
capensis (Eremaeozetes)
capensis (Eupelops)
capensis (Galumna)
capensis (Halozetes)
capensis (Hydrozetes)
capensis (Neoliodes) sp. inq.
capensis (Pergalumna) magnipora
capensis (Rhopalozetes)
capevidalensis [H. (Notophthiracarus)]
capillaris (Pergalumna) magnipora
capillata (Capilloppia)
capillata (Rhynchoppia)
capillata (Xenolohmannia)
capillatus [H. (Capillonothrus)]
capillatus (Ceylobodes)
capillatus (Dolicheremaeus)
capillatus [H. (Notophthiracarus)]
capilligera [L. (Antennoppia)]
capistrata (Crotonia)
capita (Totobates)
capitanea (Oribotritia)
capitata (Eremobelba)
capitata (Gredosella)
capitata [O. (Zygoribatula)] Banks, 1910
capitata [O. (Zygoribatula)] Hall, 1911 *(?=clavata)*
capitatus (Anderemaeus)
capitatus (Neogymnobates)
capitatus (Phthiracarus) sp. inq.
capitatus (Xenillus)
capitulum (Beckiella)
capitulum (Protozetes)
capizensis (Dolicheremaeus)
caporiacci (Multioppia) (?=laniseta)
caprai (Scheloribates)
capreolatus (Dolicheremaeus)
captator (Dissorhina) (=ornata)
capualensis (Pergalumna)
capucinus [O. (Fenestrobates)]
capucinus (Protoribates)
carbonarius [L. (Rhaphidosus)]
carboneli (Plasmobates)
carcharodon [S. (Flagrosuctobelba)]
cardosensis (Microtegeus)
cardosensis (Pergalumna)
carinata (Austrotritia)
carinata (Beckiella)
carinata (Coartobelba)
carinata (Vaghia)
carinatissima (Berniniella)
carinatus (Carabodes) (=subcarinatus)
carinatus (Dolicheremaeus)
carinatus (Eueremaeus)
carinatus (Euphthiracarus)
carinatus (Leobodes)
carinatus [H. (Notophthiracarus)]
carinatus [H. (Platynothrus)] Kramer, 1897 *(=punctatus)*
carinatus [H. (Platynothrus)] Banks, 1910 *sp. inq.*
carinatus (Rostrozetes)
carinatus (Scapheremaeus)
carinatus (Solenozetes)
carinatus (Suctoribates)
carinatus [S. (Tropacarus)]
carinatus (Wallworkodes)
carinthiaca (Lauroppia) maritima ssp. inq.
carinulatus (Pheroliodes)
carioca (Crotonia)
carli (Mycobates)
carlosi (Steganacarus)
carneus (Indoribates)
carneus (Scheloribates) sp. inq.
carniolica [O. (Moritzoppiella)] (=neerlandica)
carolensis [L. (Carolohmannia)]
caroli (Synichotritia)
carolina (Ferolocella) (=tessellata)
carolinae (Oribotritia)
carolinae (Multioppia) (?=wilsoni)
carolinae (Nothrus) (=silvicus)
carolinensis [A. (Dyobelba)]

carolinensis [L. (Rhaphidosus)]
carolinicus (Hypochthonius) rufulus ssp. inq.
carpathicus (Topobates)
carpatica (Dissorhina)
carpatica [M. (Multilanceoppia)]
carpetanus (Pilobates)
carrolli (Camisia)
cartalinicus (Liacarus) (?=subiasi)
carusoi (Steganacarus)
casabranquensis (Pheroliodes)
caspica [O. (Sacculoribatella)]
caspica [O. (Zygoribatula)]
cassolai (Cosmogneta)
castagnoliae (Senectoppia) (=complicatum)
castanea (Banksinoma) (?=lanceolata)
castanea (Galumna) sp. inq.
castaneus [H. (Capillonothrus)]
castaneus (Comeremaeus)
castaneus (Liacarus) (=banksi)
castaneus (Sphaerozetes)
castlei (Scheloribates)
castriensis (Cultroribula) (=bicuspidata)
castrii [C. (Klapperiches)] (=minusculus)
castrii (Microzetes)
casuarina [D. (Cylindroppia)]
catalauca (Hoplophorella)
catalaucus [P. (Archiphthiracarus)]
cataracta [A. (Rafacarus)] (=rafalskii)
catarinensis [Z. (Protozetomimus)]
cathayanus (Euphthiracarus)
catskillensis (Achipteria)
cattienensis (Protoribates)
cattienensis (Unguizetes)
cattienica (Furcoppia)
cattienica (Pergalumna)
caucasica (Mesoplophora) (=michaeliana)
caucasica (Suctobelba) scalpellata
caucasica (Zachvatkinella)
caucasicus (Cepheus)
caucasicus (Chamobates)
caucasicus (Eupelops)
caucasicus (Heterochthonius)
caucasicus (Microzetes)
caucasicus (Palaeacarus)
caucasicus (Pantelozetes) (=paolii)
caucasicus (Trichoribates)
caudalis (Crotonia)
caudata (Phauloppia)
caudata (Sellnickia) Mich., 1898
caudata (Sellnickia) Berl., 1910 *(=caudata* Mich.*)*
caudatus [O. (Acrotocepheus)]
caudatus (Afroleius)
caudatus (Dendrozetes)
caudatus (Nesopelops)
caudatus [H. (Notophthiracarus)]
caudatus (Poroliodes) (=farinosus)
caulis [H. (Notophthiracarus)]
cavaticus (Oribellopsis)
caverna (Hoplophorella)
cavernalis (Galumna)
cavernalis [R. (Insculptoppia)]
cavernicolus [S. (Perscheloribates)]
cavernicolus (Samarocepheus)
caverniculus (Turkmenitrichus)
cavernosa (Hoplophorella) (=neonominata)
cavernosus (Acaroceras)
cavernosus [P. (Archiphthiracarus)]
cavernosus (Charassobates)
cavernosus[H. (Steganacarellus)]
cayoaguaensis (Mucrobates)
cayugensis (Heterozetes) (=minnesotensis)
cazanicus (Hoplophthiracarus)
cebuensis (Dolicheremaeus)
cejansis (Beckiella)
celisi (Liacarus) sp. inq.
celisi (Trichocarabodes)
cellularis (Austrocarabodes)
cellularis (Galumnella)
cellulatifer (Scapheremaeus)
cellulatus (Damaeolus)
cellulosa (Eremobelba)
cendanai (Basilobelba)
cendsureni [P. (Shtanchaeviella)]
centenarius (Kalayaan)
centraliamericana [N. (Amerigloboppia)]
centroamericana (Allosuctobelba)
centroamericana [T. (Teratoppiella)]
centroamericanus (Euzetes)
centroclathrata [F. (Cosmogalumna)]
centrodentata (Rhinoppia)
centropterus [N. (Parakalumma)] (=robustus)
centurion [M. (Neobelba)]
cephalota (Oppia) sp. inq.
cephalotes (Aleurodamaeus)
cephalotes (Carabodes) sp. inq.
cephalotum (Stauroma)
cepheiformis (Cepheus)
cerebralis (Nodocepheus)
cerebrum (Carabodes)
cereus (Arthrodamaeus)
cernuus (Euphthiracarus)
ceroplastes (Pheroliodes)
cervicorna (Crotonia)
cervifer (Wallworkoppia)
cervus (Javieroppia)
cervus (Microtegeus) M., 83
cervus (Microtegeus) M., 96 *(=paracervus)*
cervus (Tectocepheus) sp. inq.
cespitum (Oribatella) sp. inq.
ceylanicus (Megalotocepheus) (=mahunkarum)
ceylanicus [L. (Paralamellobates)] (=misella)
ceylonica (Machadobelba)
ceylonicus (Dolicheremaeus)
ceylonicus (Megalotocepheus)
ceylonicus (Microtegeus)
chaac (Scapheremaeus)
chabarica [S. (Flagrosuctobelba)]
chacoensis (Benoibates)
chadaevae (Proteremaeus)
chajulensis (Malaconothrus)
chalazionus (Gymnodamaeus)
chaliyamensis (Hoplophorella)
chamartinensis [P. (Vepracarus)]
chambrieri (Mochlozetes)
chamela (Haplochthonius)
chamelensis (Archegozetes) (=longisetosus)
chamobatoides [L. (Incabates)] (=tenuifusus)
champaignensis (Afrozetes)
chancanii (Eremaeozetes)
chandleri [C. (Klapperiches)]
changbaiensis (Parautogneta)
changchunensis (Galumna)
changlingensis (Ghilarovus)
chapmani (Mixacarus)
chaquensis (Scapheremaeus)
chatham [H. (Protophthiracarus)]
chauhani (Scheloribates)
chavinensis [E. (Multoribates)]
chavinensis (Neoamerioppia)
chavinensis (Sphaerozetes)
chejuensis (Nippobodes)
cheloniella (Scapheremaeus)
cheni (Neoribates)
chernovae (Atropacarus)
chernovi (Lepidozetes) (=singularis)
cherokee (Carabodes)
cherokee (Oribotritia)
cherubin (Polypterozetes)
chiatous (Eueremaeus)
chiayiensis (Muliercula)
chibai (Acutozetes)
chichijimensis (Oribotritia)

chiebunensis [L. (Dorycranosus)]
chilensis (Anderemaeus)
chilensis (Dometorina)
chilensis (Lamellozetes)
chilensis (Multioppia)
chilensis (Neoamerioppia)
chilensis (Paraphauloppia)
chilensis [H. (Protophthiracarus)]
chilensis (Trhypochthoniellus)
chiloensis (Crotonia)
chimaera (Balogheremaeus)
chimaera (Trichogalumna)
chimalae (Zachvatkinella)
chinensis (Fissicepheus)
chinensis (Gerloubia)
chinensis (Gibbicepheus)
chinensis (Meristolohmannia)
chinensis (Trachyoribates)
chinonei (Sellnickochthonius)
chinonei (Suctobelba)
chinonei [S. (Ussuribata)]
chiranensis (Tokunocepheus)
chirstlus (Carabodes)
chistyakovi [L. (Antennoppia)]
chistyakovi (Oppiella) (=nova)
chistyakovi [P. (Triaunguis)]
chitinofincta (Anomaloppia)
chitralensis [S. (Flagrosuctobelba)]
chitralensis (Trichogalumna)
chiyukiae (Pergalumna)
choerognathus (Nasozetes)
chongqingensis (Paralycus)
chopeensis [D. (Spatiodamaeus)]
chrisengelbrechti [G. (Rostrogalumna)]
christineae (Tuparezetes)
christovi (Arenozetes)
chroniosus (Liacarus) sp. inq.
chujoi (Galumna)
chukchi [D. (Epidamaeus)]
chulumaniensis (Ramusella)
churaumi (Fortuynia)
churincensis (Trhypochthoniellus)
chuxiongensis (Hoplophthiracarus)
cicatricosus (Dolicheremaeus)
cidarus (Liacarus)
ciliarostralis [T. (Cristonothrus)]
ciliata (Leptogalumna)
ciliata (Teratoppia)
ciliatus (Limnozetes)
ciliosus (Atropacarus)
ciliosus (Stomacarus)
cincinnatus [D. (Epidamaeus)]
cincta (Banksinoma)
cinctus (Torpacarus)
cingulatus (Eremulus)
circula (Pergalumna) sp. inq.
circularis (Galumna)
circularis (Tumerozetes)
circulus (Epieremulus)
circumalatus (Planobates)
circumcarinatus (Topobates)
circumciliata (Pseudoamerioppia)
circumita [Q. (Coronoquadroppia)]
circumvallatus (Neoliodes) (=theleproctus)
cirripilis (Galumna) sp. inq.
cirrosus [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
cisalpina [C. (Ceratozetella)]
citelli (Oribella)
cladonicolus (Trhypochthonius)
clandestinus [H. (Protophthiracarus)]
clara (Hermannia)
clara (Mesotritia) (=maerkeli)
clarencei (Achipteria)
clarki (Austronothrus)
clathratus (Sphaerozetes)
claudelionsi [R. (Insculptoppia)]
clavasensilla (Belba)
clavasetosa (Hermanniella)
clavasetosa (Pseudoceratoppia)
clavata (Acrotritia) (=curticephala)
clavata (Aeroppia)
clavata (Beckiella)
clavata (Cubachipteria)
clavata [G. (Erogalumna)] (=neonominata)
clavata (Galumnopsis)
clavata (Hoplophorella)
clavata (Indotritia)
clavata (Moritzoppia) (?=punctata)
clavata (Oripoda)
clavata (Oxyoppia)
clavata [H. (Phyllhermannia)]
clavata (Topalia)
clavata [S. (Ussuribata)]
clavata [O. (Zygoribatula)]
clavatoflagellata (Oribella) (=paolii)
clavatopilus (Xenillus)
clavatosensillus [H. (Kakophthiracarus)]
clavatosensillus (Scutozetes)
clavatotrichobothria [O. (Zygoribatula)]
clavatus [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
clavatus (Atropacarus)
clavatus (Birsteinius)
clavatus (Carabodes) Warb., 12 *sp. inq.*
clavatus (Carabodes) Jac., 38 *(=neonominatus)*
clavatus (Cristeremaeus)
clavatus (Euphthiracarus)
clavatus (Fissicepheus)
clavatus (Haplochthonius)
clavatus [I. (Haplozetes)]
clavatus (Hemileius)
clavatus (Hoplophthiracarus)
clavatus [T. (Latilamellobates)]
clavatus (Liochthonius)
clavatus (Ommatocepheus)
clavatus (Oribellopsis)
clavatus (Peloribates)
clavatus [S. (Perscheloribates)]
clavatus [L. (Procorynetes)]
clavatus (Protozetes)
clavatus (Tectocepheus) velatus
clavatus (Transoribates)
clavatus [E. (Trischeloribates)]
clavatus [A. (Uluguroides)] (=wallworki)
clavatus (Unguizetes)
clavellatus (Hoplophthiracarus)
clavifer (Hoplophorella)
clavifer (Phthiracarus)
clavifer (Scapheremaeus)
claviger (Dolicheremaeus)
claviger [L. (Dorycranosus)] (=acutus)
claviger (Eupelops)
claviger (Hoplophorella)
clavigera (Allobelba)
clavigera (Hermanniella)
clavigera (Moritzoppia) unicarinata
clavigerus (Atropacarus)
clavigerus [H. (Notophthiracarus)] (=pearcei)
clavigerus [P. (Oribellopsis)] sp. inq.
clavigerus (Pseudotocepheus)
clavilanceolatus (Scheloribates)
clavimera (Setoppia)
claviopsis (Fissicepheus)
clavipectinata (Ramusella)
clavipectinatus (Scheloribates) (=latipes)
clavipes [D. (Paradamaeus)]
clavisensillata (Ceratoppia)
claviseta (Kuklosuctobelba)
clavisetosa (Zetorchella) (=latior)
clavisetus (Cordiozetes)
clavisetus (Euscheloribates)
clavisetus (Scapheremaeus)
clemens (Phthiracarus)

clericata (Carinogalumna)
closteros (Acrotritia) (=curticephala)
closteros [P. (Archiphthiracarus)]
clypeator (Xenillus)
clypeatus (Pteramerus)
clypeatus (Scutovertex) sp. inq.
clypeatus (Zetomimus) (?=furcatus)
coarctatus (Haplamerus)
coarctatus (Pseudotocepheus)
cochleaformis (Carabodes)
cochlearia (Globoppia)
cochlearia (Hoplophorella) (=hamata)
cocuyana (Neoamerioppia)
coetzeeae (Microlamellarea)
coetzeeae [H. (Notophthiracarus)]
coggii (Oribatula) (=tibialis)
cognata [O. (Oxyoppiella)] bituberculata
cognata [O. (Zygoribatula)]
cognatus [P. (Archiphthiracarus)]
cohici [K. (Glabroppia)]
coiffaiti (Perlohmannia)
coineaui (Arthrovertex)
coineaui (Phauloppia) (=nemoralis)
colchica [O. (Monoribatella)]
colchicus (Ceratozetes)
colemani (Oribatula)
coleoptrata (Achipteria)
coleoptrata (Achipteria)
coleoptrata (Galumna) (=lanceata)
colini [H. (Phyllhermannia)]
collaris (Hoplophorella)
colliger [P. (Neotocepheus)]
colloffi [H. (Phyllhermannia)]
colloffi [I. (Zeaotritia)] (=brevisetosa)
colobanthi (Halozetes) (=crozetensis)
colombiana (Acrotritia)
colombiana (Galumna)
colombianus [H. (Besuchetacarus)]
coloradensis (Galumma)
coloradensis (Oppia)
colorado (Carabodes)
colossus (Galumna)
columbiana (Aeroppia) (=magnipilosa)
columbiana (Hermanniella) (=subnigra)
columbiana (Pergalumna) (=emarginata)
columbianus [L. (Dorycranosus)]
columbianus (Eueremaeus)
columbianus (Xenillus)
columbreti [T. (Latilamellobates)]
comas (Carabodes)
comatus [P. (Archiphthiracarus)]
comatus [H. (Calyptophthiracarus)]
comatus (Hemileius) (=quadripilis)
comatus (Topobates)
combicondylus (Fissicepheus)
combinatus (Umbellozetes)
comelicensis (Astegistes) (=pilosus)
comitalis (Nanhermannia)
communis (Totobates)
commutabilis (Phthiracarus) (=compressus)
commutata (Lauroppia)
commutata (Oribatula) (=amblyptera)
comoroensis (Dimidiogalumna)
comoroensis (Sellnickochthonius)
comosa (Xenolohmannia)
comosus [P. (Neophthiracarus)]
compacta [I. (Afrotritia)]
compacta (Parasuctobelba)
comparabilis (Galumna)
comparabilis [H. (Phyllhermannia)]
comparandus (Pergalumna)
comparativus [H. (Notophthiracarus)]
complanatus (Pheroliodes)
complanatus (Plateremaeus)
completa (Indotritia) (=javensis)
completus (Nesiacarus)
complexa (Parasuctobelba)
complicata (Oxyoppia)
complicata (Pergalumna)
complicata (Senectoppia)
complicata (Tuxenia)
complicatus (Steganacarus) (=vestitus)
compositocarinata (Lauroppia) sp. inq.
compressa (Setoppia)
compressus (Phthiracarus)
compta (Tokukobelba)
comteae (Acrotritia) (=vestita)
comteae (Eremobelba)
comteae (Euphthiracarus)
comteae (Rioppia)
concava (Camisia) (=spinifer)
concava (Separatoppia)
concavus (Bathocepheus)
concavus (Cosmochthonius)
concavus (Holonothrus)
concavus (Hoplophthiracarus)
concavus (Mixochthonius)
concavus [C. (Paracavernocepheus)]
concavus (Pheroliodes)
concavus (Tegeocranellus)
concentricus (Neoliodes)
concentricus (Scheloribates)
concinna [O. (Zygoribatula)] (=arcuatissima)
concinuus (Hoplophthiracarus)
concolor (Hoplophthiracarus)
concolor [D. (Paradamaeus)] (=clavipes)
concolor [O. (Zygoribatula)] sp. inq.
concretus (Totobates) sp. inq.
concurvatus (Comorozetes)
concurvatus (Tectocepheus) (=sarekensis)
condylifer (Condyloppia)
confertus (Costacarabodes)
confervae (Hydrozetes)
confinis [N. (Confinoppia)]
confinis (Cultroribula)
conflata (Granuloppia)
confluens (Allogalumna)
confluens (Plakoribates)
confluentina (Pergalumna) sp. inq.
conformis (Gymnodampia) (=fusca)
conformis (Phauloppia) (=lucorum)
conformis (Phthiracarus) (=lentulus)
confragosus (Fissicepheus)
confundatus (Hemileius) (=initialis)
confusa (Arcoppia) (=robusta)
confusa (Pergalumna) (=louisianae)
confusa (Ramusella)
confusius (Scheloribates)
confusus (Chamobates)
confusus (Xenillus)
conglobatus (Scheloribates) parvus
congoensis (Granuloppia)
congoensis (Hermanniella)
congoensis (Neoctenogalumna)
congregator (Trhypochthonius) tectorum
congruus (Verachthonius)
conica [S. (Flagrosuctobelba)]
conicus (Malaconothrus)
conicus (Papillacarus)
coniferina (Behanpseudoppia)
coniferus (Nothrus)
conirostris [S. (Bischeloribates)]
conitus [M. (Calyptozetes)]
coniunctus (Tectocepheus) (=velatus)
coniunctus [S. (Tropacarus)]
conjuges [S. (Perscheloribates)]
conjuncta (Berniniella)
conjuncta (Phauloppia) (=lucorum)
conjunctus (Ceratozetes)
conjunctus (Dolicheremaeus)
conjunctus (Lepidozetes) (=singularis)
conjunctus (Liacarus) sp. inq.

conjunctus [P. (Minguezetes)]
conjunctus (Zachvatkinibates)
conjungenus (Damaeus)
conjungenus [D. (Spatiodamaeus)]
connexa (Gustavia) (=magnilamellata)
connexa [O. (Zygoribatula)]
connexus (Ophidiotrichus) (=tectus)
consanguineus (Microzetorchestes) (=emeryi)
consectionus (Peloribates)
consimilis [O. (Acrotocepheus)]
consimilis (Aeroppia) (=floridana)
consimilis [M. (Calyptozetes)] (=sarekensis)
consimilis (Indotritia)
consimilis [L. (Lancelalmoppia)]
consimilis (Neseutegaeus)
consimilis [H. (Notophthiracarus)]
consimilis (Suctobelba)
conspectus (Trhypochthonius)
conspersus [P. (Metaphthiracarus)]
conspicua (Pergalumna)
conspicuus [H. (Notophthiracarus)]
conspicuus (Ramsayellus)
conspicuus (Tricheremaeus)
contactus (Dolicheremaeus)
contaminatus (Eupelops)
contigua (Hexachaetoniella)
contigua (Hoplophorella)
contiguus (Ceratozetes) (=conjunctus)
contiguus (Exochocepheus)
contiguus [S. (Kaibacepheus)]
contiguus (Liacarus)
continua (Nanhermannia)
contortula (Oribotritia)
contortulus [H. (Notophthiracarus)]
contracta [O. (Zygoribatula)]
contractilis (Phthiracarus) (?=laevigatus)
contractus (Pseudotocepheus)
contraria (Microtritia)
contraria (Oribotritia)
contrarius [H. (Notophthiracarus)]
controversus (Steganacarus)
conundrum (Pedrocortesella)
convexa (Hermannia)
convexa (Novazelandiella)
convexus (Scapheremaeus)
convexus (Tegeocranellus)
cooki (Euphthiracarus)
cooki [Z. (Protozetomimus)]
copectus (Hemileius)
cophinaria (Crotonia)
copiosus (Pheroliodes)
copperminensis (Trichoribates)
copulata (Furcoribula) (=furcillata)
coracinus (Liacarus)
corae (Cepheus)
coralgablensis (Allodamaeus)
corallifera [B. (Gressittoppia)]
corallium (Lohmannia)
cordatus (Damaeus)
cordiformis (Eremaeus) hepaticus
cordisetus (Caveremulus)
cordisetus [T. (Cristonothrus)]
cordobensis (Oripoda)
cordobensis (Pheroliodes)
cordobensis (Ramusella)
cordobensis (Staurobates) schusteri
cordylinosa (Paraphauloppia)
cordylus [H. (Notophthiracarus)]
coreana (Galumna)
coreana (Gymnodampia) crassisetiger
coreana (Lohmannia)
coreanus (Dolicheremaeus) infrequens
coreanus [D. (Epidamaeus)]
coreanus (Liacarus) gammatus
coreanus [P. (Tetraperxylobates)]
coriaceus (Alaskozetes)
coriaceus (Carabodes)
corinnensis (Topalia)
corletti (Acrotritia) (=americana)
corneri (Sabacarus)
corniculata (Dissorhina) ornata
corniculata [R. (Insculptoppia)] P.-I. *et* P., 97
corniculata [R. (Insculptoppia)] I. *et* V., 99 *(=neonominata)*
corniculata (Pergalumna)
corniculatus (Fissicepheus)
corniculifera (Arcoppia)
corniger (Scapheremaeus)
cornigera (Suctobelba)
cornigera (Suctobelbella) (?=acutidens)
cornuta (Belba)
cornuta (Ceratoppia) (=bipilis)
cornuta (Crotonia)
cornuta (Furcoppia)
cornuta [H. (Kakophthiracarus)] (=multirugosa)
cornuta (Negroppia)
cornuta (Parapyroppia)
cornuta (Pedrocortesella)
cornuta (Suctobelba) (=cornigera)
cornuta (Suctobelbella)
cornuta (Suctobelbila)
cornutus (Ceratorchestes)
cornutus (Costeremus)
cornutus [M. (Cristonothrus)
cornutus (Eremaeus) sp. inq.
cornutus (Humerobates)
cornutus (Iugoribates) (=mihelcici)
cornutus [C. (Magoebazetes)]
cornutus (Microtegeus)
cornutus (Scapheremaeus)
cornutus (Tecteremaeus)
cornutus [P. (Vepracarus)]
corolevuensis (Pergalumna)
corolevuensis (Scheloribates) thermophilus
coronarius (Dolicheremaeus)
coronarius (Fissicepheus)
coronata (Berniniella) (=hauseri)
coronata (Eremobelba)
coronata (Galumna)
coronata [N. (Leptosuctobelba)]
coronata (Nanheremannia) (=dorsalis)
coronata [H. (Phyllhermannia)]
coronatus [L. (Dorycranosus)]
coronatus [C. (Klapperiches)]
coronatus (Seboetocepheus)
coronopubes (Topobates)
coronospinosus (Novonothrus)
corporaali (Oribotritia)
corpulentus (Austrocarabodes) sp. inq.
corpuscula (Anachipteria) (=howardi)
corpusculum (Scheloribates)
corpuzrarosae [G. (Atypicogalumna)]
corpuzrarosae (Erioppia)
corpuzrarosae [I. (Haplozetes)]
corpuzrarosae (Leptotocepheus)
corrugata (Oppiella) (=nova)
corrugatum (Senectoppia) (=complicatum)
corrugatus (Ameronothrus) (=lineatus)
corrugatus (Comorozetes)
corrugis (Pergalumna)
corsicanus (Ophidiotrichus)
corsicanus (Saxicolestes)
corticalis (Nothrus) sp. inq.
corticalis (Phauloppia) (?=lucorum)
corticeus (Mycobates)
corticis [N. (Parakalumma)]
corticola (Oripoda)
corynopus (Belba)
coscobensis (Pergalumna) emarginata ssp. inq.
costai [H. (Calyptophthiracarus)]
costanotus (Damaeus)
costaricensis (Paulianacarus)
costaricensis [C. (Phyllocarabodes)]

costaricensis (Rugocepheus)
costaricensis (Scheloribates)
costata [A. (Acrogalumna)]
costata (Galumna)
costula (Licnodamaeus)
costulata (Beckiella)
costulata (Tectoppia)
costulatus (Austrocarabodes)
costulatus (Eremaeozetes)
costulatus (Eupelops)
costulatus (Licneremaeus)
costulatus (Microzetes)
costulatus (Plateremaeus)
costulatus (Trichocarabodes)
costulifera [N. (Ameriglobopia)]
cotedivoirensis (Gymnobodes)
cotedivoirensis (Zetorchella)
cotopaxiensis (Nothrus)
coulsoni (Fuscozetes)
covarrubiasi (Loboppia)
covarrubiasi (Novonothrus)
coweetaensis (Carabodes)
coxalis [D. (Epidamaeus)]
cozadensis (Pilogalumna)
cozumelensis (Mesotritia)
craigheadi [D. (Epidamaeus)]
crassa (Macrogena)
crassata [O. (Oxyoppiella)]
crassiclava (Pilogalumna)
crassicostata (Galumna) (=setigera)
crassilamellaris [T. (Cristonothrus)]
crassimarginatus (Austrocarabodes)
crassiori (Austrotritia) lebronneci
crassipes (Hermannia) (=gibba)
crassipes (Oribatula) (=tibialis)
crassipes (Tyrphonothrus)
crassipilosa [O. (Bioribatella)]
crassipodus (Scheloribates)
crassipora (Pergalumna)
crassisensillatus [D. (Epidamaeus)]
crassiseta (Acutoppia)
crassiseta (Austroceratoppia)
crassisetae (Euphthiracarus)
crassisetiger (Eohypochthonius)
crassisetiger (Gymnodampia)
crassisetiger (Indoribates)
crassisetiger (Protoribates)
crassisetosa (Belba)
crassisetosa (Heterobelba)
crassisetosa (Mesoplophora)
crassisetosa [E. (Neoepilohmannia)]
crassisetosus [T. (Cristonothrus)] (=sarkarae)
crassisetosus (Eueremaeus)
crassisetosus (Haplochthonius)
crassisetosus (Magellozetes)
crassisetosus (Ommatocepheus)
crassisetosus [S. (Perscheloribates)]
crassisetosus (Perxylobates)
crassisetosus (Steganacarus)
crassisetosus (Suctoribates)
crassisetosus [T. (Tyrphonothrus)]
crassisetus (Nothrus)
crassispinosus [D. (Spatiodamaeus)] sp. inq.
crassus (Afroleius)
crassus [P. (Archiphthiracarus)]
crassus (Liochthonius)
crassus (Nesopelops)
crassus [S. (Perscheloribates)]
crassus (Scapheremaeus)
crassus (Scheloribates) Ham., 67
crassus (Scheloribatres) Kul., 79 *(=repetitus)*
crassus (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
crassuta [M. (Hammeroppia)]
craterifer (Plesiodamaeus)
craterifer (Steganacarus)
craticula [H. (Phyllhermannia)]
cremersi (Metabelba) (=papillipes)
crenata [Q. (Coronoquadroppia)]
crenata (Galumna)
crenata [R. (Insculptoppia)]
crenatosetosa [A. (Parabelbella)]
crenellatus (Austrocarabodes)
crenophilus (Phthiracarus) (=longulus)
crenula (Hoplophorella)
crenulata (Tenuiala)
crenulatus (Oribatodes)
crenulatus (Synchthonius)
creta (Teratoppia)
cretensis [H. (Calyptophthiracarus)]
cretensis (Dissorhina)
cribelliger [M. (Calyptozetes)]
cribraria (Ferolocella)
cribrarius (Euphthiracarus)
cribratus (Solenozetes)
cribriger (Pergalumna)
cricoides (Sellnickochthonius)
crimicus (Scheloribates)
crinata (Hoplophorella)
crinita (Oribella) (=pectinata)
crinita (Zetorchella) (=pedestris)
crinitosimilis [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
crinitus [M. (Archegotocepheus)]
crinitus (Austrocarabodes) sp. inq.
crinitus (Benoibates)
crinitus [H. (Capillonothrus)] (=thori)
crinitus (Diapterobates)
crinitus (Eupelops) sp. inq.
crinitus (Nothrus) (=berlesei)
crinitus (Phthiracarus)
crinitus (Plenotocepheus)
crinitus [M. (Trimalaconothrus)] sp. inq.
crispatus (Damaeus)
crispirhina (Suctobelbella)
crisposetosa [N. (Leptosuctobelba)]
crispus [P. (Archiphthiracarus)]
crispus (Dolicheremaeus)
crispus (Eremulus)
crispus (Indoribates) (=punctulatus)
crispus (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
crispus [M. (Trimalaconothrus)]
crista [G. (Stenoppia)]
cristata (Apoplophora)
cristata [O. (Dzarogneta)]
cristata (Microtritia)
cristata (Moritzoppia) unicarinata
cristata (Quadroppia)
cristata (Ululohmannia)
cristatus [P. (Archiphthiracarus)]
cristatus (Hoplophthiracarus)
cristatus (Licneremaeus)
cristatus (Otocepheus)
cristatus (Rostrozetes)
cristatus [H. (Steganacarellus)] Aoki, 80
cristatus [H. (Steganacarellus)] Niedb., 06
cristatus (Tecteremaeus)
cristatus (Zetomimus)
cristipes (Trematoppia)
croajingolongensis [H. (Phyllhermannia)]
cronadun [H. (Protophthiracarus)]
cronus (Arcoppia)
crosbyi (Hypochthoniella)
crosbyi [P. (Oribellopsis)]
crossleyi [B. (Lanibelba)]
crossleyi (Melanozetes)
crozetensis (Antarctozetes)
crozetensis (Austroppia)
crozetensis (Halozetes)
cruciata (Schalleria)
cruciseta (Scheloribates)
crux (Porrhoppia)
cruzae [P. (Vepracarus)]
cryophilus (Truncopes) (=andinus)

cryptacus [S. (Grandjeanobates)]
cryptisetosa (Moritzoppia)
cryptodonta (Cryptogalumna)
cryptomeriae (Arcoppia)
cryptonota (Lyrifissiella)
cryptopa (Maerkelotritia)
cryptoreticulata (Pedrocortesella)
cryptus (Euscheloribates)
crystallina (Dometorina)
csabai (Neoamerioppia)
csavasorum [G. (Bigalumnella)]
csikii [C. (Klapperiches)]
csiszarae (Atropacarus)
csiszarae (Ctenobelba)
csiszarae (Lanceoppia)
csoengeyi (Pilizetes)
csuzdii (Dolicheremaeus)
csuzdii (Eremulus)
csuzdii (Hymenozetes)
csuzdii (Schalleria)
ctenifera (Oxybrachioppia)
cuauhtemoctzini (Fuscozetes)
cubaensis (Pergalumna)
cubana [A. (Acrogalumna)]
cubana (Beckiella)
cubana (Borhidia)
cubana (Galumna)
cubana (Mesoplophora)
cubana (Oripoda)
cubana [O. (Oxyoppiella)]
cubanus (Arceremaeus)
cubanus (Cosmozetes)
cubanus (Hermannobates)
cubanus (Licneremaeus)
cubanus (Rostrozetes)
cubanus (Scheloribates) (=praeincisus)
cucheae (Pergalumna)
cucheana [L. (Bicristoppia)]
cuculla [H. (Kakophthiracarus)]
cucullata (Achipteria)
cucullata (Hoplophorella)
cuculloides (Hoplophorella) (=cucullata)
cucundus [H. (Protophthiracarus)] (=diazae)
cuii (Tectodamaeus)
culterisetosus [D. (Epidamaeus)]
cultrata (Epilohmannia)
cunangra (Acrotritia)
cuneata (Galumna)
cuneatus (Lamellobates)
cuneiseta (Hoplophorella) (=hamata)
cuneocostulata (Moritzoppia)
cupulata (Crotonia)
cupulatus (Neoribates)
curarii [H. (Varioppia)] (=radiata)
curassensis (Hoplophorella) (=hamata)
curiosus [P. (Archiphthiracarus)]
curiosus [H. (Notophthiracarus)]
curiosus [S. (Oxyscheloribates)]
curta (Achipteria)
curta (Oromurcia) (=lucens)
curtatus [H. (Austrophthiracarus)]
curticephala (Acrotritia)
curtipes (Globoppia) sp. inq.
curtipetata (Eremobelba)
curtipila (Arcoppia)
curtipilis (Ceratoppia) bipilis
curtipilis [L. (Dorycranosus)]
curtipilis [I. (Haplozetes)] vindobonensis
curtipilis (Melanozetes) sp. inq.
curtipilus (Eupelops) (=sulcatus)
curtipilus (Peloribates)
curtipilus (Pilizetes)
curtipilus (Pseudotocepheus) sp. inq.
curtipilus (Ramusella)
curtiramosa [R. (Rectoppia)] strinatii
curtiramosa (Rhinoppia) obsoleta
curtiseta (Arcoppia) arcualis
curtiseta (Odontocepheus)
curtiseta [S. (Plenoxylobates)]
curtiseta (Pseudotocepheus)
curtisetosa (Hoplophorella)
curtispina (Ceratozetes) subaquila
curtispinosa (Basidoppia)
curtulus (Phthiracarus)
curtus (Damaeus) sp. inq.
curtus (Liacarus) (=inermis)
curtus (Liochthonius)
curva (Trichogalumna)
curvata [H. (Phyllhermannia)]
curvatus (Granizetes)
curvialatus (Scheloribates)
curvicarinatus (Protoribates)
curviclavata (Globoppia)
curvidentatus (Liacarus) sp. inq.
curvifamulus (Galumna)
curviporosa (Neogalumna)
curviprolamellatus (Scheloribates)
curvirhynchus [S. (Perscheloribates)]
curvirostrata (Arcoppia)
curvisacculatus (Peloribates) acutus
curviseta (Austronothrus)
curviseta (Eremulus)
curviseta (Eutegaeus) (=bostocki)
curviseta [M. (Perutritia)]
curviseta (Phauloppia)
curvisetiger [O. (Acrotocepheus)]
curvisetiger (Austrocarabodes)
curvisetosus (Fissicepheus)
curvisetosus (Microtegeus)
curvisetus (Dolicheremaeus) Mah., 74
curvisetus (Dolicheremaeus) Ham., 81 *(=praeoccupatus)*
curvisetus (Malgasodes)
curvispina (Acroppia)
curypterus (Unguizetes)
cuscensis (Brachioppia)
cuscensis (Podoribates)
cuspidatiformis (Chamobates)
cuspidatus (Amerus)
cuspidatus (Berlesezetes)
cuspidatus (Ceratozetes)
cuspidatus (Chamobates)
cuspidatus (Diapterobates) pusillus
cuspidatus (Dolicheremaeus)
cuspidatus (Heterozetes)
cuspidatus (Liacarus) (=xylariae)
cuspidatus [F. (Parafurcobates)]
cuspidatus (Podoribates)
cuspidatus (Scapheremaeus)
cuspidatus (Scotiazetes)
cuspidentatus (Tectocepheus) (=minor)
cuspidodenticulata (Ceratozetella)
cuticulatus (Indoribates)
cuyi (Dolicheremaeus)
cuyi (Scheloribates)
cuyi [P. (Triaunguis)]
cyclonotus (Neoliodes) sp. inq.
cyclopeus (Ceratozetes)
cyclops (Scapheremaeus)
cyclosoma (Oppia) (=denticulata)
cyclosporosa [O. (Zygoribatula)]
cylindrica [D. (Cylindroppia)]
cylindrica (Epilohmannia)
cylindricus (Torpacarus)
cymba (Cymbaeremaeus)
cynocephalus (Carabodes) (=cephalotes)
cypha (Indotritia)
daamsae (Lasiobelba)
dactylaris (Pergalumna)
dactylaris [O. (Zygoribatula)]
dactyloscopica (Jornadia)
dactyloscopicus [H. (Notophthiracarus)]
dactyloscopicus [C. (Xiphobates)]

daghestanica (Belba)
daghestanica (Epilohmannia)
daimonios [H. (Protophthiracarus)]
dalawaeus [S. (Bischeloribates)]
dalecarlica [A. (Conchogneta)] (=willmanni)
dalenii (Tripiloppia)
daliensis (Ghilarovus)
daliensis (Tectodamaeus)
dallaii (Mystroppia)
damavandica [R. (Rectoppia)]
danbartai (Rhynchoribates)
damjanovichi (Cosmozetes)
damoeoides (Dolicheremaeus)
danae [S. (Tropacarus)] (=coniunctus)
danaus (Scheloribates)
dandenongensis (Hoplophorella)
danos (Eueremaeus)
danos [S. (Guatemalozetes)]
danubialis (Sellnickochthonius)
danubianus (Phthiracarus) (=dubinini)
daoensis (Scheloribates)
dargoltsiana [S. (Flagrosuctobelba)]
darjeelingensis (Megalotocepheus)
darwinenesis (Eremaeozetes)
darwini (Eremaeozetes)
darwini [H. (Austrophthiracarus)]
darwini [M. (Trimalaconothrus)]
dashidorzsi (Lepidozetes)
dasypus (Phthiracarus) (?=laevigatus)
daviesae (Crotonia)
davisi (Austrocarabodes)
davisi (Haplacarus)
davisorum (Xenillus)
dawidi (Brachioppiella)
debililamellata (Rhinoppia)
debilis (Eueremaeus) (=quadrilamellatus)
debilis (Mycobates) sp. inq.
debilitranslamellata [O. (Zygoribatula)] (=frisiae)
deboissezoni (Congoppia)
decarinatus (Scheloribates)
decedens (Amerobelba)
decempectinata (Lauroppia)
decemsetiger (Adrodamaeus)
decemsetosa (Neoamerioppia)
dechambrieri (Acaroceras)
dechambrieri [O. (Monoribatella)]
dechambrierorum (Arcoppia)
decipiens [A. (Acrogalumna)] (=longipluma)
decipiens (Atropacarus) (=immundus)
decipiens (Oxyoppioides)
decorata (Pergalumna)
decorata (Suctobelbella)
decoratissima (Pergalumna)
decoratus (Papillocepheus)
decoratus (Plumobates)
decoratus (Similochthonius)
decorus (Papillocepheus)
decorus (Rostrozetella)
decoui (Reticulocepheus)
decui (Lasiobelba)
decumana (Oribatella) (=calcarata)
decumana (Oribotritia) (?=berlesei)
decumanus (Peloribates)
decurvatus (Afroleius)
defectuosa (Ramusella)
defectus (Fissicepheus)
deficiens (Anachipteria)
deficiens (Beckiella)
deficiens (Neoamerioppia)
deficiens (Papillocepheus)
deficiens (Similobates)
deformatoides (Afroleius)
deformatus (Xenillus)
deformis (Afroleius)
degradatus (Meristacarus)
deharvengi (Bovicarabodes)
delamarei (Niphocepheus) nivalis
delamarei (Provertex)
delamellatus [P. (Montizetes)]
delectum (Galumna)
deleoni (Zetorchella)
delessei (Suctobelbella)
deletus [H. (Tuberemaeus)]
delicata (Lyroppia)
delicata (Suctobelbella) (=subcornigera)
delicatissimus (Plenotocepheus)
deliciosa (Brachioppia)
deliensis (Trichoribates) sp. inq.
delticus (Pheroliodes)
demeteri (Basidoppia)
demeteri (Beklemishevia)
demeteri (Passalomonia)
demeteri (Scapheremaeus)
demetororum (Similobates)
demetrii (Gilarovella)
deminuta (Oribotritia)
deminutus [H. (Steganacarellus)]
denaliensis [C. (Cyrtozetes)]
dendricola [B. (Kokoppia)]
dendrisetosus (Cryptacarus)
dendroetus [C. (Klapperiches)] (=radiatus)
dendropectinata [M. (Dysarcoppia)]
dengi (Leptogalumna)
denigratus (Pontiobates)
denscanis [M. (Neobelba)]
densefoveolatus (Dolicheremaeus)
densipunctata (Suctobelbila)
densoporosa (Trypogalumnella)
densus [P. (Archiphthiracarus)]
densus (Eremulus)
dentata (Apoplophora)
dentata (Austroceratoppia)
dentata (Austrotritia)
dentata (Baloghoppia)
dentata (Furcoppia) (=groblerae)
dentata (Lauroppia) Gol. *et* Kar., 85
dentata (Lauroppia) (=gordeevae) Gor. *et* Tar., 90
dentata [F. (Mexicoppia)]
dentata (Oribatula) Mih., 1969 *(=neonominata)*
dentata (Oribatula) G. *et* S., 2000 *(=praeoccupata)*
dentata [H. (Phyllhermannia)]
dentata (Pyroppia) (=serrifrons)
dentata (Suctobelbila)
dentata [O. (Zygoribatula)] sp. inq.
dentaticuspis [O. (Bioribatella)]
dentatus (Anderemaeus)
dentatus (Cepheus)
dentatus (Chamobates)
dentatus (Eupterotegaeus)
dentatus (Humerobates) (=rostrolamellatus)
dentatus (Mabulatrichus)
dentatus (Mirabilozetes)
dentatus (Nemacepheus)
dentatus (Nodocepheus)
dentatus (Pheroliodes)
dentatus (Pantelozetes) (=paolii)
dentatus (Plenotocepheus)
dentatus (Protoribates)
dentatus (Pseudotocepheus)
dentatus (Scheloribates)
dentatus (Sphodrocepheus)
dentatus (Trichoribates) novus
denticulata (Lauroppia)
denticulata (Oppia)
denticulatus (Neseutegaeus)
denticulatus (Pilizetes)
denticuspidatus (Peloptulus)
dentifer (Edwardzetes)
dentifera (Moritzoppia)
dentilamellata (Prionoribatella)
dentilamellatus (Eremaeus) (=hepaticus)
dentipes (Hermannia) sp. inq.

dentirostrata (Pergalumna)
dentissima (Novosuctobelba)
dentonyx (Subphauloppia)
dentotutorii (Chamobates)
depauperatus [C. (Xiphobates)]
depilata (Strenzkea)
depilatus (Antarctozetes)
depilatus (Eupelops) (=curtipilus)
depilatus [C. (Klapperiches)]
depilatus (Orthozetes)
depilis [L. (Incabates)]
depilis (Mochloribatula)
depressus (Neoribates)
depressculus (Euphthiracarus)
depressus (Tectocepheus) (=sarekensis)
desaussurei (Cosmochthonius)
desaussurei (Kalyptrazetes)
descombesi (Machadobelba)
deserticola (Tectoribates)
deserticola (Thamnacarus)
deserticus (Bipassalozetes)
desmeti [S. (Tropacarus)]
deswardti (Aleurodamaeus)
detectidens (Pirnodus)
detosus (Liacarus)
devilliersi (Halozetes) marinus
dewalteri [H. (Notophthiracarus)]
dhananjayi (Allonothrus)
dhatiensis (Pilobatella)
dhatiwalalensis (Sadocepheus)
diamantei (Pheroliodes)
diamantensis (Mikizetes)
diamphidios (Hoplophorella)
dianae (Unduloribates)
diani (Protoribates)
diaphanus (Atropacarus) (=striculus)
diaphora [S. (Campbelloppia)]
diaphorillus [H. (Notophthiracarus)]
diaphoros (Acrotritia) ardua
diaphoros (Hoplophorella)
diaphoros (Microtritia)
diaphoros [H. (Rhacaplacarus)]
diatropos (Euphthiracarus)
diatropos (Hoplophorella)
diatropos (Steganacarus)
diazae [H. (Protophthiracarus)]
dicella (Crotonia)
diceros (Allosuctobelba)
dicerosa (Rhynchobelba)
dichosa (Joboppia)
dichotoma [A. (Helvetobelba)]
dickersoni [L. (Dorycranosus)]
dickinsoni [C. (Klapperiches)]
dicornus (Eupelops) eximius ssp. inq.
dictyna (Camisia)
didyma (Austrotritia)
didyma (Indotritia)
didyma (Oribotritia)
diehli [O. (Acrotocepheus)]
differens (Anomaloppia)
differens (Eupelops) (=hirtus)
differens [I. (Haplozetes)]
difficilis (Galumna) sp. inq.
difficilis [P. (Neophthiracarus)]
diffissa (Suctobelbella) (=italica)
diforamenatus (Scheloribates)
digita (Cerachipteria)
digitata (Lamellarea)
digitatus [O. (Acrotocepheus)]
digitatus (Scapheremaeus)
digitifer (Protozetes)
digna (Hoplophorella)
dikra (Acrotritia)
dikroos [H. (Notophthiracarus)]
dikros [H. (Rhacaplacarus)]
dilatata (Allogalumna)
dilatatus (Euphthiracarus)
dilatatus [C. (Klapperiches)]
dilatatus (Hermannobates)
dilatatus [R. (Rhynchoribatodes)]
dilatatus [H. (Steganacarellus)]
dillerorum (Hermannobates)
dilucidus [H. (Protophthiracarus)]
dilutus (Liochthonius)
dilutus (Sphaerochthonius) (=splendidus)
dimentmani (Hemileius)
dimera (Neoliodes) (=theleproctus)
dimidiaspina (Tokukobelba)
dimidiata (Galumna)
diminuta (Setogalumna)
diminutus [L. (Nacunansella)]
dimorpha (Epilohmannia)
dimorpha (Fortuynia)
dimorpha (Galumna)
dimorpha (Kodiakella)
dimorphochaites (Rostrozetes)
dimorphus (Hydrozetes)
dindali [B. (Lanibelba)]
dinema (Nothrus) sp. inq.
dinghuensis [H. (Phyllhermannia)]
dinota (Acrotritia) (=americana)
dipankari (Malaconothrus)
dipterocarpensis (Oribotritia)
directa (Wallworkoppia)
dirzoius (Scapheremaeus)
discifer (Antarctozetes)
discifer (Nothrus)
discifer (Scheloribates)
discifer (Totobates)
discifera (Galumna)
discoidalis (Beckiella)
discoidalis (Licneremaeus)
discors (Topobates) (=medius)
discrepans [O. (Acrotocepheus)] duplicornutus
discrepans (Amiracarus)
discrepans (Muliercula)
discrepans (Plenotocepheus)
discrepans (Stylozetes)
discrepans (Suctobelba)
discrepans (Xenillus)
discrepans (Xenolohmannia)
discrepus [H. (Rhacaplacarus)]
discreta (Apoplophora) (=pantotrema)
discreta (Neoppia)
disiuncta (Beckiella)
disjuncta (Pararamusella)
disjuncta [M. (Pravoppia)]
disjunctus (Xenillus)
dispar (Galumna)
dispar (Hoplophthiracarus)
dispar (Machadobelba)
dispar (Oribotritia)
dispar (Orthozetes)
dispar [P. (Porallozetes)]
dispar (Rostrozetes)
dispar [H. (Tuberemaeus)]
disparilis [E. (Pocsia)]
dispariseta (Anomaloppia)
dispela (Malaconothrus)
dispersa (Hexachaetoniella)
dispersosetosa [N. (Leptosuctobelba)]
dispersus [H. (Notophthiracarus)]
dispersus (Peloribates)
dissecatus (Vilhenabates)
dissimilis (Arcoppia)
dissimilis (Galumna) (=lawrencei)
dissimilis (Hoplophorella)
dissimilis [C. (Klapperiches)]
dissimilis (Mesotritia)
dissimilis (Perlohmannia)
dissimiloides (Arcoppia)
dissonus [P. (Archiphthiracarus)]

dissonus [P. (Neophthiracarus)] (=praeoccupatus)
distenta (Epimerella)
distentus (Neseutegaeus)
distincta (Galumna) (=setigera)
distincta (Hoplophorella)
distincta (Lauroppia)
distincta (Oppiella) (=neonominata)
distincta (Oribella) (=pectinata)
distincta (Pergalumna)
distincta [C. (Triachipteria)]
distinctus (Dolicheremaeus)
distinctus (Eupelops)
distinctus (Scheloribates)
distinctus [H. (Steganacarellus)]
distinguenda (Oromurcia) (?=bicuspidata)
ditrichosus (Megeremaeus)
diutissimus [H. (Rhacaplacarus)]
divergens (Cultroribula) (=confinis)
divergens (Galumna)
divergens (Liebstadia) (=pannonica)
divergens (Oripoda)
divergens (Selenoribates)
diversa (Cultroribula)
diversa (Pergalumna) (=altera)
diversa (Pseudoceratoppia)
diversa [O. (Zygoribatula)] (=cognata)
diverseta (Haplochthonius)
diverseta [O. (Zygoribatula)]
diversiareata (Allogalumna) (=integer)
diversicostulata (Moritzoppia)
diversidactylus (Scheloribates)
diversipes [A. (Dyobelba)] (=carolinensis)
diversipilis [D. (Kunstidamaeus)]
diversipilus (Eupelops) (=plicatus)
diversiporosus [S. (Polyxylobates)]
diversiseta (Cosmochthonius) lanatus
diversiseta [T. (Paragloboppia)]
diversisetosa (Hermanniella)
diversisetosa (Hoplophorella)
diversisetosa (Hymenobelba)
diversisetosus (Xenillus)
diversosetosa [S. (Flagrosuctobelba)]
diversus [L. (Dorycranosus)] (=splendens)
diversus [D. (Epidamaeus)] tatricus ssp. inq.
diversus (Eupelops) (=subuliger)
diversus (Verachthonius)
divida (Acrotritia)
divida (Oribatula) (=interrupta)
dividipeltatus (Eremaeozetes)
divisa (Persuctobelba)
divisus (Caleremaeus) sp. inq.
dixa (Acrotritia)
djaparidzae (Ceratozetella)
djaparidzae [L. (Dorycranosus)]
djaparidzae [C. (Flexa)]
djaparidzae (Phauloppia) (=lucorum)
dkrivolutskyi (Galumna)
dlouhyi (Fijibates)
dlouhyorum (Euphthiracarus)
doderleini (Platyliodes)
dodsoni (Pergalumna)
dogmai (Cuneoppia)
doliaris (Hermannia) sp. inq.
dolosa (Hermanniella)
dolosa [E. (Neoepilohmannia)]
dolosus (Sellnickochthonius)
domahidyi (Hymenobelba)
domesticus (Cosmochthonius) (=lanatus)
dominae (Chamobates) (=cuspidatus)
dominiaki [P. (Archiphthiracarus)]
domrowi (Nanhermannia)
domrowi (Pseudopirnodus)
donacunarensis (Dolicheremaeus)
donatoi (Steganacarus) (=vernaculus)
donghaksaensis (Neogymnobates)
dongnaiensis [F. (Cosmogalumna)]
dongnaiensis (Lyroppia)
dongnaiensis (Pedrocortesella)
dongnaiensis (Sabahtritia)
donnabuangensis [H. (Protophthiracarus)]
donvictorianoensis (Sadocepheus)
doratosa (Metapyroppia)
doris (Lauroppia)
dorni (Dolicheremaeus)
dorsalis (Carabodes) tsushimaensis
dorsalis (Galumna) (?=lanceata)
dorsalis (Nanhermannia)
dorsalis (Rostrozetes) (=ovulum)
dorsatus (Neoliodes) (=theleproctus)
dorsatus (Scheloribates) (=laevigatus)
dorsofoveolatus (Malaconothrus)
doryphoros (Liacaroppia)
doryura (Zachvatkinella)
douglasensis (Passalozetes)
douhereti (Meristacarus)
douhua (Lohmannia)
doumandji [S. (Tropacarus)]
draco (Pteramerus)
draconis (Machuella)
dryas [M. (Calyptozetes)]
dubia (Dampfiella)
dubia [O. (Dzarogneta)]
dubia (Galumna) (=lanceata)
dubia (Hoplophorella)
dubia (Joelia)
dubia (Lauroppia) (=fallax)
dubia [A. (Weigmanniella)]
dubinini (Ameronothrus)
dubinini (Belba)
dubinini (Diapterobates)
dubinini (Hermanniella)
dubinini (Phthiracarus)
dubiosa (Hermanniella)
dubiosus (Trichoribates) sp. inq.
dubita [O. (Zygoribatula)] (=undulata)
dubitanda (Pergalumna)
dubius (Ceratozetes) (=mediocris)
dubius [C. (Flexa)]
dubius [E. (Pocsia)]
dubius (Sadocepheus)
dubius (Totobates)
dudichi [C. (Klapperiches)]
dudichi [B. (Kokoppia)]
dudichi [O. (Monoribatella)]
dudichi (Phthiracarus) (=boresetosus)
dudichi (Pilizetes)
duffyi (Serratoppia)
dugdalei [H. (Notophthiracarus)]
dugesi (Adrodamaeus) (=femoratus)
dungeri (Hypogeoppia)
dunlopi (Topalia)
duoaculeus (Tyrphonothrus)
duodentata (Bicyrthermannia)
duoporosa (Trichogalumna)
duoseta [P. (Triaunguis)]
duotrisetosa (Oribotritia)
duplex [P. (Archiphthiracarus)]
duplex (Eupelops) (=torulosus)
duplex (Euphthiracarus)
duplex (Galumna)
duplex (Oribotritia)
duplex (Suctobelbella) acutidens
duplicarinatus (Dolicheremaeus)
duplicata (Acrotritia)
duplicata (Beckiella)
duplicata (Pergalumna) (=ventralis)
duplicatus (Dolicheremaeus)
duplicondyla [N. (Leptosuctobelba)]
duplicornutus [O. (Acrotocepheus)]
durbanensis [P. (Triaunguis)]
durhamensis (Sphagnoppia)
durian (Otocepheus)

dusan (Microtritia) (=tropica)
dwalteri (Dolicheremaeus)
dynastes [R. (Rhynchoribatodes)]
echigoensis (Ceratotenuiala)
echinata (Camisia) (=spinifer)
echinatus (Papillacarus)
echinodiscus (Atropacarus)
echinopus (Damaeus)
echinus [H. (Notophthiracarus)]
eckeri [M. (Megazetes)]
ecphyla (Crotonia)
ecphyla [H. (Rhacaplacarus)]
ecphylus [H. (Notophthiracarus)]
ecuadorensis (Pergalumna)
ecuadoriensis (Protoribates)
ecuadorensis (Xenillus)
ecuadoriensis (Ampullobates)
ecuadoriensis (Cosmozetes)
ecuadoriensis (Eupelops)
ecuadoriensis (Gittella)
ecuadoriensis (Holonothrus)
ecuadoriensis [C. (Klapperiches)]
ecuadoriensis [R. (Rhynchoribatodes)]
edentatus (Rhynchoribates)
ecuadoriensis (Truncozetes)
edentulus (Hydrozetes)
editae (Eremobelba)
editae (Lauroppia)
eduardi (Piffliella)
eduardoi [R. (Rectoppia)]
eduardoi (Rhinoppia)
edwardensis (Halozetes)
edwardsi (Edwardzetes)
egelida [O. (Zygoribatula)]
egenus (Chamobates) sp. inq.
egregia (Galumna)
egregius [C. (Klapperiches)] (?=similis)
egregius (Malaconothrus) (=monodactylus)
egregius [P. (Neophthiracarus)]
egyptica (Lohmannia) (=paradoxa)
eharai (Eremobelba)
eichhornia (Hydrozetes) sp. inq.
eichhornicus [M. (Trimalaconothrus)]
eidikoterai (Torpacarus)
ejuncida (Acrotritia)
ekaterinae [F. (Cosmogalumna)]
ekaterinae (Pergalumna)
ekaterinae (Trichogalumna)
eksteeni (Annectacarus)
eksteeni (Indotritia)
ektactesi (Congocepheus)
elamellata (Fortuynia)
elamellata [D. (Rykella)]
elastica (Mesotritia) (=nuda)
elatus (Totobates)
elchacoensis [A. (Paradyobelba)]
elconsuleoensis [H. (Protophthiracarus)]
elegans (Achipteria) sp. inq.
elegans (Austrocarabodes)
elegans (Bipassalozetes)
elegans (Cryptoppia) (=mahunkai)
elegans (Eremulus)
elegans (Fissicepheus)
elegans (Ghilarovus)
elegans (Hypochthonius)
elegans [L. (Incabates)]
elegans (Oppia) sp. inq.
elegans (Pheroliodes)
elegans (Pulchroppia)
elegans (Scheloribates)
elegans (Selenoribates)
elegans (Sphaerochthonius) (=gemma)
elegans (Sumatrotritia)
elegans (Synchthonius)
elegans (Tectocepheus) velatus
elegans (Torpacarus)
elegans (Totobates)
elegans [M. (Trimalaconothrus)]
elegantis [D. (Epidamaeus)]
elegantissima (Nanhermannia)
elegantissima (Oribatula)
elegantissima (Parasuctobelba)
elegantula [S. (Flagrosuctobelba)]
elegantula (Galumna)
elegantula (Lanceoppia)
elegantula (Mesotritia)
elegantula (Nanhermannia)
elegantula (Oribatula) sp. inq.
elegantulus (Austrodamaeus)
elegantulus [S. (Bischeloribates)]
elevatus (Gibbicepheus)
elevatus (Sadocepheus)
elifae (Rhinoppia)
elimata (Galumna)
elisabethae (Dolicheremaeus)
elisabethae [A. (Parabelbella)]
elisabethae (Sellnickochthonius)
elisae (Ethiovertex)
elisae (Subbelba)
elizabethae (Suctobelbata)
elizabethiensis [H. (Notophthiracarus)]
elliptica [R. (Insculptoppia)]
ellipticus (Nothrus) sp. inq.
elmela [R. (Insculptoppia)]
elongata (Beckiella)
elongata (Cryptoppia)
elongata (Cultroribula)
elongata (Dometorina)
elongata (Epilohmannia) (=minuta)
elongata [L. (Incabates)]
elongata [R. (Insculptoppiella)]
elongata (Liebstadia) (=mongolica)
elongata (Oppia) sp. inq.
elongata (Oripoda)
elongata (Pergalumna)
elongata [S. (Porokalumma)]
elongata (Protoripoda) sp. inq.
elongata [O. (Zygoribatula)] (=lata)
elongatiporosa (Pergalumna)
elongatissima (Nannerlia)
elongatissimus (Ceratozetes) (?=lagrecai)
elongatus (Dolicheremaeus) Aoki, 67
elongatus (Dolicheremaeus) Bal., 68 *(=repetitus)*
elongatus (Edwardzetes)
elongatus (Eueremaeus)
elongatus (Hammerabates)
elongatus (Hemileius) (=eperezinigoae)
elongatus (Micreremus)
elongatus (Neoliodes)
elongatus (Neoribates)
elongatus (Odontocepheus)
elongatus (Papillacarus)
elongatus (Paralopheremaeus) (=legendrei)
elongatus [S. (Perscheloribates)] (=monodactylus)
elongatus (Pilobates) (?=carpetanus)
elongatus (Proteremaeus)
elongatus (Scheloribates)
elongatus (Thamnacarus)
elongatus [H. (Urubambates)]
elsi [M. (Parplophora)]
elsi (Scheloribates)
elsosneadensis (Sellnickochthonius)
elsosneadensis (Williamszetes)
emarginata [R. (Paramedioppia)]
emarginata (Pergalumna)
emarginatus (Scapheremaeus)
embeyisztini (Licneremaeus)
embrionalis (Lohmannia)
emeiensis [O. (Hexatocepheus)]
emeiensis (Liacarus)
emeryi (Microzetorchestes)
emmae (Phyllozetes)

encantadae (Heptacarus)
endroedyi [P. (Archiphthiracarus)]
endroedyi (Limnozetella)
endroedyi (Paraphauloppia)
endroedyi [O. (Zygoribatula)]
endroedyyoungai [H. (Notophthiracarus)]
endroedyyoungai (Totobates)
endroedyyoungai (Zeasuctobelba)
engelbrechti (Austrotritia)
engelbrechti [T. (Cristonothrus)]
engelbrechti (Demisalto)
engelbrechti (Eupelops)
engelbrechti (Galumna) Mah., 1997
engelbrechti (Galumna) B. *et* P. B., 2002 *(=discoidalis)*
engelbrechti (Hoplophorella)
engelbrechti (Lamellobates)
engelbrechti [C. (Magoebazetes)]
engelbrechti (Microlamellarea)
engelbrechti (Nothrus)
engelbrechti [H. (Phyllhermannia)]
engelmanni (Multioppia)
enghoffi (Arcoppia) arcualis
enigma (Novazelandiella)
enigmaticus [H. (Besuchetacarus)]
ennarpi (Lepidacarus)
enodis (Ceratozetes)
enoplura (Jacotella)
enricoi (Pergalumna)
ensifer (Austrocarabodes)
ensifer [T. (Cristonothrus)]
ensifer (Exoribatula)
ensifer (Gibbicepheus) sp. inq.
ensifer (Liochthonius) (=furcillatus)
ensifer (Phylacozetes)
ensifer (Protoribotritia)
ensifera (Eremella)
ensifera (Hoplophorella)
eoeryi (Zachvatkinibates)
eparmatos [H. (Notophthiracarus)]
eperezinigoae (Hemileius)
eperezinigoae (Licnodamaeus)
ephippiata (Galumna) sp. inq.
ephippiatus (Trichoribates) sp. inq.
ephippiger [H. (Kakophthiracarus)]
ephippiger (Eremaeozetes)
epidamaeiformis (Allobelba)
epilata (Rhinoppia)
epimeralis (Protoribates)
epiphytos (Zachvatkinibates)
eques (Neoliodes) sp. inq.
equestris (Zetorchestes)
equisetosus [H. (Protophthiracarus)]
erabuensis (Trichotocepheus)
erbanensis (Xenillus)
erectus [A. (Austroflexa)]
erectus (Carabodes)
erectus (Idiozetes)
erectus (Neoribates)
eremaeozetoides (Pasocepheus)
eremitus (Exochocepheus)
eremuloides [C. (Berndamerus)]
erfenisdamensis (Licnodamaeolus)
ericius [M. (Neobelba)]
erimo (Zachvatkinibates)
erinaceum [H. (Calyptophthiracarus)] (=olivaceus)
erinaceus (Eupelops)
ermani [R. (Insculptoppia)]
ermilovi (Aleurodamaeus)
ermilovi (Unguizetes)
erosus (Sellnickochthonius) (=immaculatus)
errinundrae [H. (Phyllhermannia)]
erupentus (Ceratozetes)
erzurumensis [Q. (Coronoquadroppia)]
escobari (Hydrozetes)
escotata (Moritzoppia)
espatulatus (Odontocepheus)
espeletiae [L. (Procorynetes)]
espeletiae [H. (Protophthiracarus)]
espeletiae [S. (Reductoppia)]
espeletiarum [N. (Ameriglobopppia)]
espinarensis (Nothrus)
esposi (Eremobelba)
espozi (Oxyoppia) (=spinosa)
esulcatus (Epilohmannoides)
ethiopica (Bursoplophora)
ethiopica (Microtritia) (=tropica)
ethiopicus [H. (Notophthiracarus)]
ethiopicus [S. (Perscheloribates)]
etruscus [P. (Oribellopsis)]
euaensis (Cryptoribatula)
euaensis (Dampfiella)
euaensis (Dolicheremaeus)
euaensis (Galumna)
eucalla [O. (Zygoribatula)] (=interrupta)
eucalyptus (Haplochthonius)
eugenius (Scapheremaeus)
eungella (Crotonia)
eupalineus [P. (Archiphthiracarus)]
eupectinata (Ctenoppia)
euramosa (Brachioppia)
eurhostus (Opsioristes)
europaea (Allosuctobelba) (=grandis)
europaea (Galumna)
europaea [S. (Lalmoppia)]
europaea (Suctobelbila) dentata
europaeus (Hypochthonius) rufulus
europaeus [P. (Peloribatodes)]
europaeus (Trhypochthonius) silvestris
eurycuspis (Hafenrefferia)
eusebioi (Dolicheremaeus)
eusetosa [H. (Phyllhermannia)]
eusetosus (Scheloribates)
euthemellus (Scapheremaeus)
euthricha [O. (Monoribatella)]
evanescens [S. (Perscheloribates)]
evansi (Africoribates)
evansi (Belloppia)
evansi (Liochthonius)
evansi (Scutovertex)
eveana (Mongaillardia)
evergladus (Hoplophorella)
evexa [H. (Mantigueracarus)]
evexus (Euphthiracarus)
evexus [H. (Notophthiracarus)]
evidens [H. (Heterohermannia)]
ewani (Scapheremaeus)
ewingi (Allodamaeus)
ewingi [L. (Convergoppia)]
ewingi (Oppia) sp. inq.
ewingi (Oribatella)
ewingi (Phthiracarus) (=japonicus)
ewingi (Scheloribates)
ewingi (Steganacarus)
ewingi [C. (Triachipteria)]
exacuta (Hoplophorella)
exaggeratus [H. (Capillonothrus)]
exarata [O. (Zygoribatula)]
exastus (Ophidiotrichus)
excavata (Oripoda)
excavata (Pedrocortesella)
excavata (Suctobelbila)
excavata [O. (Zygoribatula)]
excavatus (Benoibates)
excavatus (Cavernozetes)
excavatus (Machadocepheus)
excavatus (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
excavatus [S. (Tropacarus)]
excellens [H. (Austrophthiracarus)]
excellens [C. (Klapperiches)]
excellens (Scriptoripoda)
excellens (Setogalumna)
excelsior (Eurhynchoribates)

excelsus [O. (Acrotocepheus)]
excisa (Camisia) (=segnis)
excisa (Hammerella)
excisa (Multioppia) (=neglecta)
exclamationis (Hymenobelba)
excrescens (Brachioppia)
excultus (Euphthiracarus)
exempta (Hypogeoppia)
exigua (Allogalumna)
exigua (Galumna)
exigua (Graptoppia)
exigua (Subiasella)
exigualis (Mycobates)
exiguoareata (Galumna) (=lanceata)
exiguus (Scheloribates)
exilicornis (Oribatella)
exilior (Nothrus) silvestris ssp. inq.
exilior [A. (Dyobelba)]
exilior (Scheloribates) (?=minifimbriatus)
exilis (Hermannia) sp. inq.
exilis (Mixacarus)
exilis (Oribotritia)
exilis [O. (Zygoribatula)]
eximia [H. (Rhacaplacarus)]
eximius (Eupelops)
exobothridialis (Banksinoma)
exobothridialis (Melanozetes)
exobothridialis [H. (Phyllhermannia)]
exobothridialis (Rhinoppia)
exornata [H. (Phyllhermannia)]
exornatus (Licneremaeus)
exornatus (Patagonozetes)
expansa [Q. (Coronoquadroppia)]
expansum (Joboppia)
expansus (Megeremaeus)
expansus [H. (Capillonothrus)] (=skottsbergi)
expansus (Tectocepheus) (=sarekensis)
expolitus (Liochthonius) (?=sellnicki)
exsertus (Tectodamaeus)
exspinosus (Tectodamaeus)
exsudans (Oribatula)
extensa (Oribatella)
externus (Liacarus)
extraneus (Adoristes) ovatus
extraordinarius [H. (Notophthiracarus)]
extrema [N. (Ameriglobopppia)]
extrema (Congoppia) (=deboissezoni)
extrema (Granuloppia)
extrema (Masthermannia)
extrema (Subiasella)
extremodentata [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)
extrudens (Berniniella)
extrusa (Neoamerioppia)
exuvialis (Camisia) (=biurus)
ezoensis (Nothrus)
ezoensis (Punctoribates)
ezzati (Bicyrthermannia)
fabulosus [R. (Parhynchoribates)]
facetus [H. (Protophthiracarus)]
facula (Diapterobates) (=humeralis)
facundoi (Mixacarus)
faeroensis (Maerkelotritia) (=cryptopa)
fageti [D. (Spatiodamaeus)]
falcata (Cultroribula) (=bicultrata)
falcata (Lauroppia)
falcata (Pachygena)
falcata (Suctobelbella) (=longicuspis)
falcatus (Austrocarabodes)
falcatus (Carabodes)
falcatus [P. (Metaphthiracarus)] (=setosus)
falcidactylus (Thasecazetes)
falciformis [P. (Archiphthiracarus)]
falklandica [H. (Phyllhermannia)]
fallax (Lauroppia)
fallax (Ramsayellus) sp. inq.
fallax [P. (Triaunguis)] (=obtusus)
falxa (Drepanoppia)
falzonii (Zetorchestes) (=micronychus)
fanzagoi [C. (Triachipteria)]
farinosa (Tokukobelba) (=compta)
farinosus (Eupelops) (?=hirtus)
farinosus (Poroliodes)
farsi [R. (Insculptoppia)]
fasciata [R. (Rectoppia)]
fasciatus (Gephyrazetes)
fastigata (Pergalumna)
fatidicus [H. (Notophthiracarus)]
faviger (Micreremus)
fayoumensis (Pilogalumna) ornatula
fazendae (Xenillus)
fecundus [H. (Notophthiracarus)]
fecundus [A. (Rafacarus)]
fecundus (Xenillus)
feideri (Acaroceras)
feideri [H. (Austrophthiracarus)] (=australianicus)
feideri [L. (Bicristoppia)]
feideri (Conoppia) (=palmicincta)
feideri (Lauroppia)
feideri (Lucoppia)
feideri [H. (Notophthiracarus)]
feideri (Phthiracarus) (=zicmani)
feideri (Scheloribates)
femoralis (Carabodes)
femoralis (Neoliodes) (=striatus)
femoralis (Scheloribates) (=latipes)
femoratus (Adrodamaeus)
femoratus (Scheloribates)
femoroserrata (Muliercula)
femurgibbus (Tectodamaeus)
fenestralis (Arcoppia)
fenestralis (Austrocarabodes)
fenestrata (Ctenobelba) (=pectinigera)
fenestrata (Magyaria)
fenestratus [A. (Austroflexa)]
fenicheli [E. (Trischeloribates)]
fenneri (Nanhermannia)
fennica (Oribotritia)
fernandezi (Retrozetes)
fernandoi (Xenillus)
ferox (Maorizetes)
ferrugineus (Phthiracarus)
ferrumequina [Q. (Coronoquadroppia)] (?=circumita)
festoneata (Hypogeoppia) (=terricola)
feuerborni (Limnozetes)
figuratus (Ceratozetes) (=enodis)
figuratus (Eueremaeus) (=oblongus)
fijiensis (Arcoppia) corniculifera
fijiensis (Dolicheremaeus)
fijiensis (Galumna)
fijiensis (Parasuctobelba)
fijiensis (Scheloribates)
fijiensis (Tyrphonothrus) crassisetosus
filamentosa (Ramusella)
filaris [H. (Phthirarica)]
filata [A. (Acrogalumna)] (=longipluma)
filifera (Pergalumna)
filiferus (Machadocepheus)
filiferus [P. (Metaphthiracarus)] (=setosus)
filiferus (Rhopalozetes)
filiformis (Apoplophora)
filiformis [P. (Archiphthiracarus)]
filiformis [H. (Calyptophthiracarus)]
filiformis (Parapyroppia)
filiformis (Pergalumna)
filiger (Allogalumna)
filigera (Ramusella)
filipina (Ceratoppia)
filipina [H. (Phyllhermannia)]
filipina (Sulcoribula)
filipinus (Dolicheremaeus)
filipinus [H. (Philoribates)]
filipinus (Trachyoribates)

filippovae [M. (Neobelba)]
filosus (Sacculozetes)
fimbriata [T. (Teratoppiella)]
fimbriatissimus (Liochthonius)
fimbriatoides (Scheloribates)
fimbriatus (Liochthonius) Jac., 36
fimbriatus (Liochthonius) Ham., 58 *(=fimbriatissimus)*
fimbriatus [M. (Megazetes)]
fimbriatus (Scapheremaeus)
fimbriatus (Scheloribates)
finitima (Hoplophorella)
finlandica (Austrotritia)
finlayi (Kuklosuctobelba)
finnamorei (Pergalumna)
fiorii (Joelia)
firmus (Damaeus)
firthensis (Sphaerozetes)
fischeri (Camisia) (=biverrucata)
fisheri (Scapheremaeus)
fissurata (Austrotritia)
fissurata (Banksinoma) (=spinifera)
fissurata (Berniniella)
fissurata (Lauroppia) (=maritima)
fissurata (Microtritia)
fissurata (Sternoppia)
fissurata (Suctobelbila)
fissuratus [L. (Dorycranosus)] (=nitidus)
fissuratus (Licnodamaeus)
fissuratus (Mucrobates)
fissuratus (Neoribates) (=pterotus)
fissuratus [S. (Perscheloribates)]
fissuratus [H. (Tuberemaeus)]
fixa (Moritzoppia) (=unicarinata)
fjellbergi (Ceratozetella)
flabella [S. (Flagrosuctobelba)]
flabellatus (Hardybodes)
flabellatus (Licnozetes)
flabellifer (Austrocarabodes)
flabellifera (Galumna)
flabellifera (Suctobelbella) sp. inq.
flabelliger (Mycobates)
flabrarius (Zetorchestes)
flagellaris (Eremobelba) (=gracilior)
flagellaris [R. (Insculptoppiella)]
flagellata (Arcoppia)
flagellata (Belba)
flagellata (Camisia)
flagellata (Crotonia)
flagellata (Galumna)
flagellata (Gittella)
flagellata (Hauseroplophora)
flagellata (Mesotrtia) (=maerkeli)
flagellata (Neoamerioppia)
flagellata (Nothrolohmannia)
flagellata (Oribatella)
flagellata [A. (Parabelbella)]
flagellata (Paroppia)
flagellata (Protoripoda)
flagellata [A. (Rhaphigneta)]
flagellata [S. (Ussuribata)]
flagellatissima (Hymenobelba)
flagellatissima (Persuctobelba)
flagellatissimus [S. (Tropacarus)]
flagellatus [P. (Archiphthiracarus)]
flagellatus (Austronothrus)
flagellatus (Brazilozetes)
flagellatus (Ctenamerus)
flagellatus [D. (Epidamaeus)]
flagellatus (Euphthiracarus)
flagellatus [P. (Neophthiracarus)] (=shiptoni)
flagellatus [H. (Notophthiracarus)] Niedb., 2004
flagellatus [H. (Notophthiracarus)] Liu *et* OCon., 2014
flagellatus (Novonothrus)
flagellatus (Pseudotocepheus)
flagellatus (Scheloribates)
flagellatus (Solenozetes)
flagellatus [H. (Urubambates)]
flagelliapex (Neoamerioppia)
flagellifer (Benoibates)
flagellifer (Carabodes)
flagellifer (Damaeus)
flagellifer (Epilohmannia)
flagellifer (Eremulus)
flagellifer (Heteroleius)
flagellifer (Nippobodes)
flagellifer (Leptotocepheus)
flagellifer [L. (Magnobates)]
flagellifer [M. (Megazetes)]
flagellifer (Microzetes) (=singaporensis)
flagellifer (Mikizetes)
flagellifer (Solenozetes)
flagellifera [S. (Flagrosuctobelba)]
flagellifera (Pergalumna) (=cribriger)
flagellifera (Taiwanoppia)
flagelliformis (Mesotritia)
flagelliformis (Trimalaconthrus)
flagelliseta (Hermannobates)
flagelliseta [M. (Neobelba)]
flagelliseta (Suctobelba)
flagellisetosus (Scheloribates)
flagelloides (Austrotritia) lebronneci ssp. inq.
flagelloides [D. (Epidamaeus)]
flagellum (Nothrus)
flagellum Neoribates
flagrus [H. (Notophthiracarus)]
flaheyi (Autogneta)
flamiferus (Scapheremaeus)
flammeisetosa (Belba)
flammeus (Liacarus)
flammula (Oribatella) (?=quadricornuta)
flatus (Mochlozetes)
flavida [M. (Parplophora)]
flavipes (Banksinoma) (?=lanceolata)
flavus (Euphthiracarus)
flavus (Eupterotegaeus)
flavus (Rostrozetes) (=ovulum)
flechtmanni [L. (Brasiloppia)]
flechtmanni (Humerobates)
flexiloquus [H. (Notophthiracarus)]
flexipilus [P. (Archiphthiracarus)]
flexisetosa (Hymenobelba)
flexisetosus (Phthiracarus) (=longulus)
flexispinosus [D. (Epidamaeus)]
flexuosa (Epilohmannia)
flexuosa (Eremobelba)
flexus [D. (Epidamaeus)]
floccosus [D. (Epidamaeus)]
floralis (Pseudoamerioppia)
florens (Aokiella)
florens (Cyrthermannia)
florens (Dometorina)
florens (Micreremus)
florens (Rostrozetes)
floresiana (Parachipteria)
floresianus (Melanozetes) (=azoricus)
floridae (Fuscozetes) sp. inq.
floridae (Hoplophorella) (=hamata)
floridae (Litoribates)
floridae (Notogalumna)
floridana (Aeroppia) sp. inq.
floridana (Mochloribatula)
floridana [O. Zygoribatula)]
floridanus [N. (Parakalumma)] robustus
floridensis [L. (Dorycranosus)] sp. inq.
floridensis (Neoliodes) sp. inq.
floridensis (Peloribates)
floridus (Afrolelius)
floridus (Carabodes)
floridus [G. (Diplobodes)]
floridus [D. (Epidamaeus)]
florisbadensis [R. (Insculptoppia)]
flumengalei [A. (Conchogneta)]

fluviatilis [H. (Capillonothrus)]
foaensis (Hoplophorella)
foliaceisetus (Austrocarabodes)
foliaceus (Caveremulus)
foliata (Basilobelba)
foliata (Bicyrthermannia)
foliata (Corynoppia)
foliata (Ctenobelba)
foliata (Dampfiella)
foliata (Eremobelba)
foliata (Machadobelba)
foliata (Oribatella)
foliata [H. (Phyllhermannia)]
foliatifer (Sellnickochthonius)
foliatoides (Corynoppia)
foliatus (Carabodes) (=chirstlus)
foliatus (Cosmochthonius)
foliatus [T. (Cristonothrus)]
foliatus (Cymbaeremaeus)
foliatus (Haplacarus)
foliatus (Holonothrus)
foliatus (Javacarus)
foliatus [P. (Millotacarus)] Mond. *et* Chakr., 82
foliatus [P. (Millotacarus)] Sark. *et* Sub., 84 *(=sarbias)*
foliatus (Scutoribates)
foliatus (Sellnickochthonius)
foliatus (Suctoribates)
foliatus (Torpacarus)
foliifer [M. (Phyllolohmannia)]
foliisetus (Ctenacarus)
foliosa (Striatoppia)
foliosa [S. (Ussuribata)]
foliosus (Cepheus) sp. inq.
folious (Steganacarus)
folium [D. (Epidamaeus)]
fonseciai (Hoplophorella)
fonticula (Suctobelbila)
foraminiferus (Neoribates)
forceps (Lamellarea)
forceps (Schalleria)
forceps (Xenillus)
fordi (Galumna)
forficula (Paenoppia)
formica (Damaeus) sp. inq.
formicaria (Pergalumna)
formosa (Berniniella)
formosa (Moritzoppia) (=unicarinata)
formosana [M. (Hammeroppia)]
formosana (Heterobelba) stellifera
formosana [N. (Nippohermannia)]
formosana (Quinquoppia)
formosanus [H. (Tuberemaeus)]
formosus (Peloribates)
formosus (Rugocepheus)
formosus (Sellnickochthonius)
formosus (Trichoribates)
fornerisae (Ceratobates)
fornicarius [H. (Notophthiracarus)]
fornicatus (Megalotocepheus)
foroliviensis (Damaeus) sp. inq.
forsslundi [P. (Archiphthiracarus)]
forsslundi (Carabodes) (=ornatus)
forsslundi (Eupelops)
forsslundi [S. (Flagrosuctobelba)]
forsslundi (Liochthonius) Ham., 52
forsslundi (Liochthonius) Mah., 69 *(=evansi)*
forsslundi (Nanhermannia)
forsslundi [P. (Oribellopsis)]
forsslundi (Provertex)
forsslundi (Tripiloppia)
forsteri (Luxtoneremaeus)
forsteri [H. (Phyllhermannia)]
fortdauphini (Bovicarabodes)
fortis (Setoppia)
fortisensillus [D. (Epidamaeus)]
fortispinosus [D. (Epidamaeus)]
fortispinosus [T. (Laminizetes)]
fossalis [M. (Dicondyla)]
fossatus (Carabodes) sp. inq.
fossatus [H. (Platynothrus)] sp. inq.
fossatus (Scutovertex)
fossulatus (Eueremaeus) (=quadrilamellatus)
fournieri [H. (Bornemiszaella)]
foveiventris (Selenoribates)
foveolata [G. (Apograptoppia)]
foveolata (Baloghiella)
foveolata (Beckiella)
foveolata (Brachyoripoda)
foveolata (Camisia)
foveolata [Q. (Coronoquadroppia)]
foveolata (Ctenobelba)
foveolata (Epilohmannia)
foveolata (Foveolatoppia)
foveolata (Neoamerioppia)
foveolata (Notogalumna)
foveolata [N. (Perezinigokalumma)]
foveolata (Pergalumna)
foveolata [H. (Phyllhermannia)]
foveolata (Sabahtritia)
foveolata [K. (Stakarenoppia)]
foveolatus (Allonothrus)
foveolatus [P. (Archiphthiracarus)] (=pygmaeus)
foveolatus (Berlesezetes)
foveolatus (Cosmochthonius)
foveolatus (Dendroeremaeus)
foveolatus [G. (Diplobodes)]
foveolatus (Eremulus)
foveolatus (Eueremaeus)
foveolatus (Eupelops)
foveolatus (Euphthiracarus) cribrarius
foveolatus (Hispanozetes)
foveolatus (Hoplophthiracarus) Aoki, 80
foveolatus (Hoplophthiracarus) L., W. *et* C., 11
foveolatus (Limnozetes) (=ciliatus)
foveolatus (Microtegeus)
foveolatus (Mixacarus) exilis
foveolatus [H. (Monoschelobates)]
foveolatus (Peloptulus)
foveolatus (Plasmobates)
foveolatus (Podoribates)
foveolatus (Pseudotocepheus)
foveolatus (Rostrozetes) (=ovulum)
foveolatus (Scapheremaeus)
foveolatus (Scutoribates)
foveolatus (Setoxylobates)
foveolatus (Spinotocepheus)
foveolatus (Torpacarus)
foveolatus [M. (Trimalaconothrus)]
foveoreticulatus [H. (Austrophthiracarus)]
fraenzlei (Paraphauloppia)
fragilis (Humerobates)
fragilis [D. (Kunstidamaeus)]
fragilis (Parasuctobelba)
fragilis (Peloribates)
francisi (Zetomimus)
franconia (Eupelops) hirtus ssp. inq.
frankeae (Caucasiozetes)
franklinensis (Oribatula)
franzi (Cerachipteria)
franzi (Fernandocepheus)
franzi (Nooliodes)
franzi (Sadocepheus)
frater (Pergalumna)
frater [H. (Rhacaplacarus)]
fratercula (Beckiella)
fraterculus (Gymnobodes)
fraterculus [D. (Kunstidamaeus)]
fraternalis (Gredosella)
fraternus [P. (Archiphthiracarus)]
freestatensis (Valbehanella)
frequens (Cymbaeremaeus) (=cymba)
friedrichi (Aeroppia)

frigida (Tripiloppia)
frigidus (Scheloribates) (=latipes)
frisiae [O. (Zygoribatula)]
frogneri (Mesoplophora)
frondeus (Hoplophorella) Niedb., 03
frondeus (Hoplophorella) Niedb., 04 *(=prodorsocristata)*
frondeus (Jacotella)
frondeus [H. (Steganacarellus)]
frondifer (Gehypochthonius)
frondosa (Cosmohermannia)
frondosa (Suctobelbella)
frondosus (Gibbicepheus)
frontatus (Epieremulus)
frontinalis [L. (Dorycranosus)]
frothinghami (Suctobelbella)
frouini (Lineoppia)
fucicolum (Ameronothrus) (?=marinus)
fueginus (Eutegaeus)
fuentesi (Sellnickochthonius)
fuerteventurae (Eupelops) claviger
fuerteventurae (Subbelba) elisae
fujianensis [P. (Archiphthiracarus)]
fujianensis (Hoplophthiracarus)
fujianensis (Taiwanoppia)
fujikawae (Dolicheremaeus)
fujikawae [D. (Epidamaeus)]
fujikawae (Oribella)
fujikawae (Truncopes)
fujinitaensis (Trhypochthonius) tectorum
fukushiraensis (Hypochthoniella)
fuligineus (Eupelops) (=plicatus)
fulvus (Euphthiracarus)
fulvus (Halozetes)
fulvus (Neoribates)
fulvus [H. (Notophthiracarus)]
fumigatus (Trichoribates) sp. inq.
fumotoensis (Peloribates)
funafutiensis (Neoliodes) sp. inq.
fungifer [H. (Phyllhermannia)]
fungifer (Sphaerochthonius)
fungisetosus (Scapheremaeus)
fungorum (Humerobates) (?=rostrolamellatus)
funnagasatoensis (Eremella)
furca (Acrotritia) dikra
furcata (Acrotritia)
furcata (Camisia) (=biurus)
furcata [M. (Furculoppia)]
furcata (Heterobelba)
furcata (Hoplophorella)
furcata [R. (Insculptoppia)]
furcata (Sabahtritia)
furcatus (Acaroceras)
furcatus (Cavernocepheus)
furcatus (Dolicheremaeus)
furcatus (Lamellobates)
furcatus [P. (Neophthiracarus)] sp. inq.
furcatus [H. (Platynothrus)] (=banksi)
furcatus (Sellnickochthonius)
furcatus (Tectodamaeus)
furcatus (Trichoribates)
furcatus (Zetomimus)
furcillata (Furcoribula)
furcillatus (Dolicheremaeus)
furcillatus (Liochthonius)
furcula (Dolicheremaeus)
furtadoi (Laluritzenia)
furugelma (Multioppia)
furvus [P. (Archiphthiracarus)]
fusa (Indotritia)
fusa (Microtritia)
fusca (Gymnodampia)
fusca (Pedrocortesella)
fusca (Pergalumna) Berl., 16
fusca (Pergalumna) Mih., 56 *(=myrmophila)*
fusca [O. (Zygoribatula)]
fuscata (Galumna) sp. inq.
fuscipes (Fuscozetes)
fuscomaculatus (Scheloribates) (=laevigatus)
fuscosensillus (Scheloribates)
fuscosetosus (Peloribates)
fuscus (Liacarus) (=xylariae)
fuscus (Umbellozetes)
fusifer (Cavernocepheus)
fusifer (Gustavia)
fusifer [I. (Haplozetes)]
fusifer (Xenillus)
fusiformis (Antarctozetes)
fusiformis [L. (Dorycranosus)]
fusiformis (Eupelops)
fusiformis [R. (Insculptoppia)]
fusiformis (Maerkelotritia)
fusiformis [H. (Notophthiracarus)]
fusiformis [M. (Parplophora)]
fusiformis (Tenuialoides)
fusiger (Brazilozetes)
fusiger (Cerachipteria) (=digita)
fusiger (Ceratozetes) (=gracilis)
fusiger (Eupelops) (=plicatus)
fusiger (Fusozetes)
fusiger (Minunthozetes) (=semirufus)
fusigera (Galumna) (=setigera)
fusisetosa (Cubaoppia)
fusticula [H. (Mantigueracarus)]
fusticulus (Euphthiracarus)
fusticulus [H. (Notophthiracarus)]
fusula (Hoplophorella)
fusuligera (Fusuloppia)
fusulus (Euphthiracarus)
gabonensis (Congocepheus)
gadubanudi (Crotonia)
galaica [Q. (Coronoquadroppia)]
galaicus (Ocesobates)
galapagensis (Torpacarus) omittens
galapagoensis (Acaroceras)
galapagoensis (Alismobates)
galba (Liochthonius)
galeata (Hoplophorella) (=subsellata)
galeodula (Beklemishevia)
galerulata (Heterobelba)
gallardoi (Liebstadia)
gallonae (Solenozetes)
galula [O. (Zygoribatula)]
gambelaensis (Galumna)
gammatus (Liacarus)
gaoligongensis (Cubachipteria)
gapsaensis (Multioppia)
gapudi (Dolicheremaeus)
gapudi (Meristacarus)
garciai (Beckiella)
garciai (Dolicheremaeus)
garciai (Papuacepheus)
gaussi (Ceratozetes)
gaveae (Mesoplophora)
gebennicus (Belorchestes)
gedaii [A. (Acrogalumna)]
gelasinus (Xenillus)
geminata (Oribotritia)
geminatus (Papuacepheus)
geminatus (Pseudotocepheus)
geminosetosus (Rostrozetes)
geminus (Chamobates)
geminus [T. (Cristonothrus)]
geminus (Dolicheremaeus)
geminus (Eupelops)
geminus (Separachipteria)
gemma (Sphaerochthonius) sp. inq.
gemmula (Ceratozetes)
genavensis (Atropacarus)
genavensis (Lamellocepheus)
genavensis [Z. (Protozetomimus)]
genavensium [O. (Aciculoppia)]
genavensium (Bursoplophora)

genavensium (Carinogalumna)
genavensium (Eurhynchoribates)
genavensium (Peloribates)
geneuxi (Rostrozetes) (=ovulum)
geniculata (Phauloppia) (?=lucorum)
geniculosus [D. (Adamaeus)] (=onustus)
genitalis (Dolicheremaeus)
genitalis [P. (Triaunguis)]
geographica (Eremobelba)
geographica (Galumnella)
geometrica [N. (Leptosuctobelba)]
geometricus (Epieremulus)
geonjiensis (Protoribates)
georgensis (Rhopalozetes)
georgiae (Pseudantarcticola)
georgiae (Sandenia)
georgica [C. (Triachipteria)] (=patavina)
georgiensis (Austrocarabodes) foliaceisetus
georgii (Dolicheremaeus)
gephyrus (Liacarus)
gerdi [M. (Safrobates)]
gerdweigmanni [G. (Kalloia)]
gerdweigmanni (Oribatella)
germaineae (Neotrichozetes) spinulosus
germani (Congocepheus)
germanicus [T. (Latilamellobates)] (=incisellus)
germanicus (Parhypochthonius) (=aphidinus)
gessneri (Phauloppia) (=rauschenensis)
getica (Lauroppia)
gevi (Damaeus)
ghanensis (Allonothrus) (=hirtus)
ghanensis (Dolicheremaeus) magnus
ghanensis (Granuloppia)
ghanensis (Teleioliodes)
gharbiensis (Galumna)
ghardaqensis (Selenoribates)
ghilarovi (Punctoribates)
ghilarovi [L. (Dorycranosus)] (=acutus)
ghiljarovi (Multioppia)
gibba (Austrotritia)
gibba (Globoppia)
gibba (Hermannia)
gibba (Hoplophorella)
gibba [M. (Parplophora)] (=leviseta)
gibber [P. (Archiphthiracarus)]
gibber [N. (Confinoppia)]
gibber (Hermanniella)
gibbera (Maerkelotritia) (=cryptopa)
gibbiceps (Carabodes)
gibbofemoratus [D. (Epidamaeus)]
gibbosa (Lasiobelba)
gibbula (Galumna)
gibbus (Adrodamaeus) (=femoratus)
gibbus (Aleurodamaeus) (=setosus)
gibbus (Eupelops)
gibbus (Heterochthonius)
gibbus (Peloptulus)
gibbus (Scapheremaeus)
gigantea (Achipteria)
gigantea (Allosuctobelba)
gigantea [P. (Apolohmannia)]
gigantea (Austrachipteria)
gigantea (Basilobelba)
gigantea (Collohmannia)
gigantea (Epilohmannia)
gigantea [H. (Heterohermannia) (=scabra)
gigantea (Metapyroppia)
gigantea (Oribatella) sp. inq.
giganteus (Galumnopsis)
giganteus [S. (Grandjeanobates)]
giganteus (Humerobates) rostrolamellatus
giganteus (Trichoribates) latincisus
giganteus (Vilhenabates)
giganticus (Allonothrus)
giganticus (Dolicheremaeus)
gigas (Oribotritia)
gigas [H. (Phyllhermannia)]
gildersleeveae (Joshuella)
gilmartinoi (Multioppia)
gilva (Arcoppia) (=tripartita)
gilvipes (Hafenrefferia)
gilvulus (Hemileius) (?=initialis)
gilyarovi [D. (Epidamaeus)]
ginchiensis [R. (Rectoppia)]
gisini (Liochthonius)
gitteae (Cryptoribatula) (=euaensis)
giustii (Licneremaeus)
glaber (Berlesezetes)
glaber [H. (Capillonothrus)]
glaber [L. (Dorycranosus)] (=nitidus)
glaber (Eobrachychthonius) (=latior)
glaber (Eupelops) (?=subexutus)
glaber (Gymnobates)
glaber [I. (Haplozetes)]
glaber (Hemileius)
glaber (Nooliodes)
glaber (Peloribates)
glaber (Podoribates)
glaber (Scapheremaeus)
glaber (Scutovertex) (=sculptus)
glaber (Tyrphonothrus)
glabra (Brachioppia)
glabra (Galumna)
glabra (Jacotella)
glabra (Lauritzenia)
glabra (Mesotritia)
glabra (Multioppia)
glabra (Phauloppiella)
glabra [H. (Phyllhermannia)] (=dentata)
glabra (Subphauloppia)
glabra [O. (Zygoribatula)]
glabrata (Austrotritia)
glabrata (Mestotritia) sp. inq.
glabrata (Microtritia) Nied., 93
glabrata (Microtritia) Sta., 93 *(=neonominata)*
glabratus (Africoribates)
glabrisensillata [A. (Conchogneta)]
glabriseta [M. (Neobelba)]
glabriseta (Novonothrus)
glabriseta (Oxybrachioppia)
glabrisetus (Meristacarus) heterotrichus
glabrisetus [D. (Spatiodamaeus)]
glabroclava (Suctobelbella) (=acutidens)
glabrus (Austrocarabodes)
glabrus (Austroeremulus)
gladia [H. (Mantigueracarus)]
gladiata (Nanhermannia)
gladiata [H. (Phyllhermannia)]
gladiator [M. (Neobelba)] (=romandiolae)
gladiator (Pseuderemulus)
gladiator (Rugozetes)
gladiola (Oribotritia)
gladius [D. (Spatiodamaeus)]
glaesarius (Holonothrus)
glaesarius (Nothrus)
glandulosus (Scutovertex)
glauca (Hoplophorella) (=hamata)
glaucinus [D. (Paradamaeus)] (=clavipes)
glennieensis [H. (Austrophthiracarus)]
glennieensis [H. (Notophthiracarus)]
globata (Paraphauloppia)
globifer [D. (Epidamaeus)]
globifer (Microtegeus)
globifer [H. (Notophthiracarus)]
globifer [L. (Procorynetes)]
globifera (Globoppia)
globiger [C. (Klapperiches)]
globiger (Malaconothrus) sp. inq.
globigera (Heteroppia)
globipes (Metabelba) (=papillipes)
globosa (Dissorhina) ornata
globosa (Rhinoppia) (=subpectinata)

globosa [O. (Zygoribatula)]
globosus (Liacarus) (=subterraneus)
globosus [L. (Longocepheus)]
globosus (Neoliodes)
globosus [C. (Paraceratorchestes)]
globosus (Phthiracarus)
globula (Gustavia) (=fusifer)
globula [L. (Incabates)]
globularis (Sphaerozetes) sp. inq.
globulifera (Globogalumna)
globulifera (Suctobelbila) sp. inq.
globuliferus (Neoliochthonius)
globuloides (Galumna) sp. inq.
globulus (Euzetes)
globus [P. (Archiphthiracarus)]
glomerata (Prototritia)
glycyphagoides (Damaeus)
gnammaensis (Tyrphonothrus)
gobiensis [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
gobiensis (Bipassalozetes)
gobilliensis [B. (Lanibelba)]
gobletus (Pseudotocepheus)
goblina (Brachioppiella)
gogolensis [T. (Cristonothrus)]
golbasiensis [R. (Insculptoppia)]
goldengatensis [H. (Phyllhermannia)]
goldengatensis (Quattoppiella)
golondrinasensis [H. (Protophthiracarus)]
golosovae (Gozmanyina)
golosovae [R. (Insculptoppia)]
golosovae [A. (Parabelbella)]
golosovae (Parautogneta)
gomerae (Oribatella)
gomerensis [H. (Calyptophthiracarus)]
gomozovae (Rhinoppia)
gongylos [H. (Austrophthiracarus)]
gongylos [H. (Notophthiracarus)]
gordeevae (Lauroppia)
gorgonia (Crotonia)
gorodkovi (Nanhermannia)
gotoensis (Ceratozetes)
gotoensis (Peloribates)
gotoensis (Trichogalumna)
goulikaoensis (Arcoppia)
gozeensis (Truncopes)
gozmanyi [O. (Zygoribatula)]
gracilata [O. (Zygoribatula)]
gracile (Acrotritia)
gracilior (Eremobelba)
gracilior (Micreremus) (=brevipes)
gracilipes (Cepheus) sp. inq.
gracilipes (Damaeus)
gracilis [O. (Acrotocepheus)]
gracilis (Ceratozetes)
gracilis (Eohypochthonius)
gracilis (Eremaeus)
gracilis (Fissicepheus)
gracilis (Gehypochthonius)
gracilis (Hammerella)
gracilis [M. (Hammeroppia)]
gracilis [H. (Heterohermannia)]
gracilis (Holonothrus)
gracilis (Iugoribates)
gracilis [B. (Kokoppia)]
gracilis [S. (Lalmoppia)]
gracilis (Liacarus) (=subterraneus)
gracilis (Mahunkaia)
gracilis (Malaconothrus) (=monodactylus)
gracilis (Neoribates)
gracilis (Nothrus)
gracilis (Paraphauloppia)
gracilis (Phauloppia)
gracilis (Protoribates)
gracilis (Sellnickochthonius)
gracilis (Separatoppia)
graciosa (Eremobelba)
graeca (Mesoplophora) (=michaeliana)
graeca (Multipulchroppia)
graecus (Haplochthonius)
graecus (Platyliodes)
grafatus (Dolicheremaeus)
grahami (Paraquanothrus)
grahamius (Scapheremaeus)
gramenicus (Papillacarus)
graminetum (Pergalumna)
gramineus (Torpacarus)
graminosus (Heptacarus)
granalata (Galumna)
grancanariae (Ctenobelba)
grancanariae [A. (Dyobelba)]
grancanariae (Subbelba) elisae
grandiporosus (Scheloribates)
grandis [O. (Acrotocepheus)]
grandis (Adoristes) (=ovatus)
grandis (Allosuctobelba)
grandis (Anachipteria)
grandis (Austrachipteria)
grandis (Berniniella)
grandis (Cepheus) (=dentatus)
grandis (Ceratozetes) (=gracilis)
grandis [L. (Dorycranosus)] (=acutus)
grandis (Eobrachychthonius) (=latior)
grandis (Eremaeus)
grandis (Eupelops) sp. inq.
grandis (Hermannia) (=convexa)
grandis (Hermanniella)
grandis (Mochlozetes) W. *et* L., 96
grandis (Mochlozetes) L. *et* W., 96 *(=grandis* W. *et* L., 96*)*
grandis (Oppia) (=nitens)
grandis [R. (Parhynchoribates)]
grandis (Peloribates)
grandis (Pheroliodes)
grandis (Ramsayellus)
grandis (Reticulocepheus)
grandis (Scheloribates) (=latipes)
grandis [M. (Trimalaconothrus)] angulatus
grandis [A. (Uluguroides)]
granditrichosus (Annectacarus)
grandjeani (Acaronychus)
grandjeani (Alaskozetes) antarcticus
grandjeani (Berlesezetes)
grandjeani [H. (Calyptophthiracarus)]
grandjeani (Carabodes)
grandjeani (Cryptacarus)
grandjeani (Cryptogalumna)
grandjeani (Dimidiogalumna)
grandjeani [D. (Epidamaeus)] (=puritanicus)
grandjeani (Galumna)
grandjeani (Hoplophorella)
grandjeani (Hypochthoniella) (=minutissimua)
grandjeani (Masthermannia)
grandjeani (Mesotritia) (=nuda)
grandjeani (Mochloribatula)
grandjeani (Mongaillardia)
grandjeani (Nanhermannia)
grandjeani (Niphocepheus) nivalis
grandjeani [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
grandjeani (Protoplophora) (=palpalis)
grandjeani (Prototritia)
grandjeani (Rugozetes)
grandjeani (Solenoppia)
grandjeani (Tricheremaeus)
grandjeani [S. (Tropacarus)]
grandjeani (Zetorchestes)
grandjeani [O. (Zygoribatula)]
grandjeanica (Porobelba)
granifer (Topobates)
granifera (Suctobelbella)
granosus [C. (Klapperiches)]
granpiedraensis [P. (Archiphthiracarus)]
granulata (Acrotritia)
granulata [L. (Antennoppia)]

granulata (Baloghiella)
granulata (Cycloppia)
granulata (Hermanniella)
granulata (Pergalumna)
granulata (Pulchroppia)
granulata [H. (Rhacaplacarus)]
granulata (Suctobelba)
granulata (Topalia)
granulata (Wallworkoppia) (=machadoi)
granulata [O. (Zygoribatula)]
granulatus (Arotrobates)
granulatus (Bipassalozetes) (=perforatus)
granulatus (Carabodes)
granulatus (Dolicheremaeus)
granulatus [D. (Epidamaeus)] (=bayartogtokhi)
granulatus (Epieremulus)
granulatus (Eureremaeus) (=oblongus)
granulatus (Javacarus)
granulatus [D. (Kunstidamaeus)]
granulatus [B. (Lanibelba)]
granulatus (Liacarus)
granulatus (Licnodamaeus)
granulatus (Micreremus)
granulatus (Microtegeus)
granulatus [P. (Millotacarus)]
granulatus (Neoribates)
granulatus (Nesiacarus)
granulatus (Passalozetes) (=neonominatus)
granulatus (Pseudotocepheus)
granulatus (Sadocepheus)
granulatus (Scutovertex)
granulatus (Tectocepheus) (=velatus)
granulatus [M. (Trimalaconothrus)]
granulatus [L. (Undulozetes)]
granulatus (Unguizetes)
granuliala (Trichogalumna)
granulimorpha (Galumna)
granulosa [K. (Stakarenoppia)]
granulosus (Cepheus) sp. inq.
granulosus [T. (Cristonothrus)]
granulosus (Papillonotus)
graptoppioides (Tainsculptoppia)
gratiosa (Allobelba) sp. inq.
gratiosa (Liebstadia)
gratiosa [O. (Zygoribatula)]
gratus (Podoribates) (=longipes)
gravouwensis (Schalleriella)
grebennikovi (Pergalumna)
grecus [P. (Oribellopsis)]
greensladeae (Novazelandiella)
gregarius (Gymnodamaeus) sp. inq.
gregorioi (Carabodes)
gregoryi (Indoribates)
grenadaensis [L. (Dorycranosus)]
gressitti (Apotomocepheus)
gressitti (Austrocarabodes)
gressitti (Flammaeremaeus)
gressitti (Hemileius)
gressitti [L. (Lancelalmoppia)]
gressitti [H. (Notophthiracarus)] (=quietus)
gressitti (Peloribates)
gringai (Tyrphonothrus)
griseus (Atropacarus)
griseus (Sellnickochthonius)
grishinae [G. (Angulogalumna)]
grishinae (Punctoribates)
groblerae (Furcoppia)
groblerae (Paulianacarus)
groenlandicus (Ameronothrus) (=maculatus)
groenlandicus [D. (Epidamaeus)]
groenlandicus (Propelops)
grootaerti (Amiracarus)
grossa (Oribotritia)
grossmani (Damaeus)
grossmani (Hoplophthiracarus) sp. inq.
grossus [H. (Notophthiracarus)]
grucheti (Arcoppia)
gruezoi (Dolicheremaeus)
gruezoi (Ikarotocepheus)
gruezoi [P. (Triaunguis)]
grymae (Camisia)
guadarramica [O. (Zygoribatula)]
guadarramicus (Carabodes)
guadarramicus (Ceratozetes)
guadarramicus (Ghilarovus) hispanicus
guadarramicus (Humerobates) rostrolamellatus
guadarramicus (Niphocepheus)
guadeloupensis (Cyrthermannia)
guanarteme (Steganacarus)
guanicola (Moritzoppia)
guanicola (Serratoppia)
guanophilus (Sellnickochthonius)
guarani (Brachioppia) (=cuscensis)
guarani [E. (Neoepilohmannia)]
guehoi (Perxylobates)
guelticola [R. (Rectoppia)] (=mihelcici)
guerini (Scapheremaeus)
gueyeae (Hydrozetes)
gueyeae [P. (Vepracarus)]
guhitanus (Scheloribates)
guilfordidei (Gymnodamaeus)
guillaumeti (Malgacheliodes)
guineana (Arcoppia)
guiyangensis (Nothrus)
gumista [Q. (Coronoquadroppia)] (=nasalis)
gundungurra (Malaconothrus)
gunini (Scheloribates)
gunjina (Pedrocortesella)
guttata [Q. (Coronoquadroppia)]
guttatoides (Peloribates)
guttatus (Peloribates)
guyi (Limnozetes)
guzhangensis (Lohmannia)
gygeri (Sellnickochthonius) (=immaculatus)
gymnonota (Pedrocortesella)
gyoergyi (Lamellobates) (=botari)
gyoergyi (Multipulchroppia)
gyrata (Ramusella)
gyroplicatus (Dolicheremaeus)
gyros (Hoplophorella)
haarlovi (Lanceoppia)
habsburgeri (Cymbaeremaeus) (=cymba)
hachijoensis (Dolicheremaeus) infrequens
hagenensis (Idiozetes)
hailongensis [O. (Zygoribatula)]
hainanensis (Annectacarus)
hainanensis (Hoplophthiracarus)
hainanensis (Megalotocepheus)
hainardorum (Ramusella)
hakkai (Perxylobates)
hakonensis (Protoribates)
hakonensis [M. (Trimalaconothrus)]
hallaensis (Astegistes)
hallasanensis (Acrotritia)
halleri (Protoribates) sp. inq.
halli (Pilogalumna) tenuiclava
hallidayi (Trichonothrus)
hallidayi [P. (Neophthiracarus)]
hallidayi [H. (Notophthiracarus)]
halophilus (Eupelops)
halophilus (Xenillus)
halterata (Similoppia)
hamanni [M. (Phyllolohmannia)]
hamanni (Xiphobelba)
hamata (Autogneta)
hamata (Eremobelba)
hamata (Hoplophorella)
hamata (Medioxyoppia)
hamata (Moritzoppia) sp. inq.
hamata (Suctobelbella) subcornigera
hamatus (Hoplophthiracarus)
hamidi (Hoplophorella)

hamidi (Neoamerioppia)
hamifer (Acaroceras)
hamifer (Galumna) (=angularis)
hamifera (Parasuctobelba)
hamiltoni (Globoppia)
hammeni [P. (Archiphthiracarus)] (=peristomaticus)
hammeni [H. (Notophthiracarus)]
hammeni (Striatoppia)
hammerae (Aeroppia)
hammerae (Anderemaeus)
hammerae (Annectacarus)
hammerae (Arcoppia)
hammerae (Austrachipteria) B. *et* P. Bal., 92
hammerae (Austrachipteria) M., 97 *(=hammerae* B. *et* P. B., 92*)*
hammerae [M. (Calyptozetes)]
hammerae (Chamobates) (=javensis)
hammerae Dolicheremaeus
hammerae [D. (Epidamaeus)]
hammerae (Galumna)
hammerae (Glanderemaeus)
hammerae (Hermannobates)
hammerae (Malaconothrus) (=angulatus)
hammerae (Nanohystrix)
hammerae (Nodocepheus)
hammerae (Pheroliodes)
hammerae (Pseudotocepheus)
hammerae (Quadroppia)
hammerae (Scapheremaeus) (=patella)
hammerae (Sellnickochthonius) (=lydiae)
hammerae (Senectoppia) (=multisulcatum)
hammerae [H. (Steganacarellus)]
hammerae (Suctobelbella) (=duplex)
hammerae (Trhypochthonius) sp. inq.
hammerae (Trichoribates)
hammerae (Xenillus)
hamobatoides (Ceratozetes)
hamula [H. (Rhacaplacarus)]
hamulifera (Camisia)
hangayi (Pedrocortesella)
hannecarti (Brachioppiella)
hanoiensis [S. (Perscheloribates)]
hanswursti (Retrozetes)
hanyensis (Sellnickochthonius)
haradai (Adrodamaeus)
haradai (Austrocarabodes)
haradai (Fissicepheus)
haramachiensis (Peloribates)
hardyi (Hexachaetoniella)
harioti (Ameronothrus) sp. inq.
harpezus (Kalyptrazetes)
harrysmiti (Neogalumna)
harteni (Suctobelbella)
hartensteini [B. (Gressittoppia)]
harunaensis (Pergalumna) (=altera)
harundinosus (Hydrozetes)
hastata [S. (Flagrosuctobelba)]
hastata (Pergalumna)
hastatus (Compactozetes)
hastatus [D. (Epidamaeus)]
hastatus (Eremulus)
hastatus (Furcobates)
hasticeps (Achipteria) sp. inq.
hastilis (Neoctenacarus)
hatanoensis (Nothrus)
haughlandae [P. (Triaunguis)]
hauseri (Acrotritia) (=americana)
hauseri (Allosuctobelba)
hauseri [P. (Archiphthiracarus)] (=anonymus)
hauseri (Arthrovertex)
hauseri (Baloghacarus)
hauseri [Y. (Berndobodes)]
hauseri (Berniniella) serratirostris
hauseri [H. (Besuchetacarus)]
hauseri (Borneremaeus)
hauseri (Cavaecarabodes)
hauseri (Chamobates)
hauseri [N. (Confinoppia)]
hauseri [T. (Cristonothrus)]
hauseri (Indoribates)
hauseri (Issaniella) mograbin
hauseri (Lamellobates) (=molecula)
hauseri [N. (Leptosuctobelba)]
hauseri [S. (Lucioppia)]
hauseri (Luxtonia)
hauseri (Masthermannia)
hauseri (Mesoplophora)
hauseri [F. (Mexicoppia)]
hauseri (Microtegeus)
hauseri (Microtritia)
hauseri (Nothrus)
hauseri (Oribotritia)
hauseri (Otocepheus)
hauseri (Papillonotus)
hauseri (Passalozetes)
hauseri (Pergalumna)
hauseri (Pseudotocepheus)
hauseri (Rhynchoppia)
hauseri [R. (Sabahoppia)] (=blattarum)
hauseri (Sabahtritia)
hauseri (Suctobelbila)
hauseri (Tecteremaeus)
hauseri [M. (Trichogalumnella)]
hauseri (Trichoribates)
hauserorum (Brachychthonius)
hauserorum (Bulbocepheus)
hauserorum (Oxyamerus)
hawaiiensis (Campbellobates) acanthus ssp. inq.
hawaiiensis (Fortuynia)
hawaiiensis (Microtritia)
hawaiiensis (Neoliodes)
hawaiiensis (Oribotritia)
hawaiiensis (Paroppia)
hawaiiensis (Perglumna)
hawaiiensis (Tenuelamellarea)
haydeni (Hemileius)
headlandi [N. (Parakalumma)]
heatherae (Oribatella)
hebes (Unduloribates)
hectorperezius (Scapheremaeus)
heegi (Eupelops) sp. inq.
heelei (Phyllozetes)
heimi (Carabodes) (=labyrinthicus)
heinrichi (Protoribates)
heintoogensis [C. (Triachipteria)]
heleios (Heterozetes)
helenae (Ceratozetella) (=fjellbergi)
helenae [O. (Fberninia)]
helenensis (Scheloribates)
hellenica [C. (Berndamerus)]
hellenica (Machuella) (=ventrisetosa)
hellenicus (Microzetes)
helleri (Lemuroppia)
helleri [A. (Malgoceras)]
helluonis [P. (Neophthiracarus)]
helvetica (Joshuella)
helvetica (Metrioppia)
helvetica [R. (Paramedioppia)]
helveticus (Brachychthonius) (=bimaculatus)
helveticus (Damaeus)
helveticus (Hypocepheus)
helveticus (Kaszabobates)
helveticus (Topobates)
helvinus (Scheloribates) (=lanceoliger)
hemileiformis [H. (Monoschelobates)]
hendekensis (Eupterotegaeus)
hendriksi (Austrocarabodes)
henicos (Oribotritia)
henroi (Allonothrus)
hepaticolus (Birobates)
hepaticus (Eremaeus)
herculeana (Ceratoppia) (=bipilis)
herculeanus (Steganacarus)

herenessica (Austrotritia)
hericius (Protocepheus)
hermanni (Oribotritia)
hermannioides (Melanozetes) sp. inq.
herminae (Porrhotegaeus)
hermosaensis (Papuacepheus)
heroica (Pergalumna)
heros (Carinogalumna) sp. inq.
herzegowinensis [A. (Conchogneta)]
hesperidiana (Lasiobelba)
hesperis [T. (Tanzanycha)]
hessei (Capilloppia)
hessei [O. (Zygoribatula)] (=oudemansi)
heterocuspis (Ceratozetella)
heterochaeta [O. (Zygoribatula)]
heterodactylus [S. (Bischeloribates)] (=mahunkai)
heterodactylus [P. (Biunguis)]
heterodactylus (Cultrobates)
heterodactylus (Topobates)
heterodentata [O. (Monoribatella)]
heteropilosa (Hoplophorella)
heteropilosus (Phthiracarus)
heteropilosus [H. (Protophthiracarus)] (=neochilensis)
heteropoda (Metabelba) sp. inq.
heteroporosa [O. (Zygoribatula)] (=undulata)
heteroporosus (Fuscozetes)
heterosa [L. (Antennoppia)]
heterosa [P. (Apolohmannia)]
heterosetiger (Neoxenillus)
heterosetiger (Otocepheus)
heterosetosa (Acanthobelba)
heterosetosa (Belba)
heterosetosa (Ctenobelba)
heterosetosa (Hoplophorella)
heterosetosus (Austrocarabodes)
heterosetosus (Cepheus)
heterosetosus (Euphthiracarus)
heterosetosus (Hoplophthiracarus)
heterosetosus (Scheloribates)
heterosetosus [H. (Steganacarellus)]
heterosetus (Otopentacepheus)
heterospinifer (Camisia)
heterotricha (Apoplophora)
heterotricha (Epilohmannia)
heterotricha (Eremobelba)
heterotricha (Globoppia)
heterotricha (Hexoppia)
heterotricha (Indotritia) (=krakatauensis)
heterotricha (Mesoplophora)
heterotricha [E. (Multoribates)]
heterotricha (Oribotritia)
heterotricha [H. (Phyllhermannia)]
heterotricha (Rhinoppia)
heterotricha [G. (Stenoppia)] (=italica)
heterotricha [O. (Zygoribatula)] (=bonairensis)
heterotrichosus [A. (Baloghodes)]
heterotrichosus (*Hoplophthiracarus*)
heterotrichus [O. (Acrotocepheus)]
heterotrichus [H. (Calyptophthiracarus)]
heterotrichus (Congocepheus)
heterotrichus (Eremulus)
heterotrichus [T. (Cristonothrus)] (=mahunkai)
heterotrichus (Dolicheremaeus)
heterotrichus (Eurostocepheus)
heterotrichus (Meristacarus)
heterotrichus (Papillocepheus)
heterotrichus (Phyllozetes) (=emmae)
heterotrichus [E. (Pocsia)]
heterotrichus (Rostrozetes)
heterotrichus (Sacculobates)
heterotrichus (Scheloribates)
heterotrichus (Sellnickochthonius)
heterotrichus [H. (Steganacarellus)] Mah., 79
heterotrichus [H. (Steganacarellus)] N., 2000 *(=novazelandicus)*
heterotrichus (Tectodamaeus)
heterotrichus (Tyrphonothrus)
heterotrichus (Xenillus)
hettigei (Ceylobodes)
heveae (Sellnickia) (=caudata)
hexagona (Notogalumna)
hexagonalis (Cubabodes)
hexagonus [P. (Minguezetes)]
hexagonus (Mixacarus)
hexagonus [P. (Vepracarus)]
hexapili (Lanceoppia)
hexapilis (Neoamerioppia)
hexaporosa (Behanpseudoppia)
hexaporosus (Dynatozetes)
hexasacculata (Sacculogalumna)
hexasetosa (Macrogena)
hexasetosus [Y. (Dongnaibodes)]
hexasetosus (Malaconothrus)
hexatricha (Basiloppia)
hidasii (Anderemaeus)
hiemalis (Nanhermannia) (=dorsalis)
hieroglyphicus (Scapheremaeus)
hierrensis (Hemileius)
higginsi (Brachioppiella)
higginsi (Eueremaeus)
higginsi [C. (Klapperiches)]
higginsi (Nesopelops)
highlandensis (Dentachipteria)
higoensis (Triautogneta)
hikurangi [A. (Rafacarus)]
hillcrestensis [P. (Archiphthiracarus)]
himachalensis [M. (Multilanceoppia)]
himalayensis (Dolicheremaeus)
himalayensis (Eremaeozetes)
himalayensis (Eremobelba)
himalayensis [O. (Indotocepheus)]
himalayensis (Megalotocepheus)
himalayensis (Nanhermannia)
himalayensis (Oxyamerus)
hiore [H. (Protophthiracarus)]
hippy (Machuella) (=ventrisetosa)
hippy (Ramusella)
hirashimai (Microtegeus)
hirauchiae (Suctobelbata)
hirauchiae (Trichoribates)
hirokous (Protoribates)
hiroyoshii [F. (Cosmogalumna)]
hirsuta (Masthermannia)
hirsutus (Dolicheremaeus)
hirsutus (Eupelops) (?=hirtus)
hirsutus (Heptacarus)
hirsutus [P. (Metaphthiracarus)] (=setosus)
hirsutus (Peloribates) Banks, 1895 *sp. inq.*
hirsutus (Peloribates) Mah., 1983 *(=neonominatus)*
hirsutus (Steganacarus)
hirsutus [P. (Vepracarus)]
hirtus (Allonothrus)
hirtus (Brachychthonius)
hirtus (Eupelops)
hirtus [P. (Neophthiracarus)]
hirtus (Trichoribates) sp. inq.
hispanica (Corynoppia)
hispanica [L. (Incabates)]
hispanica [G. (Monophauloppia)]
hispanica (Tenuelamellarea)
hispanica [O. (Zygoribatula)]
hispanicus (Adrodamaeus)
hispanicus (Carabodes)
hispanicus (Ghilarovus)
hispanicus (Paralopheremaeus)
hispanicus (Passalozetes)
hispaniola (Beklemishevia)
hispaniola (Lohmannia) (=turcmenica)
hispida (Pilogalumna) tenuiclava
histricinus (Hoplophthiracarus)
histricinus (Peloribates) (=hubbardi)
hivaoa (Nuhivabates)
hivaoae (Crotonia) (=nukuhivae)

hoeli (Ceratoppia) (=sphaerica)
hogsbackensis (Pilogalumna)
hoh (Carabodes)
hokkaidensis (Hermannia)
hokkaidoensis (Suctobelbella)
hokkaiensis (Cepheus)
hokkaiensis (Eueremaeus)
holomonensis (Achipteria)
holoscripta (Galumnopsis)
holsaticus (Topobates)
holtmanni [O. (Acrotocepheus)]
homodactyla (Galumna) sp. inq.
honestus (Sellnickochthonius)
honshuensis (Diapterobates) variabilis
hooki [H. (Platynothrus)]
horakae [O. (Acrotocepheus)]
horakae (Furcoppia)
horaki (Pseudoceratoppia)
horologiorum (Sacculobates)
horreo [C. (Flexa)]
horrida (Camisia)
horrida [H. (Kakophthiracarus)] (=tuberculosissima)
horrida (Metabelba) sp. inq.
horrida (Novosuctobelba)
horridus (Austrocarabodes)
horridus (Hermannobates)
horridus (Liochthonius)
hortensis (Neoamerioppia)
hortobagyensis (Phthiracarus) (=longulus)
hortobagyensis [O. (Zygoribatula)] (=vulgaris)
horvathae (Separatoppia)
horvathorum (Pergalumna)
howardi (Anachipteria)
huancayensis (Scheloribates)
huanglongensis [D. (Spatiodamaeus)]
huangshanensis (Allosuctobelba)
huangshanensis (Oppia)
huanucoensis [H. (Varioppia)]
hubbardi (Peloribates)
hubeiensis (Tenuiala)
hudsoni (Galumna)
hugocoetzeeae (Pergalumna)
hulli [H. (Rhacaplacarus)]
humboldtensis [T. (Cristonothrus)]
humectus (Zachvatkinibates) sp. inq.
humeralis (Diapterobates)
humeralis (Euphthiracarus)
humeralis (Hemileius) (=montanus)
humeralis (Topobates) sp. inq.
humerata (Cultroribula)
humerata (Liebstadia)
humerata (Notoppia)
humerata (Oripoda)
humeratus (Cristeremaeus)
humeratus (Epieremulus)
humeratus (Microtegeus)
humeratus [B. (Passalobates)]
humeratus (Reductobates)
humeratus (Scapheremaeus)
humeratus (Scheloribates) sp. inq.
humeratus (Tyrphonothrus) P. Bal., 97
humeratus (Tyrphonothrus) B. *et* P. B., 02 *(=humeratus* P. B., 97)
humeratus (Yoshiobodes) (?=nakatamarii)
humeridens (Ghilarovus)
humicola [R. (Insculptoppiella)]
humicola [H. (Platynothrus)]
humida (Galumna)
humidus (Yoshiobodes)
humilis [P. (Archiphthiracarus)] Nied., 04
humilis [P. (Archiphthiracarus)] Nied., 06 *(=sudafricanus)*
humilis (Hermanniella)
hummelincki (Carabodes)
hummelincki [C. (Triachipteria)]
hunchunensis (Oribotritia)
hungarica [A. (Acrogalumna)]
hungarica (Berniniella) (=aequivoca)
hungarica [O. (Bioribatella)]
hungarica (Ceratoppia) sp. inq.
hungarica [M. (Hammeroppia)] wilsoni
hungarica (Oppia) sp. inq.
hungarica (Psammogalumna)
hungaricus (Aleurodamaeus)
hungaricus [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
hungaricus (Carabodes)
hungaricus (Exochocepheus)
hungaricus (Odontocepheus)
hungaricus (Peloribates)
hungaricus (Sellnickochthonius) rostratus
hungaricus [P. (Semipunctoribates)]
hungarorum (Genavensia)
hungarorum (Lohmannia)
hungarorum (Malgasodes)
hungarorum (Scapheremaeus)
hungarorum (Taiwanoppia)
hungarorum (Tegeocranellus)
hunti (Phylleremus)
hunti [H. (Phyllhermannia)]
hurkai (Miracarus)
hurshi (Suctobelbella)
huvsgulensis [L. (Procorynetes)]
hyalina (Cheloppia)
hyalinus (Oxyamerus)
hyalinus (Plasmobates)
hyalinus (Vilhenabates)
hyalinus (Wallworkodes)
hydrophila (Pergalumna)
hyeroglyphica (Acrotritia) (=americana)
hygrophila (Rhinoppia)
hygrophila (Trichogalumna)
hygrophilus (Bullibates)
hygrophilus (Eupelops)
hygrophilus (Punctoribates) (=insignis)
hygrophilus (Scheloribates)
hylaeus (Mycobates)
hylaius (Megeremaeus)
hypergranulosa (Pergalumna)
hypersetosus (Peloribates)
hypogea (Hypogeoppia)
hypoquercus (Phyllozetes)
hyrcanica (Hafenferrefia) (=nevesi)
hystricinus (Liochthonius)
hystricinus (Palaeacarus)
hystrix (Peloribates) sp. inq.
ianus (Scutovertex)
ibarakiensis [S. (Flagrosuctobelba)]
iberica [C. (Bifurcobelba)]
iberica (Bursoplophora)
ibericus [L. (Dorycranosus)] Djap., 73 *(=zachvatkini)*
ibericus [L. (Dorycranosus)] Djap., 74 *(=spledens)*
ibericus [D. (Epidamaeus)] (=pyrenaicus)
ibericus (Peloptulus)
ibericus (Scheloribates)
ibericus (Tectocepheus) (=sarekensis)
icaria [L. (Antennoppia)] (=quadriseta)
ichnusae (Oribatella)
idem (Liochthonius)
ifeana (Mesoplophora) (=africana)
ifeensis (Nothrus)
ignobilis [H. (Notophthiracarus)]
ignota (Belba) (=sculpta)
ignota (Mesoplophora)
ignotus (Adrodamaeus) (=siculus)
igorotus (Basiceramerus)
ihaguensis (Stictozetes)
iheyaensis (Neoliodes)
iheyaensis (Tectocepheus)
iheyaensis [O. (Zygoribatula)]
ikeharai [C. (Klapperiches)]
ilhabellae (Phylloribatula)
ilhaverdeensis (Dimidiogalumna)
ilicaensis [O. (Dzarogneta)]
illecebrosus (Austrodamaeus) (=elegantulus)

illinoisensis (Chamobates) sp. inq.
illinoisensis (Hoplophthiracarus)
illinoisensis (Quadroppia)
illuminata (Oribatella)
ilocanus (Arthrovertex)
ilyinae (Sellnickochthonius)
imadatei (Archegocepheus)
imadatei (Dolicheremaeus)
imadatei (Pergalumna)
imbecillis [P. (Archiphthiracarus)]
imitans (Furcoppia)
imitans (Paraxylobates)
imitans (Pirnodus)
imitator (Epactozetes)
imitator (Hypozetes)
imitator (Xenillus)
immaculatus (Sellnickochthonius)
immarginatus (Odontocepheus)
immundus (Atropacarus)
impar (Prionoribatella)
imparata (Phauloppia)
impedita (Cosmogneta)
impedita (Pedrocortesella)
impeditus (Halozetes)
imperatoria (Ceratozetella)
imperfecta [F. (Cosmogalumna)]
imperfecta (Galumna) (=teuri)
imperfecta [A. (Izuachipteria)]
imperfecta (Trichogalumna)
imperfectus (Austrocarabodes)
imperfectus (Cosmochthonius)
imperfectus (Passalozetes)
imperfectus (Protoribates)
imperfectus (Scheloribates)
imperialis (Hafenferrefia) sp. inq.
impolita [H. (Tuberemaeus)]
impolitus [H. (Protophthiracarus)]
impressus (Brachychthonius)
improvisus [H. (Notophthiracarus)]
improvisus (Pseudocarabodes)
imreorum (Epilohmannia)
inacessus [P. (Archiphthiracarus)]
inae (Afroleius)
inaequa (Hoplophorella)
inaequalis (Dolicheremaeus)
inaequalis (Pedrocortesella)
inaequatus [E. (Pocsia)]
inaequipes [A. (Parabelbella)]
inaequirostris (Arcoppia)
inaestimabilis (Steganacarus)
inauditus [H. (Notophthiracarus)]
inca (Beckiella)
inca (Pheroliodes)
incaensis (Arceremaeus)
incavatus (Nothrus)
incerta (Arcoppia)
incerta (Collohmannia) (=gigantea)
incerta (Galumna)
incerta (Oribatula)
incertus (Phthiracarus) (=lentulus)
incertus (Poroscheloribates)
incertus (Salvus)
incertus (Unguizetes)
incipatus (Charassobates)
incisa (Ceratoppia)
incisa (Galumna)
incisa [B. (Gressittoppia)]
incisa (Magyaria)
incisa (Microtritia)
incisa [O. (Monoribatella)]
incisa (Moritzoppia)
incisa (Sternoppia)
incisellus [T. (Latilamellobates)]
incisirostra (Oppia)
incisirostris (Tutorozetes)
incisiva [R. (Rectoppia)]
incisivus (Afronothrus)
incisura [P. (Italobates)]
incisus (Cepheus) sp. inq.
incisus (Chamobates) (=pusillus)
incisus (Hydrozetes) (=thienemanni)
incisus (Iugoribates) (=mihelcici)
incisus (Liacarus)
incisus (Neoribates)
inclinata [B. (Kokoppia)]
incognita (Rhinoppia)
incognita (Oribotritia)
incognitus [S. (Tropacarus)]
incomparabilis [H. (Notophthiracarus)]
incompatibilis [P. (Peloribatodes)]
incomperta (Pergalumna)
incomperta (Phauloppia)
incompleta (Allogalumna)
incompleta (Oribatula)
incompletus (Eupelops)
incompletus (Tecteremaeus)
incompletus [P. (Vepracarus)]
incomptus (Steganacarus)
incondita (Hermanniella)
inconditus (Atropacarus)
incrassatus [H. (Austrophthiracarus)]
incrassatus (Neophysobates)
incredibilis (Euphthiracarus)
incredibilis [H. (Mantigueracarus)]
incredibilis (Phthiracarus)
incrustata (Oribatula)
incrustatus [A. (Uluguroides)]
inculpatus (Atropacarus)
incurva (Ceratozetella)
incurva [S. (Lalmoppia)]
incurva (Protoripoda)
incurva [C. (Triachipteria)] distincta
incurva [O. (Zygoribatula)]
incurvata (Oribatella)
incurvata (Phauloppia) (=lucorum)
incurvata (Schalleria)
incurvatus [M. (Calyptozetes)]
incurvus (Dicrotegaeus)
indentata (Ceratoppia)
indentatus [L. (Dorycranosus)]
indentatus [H. (Tuberemaeus)]
index (Acaroceras)
indes (Sphaerogalumna)
indiana (Aeroppia)
indica (Apoplophora) (=pantotrema)
indica (Arcoppia)
indica (Basilobelba)
indica (Epilohmannia) minuta
indica (Eremobelba)
indica [S. (Flagrosuctobelba)]
indica (Galumna) crenata
indica (Galumnella)
indica (Hoplophorella)
indica (Lohmannia)
indica (Malacoangelia) remigera
indica (Mesotritia)
indica (Multioppia)
indica (Separatoppia)
indicator (Hydrozetes)
indicus (Allonothrus)
indicus (Archegozetes) (=longisetosus)
indicus (Belbodamaeus)
indicus (Dolicheremaeus)
indicus (Eremulus)
indicus (Flagellozetes) porosus
indicus (Hoplophthiracarus) (=repetitus)
indicus (Licneremaeus)
indicus [P. (Millotacarus)]
indicus (Sacculobates)
indicus (Scheloribates) Oud., 15
indicus (Scheloribates) San., 92 *(=obsessus)*
indicus (Uracrobates)

indifferens [T. (Cristonothrus)]
indiligens [H. (Notophthiracarus)]
indistincta (Pergalumna)
indistincta (Ramuselloppia)
indistinctus (Papillacarus)
indistinctus (Tumerozetes)
indivisa (Pergalumna)
indonesica (Galumna)
indonesiensis [A. (Acrogalumna)]
indubitatus [H. (Notophthiracarus)]
indusiatus [M. (Trimalaconothrus)]
induta (Eremella)
inecola [P. (Minguezetes)]
inelegans (Hoplophorella)
inenarrabilis [H. (Notophthiracarus)]
inenodabilis [N. (Leptosuctobelba)]
inepta (Hoplophorella)
inermis (Liacarus)
inermis (Unguizetes)
inexpectata (Epilohmannia)
inexpectata (Muliercula)
inexpectata (Rhynchobelba)
inexpectatus (Alismobates)
inexpectatus (Cymbaeremaeus)
inexpectatus (Hypozetes)
inexpectatus (Javacarus)
inexpectatus (Phthiracarus)
inexpectatus (Spinozetes)
infinita (Pergalumna)
infissus [L. (Dorycranosus)] (=acutus)
inflata (Dometorina)
inflata [H. (Calyptophthiracarus)]
inflata (Hoplophorella)
inflata [H. (Rhacaplacarus)]
inflatus (Physozetes)
inflexa (Oribatella)
inflexus (Tectocepheus) (=sarekensis)
infrequens (Dolicheremaeus)
infusionum [H. (Platynothrus)] (?=peltifer)
inglisi (Euphthiracarus)
inhambanensis (Fortuynia)
initialis (Hemileius)
inlenticulatus (Passalozetes)
inlenticulatus (Scutovertex)
innexa (Galumna)
inopinatus [H. (Calyptophthiracarus)] (=cretensis)
inopinatus (Dolicheremaeus)
inopinatus [C. (Phyllocarabodes)]
inopinatus [E. (Pocsia)]
inornata (Baloghoppia)
inornata (Berniniella)
inornatus [P. (Archiphthiracarus)]
inornatus [D. (Epidamaeus)] sp. inq.
inornatus (Rostrozetes)
inornatus [H. (Tuberemaeus)]
inoueae (Hoplophthiracarus)
inquirenda (Galumna) sp. inq.
inquirenda (Hydrozetes) sp. inq.
insculpta [R. (Insculptoppia)]
insculptus (Annectacarus)
insertus (Eremaeus)
insignificans (Neoribates)
insignipes (Epilohmannia)
insignis (Achipterina)
insignis [L. (Antennoppia)]
insignis (Banksinoma)
insignis (Farchacarus)
insignis (Lauritzenia)
insignis [P. (Minguezetes)]
insignis [P. (Neophthiracarus)]
insignis (Papuazetes)
insignis (Perlohmannia)
insignis (Rhynchoribates)
insignis [D. (Rykella)]
insignis [M. (Safrobates)]
insignitus (Hoplophthiracarus)
insignitus (Ocesobates) (=boodvardssoni)
insitiva (Taiwanoppia)
insolens (Hoplophorella)
insolens [H. (Steganacarellus)]
insolita (Allogalumna)
insolita (Brachioppia)
insolita (Chistyakovella)
insolita [M. (Hammeroppia)]
insolita (Multioppia) (?=laniseta)
insolita (Pluritrichoppia)
insolitus (Dolicheremaeus)
insolitus (Nippobodes)
insolitus [C. (Phyllocarabodes)]
insolitus [E. (Pocsia)]
insperatus [E. (Pocsia)]
insperatus (Scutoverticosus)
instans (Cosmozetes)
insulana [S. (Flagrosuctobelba)]
insulana [M. (Hammeroppia)]
insulanus (Steganacarus)
insularis (Aeroppia)
insularis (Ameronothrus) (=maculatus)
insularis [P. (Archiphthiracarus)] (=bulbiferus)
insularis (Atropacarus) striculus
insularis (Basilobelba)
insularis (Bursoplophora)
insularis (Dometorina) plantivaga
insularis (Gittella)
insularis (Gymnodampia)
insularis [M. (Hammeroppia)]
insularis (Hoplophthiracarus)
insularis [R. (Insculptoppia)] (=insculpta)
insularis (Mesoplophora) (=africana)
insularis (Parachipteria)
insularis (Phthiracarus)
insularis (Protoripoda)
insularis (Scapheremaeus)
insularis (Scheloribates) (=praeincisus)
insularis [I. (Triungulozetes)] (=fusifer)
insularis [O. (Zygoribatula)] (=frisiae)
insulata (Lasiobelba)
integer (Allogalumna)
integer (Mixacarus)
integer (Mycobates)
integra (Multioppia)
interiunctus (Acaroceras)
interlamellaris (Allobelba)
interlamellaris (Beckiella)
interlamellaris (Heminothrus)
interlamellaris [S. (Perscheloribates)]
interlamellaris (Tectodamaeus)
interlamellaris (Trichogalumna)
intermedia (Achipteria) (=coleoptrata)
intermedia [A. (Conchogneta)] sp. inq.
intermedia [O. (Dzarogneta)]
intermedia [S. (Flagrosuctobelba)] (=subtrigona)
intermedia (Globoppia)
intermedia [H. (Heterohermannia)]
intermedia (Oribatula) (=caliptera)
intermedia (Pergalumna)
intermedia (Serratoppia)
intermedius (Alaskozetes) antarcticus
intermedius (Antarctozetes)
intermedius (Austrocarabodes)
intermedius (Bipassalozetes)
intermedius (Eueremaeus)
intermedius (Eupelops)
intermedius (Euphthiracarus) (=reticulatus)
intermedius [C. (Flexa)]
intermedius (Fuscozetes)
intermedius (Halozetes)
intermedius (Haplochthonius)
intermedius (Hermannobates)
intermedius (Lamellobates)
intermedius (Liochthonius)
intermedius [C. (Mixozetes)]

intermedius (Peloribates)
intermedius (Pheroliodes)
intermedius (Tyrphonothrus) (=maior)
internodentatus (Liacarus) (=brevilamellatus)
internus (Papillacarus)
interpositus [C. (Xiphobates)]
interrogata (Neoamerioppia)
interrupta (Arcoppia)
interrupta (Lohmannia) javana
interrupta (Oribatula)
interrupta (Pseudoppia)
interruptus (Carabodes)
interruptus (Cavernozetes)
interruptus (Melanozetes)
interruptus (Scheloribates) praeincisus
intralamellata (Oppiella) (=nova)
intrudens (Berniniella)
inundata [A. (Conchogneta)]
inupiaq [C. (Cyrtozetes)]
inurbanus (Steganacarus)
inusitata (Sumatrotritia)
inusitatus [P. (Metaphthiracarus)]
inusitatus [H. (Notophthiracarus)]
invenusta (Camisia)
invenustus [P. (Archiphthiracarus)]
invisitata (Mesoplophora)
invitus (Ceratozetes)
involutus (Congocepheus)
iohanna (Indopacifica)
ionicus (Hellenamerus)
ionicus (Neoliodes)
ionthadosus (Xenillus)
iowaensis (Peloribates)
iracemae (Protoribates)
iranensis (Christovizetes)
iranensis [O. (Dzarogneta)]
iranensis (Galumna)
iranica (Allogalumna)
iranica (Anomaloppia) (=ozkani)
iranica (Beklemishevia)
iranica (Berniniella)
iranica [A. (Conchogneta)]
iranica [Q. (Coronoquadroppia)]
iranica (Fortuynia)
iranica [R. (Insculptoppia)]
iranica (Lauroppia)
iranica (Protoplophora)
iranica (Psammogalumna)
iranica (Ramusella) (=persica)
iranica [A. (Rhaphigneta)] (=akramii)
iranica (Serratoppia)
iranicus (Eobrachychthonius)
iranicus [I. (Haplozetes)]
iranicus (Mabulatrichus)
irazu (Galumna)
irenae (Eremaeozetes)
iriomotensis [T. (Cristonothrus)]
irmayi (Beckiella)
irmayi (Octoppia)
irmayi (Yoshiobodes)
irregularis (Joshuella)
irregularis (Pergalumna)
irregularis (Rostrozetes)
irregularis (Xenillus)
irreprehensus (Phthiracarus)
irumbuzhiensis (Indoribates)
isabelaensis (Neoribates)
isabelaensis (Oxyamerus)
isarogensis [E. (Cerostocepheus)]
ischnos (Acrotritia) (=vestita)
ishigakiensis (Austrotritia) (=saraburiensis)
ishigakiensis (Galumna) planiclava
ishikariensis (Nothrus)
ishikawai (Hoplophthiracarus)
islandica (Banksinoma) (=lanceolata)
islandica [C. (Ensicamisia)] (=solhoeyi)
ismalia (Xiphobelba)
issanielloides (Hermanniella)
italica (Achipteria)
italica (Allogalumna) (=parva)
italica [M. (Neobelba)]
italica (Nortonbelba)
italica [G. (Stenoppia)]
italica (Suctobelbella)
italicus (Adrodamaeus) (=siculus)
italicus (Microzetorchestes) (=emeryi)
italicus (Phthiracarus) (=ferrugineus)
italicus (Pocilochthonius)
italiensis (Sphaerozetes) (=orbicularis)
itascensis (Xenillus)
itatiaiae (Tyrphonothrus) P. B., 97
itatiaiae (Tyrphonothrus) B. *et* P. B., 02 *(=itatiaiae* P. B., 97*)*
iterata (Galumna) sp. inq.
iteratus (Dolicheremaeus) magnus
iteratus (Scheloribates)
iteratus [M. (Trimalaconothrus)]
ithacensis (Galumna)
itoi (Yambaramerus)
itsukiensis (Belba)
itsukushima (Licnodamaeus)
iturrondobeitiai (Cerachipteria)
iturrondobeitiai (Foraminoppia)
iubata (Hoplophorella)
iunctiporosa (Pergalumna) (=myrmophila)
iuvenalis [M. (Parplophora)]
izabalensis (Torpacarus)
izinyosa (Setoppia)
izquierdoae [L. (Antennoppia)]
izuensis (Diapterobates)
izumiensis (Acutozetes)
jaccoudi (Apoplophora) (=pantotrema)
jaccoudi (Cosmozetes)
jacoti (Belba)
jacoti (Epilohmannoides)
jacoti (Euphthiracarus) (=punctulatus)
jacoti (Galumna) Whar., 38 *sp. inq.*
jacoti (Galumna) M. *et al.*, 87 *(=iterata)*
jacoti (Gymnodampia)
jacoti (Indotritia)
jacoti [H. (Kakophthiracarus)]
jacoti (Lanceoppia)
jacoti (Mesotritia)
jacoti (Neoribates) B. *et* M., 67
jacoti (Neoribates) N. *et* K., 89 *(=neonominatus)*
jacoti (Oribatella)
jacoti (Phthiracarus)
jacoti (Sellnickochthonius)
jacquelinae (Bovicarabodes)
jahnae (Berniniella)
jaliscoensis (Nothrus)
jamaicaensis [C. (Klapperiches)]
jamalica (Moritzoppia)
jamiesoni (Anoplozetes)
janae (Allobelba)
jandai (Dampfiella)
jandiae (Pseudomultioppia)
janetscheki (Liacarus)
janosbaloghi (Hoplophorella)
janosbaloghi (Pergalumna)
japonensis (Eupelops)
japonensis [H. (Platynothrus)] peltifer
japonica (Allosuctobelba)
japonica (Austroceratoppia)
japonica (Autogneta)
japonica (Banksinoma)
japonica (Eremobelba)
japonica (Hexachaetoniella)
japonica (Mahunkana)
japonica [M. (Parplophora)]
japonica (Ramuselloppia)
japonica (Tokukobelba) compta
japonicus (Ceratozetes) (?=laticuspidatus)

japonicus (Diapterobates)
japonicus (Hydrozetes)
japonicus (Indoribates)
japonicus (Malaconothrus)
japonicus (Megalotocepheus)
japonicus (Ommatocepheus) clavatus
japonicus (Palaeacarus) hystricinus
japonicus (Phthiracarus)
japonicus (Platyliodes)
japonicus (Sabacarus)
japonicus (Scutovertex)
japonicus (Sellnickochthonius)
japonicus (Trhypochthonius)
javana (Lohmannia)
javanus (Indoribates)
javanus (Trhypochthonius)
javensis (Acutozetes)
javensis (Aribates)
javensis [M. (Bimagyaria)]
javensis (Chamobates)
javensis (Haplacarus)
javensis (Idiozetes)
javensis (Indotritia)
javensis [H. (Phyllhermannia)]
javensis (Plasmobates)
javensis (Podoribates)
javensis (Pseudoamerioppia)
javensis (Scheloribates) fimbriatus
javensis (Spinotocepheus)
javensis [T. (Tyrphonothrus)] glaber
jeanneli (Ceratozetella) (=maxima)
jelevae (Acutoppia)
jendeki (Eurhynchoribates)
jenoi (Eremobelba)
jenoi (Pergalumna)
jesti (Hermannia)
jethurmerae (Crotonia)
jeweli (Ceratozetes) (=virginicus)
jianchuanensis (Hoplophthiracarus)
jimenezi (Arceremaeus)
jindianensis (Scutovertex)
jindingensis (Cepheus)
jinggangshanensis [P. (Vepracarus)]
jinyunia (Acrotritia) (=sinensis)
jocelynae (Javacarus)
joffrevillei (Rugoceheus)
johanni (Adrodamaeus)
johnsi (Scapheremaeus)
johnstoni (Collohmannia)
johnstoni [D. (Epidamaeus)]
jonasi (Proteremaeus)
jongkyui (Pergalumna)
joonsooi [M. (Trimalaconothrus)]
jordanai (Liacarus)
jordani (Dendrozetes)
jornoti (Lohmannia)
josefstaryi [O. (Zygoribatula)]
josephineae (Oripoda)
jowettae [M. (Trimalaconothrus)]
jucunda [O. (Monoribatella)]
jucundior (Scheloribates)
juditae (Baloghia)
jueradae (Melanozetes) sp. inq.
jugata (Cerachipteria) digita
jugatus (Brachychthonius) sp. inq.
juglans (Benoibates)
jugorum [O. (Zygoribatula)] (=exilis)
juliae (Lohmannia)
jumbongiensis [P. (Metaphthiracarus)]
juncta (Cultroribula)
junichiaokii (Dolicheremaeus)
junichiaokii (Galumnella)
juniperi (Rostrozetes)
junonis (Ramusella)
jurobales [R. (Tectorhynchoribates)]
juvenalis (Phthiracarus) (=ferrugineus)
juvenalis [C. (Nanochthonius)]
jyotikanae (Graptoppia)
jyotsnai (Eremulus)
kaaimansensis [B. (Kokoppia)]
kadazan [O. (Acrotocepheus)]
kahurangiensis (Angullozetes)
kaindicola (Arcoppia)
kaisilai (Autogneta)
kalalao [L. (Bicristoppia)]
kalboprodorsalis (Peloribates)
kalimantanensis (Arcoppia) (=aequivoca)
kaliurangensis [S. (Flagrosuctobelba)]
kaluzi [H. (Rhacaplacarus)]
kamenskii (Palaeacarus)
kamaensis [D. (Spatiodamaeus)]
kamchatkicus (Fuscozetes)
kamerunensis (Granuloppia)
kamillae [P. (Metaphthiracarus)]
kanaka (Tyrphonothrus)
kananaskis (Ceratozetes)
kananaskis (Eremaeus)
kananaskis (Veloppia)
kanangra (Pedrocortesella)
kanbulaensis [D. (Epidamaeus)]
kanekoi [G. (Diplobodes)]
kanekoi [L. (Dorycranosus)]
kanoi [H. (Phyllhermannia)]
kantoensis [S. (Flagrosuctobelba)]
kapiti (Apoplophora)
karajica (Galumna)
karamani (Steganacarus) (=magnus)
kardiae (Congocepheus)
karelicus [D. (Epidamaeus)]
kargi (Cosmogneta)
kargilensis (Protoribates) sp. inq.
karinae (Setoppia)
karioi [H. (Austrophthiracarus)]
karpellesi (Euphthiracarus) sp. inq.
karppineni (Membranoppia) (=krivolutskyi)
karppineni (Passalozetes)
karubei [G. (Diplobodes)]
kashmiriensis (Oribatella)
kaszabi (Achipterina)
kaszabi (Bipassalozetes) (=striatus)
kaszabi (Kaszabobates)
kaszabi [E. (Licnocepheus)]
kaszabi (Peloribates)
kaszabi (Phthiracarus) (=boresetosus)
kaszabi [H. (Rhacaplacarus)]
katyae (Topalia)
kawanoi (Hoplophthiracarus)
kawensis [T. (Cristonothrus)]
kayoveae (Congocepheus)
kayoveae [A. (Synkrotima)]
kazakhstani (Galumna)
kazakhstanicus (Gymnodamaeus)
kazakovi (Berniniella)
kbayan (Kalyptrazetes)
kebangica (Galumna)
keewatin (Megeremaeus)
keilbachi (Moritzoppia)
kelbadjarica [O. (Zygoribatula)] (=glabra)
kellyi (Novazelandiella)
keningau [O. (Acrotocepheus)]
keniaensis (Alismobates)
kenyaensis [M. (Sagittabodes)]
kenyaensis (Uroppia)
kenyaensis (Zetomotrichus)
keralensis (Cryptacarus)
keralensis (Dolicheremaeus)
keralensis (Haplacarus)
keralensis (Unguizetes)
keralensis [O. (Zygoribatula)]
kerangas [H. (Interoppia)]
keretinus [L. (Dorycranosus)]
keriensis [T. (Cristonothrus)]

keriensis [S. (Perscheloribates)]
kethleyi (Novonothrus)
kethleyi (Psammochthonius)
kethleyi (Tegeocranellus)
kevani (Eremaeus)
khaolak [S. (Lalmoppia)]
khaustovi (Microtegeus)
khaustovi [S. (Tropacarus)]
khencensis (Camisia)
khencensis (Liochthonius)
khentiicus (Ghilarovus)
khoii (Galumna)
khosrovica [O. (Dzarogneta)]
khugniensis (Liebstadia) (=saifulmalukensis)
khustaiensis [D. (Epidamaeus)]
kieviensis [C. (Xiphobates)] (=interpositus)
kiiensis [T. (Cristonothrus)]
kikonaiensis [H. (Capillonothrus)] capillatus
kilchini (Liacarus)
kimberleyensis (Pilogalumna)
kimberleyi [M. (Trimalaconothrus)]
kinabalu (Austronothrus)
kinabalu (Dampfiella)
kinabaluensis (Austrotritia)
kingi (Berlesezetes)
kingi (Damaeus) (=angustipes)
kintrishiana (Carabodes)
kirai (Pasocepheus)
kirgisica (Ceratozetella)
kirghisicus (Liochthonius)
kirghizica (Maerkelotritia) (=krivolutskyi)
kirikiri [H. (Protophthiracarus)]
kirishimaensis [F. (Cosmogalumna)]
kishidai (Epilohmannoides)
kishidai (Maerkelotritia)
kittenbergeri (Pseudotectoribates) (=subsimilis)
kivuensis (Eupelops) sp. inq.
kiyosumiensis (Suctobelbila)
klabati (Euphthiracarus)
kluttzi [A. (Uluguroides)]
knighti [O. (Zygoribatula)]
knoepffleri (Phauloppia)
knowltoni (Gymnodamaeus) sp. inq.
knuellei (Lanceoppia)
knuellei (Tectocepheus)
knuellei [M. (Trimalaconothrus)]
knysnaensis [H. (Steganacarellus)]
knysnaensis (Tegeocranellus)
kobauensis (Scapuleremaeus)
kochi (Camisia) (=biurus)
kochi (Eupelops) (=acromios)
kochi [P. (Neophthiracarus)]
kodiakensis [D. (Epidamaeus)]
koeszegiensis (Liacarus)
koghisensis (Retrozetes)
kokae [P. (Archiphthiracarus)]
koki (Brachioppia)
koki (Drepanoppia)
koki (Lamellarea)
koki [O. (Zygoribatula)] (=baloghi)
komareki (Nanhermannia)
komodensis (Rostrozetes)
kompsosis (Tuberocepheus)
konglinensis [P. (Vepracarus)]
kontschani [S. (Flagrosuctobelba)]
kontschani [N. (Pseudoneoribates)]
kontumensis [S. (Perscheloribates)]
konwerskii [H. (Protophthiracarus)]
kootenai (Megeremaeus)
korannabergensis [H. (Steganacarellus)]
koreanus [P. (Vepracarus)]
koreense (Oribotritia) (=asiatica)
koreensis (Acrotritia) (=furcata)
koreensis (Fissicepheus) coronarius
kornhuberi (Neoliodes)
korupensis (Camcarabodes)
korupensis (Galumna)
korupensis (Hoplophorella)
kosarovi (Allobelba)
kosarovi (Corynoppia)
kosarovi (Corynoppia)
koshiensis [N. (Parakalumma)]
kotozenus [T. (Cristonothrus)]
kotschyi (Pergalumna)
koumantanosi (Phthiracarus)
kovaci (Pilobatella)
kovacsi (Lanceoppia)
koyukon [D. (Epidamaeus)]
krachan (Annectacarus)
kraepelini (Scheloribates)
krakatauensis (Indotritia)
krantzi (Dendroeremaeus)
kremenitsai (Atropacarus)
krisperi (Pergalumna)
krisztinae (Magyaria)
krivolutskyi (Africogalumna)
krivolutskyi (Birsteinius)
krivolutskyi (Caucaseremaeus)
krivolutskyi (Ghilarovus)
krivolutskyi [A. (Gordeeviella)]
krivolutskyi (Hypocepheus)
krivolutskyi [R. (Insculptoppia)]
krivolutskyi [S. (Lalmoppia)]
krivolutskyi (Maerkelotritia)
krivolutskyi (Membranoppia)
krivolutskyi (Metrioppia)
krivolutskyi (Neoribates)
krivolutskyi (Oribatella)
krivolutskyi (Oribotritia)
krivolutskyi [H. (Platynothrus)]
krygeri (Oppiella) (=nova)
kuankuoshuiensis (Tectodamaeus)
kuehnelti (Eueremaeus) (=intermedius)
kuehnelti (Javacarus)
kuehnelti (Lasiobelba)
kuehnelti (Provertex)
kugohi (Hoplophthiracarus)
kujuensis (Separatoribates)
kulaginae (Epilohmannia)
kulczynskii (Damaeus) (=flagellifer)
kulczynskii (Hoplophorella)
kumadai (Ocesobates)
kumaensis (Eupelops)
kumaensis (Ramusella)
kumasoi (Ocesobates)
kumayaensis (Eupelops)
kumayaensis (Mabulatrichus)
kumayaensis (Oribatula)
kumayaensis (Protoribates)
kumayaensis (Tectocepheus)
kumboensis [H. (Rhacaplacarus)]
kummeri (Dolicheremaeus)
kunsti (Operculoppia)
kunsti (Oribatella)
kunsti (Pergalumna)
kunsti [E. (Pocsia)]
kurchevae [O. (Multoribatella)]
kurikii (Tyrphonothrus) (=angulatus)
kurilica [N. (Suctobelboides)]
kurosawai (Cepheus)
kurozumii (Eramaeozetes)
kurti (Tenuiala)
kushiroensis [B. (Lanibelba)]
kushiroensis [P. (Oribellopsis)]
kusseri [C. (Klapperiches)]
kutchin (Lobozetes)
kvavadzei (Ghilarovus)
kymatismosi [T. (Mangabebodes)]
kyphos (Hoplophorella)
kyushuensis (Phthiracarus) (=clemens)
labradorica [C. (Ensicamisia)] (=lapponica)
labyrinthicus (Carabodes)

labyrinthicus (Euphthiracarus)
labyrinthicus (Microtegeus)
labyrinthicus (Scheloribates)
lacandonicus (Allozetes)
laccosis (Hydrozetes)
laciniatus (Fosseremus)
lacouturieri (Rogerzetes)
lacrimans (Zetomotrichus)
lacunosa (Hoplophorella)
lacunosus (Liochthonius)
lacustris (Hydrozetes)
ladislavmikoi [D. (Kunstidamaeus)]
laensis [T. (Cristonothrus)]
laensis (Nesopelops)
laetabilis [H. (Rhacaplacarus)]
laetepictus (Liochthonius) (?=sellnicki)
laetus (Malaconothrus)
laevigatus (Eupelops) (=plicatus)
laevigatus (Phthiracarus)
laevigatus (Scheloribates)
laevis (Archoplophora) (=rostralis)
laevis (Brachychthonius) sp. inq.
laevis (Nanhermannia)
laevis (Paulianacarus)
laevis (Pergalumna) emarginata ssp. inq.
laevis (Suctobelbella)
laevis (Tegeocranellus)
laeviusculus (Trichoribates) sp. inq.
lagenula [L. (Lagenobates)]
lagrecai (Ceratozetes)
lagrecai (Eutegaeus)
lagunaensis [B. (Kokoppia)]
lagunaensis (Notogalumna)
lagunensis (Hemileius)
laiae [S. (Porokalumma)]
laiae (Suctobelbella)
lakshadweepensis (Indotritia) sp. inq.
lambieae (Scapheremaeus)
lamellata (Austrachipteria)
lamellata (Beckiella)
lamellata (Brassoppia)
lamellata [R. (Insculptoppia)] (=elliptica)
lamellata [T. (Latilamellobates)] (=obesus)
lamellata (Limnozetella)
lamellata (Moritzoppia) (=unicarinata)
lamellata (Multioppia) (?=laniseta)
lamellata (Paraphauloppia)
lamellata (Parapyroppia) (=transitoria)
lamellata (Pseudoamerioppia)
lamellata (Rhinoppia)
lamellatus (Caucasiozetes)
lamellatus [A. (Coropoculia)]
lamellatus (Geminozetes)
lamellatus (Neoliodes)
lamellatus (Oribatodes) (=mirabilis)
lamellatus (Scheloribatoides)
lamellatus (Trichocepheus)
lamellatus (Xenillus)
lamellicornis (Rugoppia)
laminatus (Scheloribates)
lamingtoni (Hoplophthiracarus)
lamingtoni [P. (Neophthiracarus)]
laminipes (Ethiovertex)
laminipes (Lopheremaeus)
lamottei (Ramogneta)
lanatus [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
lanatus (Cosmochthonius)
lancearia (Lanceoppia)
lanceata (Galumna)
lanceocrinus (Eremulus) sp. inq.
lanceolata (Banksinoma)
lanceolata (Crotonia)
lanceolata (Indotritia)
lanceolata (Leptogalumna)
lanceolata (Lohmannia)
lanceolata (Neoamerioppia)
lanceolata [M. (Neobelba)] (=sphagni)
lanceolata (Pyroppia)
lanceolata (Striatoppia)
lanceolata (Suctobelbata) spicata ssp. inq.
lanceolata (Suctobelbella) longicuspis
lanceolata [O. (Zygoribatula)] (=longisensilla)
lanceolatus (Arotrobates)
lanceolatus (Borneozetes)
lanceolatus (Euphthiracarus)
lanceolatus (Hoplophthiracarus)
lanceolatus [S. (Perscheloribates)]
lanceolatus (Pseudotocepheus)
lanceolatus (Scutozetes)
lanceolatus [H. (Simkinia)] (=ovalis)
lanceolatus (Topobates)
lanceoliger (Scheloribates) sp. inq.
lanceosensilla (Galumna)
lanceosensilla (Galumnopsis)
lanceoseta (Hoplophorella)
lanceoseta (Karenella)
lanceosetoides (Hoplophorella)
lanceosetoides (Karenella)
lanceosetosus (Neoliodes)
laneus (Podoribates)
languida (Achipteria) sp. inq.
laniseta [M. (Hammeroppia)] wilsoni
lankaensis (Protoribates)
lapelerii (Elaphoppia)
lapidaria (Suctobelba)
lapidarius (Chamobates) sp. inq.
lapponica [C. (Ensicamisia)]
lapponicus (Ameronothrus)
lapponicus (Edwardzetes) (=edwardsi)
lapponicus (Liochthonius)
lapshovi (Palaeacarus)
largus [P. (Archiphthiracarus)]
largus [H. (Austrophthiracarus)]
larreae (Jornadia)
lasebikani (Nothrus)
laselvae (Galumna)
laselve (Oribotritia)
lasithiensis [S. (Tropacarus)]
lata (Cultroribula)
lata (Dometorina)
lata [S. (Flagrosuctobelba)]
lata (Galumna) (=tarsipennata)
lata (Hafenferrefia)
lata [R. (Insculptoppia)]
lata [O. (Zygoribatula)]
latebrosus [H. (Notophthiracarus)]
latens (Microzetes) (=septentrionalis)
lateoalveolatus (Austrocarabodes)
laterodentatus (Nodocepheus)
laterospinosa [H. (Rhacaplacarus)]
laterostris [R. (Insculptoppia)] (=insculpta)
laterostris (Liacarus) (=longilamellatus)
laticephalus (Neamerus) (?=lundbladi)
laticeps (Cuneoppia)
laticeps (Epieremulus)
laticeps (Verachthonius)
laticlava [S. (Grandjeanobates)]
laticlava (Hemileius) (=proximus)
laticostulatus (Eueremaeus)
laticuspidata (Sulcoribula)
laticuspidatus (Ceratozetes)
laticuspidatus (Peloptulus)
laticuspis (Cultroribula)
laticuspis (Exochocepheus)
latidens (Berniniella)
latifasciata (Globoppia)
latiflabellata (Licnobelba)
latifolius (Phyllozetes)
latilamellaris (Tectocepheus) (=sarekensis)
latilamellata (Palmitalia)
latilamellata (Schalleria)
latilamellata (Szentivanyella)

latilamellatus [T. (Latilamellobates)]
latilamellatus (Liacarus)
latilamellatus (Limnozetes)
latilamellatus (Peloptulus)
latilamellatus [C. (Tanzaniacepheus)] (=ornatus)
latilamellatus (Xenillus)
latilamellatus (Zachvatkinibates)
latilobatus (Punctoribates)
latincisus (Trichoribates)
latiohumeralis (Reductobates)
latior (Carabocepheus)
latior (Eobrachychthonius)
latior [H. (Notophthiracarus)]
latior (Zetorchella)
latipectoralis (Suctobelbella)
latipes (Scheloribates) pallidulus
latipilosa (Fenichelia)
latipilosus (Eupelops)
latipilosus (Lepidozetes)
latipluma [A. (Acrogalumna)] (=longipluma)
latirostrata (Coartobelba)
latirostratus (Trichoribates)
latirostris (Beckiella)
latirostris (Oribatula) sp. inq.
latirostris (Paraphauloppia)
latirostris (Oxyamerus)
latirostris (Peloptulus)
latirostris (Scapheremaeus)
latirostris (Tegoribates)
latirostris [S. (Ussuribata)]
latiseta (Aokiella)
latisetosus (Neovochthonius)
latissimus (Annobonzetes)
latissimus (Austrocarabodes)
latissimus (Dinozetes)
latissimus [C. (Xiphobates)]
latisternalis [O. (Dzarogneta)]
latisternum (Cycloppia)
latitecta (Anachipteria) (=howardi)
latiusculus [L. (Dorycranosus)]
lativentris (Liacarus) (=subterraneus)
latoclava (Lyrifissiella)
latodentata [S. (Ussuribata)]
latohumeralis (Austrocarabodes)
latohumeralis (Campbellobates)
latoincisus (Scheloribates)
latolamellata (Gustavia)
latus (Allozetes)
latus (Annobonzetes)
latus [M. (Archegotocepheus)]
latus (Cavernozetes)
latus (Cepheus)
latus (Feiderzetes)
latus (Liacarus) Ewing, 09
latus (Liacarus) Schweiz., 56 *(=major)*
latus (Liochthonius) Jac., 36 *(=brevis)*
latus (Liochthonius) Mah., 82
latus (Neseutegaeus)
latus (Nippobodes)
latus (Peloribates)
latus [S. (Perscheloribates)]
latus (Plateremaeus)
latus (Scapheremaeus)
latus (Totobates)
latus (Transoribates)
latus [E. (Trischeloribates)]
latus (Tyrphonothrus)
latus (Unguizetes)
latus (Xenillus) (=clypeator)
laubieri [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)
laurisilvae (Hermanniella)
lauta [N. (Leptosuctobelba)]
lautus (Phthiracarus)
lavoipierrei (Paralycus)
lawariensis (Mixacarus)
lawariensis (Proteremaeus)
lawrencei (Galumna)
lawrencei (Neoliodes)
lawrencei (Xenillus)
laxtoni (Suctobelbella) (?=subcornigera)
laysanensis (Hypozetes)
lazitanicus [S. (Tropacarus)] (=patruelis)
leahae (Paraleius)
lebanonensis (Xenillus)
lebedevi (Lauroppia)
lebronneci (Austrotritia)
lebruni (Paroppia)
lectronus (Liacarus)
ledensis (Dentizetes)
leei [C. (Aokibelba)]
leei (Hoplophorella)
leei (Pedrocortesella)
leei (Phylleremus)
leei [H. (Phyllhermannia)]
leei (Stomacarus)
legendrei (Paralopheremaeus)
lejeunei (Galumna)
leleupi (Allogalumna)
leleupi [H. (Capillonothrus)] sp. inq.
leleupi (Liacarus) sp. inq.
leleupi (Nothrus) sp. inq.
leleupi (Oppia) sp. inq.
leleupi (Scheloribates)
leliehoekensis (Phthiracarus)
lemannae [H. (Phyllhermannia)]
lemensis [P. (Triaunguis)]
lemnae (Hydrozetes)
lemuria [H. (Kakophthiracarus)]
lemuria (Lasiobelba)
lencoranicus (Liacarus) (=coracinus)
lencoranicus (Scheloribates) (=longus)
lengersdorfi [D. (Kunstidamaeus)]
lenicomus (Mycobates) (=parmeliae)
lenis [M. (Multilanceoppia)] brevipectinata
lenkoi [E. (Neoepilohmannia)]
lenkoi (Oripoda)
lenticulata (Pergalumna)
lenticulata [O. (Zygoribatula)]
lenticulatus (Hypovertex)
lentulus (Phthiracarus)
lentus (Synchthonius)
leoi [K. (Rimandocepheus)]
leoneae (Machadocepheus)
leonilae [M. (Bimagyaria)]
leonilae (Hoplophthiracarus)
leonilae [H. (Phyllhermannia)]
leontonycha (Paraleius)
leowae (Archeremella)
lepidus (Austrocarabodes)
leporoides (Eremobelba) sp. inq.
leptaleus (Liochthonius)
lepteces (Oribotritia)
lerellana (Lohmannia)
lesleyae [Q. (Coronoquadroppia)] (=monstruosa)
leucaena (Arthrovertex)
leurolomasus (Gymnodamaeus)
levigata [O. (Zygoribatula)]
levipunctatus (Peloribates)
levis (Allozetes)
levis (Liochthonius) (=evansi)
levisensilla (Galumna)
leviseta [M. (Parplophora)]
levyi (Bovicarabodes)
lewisensis [H. (Steganacarellus)]
lewissmithi (Furcobates)
leytensis (Dolicheremaeus)
leytensis [H. (Phyllhermannia)]
leytensis (Orthogalumna)
liacariformis (Suctobelbella)
liaoi (Aokiella)
liber (Punctoribates)
licnophora (Hoplophorella) (=cucullata)

licnophorus (Licneremaeus)
lichenis (Allomycobates)
lienhardi [O. (Acrotocepheus)]
lienhardi [H. (Besuchetacarus)]
lienhardi (Coronibatula)
lienhardi (Elaphoppia)
lienhardi (Hoplophorella) (=andrei)
lienhardi (Nasozetes)
lienhardi (Papillacarus)
lienhardi (Passalozetes)
lienhardi (Pseudotocepheus)
lienhardi (Sabahtritia)
lienhardi (Suctobelbella)
lienhardi (Zetomotrichus)
lienhardorum [O. (Acrotocepheus)]
ligamentifer (Stomacaus)
ligneus [P. (Archiphthiracarus)]
lignivora [M. (Pentoppia)] (=splendens)
ligulata (Cultroribula)
ligulifera (Hoplophorella) (=hamata)
lijiangensis (Leobodes)
liklik (Malaconothrus)
limae (Discoppia)
limasetosa (Metabelba)
limbata (Acrotritia) (=duplicata)
limbulatus (Eupelops) sp. inq.
limburgiensis (Oribella) (=pectinata)
limpida (Dometorina)
linata (Pergalumna) (=myrmophila)
lindoae [C. (Cyrtozetes)]
lindquisti (Eueremaeus)
lindquisti (Gymnodampia)
lindsayae (Pheroliodes)
lineaporosa [O. (Zygoribatula)]
linearis [B. (Passalobates)]
linearis (Zetomotrichus)
lineasetosa (Austrocarabodes)
lineata (Apoplophora) (=pantotrema)
lineata (Cultroribella)
lineata [S. (Flagrosuctobelba)]
lineata (Machuella)
lineata (Oribatula) (=repetita)
lineata (Protoripoda)
lineata (Trichogalumna)
lineata [O. (Zygoribatula)]
lineatus (Ameronothrus)
lineatus (Brachychthonius)
lineatus (Dolicheremaeus)
lineatus (Eremaeozetes)
lineatus (Geminozetes)
lineatus [M. (Megazetes)]
lineatus [H. (Notophthiracarus)]
lineatus (Peloribates)
lineatus [H. (Tuberemaeus)]
lineola [O. (Zygoribatula)] (=exilis)
lineolata (Heterogalumna)
lineolatus (Bipassalozetes)
lineolatus (Constrictobates)
lineolatus (Dolicheremaeus) Bal. *et* Mah., 67
lineolatus (Dolicheremaeus) Ham., 81 *(=hammerae)*
lineolatus [H. (Notophthiracarus)]
lineolatus (Tyrphonothrus)
lingulatus [L. (Dorycranosus)]
linieatus (Licneremaeus)
linjiangensis (Oribatella)
lionsi [L. (Hamoppia)]
lionsi [H. (Notophthiracarus)]
liparus [P. (Archiphthiracarus)]
lipataensis (Sphaerochthonius)
liratus [H. (Notophthiracarus)]
lischanni (Melanozetes) sp. inq.
lisosetosus (Tyrphonothrus)
liti (Dolicheremaeus)
litoralis (Mabulatrichus)
litoralis (Oribatella) arctica
litoratis (Scheloribates)
litoralis (Sphaerochthonius)
litosus (Caenosamerus)
littlewoodae (Pulchroppiella)
littoralis (Halozetes)
littorea (Schusteria)
littoristicus [C. (Klapperiches)]
lividus [P. (Archiphthiracarus)]
lizelhugoae [S. (Bischeloribates)]
lobata (Austrachipteria) Ham., 67
lobata (Austrachipteria) B. *et* P. B., 83 *(=hammerae)*
lobata (Karenella)
lobata (Oripoda)
lobata (Suctobelbella) acutidens
lobatus (Cepheus) sp. inq.
lobatus (Reticulocepheus) (=decoui)
lobatus (Torpacarus)
lobatus (Zachvatkinibates)
lobodentata (Suctobelbella) sp. inq.
loebli [O. (Acrotocepheus)]
loebli (Hoplophthiracarus)
loebli (Lohmannia) (=paradoxa)
lokobensis (Rhopalozetes)
loksai (Coartobelba)
loksai (Megalotocepheus)
loksai (Rhinoppia)
loksai [P. (Tentaculozetes)]
longa [O. (Zygoribatula)] (=longisensilla)
longelamellata (Oribatula)
longesensillus (Achipteria) sp. inq.
longesensillus (Melanozetes) (=interruptus)
longiareata (Pilogalumna) crassiclava
longibulbula (Crotonia)
longicarinatus (Epieremulus)
longicarinatus (Hoplophthiracarus)
longicaudatus (Loftacarus)
longicaulis (Antarctozetes)
longiceps (Pheroliodes)
longiciliata (Machadobelba)
longiciliata [N. (Paractenogalumna)]
longiclava (Coartobelba)
longiclava (Galumna)
longiclava (Neoamerioppia)
longiclava (Neoamerioppia)
longicoma (Leoppia)
longicoma (Neoamerioppia)
longicoma (Peloribates)
longicornis (Gustavia)
longicornis (Protozetes)
longicornutus (Furcobates) (=hastatus)
longicurva (Suctobelbella)
longicuspis (Ceratoppia)
longicuspis (Mahunkazetes)
longicuspis (Scapheremaeus)
longicuspis (Suctobelbella)
longicuspis [O. (Zygoribatula)]
longidentata (Suctobelbella)
longidorsus [T. (Cristonothrus)]
longifilis (Ceratoppia) sp. inq.
longifissus (Eupelops) (=subuliger)
longifolius (Phyllozetes)
longilamellata (Autogneta)
longilamellata (Moritzoppia)
longilamellata (Oribatula) (=macrostega)
longilamellatus (Liacarus)
longilamellatus (Scapheremaeus)
longilamellatus [P. (Triaunguis)]
longilinea [O. (Zygoribatula)]
longilineata (Neogalumna)
longinoi (Allonothrus)
longinqua (Nannerlia)
longior (Pergalumna) (=myrmophila)
longior (Liebstadia)
longior (Otocepheus)
longior (Paralycus)
longior (Pilobates) (?=carpetanus)
longior (Scheloribates)

longipectinata (Trapezoppia)
longipediseta [H. (Phyllhermannia)]
longipes (Damaeus) Will., 40 *sp. inq.*
longipes (Damaeus) Mih., 57 *(=firmus)*
longipes (Neoliodes) sp. inq.
longipes (Podoribates)
longipes (Trhypochthonius) sp. inq.
longipes (Xenillus)
longipila (Synichotritia)
longipilis (Jornadia)
longipilis (Liacarus)
longipilis (Pseudoceratoppia)
longipilis (Trichoribates) Will., 51
longipilis (Trichoribates) Mih., 56 *(=brevicuspis)*
longipilis [C. (Xiphobates)] (=interpositus)
longipilosa (Dissorhina)
longipilosa [M. (Pravoppia)] (=loxolineata)
longipilosa [H. (Rhacaplacarus)]
longipilosa [T. (Sarawakiella)]
longipilosa (Zetorchella)
longipilosus (Peloribates)
longipilosus (Totobates)
longipilus (Asperemaeus)
longipilus (Cryptacarus)
longipilus (Dolicheremaeus)
longipilus (Globozetes)
longipilus (Liochthonius)
longipilus [P. (Neotocepheus)]
longipilus (Nothrus) Berl., 10
longipilus (Nothrus) Mi., 59 *(=neonominatus)*
longipilus (Oribatula) (=pannonica)
longipilus (Xenillus)
longipilus (Zachvatkinella) sp. inq.
longipluma [A. (Acrogalumna)]
longipluma (Lauritzenia)
longiporosa (Galumna) Fuji., 72
longiporosa (Galumna) Choi, 86 *(=coreana)*
longiporosa (Neogalumna)
longiporosa (Pergalumna)
longiporosa (Phauloppia) Kuli., 68 *(=lucorum)*
longiporosa (Phauloppia) P.-I., 76 *(=lucorum)*
longiporosa (Phauloppia) Mah., 82 *(=lucorum)*
longiporosa (Phauloppia) Djap., 85 *(=lucorum)*
longiporosa [O. (Zygoribatula)] (=undulata)
longiporosus (Ghilarovizetes)
longiporosus [I. (Haplozetes)] (=vindobonensis)
longiporosus [P. (Minguezetes)]
longiporosus (Totobates)
longiporosus (Unguizetes)
longiporus [A. (Acrogalumna)] (=longipluma)
longiprocessus (Pilobates)
longiramosa (Wallworkoppia) (=cervifer)
longirostralis (Euphthiracarus)
longirostralis (Macrogena)
longirostris (Gustavia) (=maior)
longirostris (Suctobelbella)
longirostris [M. (Trimalaconothrus)] Willm., 29
longirostris [M. (Trimalaconothrus)] H., 66 *(=iteratus)*
longisacculus [I. (Haplozetes)]
longisacculus (Muliercula)
longisensilla (Aeroppia)
longisensilla (Galumna)
longisensilla (Lasiobelba)
longisensilla [O. (Zygoribatula)]
longisensillata (Elaphoppia)
longisensillata (Suctobelbella)
longisensillus (Atropacarus)
longisensillus (Scarabacarus)
longisensilus (Scheloribates)
longiseta (Condyloppia) pilosella
longiseta (Damaeus)
longiseta (Dolicheremaeus) magnus
longiseta (Epieremulus)
longiseta (Eremaeus)
longiseta (Fortuynia)
longiseta (Furcoppia)
longiseta (Genavensia)
longiseta (Globoppia) (=intermedia)
longiseta (Gustavia)
longiseta (Lucoppia) (=burrowsi)
longiseta (Mesoplophora)
longiseta (Oripoda)
longiseta [A. (Parabelbella)]
longiseta (Sadocepheus)
longiseta (Trichoppia)
longisetae (Halozetes) belgicae
longisetae (Protoribates) (=oblongus)
longisetosa (Achipteria)
longisetosa [C. (Aokibelba)]
longisetosa (Arcoppia)
longisetosa (Banksinoma)
longisetosa [O. (Bioribatella)] superbula
longisetosa (Crotonia)
longisetosa (Epimerella) smirnovi
longisetosa (Eremobelba)
longisetosa [M. (Hammeroppia)]
longisetosa (Hermanniella)
longisetosa [B. (Kokoppia)]
longisetosa (Mesoplophora)
longisetosa (Microppia) minus
longisetosa (Oribatella) (=neonominata)
longisetosa (Pergalumna)
longisetosa [H. (Phyllhermannia)]
longisetosa (Quadroppia)
longisetosa [H. (Rhacaplacarus)]
longisetosa (Setoppia)
longisetosa (Suctobelbella)
longisetosa (Tectoppia)
longisetosa (Zetorchella)
longisetosus (Annectacarus)
longisetosus (Archegozetes) magnus
longisetosus (Austrocarabodes)
longisetosus [H. (Calyptophthiracarus)]
longisetosus (Eobrachychthonius)
longisetosus (Eupelops)
longisetosus [C. (Flexa)] (=intermedius)
longisetosus (Haplochthonius)
longisetosus (Heminothrus)
longisetosus (Hydrozetes)
longisetosus [D. (Kunstidamaeus)]
longisetosus (Megatrichobates)
longisetosus (Melanozetes) Ham., 52
longisetosus (Melanozetes) Mah., 84 *(=mahunkai)*
longisetosus (Meristacarus)
longisetosus (Miracarus)
longisetosus (Papillocepheus)
longisetosus (Peloribates) Will., 30
longisetosus (Peloribates) Tseng, 84 *(=tsengi)*
longisetosus (Platyliodes)
longisetosus [H. (Protophthiracarus)] (=longisetus)
longisetosus (Rhynchoribates)
longisetosus [K. (Rimandocepheus)]
longisetosus (Scheloribates)
longisetosus (Steganacarus) (=herculeanus)
longisetosus (Thamnacarus)
longisetosus [M. (Trimalaconothrus)]
longisetosus [H. (Tuberemaeus)]
longisetosus (Xenillus)
longisetosus (Yungaseremaeus)
longisetus (Euphthiracarus)
longisetus (Galumnopsis)
longisetus (Micreremus)
longisetus [H. (Notophthiracarus)]
longisetus (Oribatodes) (=mirabilis)
longisetus (Pheroliodes)
longisetus [H. (Protophthiracarus)] (=niedbalai)
longisetus (Sphaerochthonius)
longisetus (Sturmozetes)
longisetus (Trhypochthoniellus)
longispina (Ceratozetes)
longispina (Dissorhina)
longispina (Oribatella)

longispina [Z. (Protozetomimus)]
longispinosus [D. (Epidamaeus)]
longissima (Goyoppia)
longissima (Pseudoppia)
longissimus (Heteroleius)
longissimus (Perxylobates)
longissimus (Vermacarus)
longistriatus (Berlesezetes)
longitarsalis [D. (Epidamaeus)]
longitudinalis (Suctobelbila)
longiusculus (Protoribates) sp. inq.
longocuspidatus (Ceratozetes) (=gracilis)
longohisterosoma (Moritzoppia)
longqiensis [H. (Rhacaplacarus)]
longula [A. (Acrogalumna)]
longulus (Austrocarabodes) sp. inq.
longulus (Euphthiracarus)
longulus (Phthiracarus)
longus (Damaeus)
longus (Gymnobatoides)
longus [L. (Longocepheus)] Bal., 1961
longus [L. (Longocepheus)] Mah., 1973 *(=mahunkai)*
longus [H. (Notophthiracarus)]
longus (Parapirnodus)
longus (Protoribates) (=oblongus)
longus (Scheloribates)
longus (Totobates)
longus (Tuberocepheus)
longyanensis (Paulianacarus)
loongchiensis (Lauritzenia)
lophothrichus (Protoribates)
lordhowensis (Pheroliodes)
loricata (Acrotritia) (?=ardua)
losbanosensis (Dolicheremaeus)
louisae (Eremaeozetes)
louisbothai (Floritrichus)
louiseae (Nothrus)
louiseae [D. (Saltatrichus)]
louisiae [H. (Phyllhermannia)]
louisianae (Pergalumna)
lounsburyi (Carabocepheus)
louwi (Brachioppia)
louwi (Scheloribates)
lowmanae (Paraxylobates)
loxolineata [M. (Pravoppia)]
lucasi (Novonothrus)
lucasi (Scheloribates) (=laevigatus)
lucasiformis (Scheloribates) sp. inq.
lucens (Cantharozetes)
lucens (Oromurcia)
luchili (Scheloribates)
lucianus (Microtegeus)
lucida (Acrotritia) (=curticephala)
lucida [O. (Zygoribatula)]
lucidus (Afroleius)
lucidus [P. (Archiphthiracarus)] (=piger)
lucida (Phauloppia) (=rauschenensis)
lucidus (Dolicheremaeus)
lucidus [S. (Tropacarus)]
luciensis (Scheloribates)
luciensis [A. (Synkrotima)]
lucifer (Chamobates) (=cuspidatus)
lucorum (Phauloppia)
luculenta (Neolucoppia)
lucunosus (Nothrus)
ludingensis [C. (Triachipteria)]
lugubris (Nothrus) sp. inq.
luisae (Oribatella)
luisae (Striatoppia)
luiseae [M. (Phyllolohmannia)]
luisi [G. (Stenoppia)]
luisiae [E. (Licnocepheus)]
luisiae (Rugoppia)
luminosa (Cyrthermannia)
luminosa [S. (Diphauloppia)]
luminosa (Oripoda)
luminosus (Perscheloribates)
lumotus [S. (Perscheloribates)]
lunai (Trichogalumna)
lunare (Banksinoma) lanceolata
lunaris (Austrocarabodes)
lunaris (Berniniella)
lunaris (Galumna)
lunaris (Microzetes)
lunata [R. (Insculptoppia)]
lunatus [H. (Protophthiracarus)]
lunatus [H. (Steganacarellus)]
lundbladi [A. (Neamerus)]
lupitae (Kalyptrazetes)
lupus (Damaeus)
luridus [P. (Archiphthiracarus)]
luscus (Liacarus)
lushuiensis (Campachipteria)
lusitanicus (Cosmochthonius)
lustrum (Limnozetes)
lutea (Ceratoppiella)
lutea (Kodiakella)
luteoauratus [C. (Klapperiches)]
luteomarginatus (Lopholiodes)
luteomarginatus (Scheloribates)
luteomarginatus (Totobates)
luteus (Antarctozetes)
luteus [P. (Biunguis)]
luteus (Hypochthonius)
luteus (Neogymnobates)
luteus [S. (Perscheloribates)]
luteus (Totobates)
luteus [P. (Vepracarus)]
lutosisetosus [P. (Triaunguis)]
lutulentus (Atropacarus) (=csiszarae)
luxtoni [L. (Baioppia)]
luxtoni (Dolicheremaeus)
luxtoni (Epimerella)
luxtoni [R. (Insculptoppia)]
luxtoni [L. (Lagenobates)]
luxtoni (Malaconothrus) (=scutatus)
luxtoni [H. (Phyllhermannia)]
luxtoni (Scapheremaeus)
luzonensis (Arcoppia)
luzonensis [S. (Perscheloribates)]
luzonensis (Phylloribatula)
luzonica (Dampfiella)
luzonica (Epilohmannia)
luzonica [M. (Pentamagyaria)]
luzonica (Setogalumna)
luzonicellus (Dolicheremaeus)
luzonicus (Dolicheremaeus)
lydia [N. (Parakalumma)]
lydiae (Sellnickochthonius)
lyrata (Crotonia)
lyrica (Galumna)
lyroseta (Ramusella)
mabar [O. (Zygoribatula)]
macaoensis (Meristolohmannia)
macedi (Nothrus)
macedonicus (Bipassalozetes)
macerochaeta (Allobelba)
macfadyeni (Crotonia)
macfarlanei (Africoribates)
macfarlani (Stomacarus)
machadoi [A. (Acrogalumna)]
machadoi (Dolicheremaeus)
machadoi (Eremaeozetes)
machadoi (Malaconothrus) sp. inq.
machadoi [M. (Neobelba)]
machadoi (Phthiracarus) sp. inq.
machadoi (Plasmobates) sp. inq.
machadoi [H. (Rhacaplacarus)]
machadoi (Rhynchobelba)
machadoi (Striatoppia) sp. inq.
machadoi (Wallworkoppia)
mackenziensis [D. (Epidamaeus)]

macleani (Proteremaeus)
macquariensis (Halozetes) D., 58 *(P.)*
macquariensis (Halozetes) D., 58 *(A.) (=marinus)*
macrodentata (Austrachipteria)
macrodentata (Suctobelbella)
macrodentatus [O. (Acrotocepheus)]
macrodon (Sucobelbella) (=subcornigera)
macrofissura (Micreremus)
macrofoliatus (Archegocepheus)
macrofoveolatus (Malaconothrus)
macromediocris (Ceratozetes)
macromucronatus (Leptotocepheus)
macronuda [L. (Incabates)]
macronycha (Hermannia) sp. inq.
macroonyx (Totobates)
macropoda (Tectodamaeus)
macroporosus (Eupelops) torulosus
macroporosus [F. (Cosmogalumna)]
macroprionus (Platyliodes)
macroptera (Galumna)
macropunctinatum (Pheroliodes)
macrorostralis (Euphthiracarus)
macrorostrum (Oribatula) sp. inq.
macrosacculatus (Neoribates)
macrosculpturatus [S. (Tropacarus)] (=balearicus)
macroseta [S. (Flagrosuctubelba)]
macrosetosus (Cosmochthonius)
macrosetosus (Ethiovertex)
macrostega (Oribatula)
maculata (Crotonia)
maculata (Fortuynia)
maculata [S. (Lalmoppia)]
maculata (Oribatula) (=tibialis)
maculata (Suctobelbella) subcornigera
maculatus (Ameronothrus)
maculatus (Austrocarabodes)
maculatus [H. (Notophthiracarus)]
maculatus (Papillonotus)
maculatus (Scheloribates)
maculosa (Crassoribatula)
maculosa (Ctenobelba) (?=pectinigera)
maculosus (Atropacarus)
maculosus (Eremaeozetes)
madagascarensis (Allogalumna)
madagascarensis (Austrocarabodes)
madagascarensis [I. (Haplozetes)]
madagascarensis (Hermanniella)
madagascarensis (Lanceoppia)
madagascarensis (Meristacarus)
madagascarensis (Neoribates)
madagascarensis (Nothrus)
madagascarensis (Oribatella)
madagascarensis (Striatoppia)
madagassica (Bursoplophora)
madagassica (Pustuloppia)
madagassica (Trichogalumna)
madecassus (Rhopalozetes)
madegassica [N. (Leptosuctobelba)]
madegassica [M. (Parplophora)]
madegassus (Pseudopirnodus)
madeirensis (Anomaloppia)
madeirensis (Liacarus)
madeirensis (Scapheremaeus) (=corniger)
madininensis (Teleioliodes)
maerkeli (Lanceoppia)
maerkeli (Mesotritia)
magallanesensis [G. (Stenoppia)]
maganda [H. (Phyllhermannia)]
magdalenae (Scapheremaeus)
magellanis (Anderemaeus)
magellanis (Austroppia) (=crozetensis)
maghrebinus [S. (Tropacarus)] (=boulfekhari)
magkakaibaeus (Peloribates)
magna (Ceratozetella) imperatoria
magna (Furcoribula) (=furcillata)
magna (Gigantoppia)
magna [B. (Gressittoppia)]
magna (Heterobelba)
magna (Kodiakella) (?=dimorpha)
magna (Mongaillardia)
magna (Oribotritia)
magna (Oripoda)
magna (Parachipteria)
magna (Polyoppia)
magna [H. (Rhacaplacarus)] (=sculptilis)
magna [O. (Zygoribatula)] (=excavata)
magnicava [S. (Flagrosuctobelba)]
magnifera [S. (Flagrosuctobelba)]
magnifica (Gustavia)
magnifica (Paenoppia)
magnificus (Zetomimus)
magnilamellata (Anachipteria)
magnilamellata (Gustavia)
magnilamellatus [T. (Tyrphonothrus)]
magnipilosa (Aeroppia)
magnipora (Pergalumna)
magniporosa (Paraphauloppia)
magniporosus [P. (Triaunguis)]
magniporosus (Uracrobates)
magniporus (Eueremaeus)
magniserrata (Spinoppia)
magniseta (Oribatella) (=quadridentata)
magnisetosus (Adrodamaeus)
magnisetosus (Peloribates)
magnisetosus (Tyrphonothrus)
magnodentata [S. (Ussuribata)]
magnus (Archegozetes)
magnus (Carabodes)
magnus (Damaeolus)
magnus (Dolicheremaeus) Bal., 1958
magnus (Dolicheremaeus) Aoki, 2006 *(=junichiaokii)*
magnus (Dynatozetes)
magnus (Eohypochthonius)
magnus (Eremaeus) (=cordiformis)
magnus (Humerobates) (?=guadarramicus)
magnus (Neobrachychthonius)
magnus (Nothrus)
magnus [D. (Saltatrichus)]
magnus (Scheloribates)
magnus (Steganacarus)
magnus (Topobates)
magnus (Torpacarus)
magnus (Totobates)
magnus [P. (Triaunguis)]
magoebaensis (Afrozetes)
magoebaensis [C. (Magoebazetes)]
mahabaeus (Annectacarus)
mahabasensillus (Dolicheremaeus)
mahani (Oribatella)
maharashtraensis (Haplacarus)
maheensis (Afronothrus) (=incisivus)
mahnerti (Ceratozetes) (=platyrhinoides)
mahnerti (Ctenobelba)
mahnerti (Dolicheremaeus)
mahnerti (Scheloribates)
mahunkai (Acrotritia) (=rustica)
mahunkai (Arcoppia)
mahunkai (Austrocarabodes)
mahunkai (Bipassalozetes)
mahunkai [E. (Biethiovertex)]
mahunkai [S. (Bischeloribates)]
mahunkai [Q. (Coronoquadroppia)] (=monstruosa)
mahunkai [T. (Cristonothrus)]
mahunkai (Cryptoppia)
mahunkai (Dampfiella)
mahunkai (Epilohmannia)
mahunkai (Eremobelba)
mahunkai (Eurostocepheus)
mahunkai (Gibbicepheus)
mahunkai (Hoplophorella)
mahunkai (Hypochthoniella)
mahunkai (Leptotocepheus) (=corpuzrarosae)

mahunkai [L. (Longocepheus)]
mahunkai (Melanozetes)
mahunkai [P. (Neophthiracarus)] (=shiptoni)
mahunkai [H. (Notophthiracarus)] Niedb., 1987
mahunkai [H. (Notophthiracarus)] Niedb. *et* Sta., 2013
mahunkai (Oribotritia)
mahunkai (Pergalumna)
mahunkai (Protoribates)
mahunkai (Rhinoppia)
mahunkai (Setoppia)
mahunkai (Tectoribates)
mahunkaius (Scapheremaeus)
mahunkarum (Cryptoppia) (=mahunkai)
mahunkarum (Megalotocepheus)
mahunkasandori [P. (Lignobates)]
maidii [A. (Synkrotima)]
maidililae (Basilobelba)
maiensis (Lucoppia) (=burrowsi)
maigsius [P. (Triaunguis)]
mailloli (Provertex)
maimaensis (Atopochthonius)
maior [H. (Capillonothrus)] (=capillatus)
maior (Ceratozetella) Berl., 04 *(?=maxima)*
maior (Ceratozetella) Irk, 39 *(=maxima)*
maior (Globoppia)
maior (Gustavia)
maior (Sphaerozetes) (=neonominatus)
maior (Tyrphonothrus)
maitri (Haplochthonius)
majestus (Gozmanyina)
major (Achipteria) coleoptrata ssp. inq.
major (Anachipteria) Mih., 56 *(=howardi)*
major (Anachipteria) Mih., 57 *sp. inq.*
major [L. (Antennoppia)]
major (Eueremaeus) (?= travei)
major (Eupelops) (?=hirtus)
major (Galumna) sp. inq.
major (Granuloppia)
major (Hemileius)
major [L. (Incabates)]
major (Liacarus) brevilamellatus
major (Magellozetes) (=traegardhi)
major (Minunthozetes) (=semirufus)
major (Oribatula) interrupta
major [H. (Platynothrus)] (=novaezealandicus)
major (Prototritia)
major (Scheloribates) praestantissimus
major (Tritegeus)
makarchevae (Sadocepheus)
makarchevae (Sucteremaeus)
makarovae (Pachygena)
makarovae (Pergalumna)
makii [L. (Incabates)]
makilingensis (Basiceramerus)
makilingensis (Galumna)
makilingensis (Truncopes)
makinisus (Birobates)
makokouensis (Solenozetes)
malabarica (Dometorina)
malabaricus (Drymobatoides)
malaconothroiformis (Trhypochthoniellus)
malagasensis [H. (Notophthiracarus)] aokii
malagensis (Phthiracarus)] (=longulus)
malakicondylus (Dolicheremaeus)
malakipinae (Allosuctobelba)
malakius (Dolicheremaeus)
malalatinae (Erioppia)
malangensis (Dolicheremaeus)
malapectinata (Pulchroppia)
malatestai [S. (Tropacarus] (=lucidus)
malaya (Apoplophora)
malaya (Oribatella)
malaysiaensis (Arcoppia)
maledivensis (Fortuynia)
malgache (Idiozetes)
maliit (Dolicheremaeus)
malindangensis [O. (Acrotocepheus)]
malindangensis (Pentacepheus)
malindangensis [H. (Phyllhermannia)]
mallacoolaensis [H. (Rhacaplacarus)]
malleensis (Eremaeozetes)
malleolus (Neoliodes) (=concentricus)
mambusaoensis (Dolicheremaeus)
mammillaris (Masthermannia)
mammillatus (Papillacarus)
mammillatus (Rostrozetes)
manantialis (Tuxenia)
mandelai (Brachioppia)
mandjeliae (Pentazetes)
mangamuka (Oribotritia)
manganellii (Steganacarus)
manganoi [C. (Klapperiches)]
mangrovi (Carinozetes)
manguiati (Bathocepheus)
maniculatus [M. (Trimalaconothrus)]
manifera (Anomaloppia)
manifera (Dolicheremaeus)
manifera [C. (Klapperiches)]
manipurensis [H. (Kakophthiracarus)]
manningensis (Oribatella)
manoai (Scheloribates)
manzanoensis [P. (Minguezetes)] (=insignis)
maoershanensis (Caenosamerus) spatiosus
maoershanensis [P. (Oribellopsis)] crosbyi
maoriensis (Scheloribates)
marasensis (Epimerella)
marauni [O. (Fenestrobates)]
marcuardi (Apoplophora)
marcuzzii (Ctenobelba)
margarita [N. (Leptosuctobelba)]
margaritae (Malaconothrus)
margaritae (Stictozetes)
margaritata (Pergalumna)
margaritata (Striatoppia)
margaritata (Suctobelbila)
margaritatus (Cosmochthonius)
margaritatus [L. (Undulozetes)]
margaritifera (Allogalumna)
margaritifera (Striatoppia)
margatensis (Eupelops)
marginalis (Scapheremaeus)
marginata (Pilogalumna) (?=tenuiclava)
marginatus (Benoibates)
marginatus (Carabodes)
marginatus (Gressittolus)
marginatus (Javacarus) sp. inq.
marginatus [B. (Lanibelba)]
marginatus (Liacarus) sp. inq.
marginatus (Malaconothrus)
marginatus (Neobrachychthonius)
marginatus [H. (Notophthiracarus)]
marginatus (Scutovertex)
marginatus (Sturmozetes)
marginedentata (Lauroppia) falcata
marginedentatus (Scheloribates) sp. inq.
marginepunctatus (Carabodes) (=labyrinthicus)
margosetosa (Xiphobelba) (=hamanni)
mariae (Galumna)
mariana (Hoplophorella) (=singularis)
mariana [O. (Zygoribatula)]
mariannae (Pseudoceratoppia)
marianoi (Gehypochthonius)
marieae (Austrachipteria) (=hammerae)
mariehammerae (Aeroppia)
mariehammerae (Antarctozetes)
mariehammerae (Dicrotegaeus)
mariehammerae (Dolicheremaeus)
mariehammerae [O. (Zygoribatula)]
marilynae (Neogymnobates)
marina (Fortuynia)
marina (Schusteria)
marina [O. (Zygoribatula)]

marinus (Ameronothrus)
marinus (Halozetes)
marionensis (Dometorina)
marionensis (Halozetes)
marionensis (Totobates)
maritalis (Quadroppia)
maritima (Corynoppia)
maritima (Lauroppia)
maritimus (Hoplophthiracarus)
maritimus (Tyrphonothrus)
maritimus (Zachvatkinibates)
markusi (Dolicheremaeus)
marlenae (Crotonia)
marmoratus (Scapheremaeus) (=marginalis)
maroccanus (Cosmochthonius)
maroccanus (Sellnickochthonius)
marplatensis (Neoliodes)
marquesalis (Scheloribates) indicus
marquesana (Pergalumna) hawaiiensis
marquesi (Pergalumna) bryani
marshalli (Eueremaeus)
marshalli (Multimaudheimia)
marshalli [D. (Saltatrichus)]
martensi [H. (Rhacaplacarus)]
martii (Schalleria)
martinezi [B. (Gressittoppia)]
martinezi (Tegeocranellus)
martyanensis (Ctenobelba)
maruokaensis [H. (Phyllhermannia)]
maruyamai (Ghilarovizetes)
maryae (Oribatella)
masahitoi (Autogneta)
masani [H. (Monoschelobates)]
masinasin (Eueremaeus)
masneri (Uracrobates)
mastax (Lineoppia)
mastigophora [L. (Aegyptogalumna)]
mastigophora (Medioxyoppia)
mastigos [H. (Notophthiracarus)]
mastyx (Hermanniella)
mataderoensis (Anderemaeus)
matatatipu [H. (Notophthiracarus)]
matecumbei (Galumna) macroptera
matildebellae [E. (Licnocepheus)]
matritensis (Corynoppia) kosarovi
matritensis (Oribella)
matritensis (Pergalumna) semistritata
matritensis [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)
matshabelii (Liacarus)
matskasii (Xenillus)
matuku [H. (Protophthiracarus)]
matulis (Dolicheremaeus)
matulisus (Scheloribates)
maurensis (Protoribates)
maurii [E. (Neoepilohmannia)]
mauritanica (Grandjeanoplophora)
mauritiana (Indopacifica)
mauritii (Dimidiogalumna)
mauritii (Dolicheremaeus)
mauritii (Kuklosuctobelba) (=claviseta)
mauritii [H. (Phyllhermannia)] Jac., 36
mauritii [H. (Phyllhermannia)] Mah.,78 *(=neonominata)*
mauritii (Pergalumna)
mauritius (Drymobatoides)
mauritius (Humerobates) rostrolamellatus ssp. inq.
mauritius (Neoliodes)
mauritius (Unguizetes)
maurus [H. (Notophthiracarus)]
mausiae (Hauserozetes)
maxensis (Oripoda)
maxima (Amerobelba) (=decedens)
maxima (Austrachipteria)
maxima (Ceratozetella) Berl., 08
maxima (Ceratozetella) Will., 53 *(=maxima* Berl., 08*)*
maxima (Galumna) Berl., 16 *(=inquirenda)*
maxima (Galumna) alata Willm., 39
maxima (Galumna) Mih., 56 *(=lanceata)*
maxima (Gittella)
maxima (Maerkelotritia) (=cryptopa)
maximus (Africoribates)
maximus [H. (Capillonothrus)]
maximus (Damaeus)
maximus (Mochlozetes)
maximus (Phthiracarus) (=laevigatus)
maximus (Rhopalozetes)
maximus (Scheloribates)
maximus [P. (Triaunguis)]
maxsellnicki (Cubachipteria)
maya (Lohmannia)
mayangheensis [D. (Kunstidamaeus)]
mayariana (Cubachipteria)
mayottei (Hoplophorella)
mayottensis (Uracrobates)
mayuloeus (Perxylobates)
mazandaranica (Anomaloppia)
mazandaranica (Oppiella) nova
mcadami (Arcoppia)
meakanensis [H. (Capillonothrus)]
meakanensis (Nothrus)
media [Q. (Coronoquadroppia)]
media (Epilohmannia) cylindrica
media (Galumna)
media (Rhinoppia)
media (Suctobelba) sp. inq.
medialis (Liacarus) sp. inq.
medialis (Parasuctobelba)
medialis (Pergalumna)
medialis (Tenuialoides)
mediocris [P. (Archiphthiracarus)] Nied., 1984 *(=globus)*
mediocris [P. (Archiphthiracarus)] Nied., 2017
mediocris (Ceratozetes)
mediocris (Oribatella)
mediocris (Pseudoppia)
mediolamellatus (Tegeocranellus)
mediosetosus (Archegozetes) (=magnus)
mediterraneus (Arthrodamaeus)
mediterraneus (Selenoribates)
medius (Euphthiracarus)
medius (Melanozetes) sp. inq.
medius [H. (Notophthiracarus)]
medius (Pseudotocepheus)
medius (Scheloribates) (=angustus)
medius (Topobates)
medogensis (Euphthiracarus)
medusa (Unduloribates)
megacephalum (Granuloppia) (=neonominata)
megacephalum (Hydrozetes) sp. inq.
megaforamina (Oribatula)
megale (Oribotritia)
megalonyx (Scheloribates)
megalotrichus (Stelechobates)
meghalayensis (Arcoppia)
meghalayensis (Euphthiracarus) (=pakistanensis)
megistos (Eremaeus)
mekistos [H. (Notophthiracarus)]
mekistos [H. (Rhacaplacarus)]
melanesiae (Crotonia) (=nukuhivae)
melanomerus (Thalassozetes)
melisi (Rhinoppia)
melloi (Pergalumna)
melzeri [C. (Paraceratorchestes)]
membranifer (Phthiracarus) (=ferrugineus)
membraniger (Eutegaeus)
membranigera (Dudichella)
membranulifer (Phylacozetes)
membranus (Nesozetes)
memorabilis [S. (Flagrosuctobelba)]
menglunensis (Allosuctobelba)
menglunensis (Pergalumna)
menkei [L. (Baioppia)]
mensarosi (Atalotegaeus)
mercedesae [T. (Paragloboppia)]

meridiana [A. (Parabelbella)]
meridianus (Melanozetes)
meridianus (Punctoribates)
meridionalis (Belba)
meridionalis [O. (Bioribatella)] (=superbula)
meridionalis (Bursoplophora)
meridionalis [H. (Calyptophthiracarus)] (=candidulus)
meridionalis (Chudalupia)
meridionalis (Eupelops) torulosus
meridionalis [S. (Flagrosuctobelba)]
meridionalis [L. (Incabates)] (=pallida)
meridionalis [T. (Latilamellobates)] (=incisellus)
meridionalis (Paraceratoppia)
meridionalis (Sellnickochthonius)
meridionalis [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)
merimna [R. (Insculptoppia)]
meristacaroides (Meristolohmannia)
meristos (Acrotritia)
meristos [H. (Notophthiracarus)]
meruensis (Amerioppia)
meruensis [O. (Zygoribatula)]
mesosetosa (Oribatula)
messneri (Suctobelbella)
meszarosi [H. (Kakophthiracarus)] (=tuberculosissima)
metsamoricus (Ghilarovus)
metulifera (Moritzoppia)
metzi (Mochloribatula)
metzi [O. (Monoribatella)]
mexicana [M. (Dysarcoppia)]
mexicana (Phylloribatula)
mexicana (Schalleria)
mexicana (Trichogalumna)
mexicanus (Microtegeus)
meyeri (Antarcticola)
meyeri (Joshuella)
michaeli (Cepheus) (=cepheiformis)
michaeli [Q. (Coronoquadroppia)]
michaeli [D. (Epidamaeus)] sp. inq.
michaeli (Eueremaeus)
michaeli (Metabelba) (=papillipes)
michaeli [H. (Notophthiracarus)]
michaeli (Scheloribates) (=laevigatus)
michaeli (Steganacarus)
michaeliana (Mesoplophora)
michaii (Huilicheremaeus)
micheli (Gibbicepheus)
micidus [P. (Archiphthiracarus)]
mickii (Halozetes) belgicae
microcephala (Gustavia)
microchaetus (Birsteinius)
microclava [H. (Capillonothrus)]
microclava (Coartobelba)
microclava (Hemileius)
microclava (Scheloribates) (=iteratus)
microdentata [F. (Mexicoppia)]
microdentata [O. (Moritzoppiella)]
microdentata (Suctobelbella)
microfissum (Galumna)
microfoveolata (Oribatella)
microlaminatus (Austrocarabodes)
microlancearia (Lanceoppia)
micromorpha (Fortuynia) elamellata
micronychus (Zetorchestes)
microporosa (Allogalumna)
microporosa (Galumnella)
microporosa (Luissubiasia)
microporosa [O. (Zygoribatula)]
microporosus (Stictozetes)
microptera (Conoppia) Berl., 85 *(=palmicincta)*
microptera (Conoppia) Can., 86 *(=palmicincta)*
microptera (Liebstadia) pannonica
micropterus [M. (Megazetes)]
micropunctinatum (Lopholiodes)
microsculptratus (Bipassalozetes)
microseta (Beckiella)
microseta (Lineoppia)
microseta (Metrioppia) (=helvetica)
microseta (Neoamerioppia) longiclava
microseta [E. (Pocsia)]
microseta (Totobates)
microseta (Trichogalumna)
microsetosa (Hermanniella)
microsetosa [O. (Mahuntritia)]
microsetosa [G. (Porogalumnella)]
microsetosa (Pseudoceratoppia)
microsetosus (Ceratozetes)
microsetosus (Indoribates)
microsetosus (Mucrobates)
microsetosus (Scheloribates) (=pajaki)
microsetosus (Topobates)
microspinus [D. (Epidamaeus)]
microsulcata [G. (Indogalumna)]
microtricha (Lanceoppia)
microtrichoides (Lanceoppia)
microtrichus [C. (Klapperiches)]
microtuberculata (Pergalumna)
microtuberculatus [D. (Epidamaeus)]
microtus (Globozetes)
midas (Otoppia)
mielcareki (Hoplophthiracarus)
mihelcicana (Processoppia)
mihelcici (Iugoribates) Winkler, 58
mihelcici (Iugoribates) Pav., 92 *(=mihelcici* W., 58*)*
mihelcici (Liacarus) (=ovatus)
mihelcici (Processoppia) (=mihelcicana)
mihelcici [R. (Rectoppia)]
mikaeeli (Ctenobelba)
mikoi (Galumna)
mikoi (Pilobatella)
mikoi (Rhinoppia)
mikoi (Scutovertex)
miliae (Eremobelba)
milii (Striatoppia)
milleri (Anachipteria) (=latitecta)
milleri (Pergalumna) corrugis
milleri (Scheloribates)
milloti (Nanhermannia)
milloti (Rhopalozetes)
mindanaoensis [P. (Archiphthiracarus)]
mindanaoensis (Dolicheremaeus)
mindanaoensis (Hydrozetes)
mindanensis (Megalotocepheus)
mindanensis [M. (Pentamagyaria)]
mindanensis (Xiphobelba)
minidentata [O. (Perspicuoppia)]
minidentata (Rhinoppia)
minidentatus (Pseudotectoribates)
minifimbriatus (Scheloribates)
minifoveolatus (Cosmochthonius)
minima (Brachyoripoda)
minima (Ceratozetella)
minima (Epilohmannia) cylindrica
minima [B. (Gressittoppia)]
minima (Heterogalumna)
minima [H. (Kakophthiracarus)]
minima (Mesotritia)
minima (Microtritia)
minima (Neoamerioppia)
minima (Pilogalumna)
minima (Quadroppia)
minima (Serratoppia)
minima (Suctobelbila)
minima (Wallworkoppia)
minimarginatus (Phthiracarus) (=boresetosus)
minimedia (Rhinoppia)
minimicoma (Lauritzenia)
minimus (Atropacarus) obesus
minimus (Benoibates)
minimus (Charassobates)
minimus (Euphthiracarus)
minimus (Gymnobodes)
minimus (Malaconothrus)

minimus (Micreremus) (=brevipes)
minimus (Nodocepheus)
minimus (Nothrus) sp. inq.
minimus [S. (Perscheloribates)]
minimus (Punctoribates)
minimus [H. (Simkinia)]
minimus [H. (Steganacarellus)]
minimus (Totobates)
minipora (Pergalumna)
miniporosa (Galumna)
miniporus [M. (Safrobates)]
minisetosa [H. (Kakophthiracarus)]
minisetosa (Setogalumna)
minisetosus [H. (Austrophthiracarus)]
minitricha [A. (Uluguroides)]
minituberculata (Pergalumna)
minjambuta (Scapheremaeus)
minnesotensis (Heterozetes)
minnesotensis (Propelops)
minor (Afroleius)
minor [L. (Antennoppia)]
minor [P. (Archiphthiracarus)] (=bulbiferus)
minor (Belba) sp. inq.
minor (Ceratozetes) gracilis
minor [C. (Cyrtozetes)] denaliensis
minor (Dolicheremaeus) Berl., 13
minor (Dolicheremaeus) capillatus W., 62 *(=neonominatus)*
minor (Dolicheremaeus) magnus W., 62 *(=iteratus)*
minor (Eupelops) acromios
minor (Gittella)
minor (Globoppia)
minor (Halozetes) marinus
minor (Heminothrus)
minor (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
minor (Jacotella) (=quadricaudicula)
minor (Macrogena)
minor (Pergalumna)
minor (Plasmobates) sp. inq.
minor (Sternoppia)
minor (Suctobelbella) sp. inq.
minor (Tectocepheus)
minor (Teratoppia)
minor (Topobates) (=scheloribatoides)
minor (Totobates)
minor (Zetorchella)
minorae [H. (Notophthiracarus)]
minoricana (Pergalumna)
minus (Hoplophthiracarus) (=histricinus)
minus (Microppia)
minus [D. (Saltatrichus)]
minuscula (Apoplophora)
minuscula (Cerachipteria)
minuscula (Oripoda)
minuscula [O. (Oxyoppiella)]
minusculus (Hammerabates)
minusculus (Holonothrus)
minusculus [C. (Klapperiches)]
minusculus [H. (Notophthiracarus)]
minusculus [S. (Perscheloribates)]
minusculus (Podoribates)
minuta (Belba) (=bulanovae)
minuta (Berniniella)
minuta (Epilohmannia)
minuta (Eremobelba)
minuta (Furcoppia)
minuta (Galumna)
minuta [H. (Heterohermannia)]
minuta (Microlamellarea)
minuta (Microtritia) (=minima)
minuta (Moritzoppia)
minuta (Neoppia)
minuta (Oppia) (=nitens)
minuta (Oribatella)
minuta (Oribatula) Ew., 09 (*L. m.*) *(?=amblyptera)*
minuta (Oribatula) Ew., 09 (*N. m.*) *(?=amblyptera)*
minuta (Pedrocortesella)
minuta (Pseudoamerioppia)
minutipes (Micreremus) (=brevipes)
minutisetarum (Novoribatella)
minutisetosa [K. (Glabroppia)]
minutissima (Dameobelba)
minutissima (Hypochthoniella)
minutissima (Microppia) (=minus)
minutissima (Pteroripoda)
minutissimus [P. (Archiphthiracarus)] (=pygmaeus)
minutissimus (Ceratozetes) Willm., 1951
minutissimus (Ceratozetes) Sub. *et* Ari., 2000 *(=nanus)*
minutus (Aleurodamaeus)
minutus (Eupelops)
minutus (Hardybodes)
minutus (Indoribates)
minutus (Malaconothrus)
minutus (Pedunculozetes)
minutus (Peloribates) (=repetitus)
minutus [S. (Perscheloribates)]
minutus (Pheroliodes)
minutus (Scutovertex)
minutus (Scheloribates) (=praeoccupatissimus)
minutus [H. (Steganacarellus)]
minutus (Tectocepheus)
minutus (Vilhenabates)
mirabilis (Atropacarus)
mirabilis (Cerocepheus)
mirabilis (Dicrotegaeus)
mirabilis (Dinozetes)
mirabilis (Hardybodes)
mirabilis (Hymenozetes)
mirabilis (Hypocepheus)
mirabilis (Hypovertex)
mirabilis [H. (Interoppia)]
mirabilis (Leobodes)
mirabilis (Lopheremaeus)
mirabilis [G. (Monophauloppia)] (=hispanica)
mirabilis (Nasobates)
mirabilis (Oribatodes)
mirabilis (Parasuctobelba)
mirabilis (Pheroliodes)
mirabilis (Retrozetes)
mirabilis (Sabahtritia)
mirabilis [D. (Spatiodamaeus)] (=verticillipes)
mirabilis (Sternoppia)
mirabilis (Subpirnodus)
mirabilis [M. (Trimalaconothrus)]
mirabiloides (Reticulocepheus)
miranda (Hoplophorella) Nied., 88 (*C.*)
miranda (Hoplophorella) Nied., 88 (*A.*)
mirandus (Microzetes)
mirena (Multimedioppia)
mirifica (Microtritia)
mironovi (Trichogalumna)
mirus (Berlesezetes) ornatissimus
mirus [R. (Rhynchoribatodes)]
mirus [H. (Steganacarellus)]
misamisensis (Dolicheremaeus)
misella [L. (Paralemellobates)]
mississippii (Tegeocranellus)
missouri (Indotritia)
misumaiensis (Trhypochthonius) silvestris
mitakensis (Phauloppia)
mitis (Fissicepheus)
mitis (Holonothrus)
mitlsensillus [D. (Epidamaeus)]
mitratus [H. (Calyptophthiracarus)]
mitratus (Fissicepheus)
mitratus (Sphodrocepheus)
mitrofanovi (Serratoppia)
mixoppia (Neostrinatina)
mixta (Achipteria) (=acuta)
mixtus (Austrocarabodes)
mixtus (Euphthiracarus) (=monodactylus)
mixtus (Euscheloribates)
miyajima (Tegeozetes)

miyamaensis (Eupelops)
miyamaensis (Phthiracarus) (=japonicus)
miyamaensis (Podopterotegaeus)
miyauchii (Sellnickochthonius)
mizusawai (Tokunocepheus)
mochlosimilaris (Scheloribates)
moderata (Oripoda) sp. inq.
moderatior (Achipteria) sp. inq.
moderatus (Peloribates)
moderatus (Truncopes)
modesta (Phauloppia) Banks, 04 (*L.*) *(=lucorum)*
modesta (Phauloppia) Banks, 10 (*E.*) *(=lucorum)*
modesta [H. (Phyllhermannia)]
modesta (Striatoppia)
modestior (Neoliodes) sp. inq.
modestus [P. (Archiphthiracarus)]
modestus (Eremulus) (=flagellifer)
modestus (Microtegeus)
modestus (Trichotocepheus) erabuensis
modicus (Euphthiracarus)
modicus [H. (Notophthiracarus)]
moestus (Scheloribates) sp. inq.
mograbin (Issaniella)
moldavicus (Punctoribates)
molecula (Lamellobates)
molensis (Pilogalumna) (=crassiclava)
mollicoma (Hydrozetes) (=lemnae)
mollicoma [P. (Lignobates)]
mollicoma (Plenotocepheus)
mollicoma (Totobates)
mollicomus (Melanozetes)
mollis (Galumna)
mollis (Gressittolus)
mollis (Indotritia) (=javensis)
mollis (Liochthonius)
mollis [H. (Phyllhermannia)]
mollisetosus (Malaconthrus) (=monodactylus)
mollisimilis (Melanozetes) (=mollisetosus)
molodovi [O. (Monoribatella)]
momitoi (Crotonia)
monegrensis (Cosmochthonius)
monensis (Allonothrus)
mongolica (Ceratoppia)
mongolica (Joshuella)
mongolica (Liebstadia)
mongolica (Maerkelotritia) (=krivolutskyi)
mongolica (Tokukobelba)
mongolica [O. (Zygoribatula)]
mongolicus (Adrodamaeus)
mongolicus (Bipassalozetes)
mongolicus (Birsteinius)
mongolicus [A. (Coropoculia)]
mongolicus (Eupelops)
mongolicus (Ghilarovus)
mongolicus [P. (Montizetes)]
mongolicus (Proteremaeus)
mongolicus [D. (Spatiodamaeus)]
mongolicus (Tectoribates)
mongolicus (Tyrphonothrus)
mongolicus (Zachvatkinibates)
monicae (Rhinoppia)
monicai (Pedrocortesella)
moniles (Bipassalozetes)
monilipeda [M. (Neobelba)]
monilipes (Caleremaeus)
monobina (Coartobelba)
monoceros (Banksinoma)
monoceros (Schalleria)
monocerus (Heterochthonius)
monocornis [M. (Calyptozetes)]
monodactyla (Acrotritia) (=rustica)
monodactyla (Allogalumna)
monodactyla (Cryptobothria)
monodactyla (Liebstadia) (=neonominata)
monodactyla (Macrogena)
monodactyla (Parapyroppia) (=cornuta)
monodactylus (Allonothrus)
monodactylus (Euphthiracarus)
monodactylus (Malaconothrus)
monodactylus (Mycobates)
monodactylus (Neophysobates)
monodactylus (Neoribates)
monodactylus (Nesopelops)
monodactylus (Nothrus) (?=silvicus)
monodactylus [S. (Perscheloribates)]
monodactylus (Protoribates) (?=capucinus)
monodactylus (Trhypochthonius) (=tectorum)
monodactylus (Truncozetes)
monodentis (Coartobelba)
monofenestrella [N. (Leptosuctobelba)]
monolongisetosus (Nothrus)
monongahelae [C. (Ensicamisia)]
monoramai (Berlesezetes)
monosacculatus (Ceratobates)
monosetosa [L. (Carolohmannia)]
monospicus (Oribatella)
monozygata [O. (Zygoribatula)]
monster (Persuctobelba)
monstrosus (Eremulus)
monstruosa (Acroppia)
monstruosa [Q. (Coronoquadroppia)]
monstruosa (Dendrohermannia)
monstruosa (Parasuctobelba)
monstruosa (Pilobatella)
monstruosetosa (Basilobelba)
monstruosus (Cavernocepheus)
monstruosus (Hermannobates)
monstruosus (Nippobodes)
monstruosus (Rostrozetes)
monstruosus (Tectocarabodes)
montagnensis [P. (Peloribatodes)]
montana (Arcoppia)
montana (Carinogalumna)
montana (Ceratoppia) (=spinipes)
montana [N. (Dasybelba)]
montana (Heterobelba)
montana (Licnobelba) (=latiflabellata)
montana (Moritzoppia)
montana (Oripoda)
montana (Pergalumna) Ham., 61
montana (Pergalumna) Ham., 72 *(=tahitiensis)*
montana (Pilogalumna) crassiclava
montana (Subbelba)
montana (Trichogalumna)
montanus (Aquanothrus)
montanus [P. (Archiphthiracarus)]
montanus (Carabodes)
montanus (Cymbaeremaeus) (=cymba)
montanus (Dolicheremaeus)
montanus (Eurhynchoribates)
montanus (Fuscozetes)
montanus (Hemileius)
montanus (Hypochthonius)
montanus (Liacarus)
montanus (Megeremaeus)
montanus (Neophysobates)
montanus (Nothrus)
montanus (Peloptulus)
montanus (Platyliodes)
montanus (Trhypochthonius)
montanus (Trichoribates) Irk, 39 *(=monticola)*
montanus (Trichoribates) Ham., 61 *(=hammerae)*
montanus [M. (Trimalaconothrus)]
montanus (Truncopes)
montanus (Verachthonius)
monteithi (Crotonia)
monteithi (Galumna)
monteithi (Neseutegaeus)
monteithi (Pheroliodes)
monteithi (Pseudotocepheus)
monticola (Anderemaeus)
monticola (Calozetes)

monticola (Cavernocepheus)
monticola (Ceratozetes)
monticola (Galumna)
monticola (Heterogalumna)
monticola [G. (Indogalumna)] (=balakrishnani)
monticola (Nododamaeus)
monticola (Nothrus)
monticola (Sellnickochthonius)
monticola (Trichoribates)
monticolus (Birsteinius)
monticolus (Eremaeus)
monticolus (Propelops)
montigena [H. (Rhacaplacarus)]
montis (Pedrocortesella)
montium (Phthiracarus) (=longulus)
montivagus (Diapterobates) sp. inq.
montkoupensis (Indotritia)
monttensis [A. (Acrogalumna)]
monttensis [S. (Perscheloribates)]
monyx (Euphthiracarus)
moonsani (Xenillus)
mooseri (Eobrachychthonius) (=latior)
moraviacus [L. (Dorycranosus)] (=splendens)
moraviae [D. (Kunstidamaeus)] lengersdorfi
morenoi (Paraphauloppia)
morenoi (Scapheremaeus)
moresonensis [B. (Gressittoppia)]
moresonensis (Neoctenogalumna)
moribei (Thamnacarus) (=elongatus)
morikawai (Odontocepheus)
moritzi [L. (Baioppia)]
moritzi [S. (Flagrosuctobelba)] forsslundi
moritzi [M. (Hammeroppia)]
moritzi (Liochthonius)
moritzi (Mixochthonius) (=pilososetosus)
moritzi (Verachthonius)
morticina (Oribatella) (=cespitum)
morulisensillatus (Scapheremaeus)
motasi (Lauroppia)
motomuka [H. (Notophthiracarus)]
moyae (Xenillus)
muara (Sellnickochthonius)
mucronatus (Annectacarus)
mucronatus (Centroribates)
mucronatus (Liacarus)
mucronatus (Truncozetes)
muiri (Scheloribates)
muiricius (Scheloribates) sp. inq.
muliercula (Muliercula)
multesima (Allogalumna)
multiareolatus (Cribrozetes)
multiareolatus (Licnozetes)
multiciliata (Masthermannia)
multiciliata (Rhinoppia) hygrophila
multicorrugata [G. (Stenoppia)]
multicuspidatus (Plakoribates)
multidentata (Serratobelba)
multidentatus (Pantelozetes) (=paolii)
multigranulatus [O. (Acrotocepheus)]
multiiterata (Galumna) (=maxima)
multiiteratus (Scheloribates) sp. inq.
multilineata (Striatoppia)
multipilosa (Austrogneta)
multipilosa [H. (Mantigueracarus)]
multipilosus (Neogymnobates)
multipilosus [M. (Trimalaconothrus)]
multiplisetus (Topobates)
multiplumosa [S. (Flagrosuctobelba)]
multipora (Hermanniella)
multiporosa (Mochloribatula)
multipunctata (Multoribula)
multirepetitus (Scheloribates)
multirugosa [H. (Kakophthiracarus)]
multisetosa (Mesotritia)
multisetosa [E. (Neoepilohmannia)]
multisetosa (Oribotritia)
multisetosa (Trichocondyla)
multisetosus (Atropacarus)
multisetosus (Choixenillus)
multisetosus [H. (Austrophthiracarus)]
multisetosus (Topobates)
multisetus [I. (Neoindoribates)]
multisulcatum (Senectoppia)
multisulcatus (Trhypochthonius) sp. inq.
multituberculata (Enantioppia)
multituberculata [K. (Niosuctobelba)]
multituberculata (Suctobelbila)
multituberculatus [H. (Steganacarellus)]
mumfordi (Scheloribates)
mundus (Phthiracarus) (=longulus)
mundus (Punctoribates)
munesaensis [S. (Bischeloribates)]
munita (Acrotritia) (=americana)
munizi [N. (Perezinigokalumma)]
munkhbayari [D. (Epidamaeus)]
muraiae (Bursoplophora)
muranyii (Dissorhina)
murciensis (Atropacarus)
murcioides (Mixacarus)
murmurensis [M. (Trimalaconothrus)]
muronokiensis [S. (Flagrosuctobelba)]
murotensis (Liacarus)
murphyi [P. (Archiphthiracarus)] (=montanus)
murphyi (Dolicheremaeus)
murphyi (Sumatrotritia)
murtazalievi (Liochthonius)
murvanidzeae [B. (Kokoppia)]
musaevi [L. (Dorycranosus)]
musci (Adrodamaeus)
musci (Phauloppia) (?=lucorum)
muscicola (Antarctozetes)
muscicola (Benoibates)
muscicola (Haplochthonius)
muscicola (Hemileius)
muscicola (Peloribates)
muscicola (Stachyoppia)
muscorum (Astegistes) (?=pilosus)
muscorum (Liochthonius)
muscorum (Tegeocranellus)
mussardi [G. (Baobabula)]
mussardi [R. (Insculptoppia)]
mussardi (Liochthonius)
mustaciata [O. (Oxyoppiella)]
mutabilis (Dolicheremaeus)
mutabilis (Hoplophthiracarus)
mutabilis [H. (Protophthiracarus)]
mutabilis (Xenillus)
mutilus (Camisia) (=horrida)
mutsalpina (Trhypochthonius) (=tectorum)
mwali [H. (Kakophthiracarus)]
myanmarus (Hoplophthiracarus)
myricus (Trichoribates)
myrmecophila (Oppia) (=nitens)
myrmecophilus (Protoribates)
myrmobates (Ceratozetes) (?=conjunctus)
myrmophila (Moritzoppia)
myrmophila (Pergalumna)
mystax (Galumna)
mystax (Nothrus)
nabhitabhatai (Trichogalumna)
nadchatrami (Acutozetes)
nadiji (Mycobates) (=parmeliae)
nagaii (Rostrozetes)
nagaii [H. (Tuberemaeus)]
naganoensis (Protoribates)
nagaroorica (Eremobelba)
nagasatoensis (Medioxyoppia)
naginata [S. (Flagrosuctobelba)] (=elegantula)
nagisa (Schusteria)
nagoyae (Medioxyoppia)
nagpalae (Dolicheremaeus)
nagyi (Neoamerioppia)

nahani (Eueremaeus)
naias (Zetomimus)
naisselinei (Achipterina)
nakanei (Fissicepheus)
nakanoshimensis (Scapheremaeus)
nakatamarii [C. (Aokibelba)]
nakatamarii (Yoshiobodes)
naltschicki [T. (Latilamellobates)]
namadjiensis [H. (Phyllhermannia)]
nana (Berniniella)
nana [Q. (Coronoquadroppia)]
nana [S. (Flagrosuctobelba)]
nana (Moritzoppia)
nana (Nanhermannia)
nana (Ramusella) (=curtipilus)
nantahalaensis (Carabodes)
nanus (Ceratozetes)
nanus (Scheloribates)
napoensis (Galumna)
naranensis (Suctobelbella)
nasalis (Aeroppia)
nasalis (Antarctozetes)
nasalis (Anoripoda)
nasalis [Q. (Coronoquadroppia)]
nasalis (Dolicheremaeus)
nasalis (Euphthiracarus)
nasalis (Eupterotegaeus)
nasalis [S. (Flagrosuctobelba)]
nasalis (Hammerabates)
nasalis (Hoplophthiracarus)
nasalis (Mucronothrus)
nasalis [G. (Naiazetes)]
nasalis (Oribotritia)
nasalis [O. (Oxyoppiella)]
nasalis (Teratoppia)
nasalis [P. (Wallworkiella)]
nasata (Cyrthermannia) sp. inq.
nashiroi (Scapheremaeus)
nasica (Pergalumna)
nasifera (Pergalumna)
naskreckii (Holonothrus)
nasuorum [O. (Sacculoribatella)]
nasuta (Moritzoppia) (?=punctata)
nasuta (Perlohmannia)
nasuta (Protoripoda)
nasuta (Rhinoppia)
nasutus (Birobates)
nasutus (Caleremaeus)
nasutus (Ceratozetes)
nasutus (Chamobates) (=subglobulus)
nasutus [D. (Epidamaeus)]
nasutus (Eremaeozetes)
nasutus (Euphthiracarus)
natalensis (Afroleius)
natalensis (Afrozetes)
natalensis (Archeonothrus)
natalensis (Berlesezetes)
natalensis (Galumna)
natalensis [C. (Magoebazetes)]
natalensis (Paraphysobates)
natalensis [H. (Phyllhermannia)]
natalensis (Protoribates)
natalensis [H. (Steganacarellus)]
nathanaeli [H. (Phyllhermannia)]
nativa (Oribatula)
natmaensis (Scheloribates)
naturalisi (Galumna)
navalensis (Coetzeella)
navalhillensis (Licnodamaeolus)
navarrensis (Atropacarus) (=wandae)
navicula (Heteroleius)
nayoroensis (Cosmochthonius)
nayoroensis (Diapterobates)
nayoroensis (Oribatula)
nayoroensis (Suctobelbella)
ndrii [G. (Oligogephyrazetes)]
nebaikini (Proteremaeus)
nebulosa (Dampfiella)
nebulosus (Rostrozetes) (=poensis)
necrophagus (Halozetes)
neerlandica (Allogalumna) (=integer)
neerlandica [O. (Moritzoppiella)]
neethlingi (Paroppia)
neglecta (Hoplophorella) (=lanceoseta)
neglecta (Multioppia)
neglectus (Liochthonius)
neglectus (Neoribates)
neglectus (Sphaerozetes)
negroi (Cosmozetes)
negrosensis (Otocepheus)
negrosensis [N. (Pseudoneoribates)]
nematophora (Masthermannia) (=mammillaris)
nemoralis (Eueremaeus)
nemoralis (Phauloppia)
nemoralis (Zachvatkinibates)
nemoricultricis (Pheroliodes)
nemorosus (Atropacarus) (=csiszarae)
nemossensis (Tricheremaeus)
neochilensis [H. (Protophthiracarus)]
neomexicanus (Bipassalozetes)
neonominata (Brassiella)
neonominata [L. (Convergoppia)]
neonominata [N. (Dasybelba)] (=montana)
neonominata [G. (Erogalumna)]
neonominata (Fusuloppia)
neonominata (Granuloppia)
neonominata (Graptoppia)
neonominata (Hoplophorella)
neonominata [R. (Insculptoppia)]
neonominata (Jacotella)
neonominata (Lasiobelba) (=arabica)
neonominata (Liebstadia) sp. inq.
neonominata (Microtritia)
neonominata (Oppia)
neonominata (Oppiella)
neonominata (Oribatella)
neonominata (Oribatula)
neonominata (Pedrocortesella) (=reticulata)
neonominata [H. (Phyllhermannia)]
neonominata (Suctobelbella) (=ornata)
neonominata (Suctobelbila)
neonominatus (Antarctozetes) (=translamellatus)
neonominatus [P. (Archiphthiracarus)] (=bulbiferus)
neonominatus (Bipassalozetes) neomexicanus
neonominatus (Birsteinius)
neonominatus (Carabodes)
neonominatus (Ceratozetes)
neonominatus (Dolicheremaeus) capillatus
neonominatus [L. (Dorycranosus)]
neonominatus (Eremaeus)
neonominatus (Liochthonius) (=latus)
neonominatus [L. (Longocepheus)] (=mahunkai)
neonominatus (Malaconothrus)
neonominatus Neoribates
neonominatus (Nothrus) borussicus ssp. inq.
neonominatus (Peloribates)
neonominatus [H. (Protophthiracarus)]
neonominatus (Scheloribates)
neonominatus (Scutovertex)
neonominatus (Sphaerozetes) globularis ssp. inq.
neonominatus [H. (Tuberemaeus)]
neonominatus [H. (Tuberemaeus)]
neonominatus (Xenillus)
neoplumosus [T. (Cristonothrus)]
neosimplex (Neobrachychthonius) (=marginatus)
neosota (Eremobelba) (=gracilior)
neotricha (Hermannia)
neotricha (Monogalumnella)
neotricha [E. (Neoepilohmannia)]
neotrichorostralis (Yoshiobodes)
neotrichus (Niphocepheus)
neotrichus [H. (Protophthiracarus)]

neotrichus (Trichozetes)
neotropica (Lyroppia)
neotropica (Machadobelba)
neotropica [H. (Phyllhermannia)]
neotropicalis (Acrotritia)
neotropicalis (Dissorhina)
neotropicalis [C. (Triachipteria)]
neotropicus (Afronothrus) (=incisivus)
neotropicus (Allonothrus)
neotropicus (Fissurobates)
neotropicus (Heptacarus)
neotropicus (Mixacarus)
neotropicus [P. (Neopilizetes)]
neotropicus (Papillocepheus)
neotropicus (Plakoribates)
neotropicus (Plenotocepheus)
neotropicus (Suctoribates)
neozealandicus [L. (Longocepheus)]
nepalensis (Dolicheremaeus)
nepalensis (Hoplophthiracarus)
nepalensis (Oribotritia) (=gigas)
nepalensis [S. (Perscheloribates)]
nepalensis [P. (Shtanchaeviella)]
nepalica [L. (Antennoppia)]
nepalica (Taiwanoppia)
nepenthes [O. (Acrotocepheus)]
nepos (Carabodes) (=coriaceus)
nepotulus (Eupelops) (=tardus)
nervosa (Eremobelba) (=gracilior)
nervosa (Pergalumna)
nervosus (Mystacozetes)
nesebarensis (Bipassalozetes)
netron (Euphthiracarus)
neuquinus (Pheroliodes)
nevadensis [H. (Capillonothrus)]
nevesi (Hafenferrefia)
newelli (Setuloppia)
newtaipeiensis [U. (Parauracrobates)]
nexilis [H. (Protophthiracarus)]
ngongi [H. (Rhacaplacarus)]
ngoyensis (Muliercula)
niahensis [P. (Archiphthiracarus)]
niccus (Selenoribates)
nicki (Hemileius)
nicoleti (Achipteria) (=coleoptrata)
nicoleti (Camisia) (=biverrucata)
nicoleti (Notophtiracarus)
nicora (Lucoppia)
nidicola (Ameronothrus)
nidicola (Globoppia)
nidicola [D. (Kunstidamaeus)]
nidicola (Onychobates)
niedbalai (Acrotritia) (=vestita)
niedbalai (Aleurodamaeus)
niedbalai (Dolicheremaeus)
niedbalai (Nothrus)
niedbalai [H. (Notophthiracarus)]
niedbalai (Oxyamerus)
niedbalai [M. (Parplophora)]
niedbalai [H. (Protophthiracarus)]
niedbalai [A. (Rafacarus)] P.-I. *et* Baggio, 1996
niedbalai [A. (Rafacarus)] Liu *et* Zhang, 2013
niger (Bipassalozetes)
niger (Carabodes)
niger (Compactozetes)
niger [H. (Protophthiracarus)] (=schizocomus)
niger [L. (Rhaphidosus)]
niger (Scutovertex)
nigeriana (Bicyrthermannia)
nigeriensis (Allonothrus)
nigeriensis (Hoplophorella) (=andrei)
nigeriensis (Peloribates)
nigeriocompressus (Scheloribates)
nigeriosphericus (Scheloribates)
nigerrimus (Chamobates) (=subglobulus)
nigerrimus [H. (Notophthiracarus)]
nigerrimus [L. (Procorynetes)]
nigra (Galumna)
nigra (Oribatella)
nigrescens (Liacarus) sp. inq.
nigricans (Neoliodes)
nigricans (Tectoppia)
nigricans (Trhypochthonius)
nigriclavatus (Ampullobates)
nigrisetosus (Eremulus)
nigrisetosus (Zetomimus)
nigroclava (Novazelandiella)
nigrofemoratus (Ameronothrus)
nigrolobatus (Megalotocepheus)
nigromaculatus (Spinotocepheus)
nigrosetosus [C. (Klapperiches)]
nikolskii (Moritzoppia)
nilamburicus (Phyllozetes)
nilgiria (Galumna) sp. inq.
niliaca (Galumna)
niliaca (Striatoppia)
niliaca [O. (Zygoribatula)]
niliacus (Sellnickochthonius)
niloticus (Hydrozetes) Träg., 05 *sp. inq.*
niloticus (Hydrozetes) S., H. *et* R., 91 *(=inquirenda)*
nimbus (Dolicheremaeus)
nimirumi (Scheloribates) louwi
nimius [H. (Austrophthiracarus)]
nipponica (Galumnella)
nipponica (Kuklosuctobelba) claviseta
nipponica (Trichogalumna)
nipponica (Zachvatkinella)
nipponicus (Cultrobates)
nipponicus (Protoribates) crassisetiger
nipponicus [M. (Trimalaconothrus)]
nishinoi (Peloribates)
nitens (Achipteria) Nic., 1855 *(=acuta)*
nitens (Achipteria) L. Koch, 1879 *(=acuta)*
nitens (Achipteria) Kis., 1930 *(=acuta)*
nitens (Euzetes) (?=globulus)
nitens (Liacarus)
nitens (Moritzoppia)
nitens (Oppia)
nitens (Phthiracarus) (=laevigatus)
nitida (Mesotritia)
nítida (Suctobelbella)
nitidior (Hoplophthiracarus) (=histricinus)
nitidula (Hafenferrefia)
nitidulus (Liacarus) (=coracinus)
nitidus (Aleurodamaeus) (=setosus)
nitidus (Bipassalozetes)
nitidus [H. (Calyptophthiracarus)]
nitidus [L. (Dorycranosus)]
nitidus (Lamellobates)
nitidus (Phthiracarus)
nivalis [D. (Kunstidamaeus)]
nivalis (Melanozetes) sp. inq.
nivalis (Niphocepheus)
nivalis (Oribatula) sp. inq.
nivalis (Scapheremeaus)
nivalis [C. (Triachipteria)]
nobilis (Indoribates)
nobilis (Quinquoppia)
nodifer (Liochthonius)
nodifer (Oribatula) (?=macrostega)
nodipes [D. (Paradamaeus)] (=clavipes)
nodosa (Fenestrobelba)
nodosa [H. (Heterohermannia)]
nodosa [L. (Lancelalmoppia)]
nodosus (Austocarabodes)
nodosus (Liochthonius) (=sellnicki)
nodosus (Paulianacarus)
nodosus [S. (Perscheloribates)]
nodosus (Rostrozetes) (=ovulum)
nodosus [M. (Trimalaconothrus)]
nodula (Galumna)
nodulifera (Rioppia)

nogueraius (Scapheremaeus)
nondivisa [N. (Leptosuctobelba)]
nonoensis (Galumna)
nonporosa (Galumnella)
norberti (Epilohmannia) (=heterotricha)
nordenskjoeldi (Totobates)
norfolkensis (Crotonia)
norfolkensis (Hexachaetoniella)
norikoae (Oribotritia) asiatica ssp. inq.
nortoni (Austrocarabodes)
nortoni (Camisia)
nortoni (Epilohmannia)
nortoni (Eremaeus)
nortoni (Galumna) sp. inq.
nortoni (Holonothrus)
nortoni (Liochthonius)
nortoni (Notogalumna)
nortoni [O. (Monoribatella)]
nortoni (Paralycus)
nortoni (Pedrocortesella)
nortoni [D. (Spatiodamaeus)]
nortoni (Veloppia)
nortoni (Zachvatkinibates)
nortoni (Zetorchella)
nortonroyi (Hungarobelba)
nortonroyi [C. (Paracavernocepheus)]
nortonroyi (Sadocepheus)
norvegica (Pergalumna) (=obvia)
noster (Adrodamaeus) (=hispanicus)
nosybe (Schalleriella)
nota (Epilohmannia) (=puella)
notabilis (Lauroppia)
notactis (Neoliodes) sp. inq.
notata (Hoplophorella)
notata (Neoamerioppia)
notatus (Diapterobates)
nothofagii (Novonothrus)
notoapodematus (Gymnodamaeus) sp. inq.
notogastralis [H. (Phyllhermannia)]
notoneotrichus (Heptacarus)
notoporosus [H. (Protophthiracarus)]
notoverrucatus (Scapheremaeus)
nova (Allosuctobelba)
nova (Camisia)
nova (Collohmannia) (=gigantea)
nova (Galumna) (=tarsipennata)
nova (Liebstadia) (=pannonica)
nova (Mesotritia)
nova (Oppiella)
nova (Suctobelbata)
nova (Trapezoppia)
novaecaledoniae (Holonothrus)
novaecaledoniae (Retrozetes)
novaeguineae (Arcoppia) arcualis
novaeguineae (Licneremaeus)
novaezealandiae (Andesamerus)
novaezealandiae (Arcoppia) (=curtisetosa)
novaezealandiae [T. (Tyrphonothrus)]
novaezealandicus [H. (Platynothrus)]
novaguineanus (Zetorchestes)
novazealandica (Allogalumna)
novazealandica (Austrachipteria)
novazealandica (Paraphauloppia)
novazealandica [O. (Zygoribatula)]
novazealandicus (Edwardzetes)
novazealandicus [S. (Grandjeanobates)]
novazealandicus (Poecilochthonius)
novazealandicus (Pterozetes)
novazealandiensis (Microtritia) (=glabrata)
novazelandicus [H. (Steganacarellus)]
novemsetosus (Plateremaeus)
novosibiricus (Euphthiracarus)
novus (Cosmochthonius) (=lanatus)
novus (Fuscozetes)
novus (Gibbicepheus)
novus (Licneremaeus)
novus (Tectocepheus) (=minor)
novus (Trichoribates)
novus [(T. (Tyrphonothrus)] (=maior)
nubatamae (Tegeocranellus)
nuciferosa (Scapheremaeus)
nuda (Galumna) (=flabellifera)
nuda (Granuloppia)
nuda (Hemileius) (=quadripilis)
nuda [L. (Incabates)]
nuda (Indotritia)
nuda (Mesotritia)
nuda (Pergalumna)
nuda (Tenuiala)
nudiuscula (Pelopsis) (=bifurcatus)
nudus (Guaranozetes)
nudus (Humerobates)
nudus (Indoribates)
nudus (Neophysobates)
nudus (Scheloribates)
nuevavizcayaensis (Eurhynchoribates)
nugarica (Oribatella)
nukuhiva (Nuhivabates)
nukuhivae (Crotonia)
nukusia (Graptoppia)
numatai [H. (Capillonothrus)]
numerosa (Pergalumna)
numerosus (Diapterobates) (=humeralis)
numidiana [A. (Rhaphigneta)]
numidicus (Dicatozetes)
nunomurai (Indotritia)
nymphoides (Hydrozetes) (=californiensis)
oauensis (Scheloribates)
oaxacanus (Acaroceras)
obesa (Pedrocortesella)
obesus (Atropacarus)
obesus (Dynatozetes)
obesus [T. (Latilamellobates)]
obesus (Perxylobates)
obesus (Scheloribates)
obesus (Tyrphonothrus)
oblectatoria (Ceratoppia)
obliqua (Oripoda)
obliqus [F. (Pseudogeminozetes)]
obliquus [P. (Archiphthiracarus)]
obliquus (Cavernocepheus)
oblitera (Hermanniella)
obliteratus (Scapheremaeus)
oblonga (Antarcticola) (=meyeri)
oblonga (Hoplophorella)
oblongarea (Trichoribates)
oblongata (Rhinoppia) (=loksai)
oblongisetosus [C. (Nortonchthonius)]
oblongus (Ameronothrus)
oblongus (Diapterobates)
oblongus (Eueremaeus)
oblongus (Euphthiracarus)
oblongus (Nothrus)
oblongus (Odontocepheus) Karp., 1893 *(=elongatus)*
oblongus (Odontocepheus) Banks, 1895 *sp. inq.*
oblongus (Protoribates)
oblongus (Steganacarus) (=magnus)
obscura (Eremobelba) sp. inq.
obscura (Lauroppia) (=doris)
obscurus [P. (Archiphthiracarus)]
obscurus (Austrocarabodes)
obscurus (Damaeus) (=riparius)
obscurus (Meristacarus) madagascarensis
obscurus (Sellnickochthonius) (=immaculatus)
obscurusgibbus (Tectodamaeus)
obsessa (Pergalumna)
obsessa [O. (Zygoribatula)]
obsessus [H. (Austrophthiracarus)] (=sellnicki)
obsessus (Dolicheremaeus) (=hammerae)
obsessus (Scheloribates)
obsessus [H. (Steganacarellus)]
obsessus [M. (Trimalaconothrus)]

obsidiana (Pergalumna)
obsoleta (Quadroppia)
obsoleta (Rhinoppia)
obsoletior (Hoplophorella) (=hamata)
obsoletus (Austrocarabodes)
obsoletus (Nothrus) sp. inq.
obsoletus (Trichoribates) (?=fumigatus)
obtecta (Crotonia)
obtectus (Seteremaeozetes)
obturatus [H. (Steganacarellus)]
obtusa (Allosuctobelba)
obtusa (Arcoppia)
obtusa (Metabelba)
obtusa (Metabelba)
obtusa (Notohermannia)
obtusa (Suctobelbella)
obtusinotata (Paraphauloppia)
obtusisetus (Dolicheremaeus)
obtusus (Ceratozetes) (=campestris)
obtusus (Eurhynchoribates)
obtusus (Ghilarovizetes)
obtusus [H. (Protophthiracarus)]
obtusus (Scheloribates)
obtusus [P. (Triaunguis)]
obvia (Pergalumna)
occidentale (Galumna) (=alata)
occidentalis (Ameronothrus) (=lineatus)
occidentalis [M. (Calyptozetes)]
occidentalis (Carabodes) pulcher
occidentalis (Eremaeus)
occidentalis (Hermanniella)
occidentalis (Karenella) lanceoseta ssp. inq.
occidentalis (Podacarus) auberti
occidentalis (Protectoribates)
occultatus [O. (Acrotocepheus)]
occultus (Campbellobates)
occultus (Eupelops)
occultus (Neoliochthonius)
occultus (Phthiracarus) (=compressus)
occultus (Xenillus)
oceana [O. (Zygoribatula)]
oceanica (Gustavia)
oceanicus (Liochthonius)
oceanicus (Neoribates)
oceanicus (Nothrus)
ocellatus (Austrocarabodes)
ocellatus (Gressittolus)
ocellatus (Liacarus)
ocellatus (Liochthonius) (=hystricinus)
ocellatus (Neoliodes) sp. inq.
ocellatus (Ommatocepheus)
ochraceus (Atropacarus)
ochthus [P. (Archiphthiracarus)]
ocotlicus (Trichoribates)
octo (Fenestrobelba)
octocoma (Oligoppia)
octofilamentis (Parhypochthonius) (=aphidinus)
octogonalis [C. (Phyllocarabodes)]
octomaculatus (Eremaeozetes)
octopunctata (Galumna) (=alata)
octosetosus (Arthrodamaeus)
octosetosus (Hydrozetes) lacustris
octosetosus [P. (Neophthiracarus)]
ocula (Hoplophorella)
ocularis (Lamellobates)
odontotus (Acaroceras)
oenipontanus [H. (Calyptophthiracarus)]
oenipontanus (Carabodes)
oesziae (Sellnickochthonius)
offarostrata (Ceratoppia)
officiosus (Mochlozetes)
ogawai [P. (Vepracarus)]
ogilviensis (Trichoribates)
oginoi (Dolicheremaeus)
oglasae (Odontocepheus)
oglasae [M. (Oglasacarus)]
oglasae (Ophidiotrichus)
oglasicola (Protoplophora)
ogmos [H. (Notophthiracarus)] Nied., 04 (*Not.*)
ogmos [H. (Notophthiracarus)] Nied., 04 (*Arp.*) *(=venezolanus)*
oharensis [D. (Epidamaeus)]
ohat (Phauloppia) (=lucorum)
ohkuboi (Trichogalumna)
ohmensis (Dolicheremaeus)
ohnishi (Liochthonius)
oidematos (Hoplophorella)
okinawa (Eremobelba)
okinawana (Galumnella)
okuyamai (Mesotritia)
olahi (Cordiozetes)
olbiopolitanus (Kaszabobates)
oleariae (Mycozetes)
oligochaeta (Aethioppia)
oligotricha (Protoribotritia)
olitor [D. (Epidamaeus)] sp. inq.
olivaceus [H. (Calyptophthiracarus)]
olivaceus (Liacarus) sp. inq.
olszanowskii (Benoibates)
olszanowskii (Ecuadoribates)
olszanowskii (Euscheloribates)
olszanowskii (Granuloppia)
olszanowskii (Indoribates)
olszanowskii (Nothrus)
olszanowskii [H. (Notophthiracarus)]
olszanowskii [H. (Rhacaplacarus)]
olszanowskii (Sculpteremaeus)
olympicus (Sphaerozetes)
ominei (Peloribates)
omissus (Chamobates) (=schuetzi)
omittens (Torpacarus)
omniphagous (Pergalumna) (=emarginata)
omo (Carabodes) (=granulatus)
omodeoi [Q. (Coronoquadroppia)] (=monstruosa)
ondriasi (Papillacarus)
onkos (Hoplophorella)
onondaga (Limnozetes)
onubensis (Passalozetes)
onustus [D. (Adamaeus)]
opacus [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
opcus (Tegeocranellus)
operata (Pergalumna)
operta (Lanceoppia)
opilioides (Damaeus)
opipara (Oribotritia)
opiparus [P. (Neophthiracarus)]
opisthoseta [M. (Trimalaconothrus)]
opistodentata (Suctobelbella)
oppiana (Nosybelba)
opposita (Beckiella)
oppositus [M. (Trimalaconothrus)] P. Bal., 97
oppositus [M.(Trimalaconothrus)] B.,P.B.,02*(=oppositus* P.B.97*)*
optabilis (Austrotritia) (=saraburiensis)
optatus (Tyrphonothrus) (?=saxosus)
optatus (Truncopes)
optiva [H. (Rhacaplacarus)]
opuntiseta (Striatoppia)
oralensis (Cosmochthonius)
orangutan [O. (Acrotocepheus)]
orangutan (Pseudocarabodes)
orbicularis (Sphaerozetes)
orbicularius (Gymnodamaeus)
orbiculata (Banksinoma)
orbiculata (Hermanniella)
orbiculata (Peltenuiala)
orbiculata (Zetorchella)
orbiculus (Orbiculobates)
ordunensis (Rhinoppia)
oregonae (Camisia)
oregonensis (Achipteria)
oregonensis (Metrioppia)
oregonensis (Oribatella)
oregonensis (Oribotritia)

oreia [M. (Pentoppia)] (=splendens)
oresbios (Ametroproctus)
oresbios (Ceratozetella)
oresbios (Eremaeus)
orghidani [L. (Magnobates)]
orghidani (Multioppia)
oribatelloides (Achipterina)
oribatelloides (Liacarus) (=coracinus)
orientalis (Arcoppia) fenestralis
orientalis [H. (Besuchetacarus)]
orientalis (Bipassalozetes)
orientalis (Cavaecarabodes)
orientalis (Dolicheremaeus)
orientalis (Eremaeus)
orientalis (Galumna) (=flabellifera)
orientalis (Lamellobates)
orientalis (Lauroppia)
orientalis (Leptotocepheus)
orientalis (Lucoppia) (=burrowsi)
orientalis (Melanozetes)
orientalis (Metabelba)
orientalis [P. (Millotacarus)]
orientalis (Oppia)
orientalis (Oribatella)
orientalis [E. (Orinchobates)]
orientalis (Palaeacarus)
orientalis (Parachipteria)
orientalis (Pseudopyroppia)
orientalis (Pseudotocepheus)
orientalis (Truncopes)
orientalis [T. (Viracochiella)]
orientalis (Zetorchella)
orientata (Oppiella) (=nova)
oriformis (Podoribates)
orixaensis (Muliercula)
orkneyensis (Berlesezetes) ornatissimus
orkneyensis [B. (Gressittoppia)]
ornamenta (Pergalumna)
ornamentus (Neoribates)
ornata (Acrotritia)
ornata (Apoplophora)
ornata [P. (Baloghates)]
ornata (Dissorhina)
ornata (Epilohmannia)
ornata (Eremobelba)
ornata (Gustavia)
ornata (Jacotella) B. *et* C., 63
ornata (Jacotella) P.-I., 72 *(=neonominata)*
ornata (Jacotella) Mah., 79 *(=frondeus)*
ornata [O. (Monoribatella)]
ornata [M. (Pentamagyaria)]
ornata (Suctobelbella) Kriv., 66 *(=lobata)*
ornata (Suctobelbella) B. *et* M., 69
ornata (Suctobelbila) (=neonominata)
ornata [O. (Zygoribatula)]
ornatissima (Apoplophora) (=pantotrema)
ornatissima [P. (Baloghates)]
ornatissima (Exanthoppia)
ornatissima (Hypogeoppia) (?=exempta)
ornatissima (Masthermannia)
ornatissima (Suctobelbella)
ornatissimus (Berlesezetes)
ornatissimus (Damaeolus)
ornatissimus (Eupterotegaeus)
ornatissimus (Heminothrus)
ornatissimus [C. (Klapperiches)]
ornatissimus (Lepidacarus)
ornatissimus (Plateremaeus)
ornatula (Pilogalumna)
ornatus (Africoribates)
ornatus [P. (Archiphthiracarus)]
ornatus (Carabodes)
ornatus (Charassobates)
ornatus [F. (Cosmogalumna)]
ornatus (Costeremus)
ornatus (Damaeus) (=torquisetosus)
ornatus [M. (Dicondyla)]
ornatus (Euphthiracarus)
ornatus (Eueremaeus) (=oblongus)
ornatus (Fosseremus) (=laciniatus)
ornatus (Gymnodamaeus)
ornatus (Heptacarus)
ornatus (Mystacozetes)
ornatus [C. (Phyllocarabodes)] (=pbaloghi)
ornatus (Porrhotegaeus)
ornatus (Scapheremaeus)
ornatus (Scutovertex)
ornatus (Scheloribates)
ornatus [C. (Tanzaniacepheus)]
ornatus (Tectoribates)
ornatus (Xenillus)
ornatus (Zetorchestes)
ornithorhyncha (Rhynchobelba)
ornithorhynchus (Fissicepheus)
oromiaensis [A. (Acrogalumna)]
oromii (Heminothrus)
oromurcii (Diapterobates)
oroquietaensis (Dolicheremaeus)
orthodactyla (Heteroppia)
orthogonia (Camisia)
orthogonios (Liacarus)
ortizi (Damaeus)
ortizi [H. (Rhacaplacarus)]
oryzae (Scheloribates)
oscensis (Berniniella) serratirostris
oscensis (Scheloribates) labyrinthicus
osithchnjukovi (Phyllozetes)
osornensis [H. (Capillonothrus)]
osornoensis (Cerocepheus)
osoyoosensis (Eueremaeus)
osunensis (Protoribates)
ota (Autogneta)
otagoensis (Cultroribula)
otagoensis (Halozetes)
otagoensis [H. (Notophthiracarus)]
otaheitensis (Acrotritia) (=curticephala)
othneios (Hoplophorella) (=mahunkai)
otwayensis (Hoplophorella)
oudemansi (Achipteria) Jacot, 29 *sp. inq.*
oudemansi (Achipteria) Ham., 52 *(=praeoccupata)*
oudemansi (Banksinoma) lanceolata
oudemansi (Eobrachychthonius)
oudemansi (Eupelops)
oudemansi (Processoppia)
oudemansi [O. (Zygoribatula)] (=hessei)
oumensis (Scheloribates)
outereloi [R. (Paramedioppia)]
ovalis (Achipteria) (=coleoptrata)
ovalis (Dampfiella)
ovalis (Eueremaeus) (?=travei)
ovalis (Liacarus) (=brevilamellatus)
ovalis [E. (Neoepilohmannia)]
ovalis (Parachipteria) sp. inq.
ovalis (Scutovertex) (?=sculptus)
ovalis (Scutozetes)
ovalis [H. (Simkinia)]
ovalis (Totobates)
ovata (Banksinoma)
ovata (Crotonia)
ovata (Galumna) (=antonioberlesei)
ovata [E. (Neoepilohmannia)]
ovatosetosus (Phyllochthonius)
ovatum (Pedunculozetes)
ovatus (Adoristes)
ovatus (Christovizetes)
ovatus [L. (Dorycranosus)] (=djaparidzae)
ovatus (Liacarus)
ovatus [H. (Platynothrus)]
ovatus (Sphaerochthonius) (=splendidus)
ovidianus (Ceratozetes)
ovivorus (Scapheremaeus) sp. inq.
ovulum (Hermannia) sp. inq.

ovulum (Rostrozetes)
oxapampensis (Heterobelba)
oxypterus [T. (Latilamellobates)] (?=myricus)
oxyrhinus [M. (Trimalaconothrus)]
ozkani (Anomaloppia)
ozkani (Cosmogneta)
ozkani [O. (Perspicuoppia)]
ozkani (Rhynchobelba)
pachetos (Hoplophorella)
pachypilus [T. (Cristonothrus)]
pachys [P. (Archiphthiracarus)]
pachyseta (Berlesezetes) (=ornatissimus)
pachytrichosus (Damaeus) (=flagellifer)
pacifica [A. (Acrogalumna)]
pacifica (Basilobelba)
pacifica (Epilohmannia) minuta
pacifica (Erioppia) problematica
pacifica (Exoribatula) (=biundata)
pacifica (Furcoribula)
pacifica [T. (Paragloboppia)]
pacifica (Peltenuiala)
pacifica [H. (Phyllhermannia)]
pacificus (Brachychthonius)
pacificus (Ceratozetes)
pacificus (Otocepheus) sp. inq.
pacificus (Palaeacaroides)
pacificus (Propelops)
pacificus (Scapheremaeus)
pacificus (Scheloribates) Sell., 59
pacificus (Scheloribates) Ham., 67 *(=repetitivus)*
pacificus (Zetorchestes) sp. inq.
paeneminima (Microtritia) (=simplex)
pagoda (Plasmobates)
pahabaeus (Dolicheremaeus)
pahabaeus (Scheloribates)
paillei (Ramusella)
pairathi (Haplacarus)
pajaki (Scheloribates)
pakistanensis (Euphthiracarus)
pakistanensis (Multioppia)
pakistanensis (Peloribates)
pakistanensis [H. (Rhacaplacarus)]
palaciosi [B. (Lanibelba)]
palaciosi (Prototritia)
palaciosi (Scapheremaeus)
palauensis [O. (Oxyoppiella)]
palawanensis (Suctoribates)
palawanus [O. (Acrotocepheus)]
palawanus (Dolicheremaeus)
palawanus (Peloribates)
palawanus (Scheloribates)
pallens (Hoplophorella) (=hamata)
pallens (Nothrus) (=palustris)
palliatus [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
pallida (Epilohmannia) (=minuta)
pallida (Galumna)
pallida [L. (Incabates)]
pallida (Oribatula) (?=amblyptera)
pallida (Pergalumna) (=obsessa)
pallidulus (Hypochthonius) (=rufulus)
pallidulus (Scheloribates)
pallidus (Ceratozetes) sp. inq.
pallidus (Dolicheremaeus) (=damoeoides)
pallidus (Hemileius) (=quadripilis)
pallidus (Neoribates)
pallidus (Nothrus)
pallidus (Phthiracarus) (=compressus)
pallidus (Sphaerochthonius)
pallidus [M. (Trimalaconothrus)]
palmaria (Arcoppia)
palmata (Brachioppia)
palmerae (Limnozetes)
palmicincta (Conoppia)
palmifer (Carabodes)
palpalis (Protoplophora)
paludicola (Hypochthoniella)
paludicola (Svalbardia)
paludis (Hoplophthiracarus) (=illinoisensis)
palustris (Heterozetes)
palustris (Lamellobates) (=molecula)
palustris [P. (Minguezetes)]
palustris (Nothrus)
palustris (Oppiella) nova
palustris (Oribatella)
palustris (Scapheremaeus)
palustris (Suctobelbella)
palustris (Zeascheloribates)
panabokkei (Indoribates) (=punctulatus)
panabokkei (Rhopalozetes)
panamaensis (Topobates)
panayensis (Dolicheremaeus)
panayensis (Pergalumna)
pandanensis [H. (Notophthiracarus)]
pandanus (Haplacarus)
pandus [P. (Archiphthiracarus)]
panemorfis (Nippobodes)
pangasuganensis [O. (Acrotocepheus)]
pankovi [M. (Multilanceoppia)]
pannonica (Liebstadia)
pannonica (Oribatula)
pannonicus (Pantelozetes) (=paolii)
pannonicus (Punctoribates)
pannonicus (Scutovertex)
pannosus (Dolicheremaeus)
pantai (Indopacifica)
pantotrema (Apoplophora)
paoliana (Rhinoppia) (=subpectinata)
paolianus (Heminothrus)
paoliensis [L. (Dorycranosus)]
paolii [G. (Apograptoppia)] (=foveolata)
paolii (Chamobates) (=schuetzi)
paolii [Q. (Coronoquadroppia)] (=monstruosa)
paolii [R. (Insculptoppia)]
paolii (Pantelozetes)
papillaris (Scheloribates)
papillaris (Taiwanoppia)
papillata (Basilobelba)
papillata (Striatoppia)
papillata (Zetorchella) (=pedestris)
papillatus (Atropacarus)
papillifer [H. (Tuberemaeus)]
papillipes (Metabelba)
papillisetigera (Corynoppia)
papillosus (Carabodes) (=coriaceus)
papillosus (Microtegeus)
papillosus [H. (Notophthiracarus)]
papineaui (Geminoppia)
papua (Acroppia) (=processigera)
papua (Arcoppia) cronus
papua (Heminothrus)
papuana (Cryptobothria)
papuana (Dampfiella)
papuana (Neoamerioppia)
papuana [S. (Ussuribata)]
papuanus [P. (Guineobodes)]
papuanus (Humerobates)
papuanus (Orthozetes)
papuanus (Reteremulus) aciculatus
papuanus (Yoshiobodes)
papuensis (Dolicheremaeus)
papuensis (Eutegaeus)
papuensis (Novonothrus)
papuensis (Tyrphonothrus)
papuensis (Symbioribates)
paraafricanus [E. (Pocsia)]
paraajaluela (Oribotritia)
paraallocotos [H. (Notophthiracarus)]
paraanalis (Graptoppia)
paraandinus [H. (Protophthiracarus)]
paraaokii (Oribotritia)
paraarcuata [R. (Insculptoppia)]
paraardua (Acrotritia) (=americana)

parabacilla (Mesoplophora)
parabadensis (Liebstadia)
parabah [H. (Notophthiracarus)]
parabaloghi [P. (Archiphthiracarus)]
parabarbatus (Neoribates)
parabellingeri (Austrotritia)
parabicarinata (Mesotritia)
parabilis (Scheloribates)
paraboliviana (Pergalumna)
parabonangensis [P. (Archiphthiracarus)]
paraborealis (Liacarus)
parabotrichus [P. (Archiphthiracarus)]
parabrasiliana (Acrotritia) (=dixa)
parabrasiliensis (Euphthiracarus)
parabrevipodus (Scheloribates)
parabulanovae (Neoribates)
paracalcicola (Galumna)
paracancellata (Magyaria)
paracapensis (Galumna)
paracapillatus [H. (Notophthiracarus)]
paracapucinus (Protoribates)
paracarinata (Suctobelbella)
paracarolinae (Orobotritia)
paracattienica (Pergalumna)
paracellularis (Galumnella)
paracervus (Microtegeus)
parachichijimensis (Oribotritia)
parachistyakovi [L. (Antennoppia)]
paraclavatus (Atropacarus)
paraclavigerus (Atropacarus)
paraclericata (Pergalumna)
paraclosteros [P. (Metaphthiracarus)]
paracolumbianus (Xenillus)
paraconcinuus (Hoplophthiracarus)
paraconsimilis (Indotritia)
paracontraria (Oribotritia)
paracorporaali (Oribotritia)
paracorynopus (Belba)
paracrispus [P. (Archiphthiracarus)]
paracronadun [H. (Protophthiracarus)]
paracuriosus [H. (Notophthiracarus)]
paracuriosus [S. (Oxyscheloribates)]
paracutidens (Suctobelbella)
paradecipiens (Kulievia)
paradecoratissima (Pergalumna)
paradikra (Acrotritia)
paradisparilis [E. (Pocsia)]
paradivida (Acrotritia)
paradoxa (Arthrhoplophora)
paradoxa (Chavinia)
paradoxa (Galumnella)
paradoxa (Graptoppia)
paradoxa (Iberoppia)
paradoxa (Lohmannia)
paradoxa (Tuberoppia)
paradoxus [A. (Rafacarus)]
paradudichi (Pilizetes)
paraduplicornutus [O. (Acrotocepheus)]
paraecuadoriensis (Protoribates)
paraecuadoriensis (Truncozetes)
paraelongata (Pergalumna)
paraendroedyyoungai [H. (Notophthiracarus)]
paraensis (Hoplophorella)
parafabulosus [R. (Parhynchoribates)]
paraflagellatus [H. (Notophthiracarus)]
paraflagellifera (Taiwanoppia)
paraflagelliformis (Mesotritia)
parafoliata (Ctenobelba)
parafoveolatus (Hoplophthiracarus)
parafoveolatus (Pseudotocepheus)
parafrater [H. (Rhacaplacarus)]
parafrigida (Tripiloppia)
parafusticulus [H. (Notophthiracarus)]
parafusulus (Euphthiracarus)
paragaveae (Mesoplophora)
parageographica (Galumnella)
paragibbula (Galumna)
paraglobosus [P. (Archiphthiracarus)]
paragracilis (Neoribates)
paragranulata (Acrotritia)
paraguayensis (Afronothrus) (=incisivus)
paraguayensis (Nasobates) (=spinosus)
paraguayensis (Peloribates)
paraguayensis (Pseudoamerioppia) (=barrancensis)
paraguayensis (Torpacarus) omittens
paraguayensis [H. (Urubambates)]
parahauseri (Microtritia)
parahirtus (Brachychthonius)
paraincertus (Unguizetes)
paraincisa (Sternoppia)
paraincognita (Oribotritia)
paraindistincta (Pergalumna)
parainsularis (Atropacarus)
parainusitatus [P. (Metaphthiracarus)]
parainvisitata (Mesoplophora)
paraitalica [M. (Neobelba)] (=pseudoitalica)
parajosephineae (Oripoda)
parakanekoi [G. (Diplobodes)]
parakazakhstani (Galumna)
parakontumensis [S. (Perscheloribates)]
parakunsti [E. (Pocsia)]
paralaevigatus [P. (Archiphthiracarus)] (=parabotrichus)
paralagrecai (Eutegaeus)
paralamingtoni [H. (Protophthiracarus)]
paralargus [H. (Protophthiracarus)]
paralawrencei (Galumna)
paralemuria [H. (Kakophthiracarus)]
paraleviseta [M. (Parplophora)]
paraligneus (Phthiracarus) (=ferrugineus)
parallela [Q. (Coronoquadroppia)] (=circumita)
parallela [N. (Nippohermannia)]
parallelodentata [S. (Flagrosuctobelba)]
parallelos (Acrotritia)
parallelus (Annectacarus)
parallelus [L. (Dorycranosus)]
parallelus (Oribatella)
parallelus (Poecilochthonius)
parallelus (Pseudotocepheus)
parallelus (Tumerozetes)
paralongisetosa (Pergalumna)
paralongisetosus [H. (Protophthiracarus)]
paralongulus (Phthiracarus)
paraluminosus [S. (Perscheloribates)]
paramachadoi (Allogalumna)
paramachadoi (Hoplophthiracarus)
paramacrosacculatus (Neoribates)
paramadagascarensis (Allogalumna)
paramadagascarensis [P. (Triaunguis)]
paramaigsius [P. (Triaunguis)]
paramastigophora (Galumna)
paramindanaoensis [P. (Archiphthiracarus)]
paraminimicoma (Indoribates)
paraminisetosus [H. (Austrophthiracarus)]
paramirabilis (Sternoppia)
paramutabilis (Xenillus)
parananus (Scheloribates)
paranasalis (Brachioppiella)
paranepalica (Taiwanoppia)
paranetron (Euphthiracarus)
paranovazealandica (Allogalumna)
paranovazealandiensis (Microtritia)
paraoblongus (Euphthiracarus)
paraoctopunctata (Galumna)
paraokinawana (Galumnella)
parapapuaensis (Eutegaeus)
paraparvulus [H. (Steganacarellus)]
parapassimpunctata (Pergalumna)
parapauliani [H. (Notophthiracarus)]
parapectinata (Rhinoppia)
parapilosus [P. (Neophthiracarus)]
parapinnata (Suctobelbella)
paraplanus (Sellnickochthonius)

parapocsi [P. (Archiphthiracarus)]
parapolysetosus [P. (Vepracarus)]
parapulchellula (Ctenobelba)
parapulchellus [H. (Protophthiracarus)] Nied., 06
parapulchellus [H. (Protophthiracarus)] Ni., 16 *(=neonominatus)*
parapulchra (Mesoplophora)
parapulverosa (Metabelba)
parapustulatus (Austrocarabodes)
paraquattuor (Setoppia)
pararachii (Machadocepheus)
pararadiata [R. (Rectoppia)]
pararafalskii [A. (Rafacarus)]
pararavidus [H. (Notophthiracarus)]
parareducta (Teratoppia)
parareductus [H. (Notophthiracarus)]
parareticulata (Acrotritia) (=reticulata)
parareticulatus (Euphthiracarus)
pararidiculus [H. (Notophthiracarus)]
pararotundus (Neoribates)
pararusseolus (Allonothrus)
parasaucius [H. (Notophthiracarus)]
parascaber (Galumna)
paraschizocomus [H. (Notophthiracarus)]
parasellnicki (Pilizetes)
parasensillus (Wallworkoppia)
parasentus [H. (Notophthiracarus)]
paraserrata (Apoplophora)
paraserratus (Atropacarus)
parashiptoni [P. (Neophthiracarus)]
parasigma (Berniniella)
parasimilis (Euphthiracarus)
parasiti (Paralycus)
parasomalicus [H. (Notophthiracarus)]
paraspiculifera (Acrotritia)
paraspinosa (Apoplophora)
paraspinosa (Oribotritia)
paraspinosus [D. (Epidamaeus)] sp. inq.
paraspinosus [C. (Klapperiches)] (?=similis)
parastaryi (Pilobates)
parastenos [H. (Kakophthiracarus)]
parastriculus (Atropacarus)
parastriganovae (Fissicepheus)
parasufflata [H. (Varioppia)]
parasummersi [H. (Notophthiracarus)]
paratanzicus (Liacarus)
paratenuis [H. (Simkinia)]
paratetraporosa (Galumna)
paratina (Dampfiella)
paratinctus [H. (Notophthiracarus)]
paratranslamellatus [S. (Perscheloribates)]
paratripartita (Hoplophorella)
paratryssos [P. (Archiphthiracarus)]
paratropica (Microtritia)
paratsurusakii (Pergalumna)
paratuberculatus (Neoribates)
paratuberculosissimus [H. (Kakophthiracarus)]
paratubulus [H. (Notophthiracarus)]
paratzitzikamaensis [S. (Perscheloribates)]
paraumaetluisorum (Oribatella)
paraundulata (Rhinoppia)
paraunicarinatus [H. (Steganacarellus)]
parausitatus [H. (Notophthiracarus)]
paravariolosus [H. (Notophthiracarus)]
paravenezolanus [C. (Klapperiches)]
paravermiseta (Perxylobates)
paravesciculus (Euphthiracarus)
paravicinus (Hoplophthiracarus)
paravojnitsi (Allogalumna)
paraweigmanni [M. (Trimalaconothrus)]
paraweni (Galumna)
parayunnanensis [D. (Kunstidamaeus)]
parazeucta [G. (Indogalumna)]
pardinus (Hoplophorella)
parilloi [H. (Notophthiracarus)]
paripilis (Neoamerioppia)
parisi (Oribatula) (=interrupta)
parisiensis (Hydrozetes) lacustris
paritractus (Ceratozetes)
parki (Weigmannia)
parmata (Basilobelba)
parmatus [P. (Archiphthiracarus)]
parmeliae (Mycobates)
parrillarensis (Setoppia)
particula (Neoribates)
partiocrispa (Subbelba)
partita (Indotritia)
partita (Oribotritia) (=exilis)
partita (Pelopsis) (=bifurcata)
parva (Allogalumna)
parva (Autogneta)
parva [S. (Flagrosuctobelba)]
parva (Furcoppia)
parva (Galumna)
parva (Graptoppia) (=neonominata)
parva (Indopacifica)
parva (Pedrocortesella)
parva (Pergalumna)
parva (Rhinoppia) sp. inq.
parvialatus (Scheloribates)
parviaures (Oppia) (=elongata)
parvilamellatus (Ommatocepheus)
parvilamellatus (Protoribates) (=oblongus)
parvipilosa (Synichoritia)
parviporosa (Galumna)
parvisetiger (Ghilarovizetes)
parvisetigerum (Neoribates)
parvoglobosus (Humerobates)
parvula (Galumna) (=tarsipennata)
parvula (Gustavia) sp. inq.
parvula [O. (Monoribatella)]
parvula (Porobelba) Mih., 55 *(=spinosa)*
parvula (Porobelba) Mih., 56 *(=spinosa)*
parvulus (Adrodamaeus) (=siculus)
parvulus (Atropacarus)
parvulus (Ceratozetes)
parvulus (Paralycus)
parvulus (Scapheremaeus)
parvulus (Scheloribates)
parvulus [H. (Steganacarellus)]
parvulus (Transoribates)
parvus (Akansilvanus)
parvus (Eohypochthonius)
parvus (Eupelops) (=occultus)
parvus (Liacarus) (?=brevilamellatus)
parvus [H. (Monoschelobates)]
parvus (Nothrus) (=pulchellus)
parvus (Scheloribates)
parvus [H. (Simkinia)] (=ovalis)
parvus (Trichotocepheus)
parvus (Umbellozetes)
paspalevi (Phauloppia) (=rauschenensis)
passimpunctata (Pergalumna)
passimpunctatus [P. (Archiphthiracarus)] (=pygmaeus)
patagonica (Membranoppia) (=argentinensis)
patagonica (Paroppia)
patagoniensis (Liochthonius)
patakii (Austrocarabodes)
patavina [C. (Triachipteria)]
patchlorum (Heterozetes) (=aquaticus)
patella (Scapheremaeus)
patelloides (Belba)
patoi (Temburongia)
patrius [M. (Calyptozetes)]
patruelis [S. (Tropacarus)]
paucesculptus (Passalozetes)
pauciareolatus [T. (Cristonothrus)]
paucipectinatus (Hypochthonius) rufulus
pauciramosa (Multioppia)
pauciseta (Taiwanoppia)
paucisetosa (Pergalumna) sp. inq.
paucituberculatus [B. (Lanibelba)]
paucus [P. (Archiphthiracarus)]

paulae (Antongilibodes)
pauliani (Galumnella)
pauliani (Machadocepheus)
pauliani [H. (Notophthiracarus)]
pauliani [H. (Phyllhermannia)]
pauliani (Pseudotocepheus)
pauliani (Scapheremaeus)
pauliani (Sellnickochthonius)
pauliensis (Pergalumna)
pauliensis (Pseudotocepheus)
pauliensis (Scheloribates)
paulista (Hydrozetes)
paulyi (Indotritia)
pauper (Coartobelba)
pauropelor (Crotonia)
pavelklimovi (Oribatella)
pavidus [H. (Calyptophthiracarus)] (=illinoisensis)
pavlovskii [D. (Epidamaeus)]
pavlovskii (Papillacarus)
pawnee (Oribatella)
payatosensillus [E. (Trischeloribates)]
pbaloghi [C. (Phyllocarabodes)]
pearcei [H. (Notophthiracarus)] sp. inq.
pearsei (Gymnodamaeus)
pecki (Oribotritia)
pectigera (Neoamerioppia)
pectinata [A. (Acrogalumna)] sp. inq.
pectinata (Acrotritia) (=americana)
pectinata (Brachioppia)
pectinata (Hammerella)
pectinata (Lucoppia) (=burrowsi)
pectinata (Mesoplophora) (=michaeliana)
pectinata (Multipulchroppia) Bal. *et* Mah., 67
pectinata (Multipulchroppia) Aoki, 67 *(=siamensis)*
pectinata (Nanhermannia)
pectinata (Oribella)
pectinata (Schalleria)
pectinata [T. (Teratoppiella)] Bal., 61
pectinata [T. (Teratoppiella)] B. *et* M., 69 *(=pluripectinata)*
pectinatus (Bipassalozetes)
pectinatus (Dolicheremaeus)
pectinatus (Eremobodes)
pectinatus (Eremulus)
pectinatus [M. (Phyllolohmannia)]
pectinatus (Protoribates) (?=lophothrichus)
pectinatus (Spinozetes) (=inexpectatus)
pectinifera (Belba) sp. inq.
pectiniger (Oxyzetes)
pectinigera (Ctenobelba)
peculiaris (Andesamerus)
peculiaris (Bornebuschia)
peculiaris (Platyamerus)
pedanos (Euphthiracarus)
pedanos [H. (Notophthiracarus)] Nied., 03
pedanos [H. (Notophthiracarus)] Nied., 04
pedemontanus (Chamobates) sp. inq.
pedestris (Zetorchella)
peduncularius (Liochthonius)
pegazzanoae (Cepheus)
pehuen (Gozmanyina)
pellitus (Pheroliodes)
pellucida (Allogalumna)
pellucidus [P. (Archiphthiracarus)]
peloponnesiaca (Dissorhina) ornata
peloptoides (Peloribates)
peltifer [H. (Platynothrus)]
peltiferinus [H. (Capillonothrus)] capillatus ssp. inq.
pembertoni (Euscheloribates)
pembertoni (Galumna) australis
pembertoni (Protoribates)
pendula (Pulchroppia)
penetrabilis (Mochlozetes)
penicillata (Acrotritia) P.-I., 69
penicillata (Acrotritia) Mah., 82 *(=furcata)*
penicillata [S. (Flagrosuctobelba)]
penicillatus (Hardybodes)
penicillatus (Hoplophthiracarus)
penicillatus [C. (Klapperiches)]
penicillatus (Scheloribates) (=barbatulus)
penicillifer (Brassiella)
penicillifer (Punctizetes)
penicilliger (Xenillus)
penicillum (Autogneta)
penicillus [C. (Klapperiches)]
penicillus (Liochthonius)
peniculatus (Carabodes) (=palmifer)
peniculatus (Nippobodes)
peniculus (Phyllochthonius)
pennata (Krivolutskiella)
pennata [O. (Zygoribatula)]
pennatus (Rhabdozetes)
penniseta (Suctobelbila)
pentagona (Graptoppia)
pentasacculus (Ecuadoribates)
pentasetarum [C. (Magoebazetes)]
pentasetarum (Novoribatella)
pentasetata [D. (Cylindroppia)]
pentasetosus (Carabodes)
pentatrichus [A. (Uluguroides)]
pepitensis [B. (Gressittoppia)]
pepitensis (Liochthonius)
peracuta [S. (Flagrosuctobelba)]
peracutus (Scheloribates)
peracutus (Steganacarus) (=sol)
perakensis (Galumna)
perangustus (Reductobates)
perarmata (Suctobelbella)
perarmatus (Eupelops) (=hirtus)
perates (Mycobates)
perbella (Kuklosuctobelba)
perdentata [N. (Leptosuctobelba)]
peregovitsi (Anomaloppia)
peregrinus (Meriocepheus)
perelegans (Liochthonius)
perennis (Pteroripoda)
perexigua (Mesoplophora) (=michaeliana)
perezi (Galumna)
perezinigoi (Annectacarus)
perezinigoi (Arcoppia)
perezinigoi (Carabodes)
perezinigoi (Chamobates)
perezinigoi (Cosmochthonius)
perezinigoi (Ctenobelba)
perezinigoi (Hypogeoppia)
perezinigoi (Jacotella) (=frondeus)
perezinigoi [L. (Lancelalmoppia)]
perezinigoi (Liacarus)
perezinigoi [H. (Mantigueracarus)]
perezinigoi (Nothrus)
perezinigoi [H. (Notophthiracarus)]
perezinigoi [P. (Peloribatodes)]
perezinigoi (Rostrozetes)
perezinigoi (Sphaerozetes)
perezinigoi (Steganacarus) (=hirsutus)
perfecta (Multioppia)
perfectus (Trichoribates) sp. inq.
perfectus [S. (Tropacarus)] (=brevipilus)
perforata (Crotonia)
perforata (Suctobelbella)
perforatoides [H. (Tuberemaeus)]
perforatulus (Scutovertex)
perforatus (Bipassalozetes)
perforatus (Scheloribates)
perforatus (Scutovertex) (=neonominatus)
perforatus [H. (Tuberemaeus)]
perfusorius (Liochthonius)
pergeli (Arcoppia) (=rugosa)
pergratus (Steganacarus)
periculosa (Brachioppiella)
perikopesis (Meristacarus)
perinfamis (Cyrthermannia) sp. inq.
perisi (Anachipteria) (=howardi)

perisi (Arcoppia)
perisi (Dolicheremaeus)
perisi (Hoplophorella)
perisi (Scheloribates)
peristomaticus [P. (Archiphthiracarus)]
peritus (Ceratozetes)
perkinsi (Humerobates)
perkinsi (Phauloppia)
perlongoides (Birsteinius)
perlongum (Trichoribates) (=longipilis)
perlongus [Z. (Alpizetes)]
perlongus (Birsteinius)
perlongus [H. (Simkinia)] (=ovalis)
perlucidus (Phthiracarus) (=insularis)
perlucundus [H. (Steganacarellus)]
permirus (Hoplophorella)
permixta [S. (Ussuribata)]
permixtus (Bipassalozetes) sp. inq.
permixtus (Xenillus) (=clypeator)
permodica (Mesoplophora)
pernettyae [S. (Campbelloppia)]
perolata (Oppia) (=nitens)
perona [N. (Dasybelba)]
perparvus [H. (Steganacarellus)]
perpendiculata (Suctobelbella) (=acutidens)
perpropinqus [H. (Protophthiracarus)]
perproxima [C. (Triachipteria)]
perpusilla (Oribotritia)
perpusillus (Liochthonius) (=brevis)
perreti (Cavernocarabodes)
perreti (Dolicheremaeus)
perreti (Mahnertozetes)
perreti (Peloribates)
perrugosa (Eremobelba)
persetosus (Pseudopirnodus)
persiangulfi (Rostrozetes)
persiangulfia (Lauroppia)
persica (Pergalumna)
persica (Ramusella)
persicus (Zetomotrichus)
persimilis [P. (Archiphthiracarus)]
persimilis [H. (Rhacaplacarus)] (=somalica)
persimilis (Trichoribates)
persimplex (Phthiracarus)
personatus (Lamellocepheus)
personatus (Steganacarus) spinosus
perspicua [O. (Perspicuoppia)]
pertenuis [P. (Archiphthiracarus)]
pertenuis [M. (Parplophora)] Niedb., 01
pertenuis [M. (Parplophora)] Niedb., 06 *(=niedbalai)*
perti [H. (Notophthiracarus)]
pertineata [L. (Lancelalmoppia)]
pertrichosa (Pergalumna)
pertusus (Cepheus) sp. inq.
peruensis (Acrotritia)
peruensis (Aeroppia)
peruensis (Berlesezetes)
peruensis [T. (Cristonothrus)]
peruensis (Neoribates)
peruensis (Nothrus)
peruensis (Suctobelbila)
peruensis (Xenillus)
pervagatus (Cymbaeremaeus)
pervalida (Hoplophorella)
perversus (Atropacarus)
pervicax (Hoplophorella)
pervigens [H. (Rhacaplacarus)]
peseki (Dampfiella)
petalus (Caudamaeolus)
petalus [J. (Euryacarus)]
peterjaegeri (Eurostocepheus)
petiolata (Laroppia)
petiti [C. (Triachipteria)]
petri (Ceratozetes) (=simulator)
petrinjensis (Globozetes)
petrocoriensis (Microzetes)
petrofagus (Scutovertex)
petrohuensis (Austroppia)
petronia (Maudheimia)
petrosus (Scapheremaeus)
petrovae (Umbellozetes)
petrovi (Ceratozetes) (=campestris)
petrunkevitchi (Hydrozetes)
peullaensis [B. (Plaesioppia)]
peyrierasi (Malgachebates)
phaeonotus (Peloptulus)
phalangioides (Allobelba)
phalerata (Apoplophora)
phaleratus [H. (Austrophthiracarus)]
phaseola (Schalleriella)
phaseolus (Brazilozetes)
phasganus [A. (Rafacarus)]
philippica (Dampfiella)
philippinensis [O. (Acrotocepheus)]
philippinensis (Allosuctobelba) grandis
philippinensis (Allozetes)
philippinensis (Campbellobates)
philippinensis (Carinogalumna)
philippinensis (Dolicheremaeus)
philippinensis (Eupelops)
philippinensis (Farchacarus)
philippinensis [I. (Haplozetes)]
philippinensis (Nesiacarus)
philippinensis (Oripoda)
philippinensis (Ramusella)
philippinensis (Scheloribates)
philippinensis (Suctotegeus)
philodendrus (Tuparezetes)
phitosi (Hauseroplophora)
phitosi (Liochthonius)
phitosi (Microzetes)
phongnhae (Austrachipteria)
phoretica (Neoamerioppia)
phoxos [H. (Notophthiracarus)]
phoxos (Phthiracarus)
phryxothrixus (Xenillus) (=occultus)
phylliferus (Zetorchestes)
phylliformis (Carabodes)
phylliformis (Nothrus)
phylliformis [H. (Phyllhermannia)]
phylliformis [S. (Ussuribata)]
phyllodes [H. (Steganacarellus)]
phyllophora (Oribatella)
phyllophora [H. (Phyllhermannia)]
phyllophorus (Atropacarus)
phyllophorus (Machadocepheus)
phyllophorus (Neoeutegaeus)
phyllophorus (Sellnickochthonius)
phyllophorus (Sphaerochthonius)
phylloseta (Oxymystroppia)
phyllosetus (Zetorchestes)
phyllotrichus (Dolicheremaeus)
phymatha (Indotritia)
phymatos (Hoplophorella)
physoseta (Stylozetes)
phytophilus (Eupelops) (=acromios)
pianmaensis (Cubachipteria)
pianmaensis [D. (Epidamaeus)]
picea (Hermanniella)
picipes (Diapterobates) (=humeralis)
picturatus (Austrocarabodes)
pictus (Scutovertex)
pietertheroni (Pergalumna)
piffli (Arcoppia)
piffli (Eremobelba)
piffli (Heptacarus)
piffli (Lanceoppia)
piffli (Mesotritia) (=nuda)
piger [P. (Archiphthiracarus)]
pigerrima (Camisia) (=biurus)
pileatus (Scutovertex)
pileiformis (Nothrus) sp. inq.

pilifera [S. (Flagrosuctobelba)]
piligera (Liebstadia) sp. inq.
pilipes (Tyrphonothrus) (=maior)
pilipinus (Eremulus)
pilipinus (Peloribates)
pilisinopia (Karenella)
pilosa (Galumnella)
pilosa (Liebstadia)
pilosa (Lucoppia) (=burrowsi)
pilosa [E. (Neoepilohmannia)]
pilosa [O. (Oxyoppiella)]
pilosa (Phauloppia)
pilosella (Cenobelba)
pilosella (Condyloppia)
pilosellus (Malaconothrus)
pilosellus (Pilobates)
pilosetosus (Scutovertex)
pilososetosa (Phylloribatula)
pilososetosa (Suctobelbella) acutidens
pilososetosus (Mixochthonius)
pilosus (Africoribates)
pilosus [P. (Archipththiracarus)] (=bryobius)
pilosus (Astegistes)
pilosus (Bipassalozetes)
pilosus [J. (Euryacarus)]
pilosus [P. (Neophthiracarus)]
pilosus (Parhypochthonius)
pilosus (Peloribates)
pilosus (Scheloribates) sp. inq.
pilosa (Trichoribates) (=brevicuspis)
piluliferus (Neoliochthonius)
pinarbasiensis [R. (Insculptoppia)]
pinarensis (Hoplophorella)
pinarensis (Microtritia)
pinea (Moritzoppia)
pinguis [D. (Epidamaeus)]
pinguis (Rostrozetella)
pinguis (Scapheremaeus)
pinguisetosa (Acrotritia) (=ardua)
pinguisetus (Peloribates)
pini (Fuscozetes)
pini [B. (Lanibelba)]
pinicola (Oripoda)
pinicola [H. (Phyllhermannia)]
pinicus (Propelops) sp. inq.
pinifera (Ramusella)
pinnatifilis (Hammerella) sp. inq.
pinnatus (Austrocarabodes)
pinnatus (Eutegaeus)
pinnatus (Scheloribates) sp. inq.
pinnigera (Lohmannia)
pinnigera (Suctobelbella)
pinsapi (Rhinoppia)
piramidalis (Odontocepheus)
pirata [F. (Multifossoppia)]
pirenaicus (Carabodes)
piriformis (Belba) (=rossica)
piriformis (Nothrus)
piriformis (Sphaerozetes)
piriformis (Trichoppia)
pirinensis (Carabodes)
pirovaci (Acrotritia) (=penicillata)
pisacensis (Paraphauloppia)
pisacensis (Scapheremaeus)
pisgahi (Euphthiracarus) (=pulchrum)
pistillifer (Fosseremus) (=laciniatus)
pitentzin (Tyrphonothrus)
piton [N. (Perezinigokalumma)]
pius (Brachychthonius)
planatus (Belorchestes)
planeta (Neosuctobelba)
planiclava (Galumna)
planicornis (Eupelops) (?=acromios)
planisetus (Austrocarabodes)
planissima [G. (Monophauloppia)]
plantivaga (Dometorina)
planus [H. (Besuchetacarus)]
planus (Eobrachychthonius)
planus (Heteroleius)
planus [M. (Trimalaconothrus)] sp. inq.
platakisi (Atropacarus)
platensis (Dometorina)
platensis (Hydrozetes) sp. inq.
platensis (Podoribates)
platynota [M. (Neobelba)]
platypterus (Acanthozetes)
platyrhina (Ceratozetella)
platyrhinoides (Ceratozetella)
platyrhinus [M. (Trimalaconothrus)]
plegados [H. (Notophthiracarus)]
plenus (Phthiracarus)
plesiomorphica (Nortonbelba) italica
plethotricha (Umashtanchaeviella)
pletzenae [L. (Convergoppia)] (=neonominata)
pletzenae (Pheroliodes) (=africanus)
pletzenae (Pletzenoppia)
plicata [S. (Flagrosuctobelba)]
plicata (Machuella) ventrisetosa
plicatus (Eupelops)
plokosus (Gymnodamaeus)
plowmanae [A. (Acrogalumna)]
plumalae (Pergalumna) weberi
plumata [S. (Flagrosuctobelba)]
plumata [K. (Niosuctobelba)]
plumata [R. (Paramedioppia)]
plumata (Pergalumna)
plumatus (Atropacarus)
plumatus (Cosmochthonius)
plumifer (Plumozetes)
plumiger (Spathulocepheus)
plummeri [O. (Monoribatella)]
plumosa [S. (Flagrosuctobelba)]
plumosa (Zetorchella)
plumosulus (Yoshiobodes)
plumosus [T. (Cristonothrus)]
plumosus [D. (Epidamaeus)] sp. inq.
plumosus (Eremaeus)
plumosus (Halozetes)
plumosus (Heptacarus)
plumosus [Z. (Keralotrichus)]
plumosus (Liochthonius) Mah., 69
plumosus (Liochthonius) Chin. *et* Aoki, 72 *(=alius)*
plumosus (Otocepheus)
plumosus (Peloribates)
plumosus (Sellnickochthonius)
plumosus (Yoshiobodes)
pluosiae [M. (Sagittabodes)]
pluripectinata [O. (Dzarogneta)]
pluripectinata [T. (Teratoppiella)]
pluriseta (Nanhermannia) Mah., 84
pluriseta (Nanhermannia) Mah., 88 *(=sabahensis)*
plurisetosa (Pulchroppiella)
plurisetus (Benoibates)
plurisetus (Paradolicheremaeus)
pluritrichosus (Baloghoizetes)
pocsi (Allogalumna)
pocsi [P. (Archiphthiracarus)] (=anonymus)
pocsi (Eupelops)
pocsi (Eurhynchoribates)
pocsi [B. (Gressittoppia)]
pocsi [R. (Insculptoppiella)]
pocsi [C. (Klapperiches)]
pocsi [M. (Megazetes)]
pocsi (Peloribates)
pocsi (Pergalumna)
pocsi [H. (Phyllhermannia)] sp. inq.
pocsi (Suctobelbila)
pocsiana (Sternoppia)
pocsorum (Basidoppia)
poensis (Rostrozetes)
poggii [C. (Klapperiches)]
polaris [T. (Sacculoribates)]

polilloensis (Cavaecarabodes)
polilloensis (Oxyamerus)
polilloensis [H. (Phyllhermannia)]
polita (Oxyoppia)
polita [M. (Parplophora)]
politus (Eueremaeus) (=columbianus)
politus [H. (Rhacaplacarus)] (=eximia)
pollinivorus (Saxicolestes)
pollinosus (Metabelba) (=pulverulenta)
polonicus (Amerus)
polpaicoensis [Z. (Protozetomimus)]
polychothomus [L. (Dorycranosus)]
polygonalis (Licneremaeus)
polygonalis (Sphaerozetes)
polygonata (Lunoribatula)
polygonata (Neoamerioppia)
polygonatus (Afroleius)
polygonatus (Papillacarus)
polygonatus (Rostrozetes)
polygonatus (Scheloribates)
polygrammus (Joshuella)
polynesia [O. (Oxyoppiella)]
polynesica (Striatoppia) similis
polynesius (Nesopelops)
polyphyllos (Adhaesozetes)
polyporetes (Carabodes)
polyporus (Galumna) sp. inq.
polyptychus [M. (Archegotocepheus)]
polysetosa [C. (Aokibelba)] (=rameus)
polysetosus (Neoliodes)
polysetosus (Scapheremaeus)
polysetosus [P. (Vepracarus)]
polystriata [H. (Heterohermannia)]
polytretos (Euphthiracarus) (=crassisetae)
polytricha (Camisia)
polytrichus [A. (Uluguroides)]
polytuberculata (Oribatula)
pomboi [D. (Eudamaeus)]
pomboi (Humerobates)
pondoklowii [P. (Archiphthiracarus)]
pontica (Lasiobelba)
ponticula [S. (Flagrosuctobelba)]
ponticuliger (Scheloribates)
ponticus (Cosmochthonius)
ponticus (Phthiracarus) sp. inq.
ponticus (Scheloribates) (=pallidulus)
pontiger (Carabodes) (=marginatus)
pontiger (Ceratobates)
pontigera (Coartobelba)
popovi (Suctobelbila)
poppei (Adoristes) ovatus
poppi (Lanceoppia)
porcella (Eremobelba)
porcella (Nasozetes)
porcellus (Neoliodes) sp. inq.
porcinolus (Dolicheremaeus)
porcula (Meristacarus)
pori (Lasiobelba) (=kuehnelti)
porifera (Arcoppia)
poronota (Trypogalumnella)
porosa (Fenichelia)
porosus (Acaroceras)
porosus (Eremaeus)
porosus (Flagellozetes)
porosus (Haplacarus)
porosus (Javacarus)
porosus (Nehypochthonius)
porosus (Peloribates)
portentosus [P. (Neophthiracarus)]
porticus (Trhypochthoniellus)
posticus (Nothrus) sp. inq.
potchefstroomensis (Scheloribates)
praearcuata (Arcoppia)
praeconcavus (Leobodes)
praedatoria (Dometorina)
praeincisus (Scheloribates)
praelineatus (Scheloribates)
praeoccupata (Achipteria)
praeoccupata [F. (Cosmogalumna)] (=imperfecta)
praeoccupata [S. (Flagrosuctobelba)] (=plumata)
praeoccupata (Hoplophorella)
praeoccupata (Oribatula)
praeoccupatissimus (Scheloribates)
praeoccupatus (Dolicheremaeus)
praeoccupatus (Malaconothrus) (=machadoi)
praeoccupatus [P. (Neophthiracarus)]
praeoccupatus (Nothrus)
praeoccupatus (Peloribates) (=tsengi)
praeoccupatus [H. (Platynothrus)]
praeoccupatus (Scheloribates)
praeoccupatus [P. (Triaunguis)]
praestans (Moritzoppia)
praestantissimus (Scheloribates)
praetiosa (Notogalumna)
praetritia (Epilohmannia)
pragensis (Punctoribates) (?=sphaericus)
prahuensis [M. (Trimalaconothrus)]
prasadi (Belba)
prasadi (Christovizetes)
pratensis (Anachipteria)
pratensis (Mesoplophora) (=cubana)
pratensis (Nothrus)
pratensis (Podoribates)
prelli (Suctobelbata)
preptos (Hoplophorella)
presbytis [C. (Ensicamisia)]
pretiosa (Banksinoma)
prima (Baloghiella)
prima [O. (Zygoribatula)]
primorica (Oppiella)
primoricus (Scheloribates)
primus [H. (Besuchetacarus)]
primus (Papillocepheus)
princeps (Heminothrus) (=targionii)
principalis (Diapterobates) (=reticulatus)
principalis [S. (Polyxylobates)]
prionotus (Protoribates) (=lophothrichus)
prior (Liochthonius)
prior (Phthiracarus) (=longulus)
prismaticus [T. (Cristonothrus)] sp. inq.
problematica (Erioppia)
problematica (Moritzoppia) (=incisa)
problematica (Topalia)
problematicus (Fijibates)
problematicus [I. (Haplozetes)] (=vindobonensis)
problematicus [C. (Klapperiches)]
probus [P. (Neophthiracarus)]
procera (Dampfiella)
procera (Hoplophorella)
procera (Leptoppia)
procera (Mesotritia)
procerus (Carabodes)
procerus [H. (Notophthiracarus)] (=niedbalai)
processa (Galumnella)
processa (Zeasuctobelba)
processigera (Acroppia)
processus (Antarctozetes)
processus (Ceratorchestes)
processus (Magellozetes)
processus (Malaconothrus)
processus (Scheloribates)
processus (Stylozetes)
prodigiosa (Decoroppia)
prodigiosus (Licneremaeus)
prodorsissima [O. (Zygoribatula)]
prodorsocristata (Hoplophorella)
producta [O. (Monoribatella)] (=ornata)
producta (Rhinoppia)
profundus (Elliptochthonius)
projectus (Hoplophthiracarus)
prolamellatus (Protoribates)
prolixus [H. (Notophthiracarus)]

prolongata (Oribatella)
promecus (Cryptacarus)
prominens (Aleurodamaeus)
prominens (Hoplophorella)
prominens (Oripoda)
prominens (Passalozetes)
prominens (Peloribates)
prominens (Phauloppia)
prominens (Suctobelbella)
promissus (Pseudotocepheus)
propexa (Metabelba)
propinqua (Indotritia)
propinqua (Metabelba) sp. inq.
propinqua (Oppiella) nova
propinqua (Pedrocortesella)
propinqua [O. (Zygoribatula)]
propinquus (Bipassalozetes) (=perforatus)
propinquus (Licneremaeus) sp. inq.
propinquus (Liochthonius)
propinquus (Phthiracarus) boresetosus
propinquus [H. (Tuberemaeus)]
prosopis (Parapirnodus)
prostrata (Dampfiella)
protrusus [H. (Besuchetacarus)]
protrusus (Euphthiracarus)
protrusus (Hoplophthiracarus)
protrusus (Neoribates)
proxima (Acrotritia) (=paraspiculifera)
proximus (Acaronychus)
proximus (Eueremaeus)
proximus (Hemileius)
proximus (Hoplophthiracarus)
proximus (Tectoribates)
prudens (Trichoribates) (?=angustatus)
prunum (Carabodes)
psadilliferus (Stictozetes)
psammophylus (Brachychthonius)
psammophylus (Ceratozetes)
pseudoaciculatus (Papillacarus)
pseudoadilatatus [T. (Cristonothrus)]
pseudoareolatus (Lamellozetes)
pseudoareolatus [H. (Tuberemaeus)]
pseudoauritus (Damaeus)
pseudoborussicus (Nothrus) (=anauniensis)
pseudobrevisetiger (Nippobodes)
pseudocallipygus (Torpacarus)
pseudocarinatus [S. (Tropacarus)]
pseucocircumita [Q. (Coronoquadroppia)]
pseudoconfinis (Neotrichoppia)
pseudocontiguus (Liacarus)
pseudocorrugata (Membranoppia)
pseudocorynopus (Belba) (=patelloides)
pseudocostulata (Brachioppia) (=deliciosa)
pseudofurcatus (Acaroceras)
pseudofurcatus (Dolicheremaeus)
pseudofurcatus (Rostrozetes)
pseudofusiger (Minunthozetes)
pseudoglabra (Multioppia)
pseudohigginsi [B. (Gressittoppia)]
pseudohystricinus (Liochthonius)
pseudoimmaculatus (Brachychthonius)
pseudoinaequipes [A. (Parabelbella)]
pseudoitalica [M. (Neobelba)]
pseudojacoti (Neoribates)
pseudokhoii (Galumna)
pseudolamellatus (Malaconothrus)
pseudolaticeps (Verachthonius)
pseudomaculatus (Ameronothrus) (=maculatus)
pseudomahnerti (Ctenobelba)
pseudomargaritata (Pergalumna)
pseudomediocris (Ceratozetes)
pseudomochlosimilaris (Scheloribates)
pseudonigra [O. (Multoribatella)]
pseudonodosa [H. (Heterohermannia)]
pseudoornatissima (Suctobelbella)
pseudopapillipes (Neobelba)
pseudoporosus (Peloribates)
pseudoprincipalis (Scheloribates)
pseudoreticulatus (Alismobates)
pseudoreticulatus (Austrocarabodes)
pseudoreticulatus (Scapheremaeus)
pseudornata (Suctobelbella)
pseudosculptus (Eupterotegaeus) (?=ornatissimus)
pseudosejugalis (Pergalumna)
pseudosetosus (Fuscozetes)
pseudosomalica [H. (Rhacaplacarus)]
pseudotatricus (Belbodamaeus)
pseudotriquetra (Galumna)
pseudotuberculatus [H. (Notophthiracarus)]
pseudoturcmenica (Lohmannia)
pseudovermiseta (Sicaxylobates)
psyla (Basidoppia)
pterata (Pilogalumna) (=ornatula)
pterinervis (Pergalumna)
pterolineata [G. (Erogalumna)]
pterota (Hafenrefferia) (=gilvipes)
pterotus Neoribates
pterygoides (Totobates)
pubescens (Krivolutskiella)
pubescens (Scheloribates)
pubescentius (Meristacarus)
pudicus (Phthiracarus)
puella (Epilohmannia)
puertoincaensis (Rhynchoppia)
puertomonttensis (Oribatella)
puertomonttensis (Ramusella)
pugio (Acaroceras)
pugionis [H. (Rhacaplacarus)]
pulchella (Eremella)
pulchella (Eremobelba)
pulchella (Galumnella)
pulchella [H. (Heterohermannia)]
pulchella (Phylloribatula)
pulchella (Rohria)
pulchella (Suctobelbila)
pulchellula (Ctenobelba)
pulchellus (Dendracarus)
pulchellus (Eupelops) (=tardus)
pulchellus (Nothrus) Berl., 10
pulchellus (Nothrus) Tseng, 82 *(=praeoccupatus)*
pulchellus [H. (Protophthiracarus)]
pulchellus (Scapheremaeus)
pulcher [L. (Dorycranosus)]
pulcher (Holonothrus)
pulcher [C. (Klapperiches)]
pulcher (Malaconothrus) Mih., 57 *(=monodactylus)*
pulcher (Malaconothrus) Ham., 61 *(=neonominatus)*
pulcher (Pareutegaeus)
pulcherrimus (Cosmopirnodus)
pulcherrimus (Licnodamaeus)
pulcherrimus (Ommatocepheus) (=ocellatus)
pulcherrimus (Rostrozetes) Bal., 61 *(=poensis)*
pulcherrimus (Rostrozetes) Bal., 70 *(=baloghi)*
pulcherrimus (Trichthonius)
pulcherrimus [S. (Tropacarus)] carinatus
pulchra (Belba)
pulchra (Carinabella)
pulchra (Crotonia)
pulchra [O. (Monoribatella)]
pulchra (Multioppia)
pulchra [M. (Parplophora)]
pulchra (Pedrocortesella)
pulchra [H. (Phyllhermannia)]
pulchra (Suctobelbella) sp. inq.
pulchra (Veloppia)
pulchritude (Cavaecarabodes)
pulchrum (Euphthiracarus)
pulla (Austrachipteria)
pulla (Oribotritia)
pulleni (Scapheremaeus)
pullus [H. (Notophthiracarus)]
pulverosa (Metabelba) (=pulverulenta)

pulverulenta (Metabelba)
pulvillifer (Cymbaeremaeus) (=cymba)
pulvillus (Xenillus)
pumila (Oribotritia)
pumila (Suctobelbella)
pumilatus (Nothrus)
pumilis (Tumerozetes)
pumilus [H. (Notophthiracarus)]
pumularis (Trichogalumna)
punctata (Adoribatella)
punctata (Brachyoripoda)
punctata (Gittella)
punctata [L. (Incabates)]
punctata (Moritzoppia)
punctata (Oribatella)
punctata (Oripoda)
punctata (Parachipteria)
punctata (Pergalumna) (=retalata)
punctata [H. (Phyllhermannia)]
punctata [H. (Rhacaplacarus)]
punctata (Suctobelbata)
punctata (Trichogalumna)
punctatus [O. (Acrotocepheus)]
punctatus [M. (Calyptozetes)]
punctatus (Constrictocepheus)
punctatus (Dolicheremaeus)
punctatus (Eremulus)
punctatus (Nesopelops)
punctatus [H. (Platynothrus)]
punctatus (Pseudotocepheus)
punctatus (Rostrozetes)
punctatus (Scutovertex)
punctatus (Tectoribates) (=proximus)
punctatus (Tegeocranellus)
punctatus [P. (Triaunguis)]
punctatus (Trichoribates)
punctatus [H. (Tuberemaeus)] (=neonominatus)
punctatus [H. (Urubambates)]
punctatus [P. (Vepracarus)]
punctillata (Suctobelbila)
punctipennis (Galumnella)
punctocostulata (Suctobelbila)
punctulata (Hermanniella) (=picea)
punctulata (Multipulchroppia) schauenbergi
punctulata (Oribatella) sp. inq.
punctulata (Pergalumna)
punctulata (Pilobatella)
punctulatus (Atropacarus)
punctulatus [L. (Dorycranosus)]
punctulatus (Euphthiracarus) Berl., 13 *(=cribrarius)*
punctulatus (Euphthiracarus) Jac., 30
punctulatus (Hispanozetes)
punctulatus (Indoribates)
punctulatus (Malaconothrus) Ham., 52 *(=monodactylus)*
punctulatus (Malaconothrus) Bal., 58 *(=machadoi)*
punctulatus Neoribates
punctulatus (Proteremaeus)
punctulatus (Rostrozetes) (=ovulum)
punctulatus (Steganacarus) (=personatus)
punctulatus (Tectocepheus)
punctulatus (Xenillus) Banks, 1895 *sp. inq.*
punctulatus (Xenillus) B. *et* P. B., 1984 *(=neonominatus)*
punctulifer (Rostrozetes) (=ovulum)
punctum (Punctoribates)
punctus [M. (Trimalaconothrus)]
pundamiliaensis (Scapheremaeus)
puniceus (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
puntaarenasensis (Pseudotocepheus)
pupula [L. (Lagenobates)] (?=lagenula)
puritanicus [D. (Epidamaeus)]
purpurarius [C. (Klapperiches)]
puruczkyi [H. (Tuberemaeus)]
purvisi (Malaconothrus)
pusilla (Galumna)
pusilla (Mesoplophora)
pusilla (Oribatella)
pusillus (Allozetes)
pusillus (Allozetes)
pusillus (Chamobates)
pusillus (Diapterobates)
pusillus (Gymnodamaeus)
pusillus (Liochthonius)
pusillus (Phthiracarus)
pustulata [O. (Dzarogneta)]
pustulata [H. (Kakophthiracarus)]
pustulata (Reticuloppia)
pustulatus (Cepheus) sp. inq.
pustulatus (Dolicheremaeus)
pustulatus (Limnozetes)
pustuloreticulatus (Austrocarabodes)
putinglupa (Dampfiella)
putinglupaensis [P. (Triaunguis)]
puyeue (Novonothrus)
puylaerti [P. (Archiphthiracarus)]
puzanovi (Epimerella)
pyemaireneri (Crotonia)
pygiseta (Uracrobates)
pygmaea (Heterogalumna)
pygmaeus [P. (Archiphthiracarus)]
pygmaeus (Malaconothrus)
pygmaeus (Malaconothrus)
pygmaeus (Pseudotocepheus)
pyramidalis (Neoliodes)
pyramidalis (Neoribates)
pyramidalis (Trizetes)
pyrenaica (Cerachipteria)
pyrenaica (Hungarobelba)
pyrenaicus [D. (Epidamaeus)]
pyrenaicus (Microzetes)
pyri (Galumna) (=flabellifera)
pyriformis (Allonothrus)
pyriformis (Machuella) ventrisetosa
pyriformis (Truncopes)
pyrigerum (Adoristes) (=ovatus)
pyrigerus (Paralycus)
pyrostigmata [O. (Zygoribatula)] (=frisiae)
qianensis (Trhypochthoniellus)
qinlingensis (Gymnodampia)
quadracantha (Camisia) (=spinifer)
quadrangulus (Carabodes)
quadrata [S. (Flagrosuctobelba)]
quadrata (Lamellarea)
quadriareatus (Minunthozetes)
quadricarina [S. (Flagrosuctobelba)] (=elegantula)
quadricarinata (Austrotritia)
quadricarinata (Quadroppia)
quadricaudicula (Jacotella)
quadricornis (Lamellobates)
quadricornuta (Bicyrthermannia)
quadricornuta (Oribatella)
quadricornutus (Hymenozetes)
quadricuspidatus (Cultrobates)
quadricuspis (Oribatella) (?=quadricornuta)
quadridentata (Achipteria)
quadridentata (Austrachipteria)
quadridentata (Austrogneta)
quadridentata (Ceratoppia)
quadridentata (Nanhermannia)
quadridentata (Oribatella)
quadridentatus (Phylacozetes)
quadrifasciatus (Mixacarus)
quadrifoveolata [O. (Oxyoppiella)]
quadrihastatus [D. (Spatiodamaeus)] (=verticillipes)
quadrilamellatus (Eueremaeus) oblongus
quadrilineata (Striatoppia)
quadrilineatus (Scapheremaeus)
quadrilineatus (Schizozetes)
quadrilobatus (Sphaerozetes)
quadrimaculata (Allogalumna)
quadrimaculata [S. (Lalmoppia)]
quadrimucronata (Oribatella) (=eutricha)
quadripertitus (Fosseremus) (=laciniatus)

quadripilis (Hemileius)
quadripilosa (Elaphoppia)
quadripilus [I. (Haplozetes)]
quadripilus (Nothrus)
quadriporosa [G. (Porogalumnella)]
quadrireticulatus (Scapheremaeus)
quadrirotunda [H. (Phyllhermannia)]
quadriseriata [H. (Heterohermannia)] (=reticulata)
quadriseriatus (Steganacarus) (?=applicatus)
quadriseta [L. (Antennoppia)]
quadriseta (Gymnodamaeus)
quadriseta (Sternoppia)
quadrisetosa (Oppia) sp. inq.
quadrisetosa (Paraceratoppia)
quadrisetosa (Paraphauloppia)
quadrisetosa (Quadroribula)
quadrisetosus (Microtegeus)
quadrisetosus (Neoribates)
quadrispinata (Oribatella)
quadristriatus (Microtegeus)
quadristriatus [H. (Platynothrus)] Ham., 58
quadristriatus [H. (Platynothrus)] C. *et* K., 78 *(=praeoccupatus)*
quadrituberculata (Lauroppia) (=marginedentata)
quadrituberculata (Rugoppia)
quadrituberculatus [D. (Spatiodamaeus)]
quadrivertex (Zachvatkinibates)
quadrus [H. (Besuchetacarus)]
quagesetosa [P. (Ausoribula)]
quasidivida (Acrotritia)
quasigaveae (Mesoplophora)
quasiminisetosus [H. (Austrophthiracarus)]
quasimodo (Selenoribates)
quasisimilis [H. (Notophthiracarus)]
quasisomalicus [H. (Notophthiracarus)]
quasitakahashii (Euphthiracarus)
quasiuluguruensis [H. (Notophthiracarus)]
quateorum [O. (Acrotocepheus)]
quaternaria [H. (Mantigueracarus)]
quathlambae [G. (Stenoppia)]
quattuor (Setoppia)
quatuor (Neosuctobelba)
queenslandensis [H. (Notophthiracarus)]
queenslandiae (Crotonia)
queenslandica (Hoplophorella) (=singularis)
queenslandica (Novazelandiella)
queulatensis (Eutegaeus)
quezonensis (Dolicheremaeus)
quezonensis (Galumnella)
quezonensis [S. (Perscheloribates)]
quezonica (Heterobelba)
quietus [H. (Notophthiracarus)]
quindecim (Topobates)
quinquecostata (Parasuctobelba)
quinquedentata [S. (Flagrosuctobelba)]
quinquenodosa (Suctobelbila)
quinquenodosa (Zeasuctobelba)
quinquepilosa (Graptoppia) (=paraanalis)
quinquesetosa (Cultroribula)
quintus (Scheloribates) laevigatus
rabacalensis [P. (Metaphthiracarus)]
rabori [E. (Neoepilohmannoides)]
rabus [H. (Notophthiracarus)]
rachii (Machadocepheus)
racovitzae [L. (Dorycranosus)] (?=acutus)
raczi (Microzetes)
radiata (Arcoppia)
radiata (Multioppia)
radiata [R. (Rectoppia)]
radiata [H. (Varioppia)]
radiatus [H. (Austrophthiracarus)]
radiatus (Cubabodes)
radiatus (Eutegaeus)
radiatus [C. (Klapperiches)]
radiatus (Pseudotocepheus)
radula (Eurhynchoribates)
rafaelius (Mexiceremus)
rafalskii [P. (Archiphthiracarus)] (=cognatus)
rafalskii [H. (Notophthiracarus)]
rafalskii (Berniniella) (=hauseri)
rafalskii (Brachioppia)
rafalskii (Hoplophorella)
rafalskii [H. (Kakophthiracarus)]
rafalskii (Oribotritia)
rafalskii [A. (Rafacarus)]
rafalskii [H. (Rhacaplacarus)]
rafalskii (Tyrphonothrus)
rafflesiae [O. (Acrotocepheus)]
rajskii (Brachioppiella)
rakhali (Scheloribates)
ramadani (Malaconothrus) sp. inq.
ramensis [T. (Cristonothrus)]
rameus [C. (Aokibelba)]
ramifera (Pulchroppia)
ramirezae [P. (Vepracarus)]
ramirezi [H. (Bornemiszaella)]
ramiseta (Ramuloppia)
ramisetosa (Congoppia)
ramosa (Brachioppiella)
ramosa [S. (Flagrosuctobelba)]
ramosa (Pseudobrachioppiella)
ramosa (Schalleria)
ramosus (Cepheus) sp. inq.
ramosus [S. (Plenoxylobates)]
ramosus (Teleioliodes)
ramosus (Trhypochthoniellus)
ramosus [P. (Vepracarus)]
ramsayi (Austrotritia)
ramsayi (Crotonia)
ramsayi (Lanceoppia)
ramsayi [H. (Notophthiracarus)]
ramulifera [M. (Furculoppia)] (=furcata)
ramulifera [R. (Insculptoppia)]
ramulosus (Ctenamerus)
rangifer (Arcoppia)
rangifera (Multioppia)
rangiroaensis (Hoplophorella)
rangiroaensis (Peloribates)
ranokaoensis (Sabacarus) (=corneri)
ranomafanensis [P. (Archiphthiracarus)]
rapaensis (Eupelops)
rapax [H. (Notophthiracarus)]
rapoporti (Poecilochthonius) (=spiciger)
rara (Ceratoppia)
rara (Metabelba)
rara [O. (Perspicuoppia)]
rarisetosa [F. (Mexicoppia)]
rarisetosus (Licnodamaeus)
rarisetosus [P. (Montizetes)]
rarituberculatus [B. (Lanibelba)]
rarus (Singabodes)
rasile (Acrotritia) (=sinensis)
rasilis [G. (Erogalumna)]
rastelligera (Rastellobata)
rastratus [C. (Xiphobates)]
rattura [L. (Lancelamoppia)]
ratubakensis (Peloribates)
raulti (Paralycus)
rauschenensis (Phauloppia)
rausensis (Trichoribates)
ravenala [L. (Lancelalmoppia)]
raveni (Crotonia)
ravidus [H. (Notophthiracarus)]
rawisensis (Dolicheremaeus)
raychaudhurii (Hoplophorella) (=vitrina)
razdolnicus (Euphthiracarus)
recasensis (Damaeus)
recenfesevpi (Aleurodamaeus)
recta (Beckiella)
recta (Oribotritia)
recta (Pilogalumna) tenuiclava
rectangularis [C. (Cyrtozetes)]
rectisetosus [P. (Archiphthiracarus)] (=montanus)

rectosetosus (Hypochthonius) (=luteus)
rectus (Euphthiracarus)
rectus (Hemileius)
rectus (Hoplophthiracarus)
rectus (Podoribates)
rectus (Scheloribates) praeincisus
rectus (Tyrphonothrus)
recursa (Mesotritia)
redempta (Ceratozetella)
reducta [P. (Ermilovia)]
reducta (Hoplophorella) (=repetita)
reducta (Leptogalumna)
reducta (Oribatella)
reducta [G. (Porogalumnella)]
reducta (Teratoppia)
reductus [L. (Afroliochthonius)]
reductus (Benoibates)
reductus (Birobates)
reductus [H. (Notophthiracarus)] (=parareductus)
reductus (Ozacarus)
reductus (Papillocepheus)
reductus (Phthiracarus)
reductus [H. (Platynothrus)]
reductus [H. (Steganacarellus)]
reductus (Vilhenabates)
redux (Achipteria) (=coleoptrata)
reevesi (Ceratozetella)
reevesi (Eueremaeus) (=columbianus)
reevesi [B. (Lanibelba)]
reevesi [G. (Naiazetes)]
refracta (Acrotritia) (=divida)
regalis (Achipteria) sp. inq.
regalis (Hoplophorella) (=singularis)
regalis (Lohmannia)
regalis [T. (Teratoppiella)]
regeli (Liacarus) (=matshabelii)
regia (Suctobelba)
rehmabia (Lepidacarus) ornatissimus
reiterata (Galumna) (=coreana)
reiteratus [S. (Perscheloribates)]
reiteratus [H. (Protophthiracarus)] (=neonominatus)
relictus [A. (Rafacarus)]
remigera (Hoplophorella)
remigera (Malacoangelia)
remota (Apoplophora) (=pantotrema)
remota (Cubachipteria)
remota [R. (Insculptoppia)]
remota (Lasiobelba)
remota (Pergalumna)
remotus [H. (Notophthiracarus)]
remotus (Torpacarus)
remyi (Ramusella)
reniformis [O. (Acrotocepheus)]
reniformis (Pergalumna)
renukae (Dolicheremaeus)
renukae (Eremulus)
repetita (Hoplophorella)
repetita (Oribatula)
repetitivus (Scheloribates)
repetitus [H. (Austrophthiracarus)] (=largus)
repetitus (Dolicheremaeus)
repetitus (Hoplophthiracarus)
repetitus (Peloribates)
repetitus (Scheloribates)
repetitus [M. (Trimalaconothrus)]
replazamentica (Hydrozetes) sp. inq.
repostus [H. (Notophthiracarus)]
restata (Cycloppia)
restrictus [P. (Metaphthiracarus)] (=brevisetae)
retalata (Pergalumna) nervosa
retalteca (Indotritia) sp. inq.
retanai (Protobelba)
retestriatus (Scapheremaeus)
rethejumi (Mystroppia)
retiaria (Basilobelba)
reticularis [H. (Rhacaplacarus)]
reticulata (Acrotritia)
reticulata (Anakingia)
reticulata (Brassiella) (=neonominata)
reticulata [C. (Caucasiobelba)]
reticulata (Crotonia)
reticulata (Dudichoplophora)
reticulata [G. (Erogalumna)]
reticulata (Hermanniella)
reticulata [H. (Heterohermannia)]
reticulata (Hoplophorella)
reticulata (Jacotella)
reticulata (Lohmannia)
reticulata (Lucoppia) (=feideri)
reticulata (Magyaria)
reticulata (Oribatella)
reticulata (Pedrocortesella)
reticulata (Reticuloppia)
reticulata [H. (Rhacaplacarus)]
reticulata (Sternoppia)
reticulata (Suctobelba)
reticulata (Synichotritia)
reticulata [T. (Teratoppiella)]
reticulata [S. (Ussuribata)] Ham., 82
reticulata [S. (Ussuribata)] Chin., 03 *(=chinonei)*
reticulata (Zetorchella)
reticulatoides (Oribatella)
reticulatoides (Suctobelbella)
reticulatus (Adelphacarus)
reticulatus (Alismobates)
reticulatus (Allonothrus) russeolus
reticulatus (Arthrodamaeus)
reticulatus (Bipassalozetes)
reticulatus (Bulleremaeus)
reticulatus (Carabodes)
reticulatus [A. (Coropoculia)]
reticulatus (Cosmochthonius)
reticulatus (Diapterobates)
reticulatus (Eremaeozetes)
reticulatus (Eupelops)
reticulatus (Euphthiracarus) Berl., 1913
reticulatus (Euphthiracarus) Niedb., 2004 *(=arilloi)*
reticulatus (Heptacarus)
reticulatus (Hymenozetes)
reticulatus [M. (Inigozetes)]
reticulatus (Lamellobates)
reticulatus (Liacarus)
reticulatus [E. (Licnocepheus)]
reticulatus [C. (Magoebazetes)]
reticulatus (Microtegeus)
reticulatus (Nesiacarus)
reticulatus (Nothrus)
reticulatus (Ommatocepheus)
reticulatus (Peloptulus)
reticulatus (Peloribates)
reticulatus (Pheroliodes)
reticulatus (Reticulocepheus)
reticulatus (Scapheremaeus)
reticulatus (Scheloribates)
reticulatus (Torpacarus)
reticulatus (Trhypochthoniellus)
reticulatus [M. (Trimalaconothrus)] Bal., 58 *sp. inq.*
reticulatus [M. (Trimalaconothrus)] Yam.,77 *(=repetitus)*
reticulatus (Unguizetes)
reticulatus (Zetorchestes)
reticulofemorata (Beckiella)
retilia (Ceratoppia)
retinervius (Papillacarus)
retractus (Caleremaeus)
retrorsus [H. (Phthirarica)]
retroversa (Pergalumna) intermedia
retusa (Indotritia)
reunionensis (Nothrus)
reyesi (Dolicheremaeus)
rhachis [H. (Notophthiracarus)]
rhadamanthus (Gehypochthonius)
rhamphosus (Eupterotegaeus)

rhinina [R. (Rectoppia)]
rhinoceros [G. (Kabylogalumna)]
rhodopeia [M. (Neobelba)]
rhomboides [P. (Triaunguis)]
rhopalota (Acrotritia)
ribagai (Eulohmannia)
richmondensis (Pseudotocepheus)
ricknuttalli [B. (Gressittoppia)]
ridiculus [H. (Phthirarica)]
riezuae (Acrotritia) (=curticephala)
rigida [L. (Antennoppia)] sp. inq.
rigida (Hermanniella) subnigra
rigidicoma (Peloribates)
rigidiseta (Lanceoppia)
rigidisetosus (Liochthonius)
rigidisetosus (Scheloribates)
rigidisetus (Eremulus)
rigidus [P. (Triaunguis)]
rileyi (Mycobates) sp. inq.
rimachensis (Rostrozetes)
rima (Pergalumna)
rimandoi (Dolicheremaeus)
rimi [H. (Notophthiracarus)]
rimosa [P. (Bigalumna)]
rimosus (Austrocarabodes)
rimosus (Austrodamaeus) (=elegantulus)
rimosus (Carabodes)
rimosus (Eremulus)
rimosus (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
rimosus (Neoribates)
rimosus (Suctotegeus)
ringueleti (Hydrozetes)
ringwoodensis (Dentachipteria)
rioensis (Protoribates)
rioyuyapichisensis [R. (Rhynchoribatodes)]
riparius (Damaeus)
riparius (Thalassozetes)
ritza [Q. (Coronoquadroppia)] (=media)
riyadhiensis (Scheloribates) sp. inq.
rizali (Kalayaan)
rjabinini (Pedrocortesella)
robertsi [H. (Steganacarellus)]
robinsoni (Eurhynchoribates)
robinsoni (Ghilarovus)
roblensis (Pheroliodes)
robusta (Arcoppia)
robusta (Austrotritia)
robusta (Berniniella)
robusta (Cosmohermannia)
robusta (Hermanniella)
robusta (Machuella) ventrisetosa
robusta (Oribatula) (=major)
robusta (Separatoppia)
robusta [O. (Zygoribatula)] (=similitricha)
robustia (Arcoppia)
robustior (Hoplophthiracarus) (=histricinus)
robustior [H. (Platynothrus)]
robustior (Protoribates) Ja., 37 (*X. oblongus r.*)
robustior (Protoribates) Ja., 37 (*X. capucinus r.*) *(=robustior)*
robustus [M. (Archegotocepheus)]
robustus [T. (Cristonothrus)]
robustus (Dolicheremaeus)
robustus (Eohypochthonius)
robustus [D. (Epidamaeus)] sp. inq.
robustus (Hemileius)
robustus (Holonothrus)
robustus (Liacarus) Ew., 18 *(=nitens)*
robustus (Liacarus) Mih., 54 *(=chroniosus)*
robustus (Nothrus) truncatus ssp. inq.
robustus [N. (Parakalumma)]
robustus (Peloribates)
robustus (Pheroliodes)
robustus [D. (Saltatrichus)]
robustus (Scheloribates) Plet., 63
robustus (Scheloribates) Mih., 69 *(=angustirostris)*
rodickae (Scapheremaeus)
rodriguezi (Protoribates)
rogersi (Eremaeozetes)
roguini (Eremaeozetes)
rohdendorfi (Metabelba)
rohri (Cosmozetes)
rohri [T. (Cristonothrus)] P. Bal., 97
rohri [T. (Cristonothrus] B. *et* P. Bal., 02 *(=rohri* P. Bal., 97*)*
rohri (Xenillus)
roigi [N. (Leptosuctobelba)]
roissi (Eueremaeus)
romandiolae [M. (Neobelba)]
romaniae [D. (Kunstidamaeus)] tecticola
romanicus [H. (Urubambates)]
romeroi (Hydroecocepheus)
romyi (Dolicheremaeus)
ropalus (Atropacarus) (=phyllophorus)
rosaeus (Basiceramerus)
rosarius (Arthrodamaeus)
rosauraruizae (Pilogalumna)
rossica (Belba)
rossica (Berniniella)
rossica (Galumna)
rossica (Oppiella) (=nova)
rossica (Oribatella)
rossicus (Aphelacarus) (=acarinus)
rossicus (Gymnodamaeus)
rossicus (Ovochthonius)
rossicus (Propelops)
rossicus [H. (Simkinia)] (?=ovalis)
rostralis (Archoplophora)
rostralis (Austronothrus)
rostralis (Diapterobates)
rostralis (Ghilarovizetes)
rostralis (Hypozetes)
rostrata (Camisia) (=segnis)
rostrata (Dometorina)
rostrata (Galumna) sp. inq.
rostrata (Galumnopsis)
rostrata (Heterobelba)
rostrata (Mesoplophora)
rostrata (Pilogalumna)
rostrata [G. (Rostrogalumna)] (=chrisengelbrechti)
rostrata [O. (Zygoribatula)] (=fusca)
rostratus (Acutozetes)
rostratus (Angullozetes)
rostratus (Eupterotegaeus)
rostratus (Fijibates)
rostratus (Mucronothrus) (=nasalis)
rostratus [S. (Perscheloribates)]
rostratus (Rhynchoribates)
rostratus (Sellnickochthonius)
rostratus (Sphaerozetes)
rostratus (Tubulozetes)
rostrodentatus (Scheloribates)
rostroincisa [D. (Cylindroppia)] cylindrica
rostrolamellatus (Humerobates)
rostropilosus [T. (Cristonothrus)]
rostropilosus (Fijibates) Sanyal, 88
rostropilosus (Fijibates) Sanyal *et al.*, 06 *(=sanyali)*
rostropilosus [I. (Mancoribates)]
rostropterus (Nesozetes)
rostroreticulata [H. (Interoppia)]
rostrorugosa (Apoplophora) (=pantotrema)
rostroserratus [(Z. (Protozetomimus)]
rostrotuberculatus (Diapterobates)
rostroundulatus [Z. (Protozetomimus)] (=acutirostris)
rothschildi (Crotonia)
rotoitiensis [H. (Notophthiracarus)]
rotoruensis (Compactozetes)
rotoruensis (Lopholiodes)
rotunda (Aokiella)
rotunda (Arcoppia)
rotunda (Ceratozetella)
rotunda (Exoribatula)
rotunda (Fortuynia)
rotunda (Neoamerioppia)

rotunda (Pergalumna)
rotunda [S. (Porokalumma)]
rotunda (Pseudopyroppia)
rotunda (Suctobelbella)
rotundata (Cultroribula) (=bicultrata)
rotundata (Oribatula) sp. inq.
rotundata (Tuberoppia) Gol., 70
rotundata (Tuberoppia) Gol., 74 *(=rotundata* Gol., 70)
rotundatus (Arcozetes)
rotundatus (Fuscozetes) sp. inq.
rotundatus (Lamellobates) (=molecula)
rotundatus [T. (Latilamellobates)] incisellus
rotundatus (Liacarus) sp. inq.
rotundatus (Pheroliodes)
rotundatus (Scheloribates)
rotundatus (Sellnickochthonius)
rotundiceps (Allogalumna)
rotundiclava (Scheloribates) (=interruptus)
rotundigranulatus (Gymnodamaeus)
rotundirostrum [I. (Haplozetes)]
rotundocuspidatus (Diapterobates)
rotundicuspidatus (Trichoribates)
rotundus (Alismobates)
rotundus [H. (Austrophthiracarus)]
rotundus (Hammerabates)
rotundus (Hoplophthiracarus)
rotundus (Neoribates)
rotundus (Phthiracarus) Ew., 08 *(=globosus)*
rotundus (Phthiracarus) Berl., 23 *(=lentulus)*
rotundus (Protoribates)
rotundus (Steganacarus) (=magnus)
rotundus (Trichoribates)
rotundus [E. (Trischeloribates)]
roubali (Neoribates)
roubali (Phthiracarus) (=laevigatus)
royi [M. (Calyptozetes)]
royi [G. (Stenoppia)]
royi (Topalia)
roynortoni (Chamobates)
roynortoni [P. (Peloribatodes)]
roynortoni (Pterochthonius)
roynortoni (Pulchroppia)
rubeni (Epimerella)
rubens (Fuscozetes) (?=intermedius)
ruber (Diapterobates) (=humeralis)
rubescens (Meristacarus)
rubida (Lasiobelba)
rubra (Epilohmannia)
rubra [H. (Phyllhermannia)]
rubripedes (Dolicheremaeus)
rubrus (Humerobates) (?=rostrolamellatus)
ruchljadevi [O. (Zygoribatula)]
rudentiger (Dentizetes)
rudentiger (Macrogena)
rudentigera (Amerioppia)
ruderalis (Passalozetes)
rudrasagarensis (Berlesezetes)
rufafulvus (Protoribates) sp. inq.
rufulus (Hypochthonius)
ruga [K. (Niosuctobelba)]
rugata [A. (Acrogalumna)]
rugiceps (Scheloribates)
rugifrons [P. (Neopilizetes)] sp. inq.
rugifrons [O. (Zygoribatula)] (=exarata)
ruginervis (Galumnopsis)
rugosa (Arcoppia)
rugosa (Autogneta) (=parva)
rugosa [L. (Baioppia)]
rugosa (Epilohmannia) minuta
rugosa (Galumna)
rugosa (Galumnella)
rugosa (Gustavia) sp. inq.
rugosa (Hermannia) (=convexa)
rugosa [G. (Indogalumna)] (=sanctaehelenae)
rugosa (Senectoppia) Aoki, 76
rugosa (Senectoppia) Ham., 79 *(=multisulcatum)*
rugosa (Serratobelba)
rugosa (Zetorchella)
rugosa [O. (Zygoribatula)] (=exarata)
rugosala (Pergalumna) sp. inq.
rugosior (Carabodes)
rugosula (Galumnella)
rugosula (Oribatella)
rugosus (Austrocarabodes)
rugosus (Benoibates)
rugosus (Bipassalozetes)
rugosus (Gibbicepheus)
rugosus (Haplacarus)
rugosus (Limnozetes)
rugosus (Microtegeus)
rugosus (Microzetes)
rugosus (Neoliodes)
rugosus (Paulianacarus)
rugosus (Scheloribates)
rugosus (Scutovertex) (=sculptus)
rugosus (Truncozetes)
rugulosa (Camisia) (=horrida)
rugulosus (Paulianacarus)
ruizi [C. (Nanochthonius)]
rumbleseatus (Odontocepheus)
runcifer (Masthermannia)
runcinata (Camisia) (=horrida)
runcinata (Oribatula)
ruseki (Hermannobates)
ruseki (Hoplophorella)
rusfareastensis [A. (Parabelbella)]
russeolus (Allonothrus)
russiae (Dolicheremaeus)
rustenburgensis [S. (Perscheloribates)]
rustenburgensis (Scapheremaeus)
rustica (Acrotritia)
rusticus (Pheroliodes)
ruttneri (Trhypochthonius)
ruwenzorii (Mesotritia)
ruzsinszkyi [S. (Flagrosuctobelba)]
rwandensis (Congocepheus)
ryabinini [L. (Lagenobates)]
rybalovi [H. (Rhacaplacarus)]
ryszardi (Crotonia) (=ovata)
ryukyuensis (Mochlozetes)
ryukyuensis (Oribotritia) (=chichijimensis)
ryukyuensis (Peloribates)
saakadzei (Phauloppia) (=lucorum)
sabahensis (Arcoppia) bidentata Mah., 87
sabahensis (Arcoppia) Mah., 88 *(=aequivoca)*
sabahensis [N. (Leptosuctobelba)]
sabahensis (Nanhermannia)
sabahna (Austroceratoppia)
sabahna (Galumna)
sabahna (Hoplophorella)
sabahnus [U. (Calugarella)]
sabahnus (Dolicheremaeus)
sabahnus (Microtegeus)
sabinae (Eremaeozetes)
sabitai (Pergalumna)
saboorii [L. (Aegyptogalumna)] (=mastigophora)
saboorii (Amerobelba)
sabulosa [O. (Zygoribatula)]
sabulosus [B. (Passalobates)]
sacchareus (Tegeocranellus)
saccharomycetoides (Epieremulus) (=geometricus)
saccularis (Sacculogalumna)
sacculatus (Licnodamaeolus)
sacculifera (Oripoda)
sacculifera [A. (Weigmanniella)]
sacculiferus [P.(Sacculoptulus)]
sacculiferus [S. (Tropacarus)] (=grandjeani)
sacculipunctatus (Scheloribates)
sacculus [M. (Trimalaconothrus)]
sacsahuamanensis (Scheloribates)
sacyae (Hoplophorella)
sadbinia [O. (Dzarogneta)]

sadoensis (Nothrus)
saetosa (Suctobelba) (=granulata)
saeva (Orthogalumna)
sagami (Goyoppia)
sagatus (Reptacarus)
sagitta (Galumnopsis)
sagitta [M. (Sagittabodes)]
sagittatus (Flagellocepheus)
sahariensis (Aphelacarus) acarinus
sahariensis (Masthermannia)
sahariensis [R. (Rectoppia)] fasciata
saifulmalukensis (Liebstadia)
sajisei (Eurostocepheus)
sakamorii (Phauloppia)
sakaryaensis (Corynoppia) andulau
sakeni (Berniniella) (=sigma)
sakhalinensis (Lasiobelba)
salamoni (Xenillus)
salasi [H. (Bornemiszaella)]
salebrosus [H. (Notophthiracarus)]
salebrosus (Scheloribates)
salicifolius (Eohypochthonius)
salicinus (Caveremulus)
salicis (Neoribates)
salina [O. (Zygoribatula)]
salish (Eremaeus)
saljanica (Oribatula) (=amblyptera)
salmani [R. (Insculptoppia)]
salmanticensis (Hypogeoppia) terricola
salonae (Foraminoppia)
saltaensis (Fosseremus) (=laciniatus)
saltaensis (Liochthonius)
saltaensis (Mochlozetes)
saltator (Zetorchestes)
saltuensis (Gymnodamaeus) sp. inq.
salvadordalii (Aleurodamaeus)
salvadoriensis [N. (Ameriglobopia)]
samadi (Oppia) sp. inq.
samaina (Rhinoppia)
samarensis (Dolicheremaeus)
samarensis (Indoribates)
samarensis (Microzetes)
samarensis [E. (Neoepilohmannoides)]
samarensis (Nothrolohmannia)
samarensis [E. (Orinchobates)]
samarensis [H. (Phyllhermannia)]
samarensis (Sacculogalumna)
samarensis [H. (Steganacarellus)]
samarus [O. (Acrotocepheus)]
sambhui (Arcoppia)
samirani (Scheloribates)
samiyai [R. (Insculptoppia)]
samoaensis (Galumna)
samoaensis (Nesopelops)
samoaensis (Oribotritia)
samoensis [C. (Klapperiches)]
samsinaki (Euscheloribates)
samueli (Rogerzetes)
sanctaehelenae [G. (Indogalumna)]
sanctaeluciae (Haplochthonius)
sanctaemariae (Melanozetes) azoricus
sanctipauli (Euphthiracarus) (=dlouhyorum)
sanctipauli (Xenillus)
sandori [F. (Cosmogalumna)]
sandormahunkai (Galumna)
sandvicensis (Scheloribates) (=interruptus)
sangumburiensis [P. (Archiphthiracarus)]
sangumburiensis [P. (Triaunguis)]
sanjiangensis [S. (Flagrosuctobelba)]
sanpabloensis (Dometorina)
sanqingi [F. (Cosmogalumna)]
sanremensis (Lucoppia) (=burrowsi)
sanukiensis (Eobrachychthonius)
sanukiensis (Ghilarovus)
sanvicensis [P. (Archiphthiracarus)]
sanyali (Fijibates)
saraburiensis (Austrotritia)
sarahae (Phthiracarus)
sarawak (Sabahtritia)
sarawaki (Apoplophora)
sarawaki (Hoplophorella)
sarawaki [E. (Pocsia)]
sarbias [P. (Millotacarus)]
sardoa (Oribatella)
sardoa (Oribatula) (=tibialis)
sarekensis [M. (Calyptozetes)]
sarekensis (Suctobelbella) acutidens
sarekensis (Tectocepheus) velatus
sarkarae [T. (Cristonothrus)]
sarkarae [P. (Millotacarus)] (=sarbias)
sarvari (Belba)
sasakawai (Belba)
saskai [O. (Oxyoppiella)]
saskai (Pilizetes)
sassafrasensis [H. (Notophthiracarus)]
saswatii (Scheloribates)
satanicus (Selenoribates)
satellitius (Galumna) (=alata)
satsumaensis (Allosuctobelba) tricuspidata
satsumaensis (Tectocepheus)
saucius [H. (Notophthiracarus)]
saudicus (Hypozetes) translamellatus
saudicus (Scheloribates)
saudiensis (Scheloribates) sp. inq.
sauli [H. (Phyllhermannia)]
sausai (Sadocepheus)
savagei [C. (Triachipteria)]
saviah [D. (Epidamaeus)]
saxea (Schusteria)
saxicola (Dometorina) plantivaga
saxicola (Ethiovertex)
saxicola (Ghilarovus)
saxicola (Oribatula) (=major)
saxicola (Phauloppia)
saxicola (Scheloribates)
saxosus [T. (Tyrphonothrus)]
sayedi [O. (Zygoribatula)] (=connexa)
scaber (Camisia) (?=biverrucata)
scaber (Carabodes)
scaber (Galumna)
scaber (Stictozetes)
scabra [H. (Heterohermannia)]
scalaris (Liochthonius) (=sellnicki)
scalifera [O. (Oxyoppiella)]
scaliger (Platyliodes)
scalpellata (Suctobelba)
scapellata (Hoplophorella) (=vitrina)
scapulatus (Mysterozetes)
schachtachtinskoi [H. (Urubambates)]
schalleri (Acaroceras)
schalleri (Rostrozetella)
schatzi (Eremaeozetes)
schatzi (Galapagacarus)
schatzi (Hoplophorella)
schatzi [C. (Klapperiches)]
schatzi (Ocesobates)
schatzi [C. (Phyllocarabodes)] (=pbaloghi)
schatzi (Scapheremaeus)
schatzi (Torpacarus)
schatzi (Zachvatkinibates)
schauenbergi [P. (Archiphthiracarus)] (=crispus)
schauenbergi (Austrocarabodes)
schauenbergi (Cryptacarus)
schauenbergi (Hoplophorella) (=hamata)
schauenbergi (Multipulchroppia)
schauenbergi (Neoppia)
schauenbergi (Pilobatella)
schauenbergi (Scheloribates)
schauenbergi [O. (Zygoribatula)]
schawalleri (Vilhenabates)
scheloribatoides (Topobates)
schizocoma [H. (Notophthiracarus)]

schneideri (Ameronothrus)
schneideri (Phauloppia) (=lucorum)
scholzi (Passalozetes)
schoutedeni [L. (Paralamellobates)] (=misella)
schubarti (Ameronothrus)
schubarti (Plasmobates)
schuetzi (Chamobates)
schuilingi (Allonothrus)
schusteri (Ameronothrus)
schusteri [P. (Archiphthiracarus)]
schusteri (Autogneta)
schusteri [L. (Convergoppia)]
schusteri (Epilohmannia)
schusteri [H. (Heterohermannia)]
schusteri (Microtritia)
schusteri (Nesiacarus)
schusteri (Oribotritia)
schusteri (Staurobates)
schusteri [H. (Notophthiracarus)]
schusteri (Zetorchestes)
schwartzi (Austrocarabodes)
schweizeri (Lanceoppia)
schweizeri (Liacarus) Forss., 63 *(=major)*
schweizeri (Liacarus) Wooll., 68 *(=major)*
schweizeri (Steganacarus) (=vernaculus)
schwendingeri (Mahunkaia)
scilierensis (Trichoribates)
scimitarum (Tyrphonothrus)
scissurata (Oripoda)
scitus [P. (Archiphthiracarus)]
sclerotrichus (Trhypochthonius) sp. inq.
scoparius (Hermannobates)
scopolii [H. (Austrophthiracarus)]
scopulae [C. (Flexa)]
scopulus (Neoxenillus)
scotiae (Halozetes) sp. inq.
scotiae [M. (Pravoppia)]
scotti (Acrotritia)
scotti (Nothrus) (=seychellensis)
scripta (Galumna)
scriptus [M. (Megazetes)]
scrobinus [H. (Tuberemaeus)]
scrofa (Suctobelbella)
scrupeus (Hoplophthiracarus)
sculperens (Ethiovertex)
sculpta (Belba)
sculpta (Lasiobelba)
sculptilis (Oppiella) (=nova)
sculptilis [A. (Rafacarus)]
sculptilis [H. (Rhacaplacarus)]
sculptrata (Hexachaetoniella)
sculptrus (Xenillus)
sculpturata (Aeroppia)
sculpturata (Condylobelba)
sculpturata (Dometorina)
sculpturata (Epilohmannia)
sculpturata (Oribatella)
sculpturata [H. (Phyllhermannia)]
sculpturata (Pulchroppia)
sculpturata [O. (Zygoribatula)]
sculpturatus (Fosseremus) (=laciniatus)
sculpturatus [H. (Tuberemaeus)]
sculptus (Adrodamaeus) (=hispanicus)
sculptus (Eupelops) sp. inq.
sculptus (Scutovertex)
sculptus (Tritegeus)
sculptus (Tyrphonothrus)
scutata (Berlesiella)
scutata (Suctobelbila)
scutatus (Malaconothrus)
scutatus (Plakoribates)
scutatus (Tyrphonothrus) sp. inq.
scuticus (Euphthiracarus)
scuticus [H. (Notophthiracarus)]
scutigera (Lyroppia)
scymus (Carabodes) (=labyrinthicus)
scytheae (Lanceoppia)
secata (Wallworkoppia)
seconda (Terratritia)
secta (Suctobelba)
sectus (Microzetorchestes) (=emeryi)
secunda (Galumnopsis)
secundus [A. (Baloghodes)]
secundus [E. (Pocsia)]
sedecima [H. (Mantigueracarus)]
sedlaceki (Rhynchoppia)
seemani (Crotonia)
segestris (Neoliodes)
seghetti (Scheloribates) (=callipus)
segmella (Subiasella)
segmentatus (Arthrovertex)
segnis (Camisia)
segnoides (Camisia) (=segnis)
sejugata (Zetorchella)
sejugatus (Annectacarus)
sejunctus (Liacarus) (=koeszegiensis)
selgae (Damaeus)
selgae (Punctoribates)
selgae (Xenillus)
sellnicki (Achipteria)
sellnicki (Adelphacarus)
sellnicki [H. (Austrophthiracarus)]
sellnicki (Beckiella)
sellnicki (Ceratozetella)
sellnicki [L. (Convergoppia)]
sellnicki (Galumnopsis)
sellnicki (Indotritia) (=krakatauensis)
sellnicki (Liochthonius)
sellnicki (Maerkelotritia) (=kishidai)
sellnicki (Melanozetes)
sellnicki (Mystroppia)
sellnicki (Nanhermannia)
sellnicki (Phthiracarus) (=ferrugineus)
sellnicki (Pilizetes)
sellnicki (Punctoribates)
sellnicki (Tokukobelba)
semengok [C. (Klapperiches)]
semiaciculata [H. (Rhacaplacarus)]
semiareolatus (Cosmochthonius)
semiareolatus (Licneremaeus)
semibarbulata (Lohmannia)
semicapillatus (Dolicheremaeus)
semicirculata [O. (Zygoribatula)]
semiconvexus (Scapheremaeus)
semicostulata (Arcoppia)
semidentata (Suctobelbella) (=subcornigera)
semidesertus (Scheloribates)
semifoveolatus (Cosmochthonius)
semilunatus (Austrocarabodes)
semilunatus (Dolicheremaeus)
seminervosa (Pergalumna)
seminuda (Oppia)
seminuda (Trichogalumna)
seminudus [P. (Triaunguis)]
seminulum (Euzetes) (?=globulus)
semiornatus (Scapheremaeus)
semiornatus (Sellnickochthonius) (=immaculatus)
semiplumosa [S. (Flagrosuctobelba)]
semireticulata (Pedrocortesella)
semirufus (Minunthozetes)
semirugosa (Zetorchella)
semistriata (Pergalumna)
semota (Mesotritia)
semovitusi (Trhypochthonius)
senecionis [N. (Ameriglobopppia)]
senegalensis (Nothrus)
senegalensis [T. (Paragloboppia)]
senensis (Amiracarus)
senex (Atropacarus) (=striculus)
sengbuschi (Ramusella)
seniczakae [R. (Insculptoppia)]
seniczaki (Neogalumna)

seniczaki [M. (Trimalaconothrus)]
sensiclavata [R. (Insculptoppia)] sp. inq.
sensifus [H. (Notophthiracarus)]
sensilla [B. (Gressittoppia)]
sensillinuda [S. (Flagrosuctobelba)]
sentus [H. (Notophthiracarus)]
separata [S. (Ussuribata)]
separatum (Nothrus)
sepilok (Dampfiella)
septatus (Nothrus)
septemtuberculatus (Pseudotocepheus) (=amonstruosus)
septenia (Parisuctobelba)
septentrionalis [H. (Capillonothrus)] (=capillatus)
septentrionalis (Eupelops)
septentrionalis (Hermanniella)
septentrionalis (Indrotritia) (=krakatauensis)
septentrionalis [S. (Lalmoppia)]
septentrionalis (Microzetes)
septentrionalis (Trhypochthonius) silvestris
sequoiae (Galumna)
serangos (Euphthiracarus)
serapi (Austroceratoppia)
sergienkoae [T. (Latilamellobates)]
sergienkoae (Scheloribates)
sergienkoae [C. (Xiphobates)]
seropedica (Masthermannia)
seropedicalensis (Nothrus)
serrata (Achipteria)
serrata (Allosuctobelba)
serrata (Apoplophora)
serrata (Ctenobelba)
serrata (Epilohmannia)
serrata (Hermanniella)
serrata (Lohmannia)
serrata (Machadobelba)
serrata (Mesotritia)
serrata (Metrioppia)
serrata (Oribatella)
serrata (Oribotritia)
serrata [H. (Phyllhermannia)]
serrata (Serratoppia)
serratirostris (Berniniella)
serratirostrum (Suctobelbella)
serratomarginata (Liebstadia) (=similis)
serratoseta (Peloribates)
serratus (Atropacarus)
serratus (Caveremulus)
serratus (Eremulus)
serratus (Eurhynchoribates)
serratus [P. (Montizetes)] (=bayartogtokhi)
serratus [H. (Notophthiracarus)]
serratus (Pantelozetes)
serratus (Sadocepheus)
serratus (Scutovertex)
serratus (Tansocepheus)
serratus (Tricheremaeus)
serratus (Trichoribates)
serrifrons (Pyroppia)
serrula [P. (Archiphthiracarus)] (=pygmaeus)
serrula [O. (Monoribatella)]
serrula (Oribotritia)
serrulata (Arcoppia)
serrulatus (Phthiracarus)
servadeii (Belba) sp. inq.
sestai (Microzetes)
setacea (Hermanniella) (=subnigra)
setantis (Trhypochthonius)
setanus [P. (Metaphthiracarus)]
setata (Gymnodampia)
setiformis [A. (Acrogalumna)] (=longipluma)
setiformis [H. (Calyptophthiracarus)]
setiformis (Conoppia)
setiformis [H. (Phyllhermannia)]
setiger (Eremaeus) (=cordiformis)
setiger (Neoribates)
setiger [S. (Perscheloribates)]
setiger (Pseudotocepheus)
setiger (Sadocepheus) undulatus
setiger [D. (Spatiodamaeus)]
setiger (Sphaerozetes)
setiger (Stomacarus)
setiger (Unguizetes)
setiger (Xenillus)
setigera (Galumna)
setigera (Heteroppia)
setilonga (Berniniella)
setoensis (Epilohmannoides)
setosa (Banksinoma)
setosa (Dampfiella)
setosa [S. (Flagrosuctobelba)]
setosa (Hexachaetoniella)
setosa [G. (Porogalumnella)]
setosa (Xiphobelba)
setosa [O. (Zygoribatula)]
setosellus (Phthiracarus) (=longulus)
setosoclavata [S. (Flagrosuctobelba)]
setosus (Aleurodamaeus)
setosus (Aleurodamaeus)
setosus (Ceratorchestes)
setosus (Epactozetes)
setosus (Fuscozetes)
setosus (Humerobates)
setosus (Megalotocepheus) japonicus
setosus [P. (Metaphthiracarus)]
setosus [Z. (Protozetomimus)]
setosus (Topobates)
setosus (Trhypochthoniellus) longisetus
setosus (Xenillus)
setoumi (Malaconothrus)
setulosa [A. (Izuachipteria)]
setulosa [M. (Parplophora)]
setus (Eobrachychthonius)
sexareata (Pergalumna) (=myrmophila)
sexclavatus (Rostrozetes) sp. inq.
sexcornuta (Schalleria)
sexdentata [O. (Monoribatella)]
sexdentata (Suctobelbella) sp. inq.
sexdentatus (Pseudotocepheus) sp. inq.
sexidimorphus [L. (Longocepheus)]
sexmaculata (Multioppia) (?=laniseta)
sexnodosa (Suctobelbila)
sexnotatus (Eobrachychthonius) (=latior)
sexparus [E. (Neoepilohmannoides)]
sexpilosa (Ceratoppia)
sexpilosa (Goyoppia)
sexpilosa (Hexachaetoniella)
sexpilosus [G. (Neocarabodes)]
sexsetosa (Pseudoceratoppia)
sexsetosa [S. (Ussuribata)]
sextiana (Acrotritia) (=curticephala)
seychellensis (Dolicheremaeus)
seychellensis (Nothrus)
seychellensis (Ramsayellus)
seychelli (Allonothrus) schuilingi
seydi (Lanceoppia)
sezeki [Q. (Coronoquadroppia)]
sgardelisi [C. (Triachipteria)]
shagdarsureni (Eupelops)
shaldybinae (Ceratozetella)
shaldybinae [R. (Insculptoppia)] (=insculpta)
shaldybinae (Oribatella)
shaldybinae [P. (Triaunguis)]
shaldybinae (Zachvatkinibates)
shapensis (Nothrus)
sharipovi (Moritzoppia) escotata
sharjah [O. (Zygoribatula)]
shauni (Pseudotocepheus)
shealsi (Austrotritia) (=saraburiensis)
shealsi (Belloppia)
shealsi [H. (Notophthiracarus)]
shekarii (Tectoribates)
sheshanensis [R. (Insculptoppia)]

shibai (Fortuynia) elamellata
shibai (Rostrozetes)
shigeruus (Scheloribates)
shikoku (Oribotritia)
shikongensis [H. (Phyllhermannia)]
shillongensis (Eremobelba)
shimanoi (Hermannia)
shimojanai (Thalassozetes)
shinanoensis (Multioppia)
shipitsyni [L. (Dorycranosus)]
shiptoni [P. (Neophthiracarus)]
shiraensis [S. (Perscheloribates)]
shirakamiensis (Phthiracarus) (=persimplex)
shirakamiensis (Caenosamerus)
shirakamiensis (Protoribates)
shirakamiensis (Tectocepheus)
shiranensis [C. (Cyrtozetes)]
shironeseta (Suctobelbella)
shogranensis [A. (Acrogalumna)]
shogranensis (Coartobelba)
shogranensis (Euphthiracarus)
shogranensis (Sphaerozetes)
shqipetarica (Dissorhina)
shtanchaevae (Anachipteria)
shtanchaevae (Epilohmannia)
shtanchaevae (Machadobelba)
shukuminensis (Cultroribula)
shvanderovi (Protoribates)
siamensis (Dolicheremaeus)
siamensis (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
siamensis (Multipulchroppia)
siamensis (Rhabdoribates)
sibirica [C. (Ensicamisia)]
sibirica (Pyroppia)
sibirica [C. (Triachipteria)]
sibiricus (Neoribates)
sibiricus [H. (Platynothrus)] Sitn., 75
sibiricus [H. (Platynothrus)] Kriv., 84 *(=krivolutskyi)*
sibiricus (Punctoribates)
sicafer (Sicaxylobates)
sicarius (Pheroliodes)
sicata (Dometorina)
sicca (Galumna) (=setigera)
siccatus (Diapterobates) (=rotundocuspidatus)
sichuanensis (Gymnodampia)
sichuanensis (Phthiracarus)
sichuanensis [P. (Triaunguis)]
sicilicoma [H. (Notophthiracarus)]
sicilifera [S. (Flagrosuctobelba)]
sicula [P. (Siciliophora)]
sicula [D. (Siculobata)]
siculus (Adrodamaeus)
siculus (Eupelops) (=plicatus)
siculus (Scutovertex) (=minutus)
siculus (Siciliotrichus)
sidorchukae (Anderemaeus)
sidorchukae [H. (Calyptophthiracarus)]
sidorchukae (Dentachipteria)
sidorchukae (Galumnella)
sidorchukae (Pergalumna)
sidorchukae [H. (Rhacaplacarus)]
sidorchukae [H. (Steganacarellus)]
sidorchukae (Trichoribates)
siefi (Loftacarus)
sierramadrensis (Peloribates)
sierriensis (Euphthiracarus) (=tanythrix)
sigifurcatus [H. (Notophthiracarus)]
sigma (Berniniella)
sigmolamellatus (Eremulus)
signata (Anachipteria)
signata (Dissorhina)
signatus (Cosmochthonius)
sikhotealinicus (Euphthiracarus)
sikhotealinus (Megeremaeus)
sikkimensis (Scheloribates)
silesius (Liebstadia) (=similis)
silva (Cymbaeremaeus)
silva [S. (Ussuribata)]
silvai (Beckiella)
silvanus [G. (Naiazetes)]
silvanus (Novonothrus)
silvatica (Berniniella)
silvatica (Parautogneta)
silvatica (Pergalumna)
silvatica [D. (Vesiculobates)]
silvaticus (Malaconothrus)
silvestris (Eueremaeus) oblongus
silvestris (Eupelops)
silvestris (Neoliodes)
silvestris (Nothrus)
silvestris (Pergalumna)
silvestris (Trhypochthonius)
silvicola (Drymobates)
silvicola (Limnozetes)
silvicola (Neoeutegaeus)
silvicola (Striatoppia)
silvicus (Nothrus)
silvosus (Carabodes)
similanensis (Temburongia)
simile (Acrotritia) (=rustica)
similesuperbula (Oribatella)
similidentata (Suctobelbella)
similifallax (Lauroppia)
similis (Acaroceras)
similis (Acrotritia)
similis (Amiracarus)
similis (Austrocarabodes)
similis [H. (Austrophthiracarus)] (=radiatus)
similis (Berniniella) (=bicarinata)
similis (Cepheus)
similis (Ceratozetella)
similis (Ceratozetes) (=neonominatus)
similis (Chavinia)
similis (Dampfiella)
similis (Eobrachychthonius)
similis (Eupelops)
similis (Galumna)
similis [G. (Gibbibodes)]
similis [M. (Hammeroppia)]
similis (Heminothrus)
similis (Hermanniella)
similis (Hoplophthiracarus)
similis [L. (Incabates)]
similis [C. (Klapperiches)]
similis (Liacarus) (=coracinus)
similis (Licneremaeus) (=novus)
similis (Liebstadia)
similis (Limnozetes)
similis (Liochthonius)
similis (Lohmannia)
similis (Lyroppia)
similis (Machadobelba)
similis (Malacoangelia)
similis (Mesoplophora)
similis (Mesotritia)
similis (Microtegeus)
similis (Moritzoppia) (=unicarinata)
similis (Multipulchroppia)
similis (Neoamerioppia)
similis (Neoribates)
similis [H. (Notophthiracarus)]
similis (Oribatella)
similis (Pareutegaeus)
similis [V. (Phalacrozetes)]
similis (Phthiracarus)
similis [H. (Phyllhermannia)]
similis (Schizozetes)
similis (Sellnickochthonius)
similis [D. (Spatiodamaeus)] (=verticillipes)
similis (Steganacarus)
similis (Striatoppia)
similis (Suctobelbella)

similis [M. (Trimalaconothrus)] sp. inq.
similis [H. (Tuberemaeus)]
similis (Unguizetes)
similis (Xenillus)
similitricha [O. (Zygoribatula)]
simillima [S. (Flagrosuctobelba)] (=semiplumosa)
similoides (Dampfiella)
simonettae (Steganacarus)
simplex (Afroleius)
simplex (Berniniella) (=inornata)
simplex (Charassobates)
simplex (Ctenobelba) sp. inq.
simplex (Cycloppia) (=restata)
simplex (Cyrthermannia)
simplex (Dolicheremaeus)
simplex (Eupelops) (=hirtus)
simplex [S. (Flagrosuctobelba)]
simplex (Fusuloppia) (=neonominata)
simplex (Globoppia) sp. inq.
simplex (Haplobelba)
simplex (Haplochthonius)
simplex (Liacarus) coracinus ssp. inq.
simplex (Liochthonius)
simplex (Lophotocepheus)
simplex (Machadobelba)
simplex (Microppia) (=minus)
simplex (Microtritia)
simplex (Nipponiella)
simplex [H. (Notophthiracarus)]
simplex (Protoribates) (=halleri)
simplex (Pseudotocepheus) (=amonstruosus)
simplex (Rhynchobelba)
simplex (Scapheremaeus)
simplex (Scheloribates) Ger., 1849 *sp. inq.*
simplex (Scheloribates) Stor., 1925 *(=multiiteratus)*
simplex (Suctobelba) (=chinonei)
simplex (Tyrphonothrus) (=glaber)
simplex (Vaghia)
simplex (Vilhenabates)
simplirostratus (Papillacarus)
simpliseta [G. (Kalloia)]
simpliseta [E. (Licnocepheus)]
simplisetosus (Cosmozetes)
simplisetosus (Paulianacarus)
simplisetus (Microzetes)
simplissima [S. (Lalmoppia)] sp. inq.
simplitricha (Multioppia)
simulator (Ceratozetes)
sinaraja (Truncopes)
sinarmatus (Afrotocepheus)
sinatus [V. (Phalacrozetes)]
sine (Scheloribates) (=angustirostris)
sinensis (Acrotritia)
sinensis (Arcoppia) fenestralis
sinensis (Fortuynia)
sinensis [P. (Neoperxylobates)]
sinensis (Nesiacarus)
sinensis (Pergalumna) obvia
sineornata (Gustavia)
singaporensis (Austrotritia)
singaporensis (Dolicheremaeus)
singaporensis (Microzetes)
singularis [M. (Archegotocepheus)]
singularis [F. (Cosmogalumna)]
singularis (Euphthiracarus)
singularis (Hoplophorella)
singularis (Lepidozetes)
singularis (Mahunkobates)
singularis (Metabelba)
singularis (Protoribates) (=capucinus)
singularis (Sacculoppia)
singularis (Suctobelbella)
singularis [H. (Tuberemaeus)]
singularis (Xenillus)
sinica (Banksinoma)
sinica (Mahunkana)
sinica [S. (Ussuribata)]
sinicus (Allonothrus)
siniloanensis (Philippotocepheus)
sinlimes (Perxylobates)
sinornata (Allogalumna)
sintranslamella (Oribatella)
sinuata (Camisia) (=horrida)
sinuata [S. (Flagrosuctobelba)]
sinuata [L. (Incabates)]
sinuofrons (Galumna)
sinuosociliatus (Austrocarabodes)
sinuosus [H. (Notophthiracarus)]
sinuosus (Scapheremaeus)
sisiri (Gibbicepheus)
sisiri (Zetorchella)
sistanbaluchestanica (Pergalumna)
sitnikovae [D. (Cylindroppia)] (=casuarina)
sitnikovae (Diapterobates)
sitnikovae (Ferolocella) (=cribraria)
sitnikovae (Fissicepheus)
sitnikovae (Membranoppia)
sitnikovae (Moritzoppia)
sitnikovae (Oribatula) (=interrupta)
skookumchucki (Quadroppia) (=quadricarinata)
skottsbergi [H. (Capillonothrus)]
skrjabini (Hololohmannia) sp. inq.
skrjabini [O. (Zygoribatula)]
slaveki (Umbellozetes)
slossonae (Fuscozetes) (=fuscipes)
sloupensis (Phauloppia) sp. inq.
smirnovi [D. (Epidamaeus)]
smirnovi (Epimerella)
smirnovi (Thamnacarus)
smirnovi [O. (Zygoribatula)] (=exarata)
smithersi (Megatrichobates)
smithi (Spineremaeus)
smiti (Fortuynia)
snowdonensis [C. (Triachipteria)]
socia [O. (Zygoribatula)] (=cognata)
socotrensis [O. (Zygoribatula)]
sol (Gustavia) (=microcephala)
sol (Helioppia)
sol (Steganacarus)
solhoeyi [C. (Ensicamisia)]
solhoeyi (Mesotritia)
solhoyorum (Limnozetes)
solifera (Interbelba)
solita [S. (Flagrosuctobelba)]
solitaria (Oribotritia)
solitarius [H. (Notophthiracarus)]
sollertia (Basilobelba) (=retiaria)
soloduchi [C. (Aokibelba)]
solomonensis (Apoplophora)
solomonensis [H. (Notophthiracarus)]
somalica (Pergalumna)
somalica [H. (Rhacaplacarus)]
somalicus (Eupelops)
songliensis (Diapterobates)
soniae (Hauseroplophora)
soonkii (Gymnodampia)
soosi [L. (Hamoppia)]
sordida (Camisia) (=spinifer)
sordidus (Austrocarabodes) sp. inq.
sordidus [H. (Notophthiracarus)]
soror (Allobelba)
soror (Eutegaeus)
soror [R. (Insculptoppia)]
soror [M. (Trimalaconothrus)] sp. inq.
sororia (Hoplophorella)
sorrentensis (Suctobelba)
sottoetgarciai (Zetorchella)
souchnaiensis (Protoribates)
southafricanensis (Eremulus)
southensis (Zealandozetes)
soyeri (Pirnodus)
spadix (Phthiracarus)

sparsa (Mesoplophora)
spasmenosi (Basilobelba)
spathulata (Epilohmannia)
spathulata [H. (Phyllhermannia)]
spathulatus (Austrocarabodes)
spathulatus (Ceratobates)
spathulatus (Cubabodes)
spathulatus (Oxyamerus)
spathulatus (Rhynchoribates)
spathulatus (Rogerzetes)
spathulatus [H. (Steganacarellus)]
spathulifer (Machadobelba)
spathuloides (Epilohmannia)
spatiosus (Caenosamerus)
spatulasetosus (Trichoribates)
spatulata (Hoplophorella) (=hamata)
spatulatus (Dolicheremaeus)
spatulatus (Otocepheus)
specifica (Neogalumna)
speciosa (Oppia)
speciosus (Dolicheremaeus) sp. inq.
speciosus (Hydrozetes) sp. inq.
spectabilis (Fissurobates)
spectabilis (Rhynchoribates)
spectabilis (Sphaerochthonius)
sphaerica (Ceratoppia)
sphaericus (Annobonzetes)
sphaericus (Liacarus) (=xylariae)
sphaericus (Punctoribates)
sphaeroclava [I. (Haplozetes)]
sphaerodendron (Sternoppia)
sphaeroides (Scheloribates)
sphaeroides (Topobates)
sphaeroideus (Austrocarabodes)
sphaerula (Austrocarabodes)
sphaerula (Taeniogalumna)
sphaerula (Unguizetes)
sphaerulus (Ellipsozetes)
sphaerulus (Phthiracarus) (=globosus)
sphagni (Galumna)
sphagni (Limnozetes) (=ciliatus)
sphagni [M. (Neobelba)]
sphagnicola [K. (Niosuctobelba)]
sphagnicola (Processoppia)
sphagnicola (Trhypochthonius) (=nigricans)
sphagnicola (Tyrphonothrus) (=maior)
sphagnicolus (Hydrozetes)
spherisensilla [O. (Zygoribatula)] exilis
spicata (Suctobelbata)
spiciger (Poelcilochthonius)
spiculatus (Ceratozetes)
spiculifer [Y. (Berndobodes)]
spiculifera (Acrotritia) (=sinensis)
spiculifera [O. (Oxyoppiella)] (=polynesia)
spiculigera [S. (Flagrosuctobelba)] sp. inq.
spilotus [X. (Stonyxenillus)]
spina (Joelia)
spina [H. (Rhacaplacarus)]
spinata [H. (Rhacaplacarus)]
spinatus (Eupterotegaeus)
spinatus (Neseutegaeus)
spindleformis (Cycloppia)
spindleformis (Eremulus)
spindleformis (Indotritia)
spindleformis (Neoribates)
spinifer (Camisia)
spinifer (Eremulus)
spinifera (Baloghia)
spinifera (Banksinoma)
spinifera [M. (Hammeroppia)]
spinifera [H. (Rhacaplacarus)]
spiniformis (Carabodes)
spiniformis (Hoplophthiracarus)
spiniformis [H. (Notophthiracarus)]
spiniformis (Peloribates)
spiniformis [H. (Steganacarellus)]
spiniger [H. (Kakophthiracarus)]
spiniger (Liacarus)
spiniger (Tectodamaeus)
spinipes (Ceratoppia) bipilis
spinipes (Ceratozetella) (?=maxima)
spinipes (Nosybelba)
spinipes (Physobates)
spinipes (Scutovertex) sp. inq.
spinipes (Tikizetes)
spiniseta (Hermanniella)
spinitecta (Heterobelba)
spinogenuala (Trichoribates)
spinosa (Achipteria) armata ssp. inq.
spinosa (Apoplophora)
spinosa (Gymnodampia)
spinosa (Mesotritia) (=maerkeli)
spinosa (Oribotritia)
spinosa (Oxyoppia)
spinosa (Phauloppia) (=lucorum)
spinosa (Porobelba)
spinosissima (Heterobelba)
spinosissima (Lucoppia) (=burrowsi)
spinosus (Carabodes) sp. inq.
spinosus (Cepheus)
spinosus (Cosmochthonius)
spinosus (Eremulus)
spinosus (Eupelops) (=acromios)
spinosus (Megeremaeus)
spinosus (Nasobates)
spinosus (Papillacarus)
spinosus (Seteremaeus)
spinosus (Steganacarus)
spinosus (Stylozetes)
spinosus (Tectocepheus) (=velatus)
spinosus (Trhypochthonius) tectorum
spinosus [P. (Triaunguis)]
spinosus [C. (Xiphobates)] (=rastratus)
spinosus (Zetomimus)
spinulosa (Peloptoribula)
spinulosa (Synichotritia)
spinulosus (Neotrichozetes)
spinus (Euphthiracarus)
spinus [H. (Kakophthiracarus)]
spinus [H. (Notophthiracarus)]
spirochaeta [S. (Ussuribata)]
spirofilus [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
spirulatus (Hemileius)
spitsbergensis (Ceratozetes)
splendens [L. (Dorycranosus)]
splendens [M. (Pentoppia)]
splendidus (Sphaerochthonius)
spongiosus (Eupelops)
spoofi (Ameronothrus) (=marinus)
spooneri (Paraquanothrus)
spora (Muliercula)
springsmythi (Nothrus)
springthorpei (Pheroliodes)
spumosa (Heterobelba)
spurcus [H. (Notophthiracarus)]
sqamaceus (Umbellozetes)
squamiger (Neoliodes) sp. inq.
squamiseta (Suctobelbella)
squamosa (Suctobelbila)
squamosus (Austrocarabodes) imperfectus
squarrosa (Oppiella) (=nova)
squarrosa (Quadroppia)
stabelchodi (Trichoribates) sp. inq.
stagaardi (Capillibates)
stagnatilis (Melanozetes)
starki (Adrodamaeus)
staryi [G. (Angulogalumna)]
staryi (Pilobates)
staryi (Similobates)
staryi [T. (Tamdamaeus)]
stebaevae (Hexachaetoniella)
stebaevae (Protodamaeus)

stefanetfranzorum (Hemileius)
steinboecki (Eupterotegaeus) (=ornatissimus)
steineri (Scutovertex) (=sculptus)
steinmanni (Fissicepheus)
steinmanni (Pilogalumna)
stellata (Cyrthermannia)
stellata (Pedrocortesella)
stellatus (Passalozetes)
stellatus (Peloribates)
stellifer (Cuspitegula)
stellifer (Hymenozetes)
stellifer (Hypozetes)
stellifer (Passalozetes)
stellifera (Heterobelba)
stellifera (Multioppia)
stenodes [H. (Mantigueracarus)]
stenolamellatus (Exochocepheus)
stenos [H. (Kakophthiracarus)]
stenotus (Phthiracarus)
stenotus [H. (Steganacarellus)]
stepensis (Xenillus) (=sculptrus)
stepposa (Jacotella) (=austriaca)
stercus (Trhypochthonius) tectorum
sterigma (Acrotritia) (=brasiliana)
sterigma (Crotonia)
sternalis [P. (Metaleius)] (?=strenzkei)
sticta (Niloppia)
stigmata (Granuloppia)
stigmatus [T. (Cristonothrus)]
stigmosus (Hoplophthiracarus)
stiktos (Eueremaeus)
stilifera (Hoplophorella)
stipatus (Ghilarovus)
stipularis [K. (Stakarenoppia)]
storkani (Oribotritia) sp. inq.
storkani (Pergalumna)
stramineus [P. (Archiphthiracarus)] (?=bryobius)
strandi (Diapterobates) (=notatus)
stratus (Scapheremaeus)
strenzkei (Bipassalozetes)
strenzkei (Eupelops)
strenzkei (Gehypochthonius) sp. inq.
strenzkei (Lanceoppia)
strenzkei (Liochthonius)
strenzkei [P. (Metaleius)]
striata (Apoplophora) (=pantotrema)
striata (Joshuella)
striata (Macquarioppia)
striata (Microtritia)
striata (Oribotritia)
striata (Pergalumna)
striata (Phauloppiella)
striata (Sabahtritia)
striata (Sternoppia)
striata [O. (Zygoribatula)] (=exarata)
striatiprodorsum (Pergalumna)
striatissima (Microtritia)
striatissima [O. (Zygoribatula)] (=excavata)
striatissimus (Cosmozetes)
striatissimus (Neoribates)
striatomarginatus (Scapheremaeus)
striatus (Adrodamaeus)
striatus (Bipassalozetes)
striatus (Ceratozetes)
striatus (Damaeus)
striatus (Hispanozetes)
striatus (Megatrichobates)
striatus (Meristacarus)
striatus (Neoliodes)
striatus [L. (Paralamellobates)] (=misella)
striatus (Peudotectoribates) subsimilis
striatus (Scheloribates) Ham., 58
striatus (Scheloribates) C.-R., 80 *(=multirepetitus)*
striatus (Sellnickochthonius) (=immaculatus)
striatus (Trichoribates)
striatus (Unguizetes)
stricta (Hoplophorella)
strictior (Eobrachychthonius) (=latior)
striculus (Atropacarus)
striganovae (Asperemaeus)
striganovae (Fissicepheus)
strigatus (Trichoribates)
strigosa [H. (Phyllhermannia)]
strigosus [H. (Protophthiracarus)]
strigulata (Pergalumna)
strinatii (Oribatella)
strinatii [R. (Rectoppia)]
strinatii (Sphaerochthonius)
strinovichi (Galumna)
strinovichi [C. (Klapperiches)]
strinovichi [M. (Pentamagyaria)]
strinovichi (Setoppia)
striolatus [H. (Notophthiracarus)]
striolatus (Scheloribates)
struthio [O. (Oxyoppiella)]
stunkardi (Nasozetes)
stupenda (Vaghia)
sturmi (Anderemaeus)
sturmi (Neoamerioppia)
sturmi (Pseudotocepheus)
sturmi (Truncozetes)
stylesi (Eutegaeus)
stylosanthes (Haplochthonius)
styosetosus (Arborichthonius)
styphelos [H. (Rhacaplacarus)]
styriaca (Epilohmannia)
styriacus (Cymbaeremaeus) (=cymba)
subaequalis (Eurhynchoribates)
subaequalis (Pergalumna) (=myrmophila)
subalpinus (Carabodes) sp. inq.
subalpinus (Gymnodamaeus)
subantarctica [O. (Zygoribatula)]
subaquila (Ceratozetes)
subarcticus (Carabodes)
subareolata (Galumnella)
subborealis (Propelops) (=monticolus)
subcarinatus (Carabodes)
subcedrus (Euphthiracarus)
subciliata (Hoplophorella)
subclavatus (Fissicepheus)
subcomplexa (Parasuctobelba)
subcorniger (Scapheremaeus)
subcornigera (Suctobelbella)
subcricoides (Brachychthonius) (=impressus)
subdolus (Phthiracarus)
subexutus (Eupelops)
subfallax [O. (Moritzoppiella)]
subglaber (Micreremus)
subglaber (Pilizetes)
subglaber (Scapheremaeus)
subglabra [H. (Heterohermannia)]
subglobosus (Phthiracarus) (=globosus)
subglobulus (Chamobates)
subiasi (Africoribates)
subiasi [P. (Archiphthiracarus)]
subiasi (Dolicheremaeus)
subiasi [D. (Epidamaeus)]
subiasi (Epimerella)
subiasi [S. (Lalmoppia)]
subiasi (Liacarus)
subiasi (Phyllozetes)
subiasi (Tainsculptoppia)
subiasi (Tripiloppia)
subinconspicuus (Ceratozetes)
subintectus (Sphaerozetes) sp. inq.
subita (Hoplophorella)
sublanatus (Cosmochthonius)
sublestus (Mixacarus)
submolesta (Oribotritia)
subniger (Sadocepheus)
subniger (Tegoribates)
subnigra (Hermanniella)

subnitida [L. (Antennoppia)] sp. inq.
subnitidus (Ovobates)
subnuda (Trichogalumna)
subnudus (Gymnobodes)
subnudus (Xenillus)
subpectinata (Rhinoppia)
subrasus [T. (Cristonothrus)]
subsellata (Hoplophorella)
subseminulum (Ceratozetella) (?=maxima)
subsimilis (Dolicheremaeus)
subsimilis (Pilizetes)
subsimilis (Pseudotectoribates)
subsimilis (Scheloribates) Mih., 56 *(=barbatulus)*
subsimilis (Scheloribates) Bal., 62 *(=caprai)*
subspinipes (Scutovertex)
substriata [O. (Zygoribatula)] connexa
substrictus (Atropacarus)
subterraneus (Liacarus)
subtilis [M. (Parplophora)]
subtilis (Pseudotocepheus)
subtilis (Tectodamaeus) sp. inq.
subtilisfinem (Tectodamaeus)
subtrigona [S. (Flagrosuctobelba)]
subtropica (Taiwanoppia)
subtropicus [S. (Perscheloribates)]
subula (Pedrocortesella)
subulatus (Eupelops) sp. inq.
subuliger (Eupelops)
subuligera (Lasiobelba)
subverticillipes [D. (Spatiodamaeus)] (=verticillipes)
succincta (Oribotritia)
succincta [H. (Rhacaplacarus)]
suchetae (Lasiobelba)
suciui [R. (Insculptoppia)]
suctobelboides (Suctobelbila)
suctorius (Suctoribates)
sudafricanus [P. (Archiphthiracarus)]
sudafricanus (Scheloribates)
sudamericana [R. (Rectoppia)] fasciata
sudamericanus [P. (Archiphthiracarus)]
sudamericanus [E. (Pocsia)]
sudetica (Oromurcia) (=bicuspidata)
suecicus (Sellnickochthonius)
sufflata [H. (Varioppia)]
sufflexa (Belba) (=corynopus)
suiyangensis (Sacculogalumna)
sulcatomarginata (Pergalumna)
sulcatus (Afronothrus) (=incisivus)
sulcatus (Dolicheremaeus)
sulcatus (Eupelops)
sulcatus (Hammerabates)
sulcatus [H. (Notophthiracarus)]
sultan (Sacculobates)
sumatrana (Hypochthoniella)
sumatranus (Dolicheremaeus)
sumatranus [H. (Notophthiracarus)]
sumatrensis (Achipteria)
sumatrensis [F. (Cosmogalumna)]
sumatrensis (Nasozetes)
sumatrensis (Oppiella) (=nova)
summersi [H. (Notophthiracarus)]
sumonyii (Oripoda)
sundaicus [M. (Trimalaconothrus)] foveolatus
sundarbanensis (Hoplophorella) (=singularis)
sundensis (Graptoppia)
sundensis (Meristacarus)
sungai (Microzetes)
sungohi (Gymnodampia)
suoxiensis (Mixacarus)
superba (Camisia) (=spinifer)
superbula [O. (Bioribatella)]
superbus [G. (Diplobodes)]
superbus (Xenillus)
superporosa [A. (Acrogalumna)]
supertrichus (Heptacarus)
suputincus (Euphthiracarus)
sura (Pergalumna)
suramericana (Multoribula)
suramericana [O. (Oxyoppiella)]
suramericanus (Benoibates)
suramericanus (Cosmochthonius) plumatus
suramericanus (Eupelops)
suramericanus (Hemileius)
suramericanus (Nothrus)
surigaoensis [O. (Acrotocepheus)]
surigaoensis [S. (Perscheloribates)]
suzukii (Sphaerochthonius)
svetlanae (Anachipteria)
swezeyi (Galumna)
swezeyi (Neoliodes) sp. inq.
swiftae [S. (Lucioppia)]
swiftae (Phthiracarus)
sylvicola (Scheloribates) (=lanceoliger)
symmetrica (Basilobelba) retiaria ssp. inq.
symmetrica (Machadobelba)
symmetrica (Malacoangelia) (=remigera)
synlamellata (Beckiella)
szabadosi Neoribates
szaboi [O. (Monoribatella)]
szaboi (Setoppia)
szanisloi (Epilohmannia) (=cylindrica)
szemesi (Oribatella)
szemmelveiszi (Liochthonius)
szentirmayi (Cycloppia)
szentivanyi (Austrocarabodes)
szentivanyi (Cultroribula) (=bicultrata)
szentivanyi (Dolicheremaeus)
szentivanyi (Szentivanyella)
szentivanyorum (Galumna)
szentivanyorum (Pseudotocepheus)
szeptyckii (Hoplophorella)
szeptyckii [H. (Notophthiracarus)]
szeptyckii [H. (Rhacaplacarus)]
szerediae (Acaroceras)
szirakii (Peloribates)
szunyoghyi (Oribatella)
taberlyi (Solenoppia)
tablasoti (Oribatula) sp. inq.
tabuencai (Plesiodamaeus)
tabulatus [T. (Laminizetes)]
tabulatus (Paradolicheremaeus)
tadrosi [O. (Zygoribatula)] (=undulata)
taeda [E. (Neoepilohmannia)]
taedaceus (Gymnodamaeus) sp. inq.
taeniata (Trichogalumna)
taeniophorus (Amnemochthonius)
taftensis [O. (Acrotocepheus)]
tahitiana (Austrotritia) lebronneci
tahitiensis (Eupelops)
tahitiensis [S. (Flagrosuctobelba)] semiplumosa
tahitiensis (Ozacarus)
tahitiensis (Pergalumna)
taibaiensis (Mixacarus)
taidinchani (Dolicheremaeus)
taidinchani (Perxylobates)
taigagica [F. (Mexicoppia)]
taigangensis (Setoxylobates)
taira (Protoribates)
taisetsuensis (Nothrus)
taisetsuensis (Trhypochthoniellus)
taishanensis (Cryptoribatula)
taiwanensis (Humerobates)
taiwanica (Brassiella)
taiwanica (Dometorina)
taiwanica (Epilohmannia)
taiwanica (Fortuynia)
taiwanus (Dolicheremaeus) infrequens
tajikistanica (Pyroppia)
takahashii (Euphthiracarus)
takara (Fissicepheus) mitis
takasago (Cepheus)
takenouchiensis (Fissicepheus)

takensis (Protoplophora)
talacrensis [L. (Baioppia)]
talaitae [M. (Trimalaconothrus)]
talarica [D. (Siculobata)]
talis [O. (Zygoribatula)]
talischica [A. (Conchogneta)] (=willmanni)
talpae (Oribatella) sp. inq.
tamaki [H. (Besuchetacarus)]
tamarae (Hydrozetes)
tamayura (Banksinoma)
tamdao (Multioppia)
tamdaoensis (Xenillus)
tameya [O. (Zygoribatula)]
taminae (Ramusella) (=clavipectinata)
tamlaensis (Nippobodes)
tamurai (Dolicheremaeus)
tamurai [K. (Niosuctobelba)]
tana (Sceletoppia)
tanaitica (Graptoppia)
tanana (Melanozetes)
tanganyikensis (Metabelba)
tanjili [H. (Phyllhermannia)]
tanngardenensis (Maudheimia)
tantilla (Trichogalumna) (=curva)
tanythrix (Euphthiracarus)
tanytrichosus (Peloptulus)
tanzanica (Galumnella)
tanzanica (Pergalumna)
tanzanica (Taeniogalumna)
tanzanicus (Annectacarus)
tanzanicus (Liochthonius)
tanzanicus (Topobates)
tanzica (Machadobelba)
tanzica [H. (Rhacaplacarus)]
tanzicus (Liacarus)
tanzicus [M. (Megazetes)]
taprobanae (Tenuelamellarea)
taprobanica (Pergalumna)
taprobanicus (Machadocepheus)
taranaki [H. (Calyptophthiracarus)]
tarandus (Austrocarabodes)
tarbae [C. (Flexa)]
tardus (Eupelops)
tardus (Phthiracarus) (=longulus)
tardus [M. (Trimalaconothrus)]
targionii (Heminothrus)
tarmani (Minunthozetes)
tarraswahlbergi (Tripiloppia)
tarsipennata (Galumna)
tasdemiri [R. (Paramedioppia)]
tasetata (Ramusella)
tashkentae (Oribotritia)
tasmaniana (Crotonia)
tasmanica (Crotonia)
tasmanica [L. (Lancelalmoppia)]
tatarica [S. (Flagrosuctobelba)]
tatrica (Camisia)
tatricus [D. (Epidamaeus)]
tatricus (Fuscozetes)
tatyanae (Peloribates)
taungensis (Zetorchella)
tauricus (Damaeus)
tauricus (Phyllozetes)
taurina (Camisia) (=spinifer)
taurus (Acaroceras)
taurus (Congocepheus)
taurus (Cosmochthonius)
taurus [O. (Dzarogneta)]
taurus (Scapheremaeus)
tavruei (Phauloppia) sp. inq.
tawhai [H. (Phthirarica)]
taylori (Tyrphonothrus)
teberdaensis (Oribotritia)
tecticola [D. (Kunstidamaeus)]
tectopedacutus (Trichoribates) sp. inq.
tectopediosus [B. (Lanibelba)]
tectoria (Joshuella)
tectorum (Trhypochthonius)
tectus (Ophidiotrichus)
tectus (Podopterotegaeus)
tegeocranus (Xenillus)
tegularum (Gymnodampia)
tegulatus (Scapheremaeus)
teldanicus (Scheloribates)
temperata (Pedrocortesella)
templadoi (Rhinoppia) (=media)
tenareae (Haloribatula)
tenasserimensis [M. (Phyllolohmannia)]
tenella (Oribatula) (=pannonica)
tenensis [F. (Cosmogalumna)]
tenerifensis [C. (Klapperiches)]
tenerifensis (Oribatella)
tenerifensis (Steganacarus)
tenorioae (Scriptoripoda)
tentaculus (Protoribates) capucinus ssp. inq.
tenue (Multioppia)
tenuelamellata [O. (Zygoribatula)] (=frisiae)
tenuiclava (Pilogalumna)
tenuiclava [H. (Platynothrus)]
tenuicoma (Arcoppia)
tenuicoma (Nanhermannia)
tenuifusus [L. (Incabates)]
tenuilamellatus [L. (Dorycranosus)]
tenuipectinata (Lauroppia)
tenuipes [D. (Kunstidamaeus)]
tenuis (Arthrodamaeus) (?=rosarius)
tenuis (Berniniella)
tenuis (Carabodes)
tenuis [D. (Cylindroppia)]
tenuis (Eremulus)
tenuis (Kuklosuctobelba)
tenuis (Liebstadia)
tenuis [O. (Monoribatella)]
tenuis [S. (Perscheloribates)]
tenuis (Phthiracarus) (=boresetosus)
tenuis (Protoribates)
tenuis [H. (Simkinia)]
tenuis (Tectocepheus) (=velatus)
tenuisensillatus (Eueremaeus) (=quadrilamellatus)
tenuiseta [N. (Confinoppia)] confinis
tenuiseta (Mimoppia)
tenuiseta [H. (Phyllhermannia)]
tenuiseta (Pseudotocepheus)
tenuiseta (Scheloribates) praeincisus
tenuiseta [H. (Steganacarellus)]
tenuiseta [O. (Zygoribatula)]
tenuisetiger (Eremaeus)
tenuisetosa (Belba)
tenuisetosa (Hermanniella)
tenuisetosa (Nanhermannia)
tenuisetosus [D. (Epidamaeus)]
tenuisetosus (Thalassozetes)
tenuisetus (Cosmochthonius)
tenuisetus (Dolicheremaeus)
tenuissimus [D. (Epidamaeus)]
tenuitibialis [D. (Epidamaeus)]
tepetlensis [T. (Latilamellobates)]
tepoztecus (Trhypochthonius)
tequila (Berniniella)
teraja (Arcoppia)
terebrantis (Orthogalumna)
teretis (Oribotritia)
terminalis (Eupelops)
terminalis (Nothrus) (?=silvicus)
termitophila [P. (Ausoribula)]
terrae (Epilohmannoides)
terrapene (Atropacarus)
terrestris (Hydrozetes) (=confervae)
terrestris (Neoliodes)
terricola (Hypogeoppia)
terricola [R. (Insculptoppia)]
terricola [O. (Zygoribatula)] (=excavata)

tesselatus (Euphthiracarus)
tessellata (Ferolocella)
tessellata (Galumna) sp. inq.
testacea (Mesotritia) (=flagelliformis)
testudineus (Phthiracarus) (=ferrugineus)
tetraciliata (Wallworkoppia)
tetradis (Indotritia)
tetraporosa (Galumna)
tetrasetosus [P. (Lignobates)]
tetrasklerosis (Zachvatkinibates)
tetrosus (Eueremaeus)
teuri (Galumna)
texana (Galumna)
texana (Hoplophorella)
texana (Lohmannia)
texana (Mochloribatula)
texana (Oribatella)
thabazimbiensis (Eupelops) sulcatus
thaiensis [P. (Archiphthiracarus)]
thaiensis (Fissicepheus)
thaiensis (Nanhermannia)
thailande [G. (Diplobodes)]
thailandensis (Pergalumna)
thailandiae [C. (Tanzaniacepheus)]
thailandica (Nothrolohmannia)
thalassophila [O. (Zygoribatula)]
thaleri (Carabodes)
thamdrupi (Lanceoppia)
thanhoaensis (Perxylobates)
thani (Hermanniella)
theleproctus (Neoliodes)
theliis (Gymnodamaeus)
thermophilus (Scheloribates)
thermophilus (Tutorozetes)
thienemanni (Ceratozetella)
thienemanni (Hydrozetes)
thienemanni [H. (Monoschelobates)]
thoracicus [P. (Neopilizetes)]
thoreaui [H. (Rhacaplacarus)]
thori [H. (Capillonothrus)]
thori [L. (Lancelalmoppia)]
thorntonensis [P. (Archiphthiracarus)]
thujae (Hemileius)
thysanura (Psammogalumna)
tianmuensis (Mixacarus)
tianmuensis (Sabahtritia)
tianshanensis [P. (Montizetes)]
tianshanensis (Trichoribates)
tianshanicus (Megalotocepheus)
tianshanicus (Pantelozetes)
tianshanicus [H. (Simkinia)]
tibetensis (Acrotritia) (=vestita)
tibetensis (Protoribates)
tibialis (Bipassalozetes) (?=perforatus)
tibialis (Eupelops)
tibialis (Oribatula)
tichomirovae (Berniniella)
tichomirovae (Pallidacarus)
tichonravovi (Allobelba)
tidbinbilla [M. (Trimalaconothrus)]
tierradelfuegoensis [P. (Oribellopsis)]
tierradelfuegoensis (Zeasuctobelba)
tigris [P. (Neopilizetes)]
tillandsiae (Scapheremaeus)
tillandsiophilus (Scapheremaeus)
tillandsius (Peloribates) (=hubbardi)
timah (Bukitritia)
tinctus [H. (Notophthiracarus)]
titanius (Tectocepheus) (=velatus)
titiwangsaensis (Pergalumna)
tiunovi (Galumnella)
tiwi (Oribotritia)
tjanshanicus (Trichoribates)
tjibodensis (Spinotocepheus)
tobagoensis [S. (Grandjeanobates)]
tobaicus (Hydrozetes)
tobiasi [R. (Insculptoppia)]
todori (Hermanniella)
toelgyesii (Suctobelbella)
toeroeki (Setoppia)
tofinoensis (Ceratoppia)
tohivea [H. (Notophthiracarus)]
tohokuensis (Protoribates)
tohokuensis (Sadocepheus) (=setiger)
tohokuensis (Suctobelbella)
tokara (Allosuctobelba) tricuspidata
tokara (Nanhermannia)
tokaraensis (Nippobodes)
tokukoae (Oribotritia)
tokyoensis (Galumna)
tokyoensis (Ramusella) sengbuschi
tolanaro (Pseudotocepheus)
toletana (Serratoppia) (?=intermedia)
tolstikovi (Lopholiodes)
tolstikovi (Neogalumna)
tonatiuh (Scapheremaeus)
tongaensis (Neotrichocepheus)
tongaensis (Pilogalumna)
tongatapuensis (Nesopelops)
tongliaoensis (Neogalumna)
tonkini [M. (Trimalaconothrus)]
toolangiensis (Hoplophthiracarus)
topali (Phauloppia)
topali [L. (Undulozetes)]
torii (Punctoribates)
torosus [P. (Archiphthiracarus)]
torquatus [S. (Perscheloribates)] clavatus
torquisetosus (Damaeus)
torrijosi (Oribatula)
tortile (Lanceoppia)
tortilis [O. (Zygoribatula)]
tortuosa (Acanthobelba)
torulosus (Eupelops)
torvus [D. (Spatiodamaeus)] (?=verticillipes)
tosaensis (Scapheremaeus)
totus [P. (Archiphthiracarus)]
toxotes (Setoppia)
traegardhi (Acaronychus)
traegardhi [A. (Conchogneta)]
traegardhi [D. (Epidamaeus)] (=fortispinosus)
traegardhi (Magellozetes) antarcticus ssp.inq .
traegardhi [H. (Phthirarica)]
traegardhi (Tripiloppia)
transaltaicus (Mainothrus)
transcripta (Novoribatella)
transitans (Oribatula) (=tibialis)
transitans (Steganacarus) (=magnus)
transitoria Fenestrobelba
transitoria (Mahunkella)
transitoria (Neosuctobelba)
transitoria (Parapyroppia) sp. inq.
transitus (Joshuella)
translamellaris [M. (Hammeroppia)]
translamellaris (Scheloribates) (=praeincisus)
translamellaris (Tectocepheus) (=velatus)
translamellata (Acroppia)
translamellata (Ceratozetella)
translamellata (Ctenobelba)
translamellata [O. (Moritzoppiella)] (=neerlandica)
translamellata (Ramusella)
translamellata (Teratoppia)
translamellatus (Allozetes)
translamellatus (Antarctozetes)
translamellatus [T. (Cristonothrus)]
translamellatus (Eremaeus)
translamellatus (Eremulus)
translamellatus (Euscheloribates)
translamellatus (Hemileius)
translamellatus (Humerobates)
translamellatus (Hypozetes)
translamellatus [C. (Klapperiches)] similis
translamellatus (Liacarus) (=xylariae)

translamellatus [S. (Perscheloribates)]
translamellatus (Tectocepheus) (=velatus)
translamellatus (Tenuialoides) (=fusiformis)
translineata (Oribatula)
translucens (Lanceoppia)
transplicatus (Scheloribates)
transrugosa (Suctobelbila)
transtriata (Oribatella)
transvaalensis [H. (Phyllhermannia)]
transvaalensis (Zetorchestes)
transvectus (Orbiculobates)
transversa (Allogalumna) (=integer)
transversa [N. (Hanoiella)]
transversalis (Cepheus) sp. inq.
transversalis (Coartobelba)
transversalis (Ethiovertex)
transversalis (Pseudotocepheus) (=amonstruosus)
transversaria (Nanhermannia)
transversarius (Carabodes)
transversus (Malaconothrus) sp. inq.
transversus (Nesopelops)
transversus (Pheroliodes)
transversus (Sphaerochthonius)
transversus (Sphaerochthonius)
transylvanica (Gustavia)
transylvanicus (Cepheus)
trapezoida (Lauroppia)
trapezoidea [Q. (Coronoquadroppia)]
trapezoides [L. (Baioppia)]
trapezoides [H. (Notophthiracarus)]
travei (Austrocarabodes)
travei (Eueremaeus)
travei (Licnodamaeolus)
travei [E. (Neoatrichosus)]
travei (Niphocepheus)
travei [P. (Shtanchaeviella)]
travei (Solenoppia)
travei [C. (Triachipteria)]
travei (Tricheremaeus)
travei [S. (Tropacarus)]
travei [O. (Zygoribatula)] (=thalassophila)
traversus [H. (Capillonothrus)]
tredecemsetosus (Peloribates)
trembleyi [M. (Hammeroppia)]
tremellae (Liacarus) (?=subterraneus)
tremicta [H. (Phyllhermannia)]
trentus [E. (Pocsia)]
triacantha (Ramusella)
triangula (Nanhermannia)
triangularibus (Prototritia)
triangularis (Chamobates) (?=confusus)
triangularis (Dolicheremaeus)
triangularis (Protoribates)
triangulata (Allogalumna)
triangulata (Galumna)
triangulata (Lohmannia)
triangulata (Oribatella)
triangulata (Pedrocortesella)
triangulata (Suctobelbella)
triangulum (Trhypochthonius)
triapicini [L. (Dorycranosus)]
triarcuatus (Pasocepheus)
tribuliformis (Striatoppia)
tricarinata (Dissorhina) (=ornata)
tricarinata (Indotritia)
tricarinatoides (Dissorhina)
tricarinatus [H. (Besuchetacarus)]
tricarinatus (Papillonotus)
tricarinatus (Scapheremaeus)
tricarinus (Scheloribates)
trichionus (Liacarus)
trichoptera (Oribatella)
trichosa (Neoamerioppia)
trichosa (Neohermannia)
trichosa (Suctobelbella) (?=pilososetosa)
trichosa [O. (Zygoribatula)] (=excavata)
trichoseta [L. (Antennoppia)]
trichosoides (Neoamerioppia)
trichosus (Aleurodamaeus)
trichosus (Atropacarus) (=striculus)
trichosus (Hemileius)
trichosus [H. (Notophthiracarus)]
trichosus (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
trichosus [A. (Uluguroides)]
trichotos [T. (Paragloboppia)]
triconica (Berniniella) (=bicarinata)
tricornis (Mahunkaia)
tricornuta (Furcoppia)
tricornuta (Parasuctobelba)
tricornutus (Dolicheremaeus)
tricostatus (Mycobates)
tricuspidata (Allosuctobelba)
tricuspidata (Amazoppia)
tricuspidata (Galumna)
tricuspidata (Metrioppia)
tricuspidatus (Chamobates) (=birulai)
tricuspidatus (Liacarus) (=olivaceus)
tricuspidatus (Sphaerozetes)
tridactyla (Oribatella)
tridactylus (Anderemaeus) sp. inq.
tridactylus [M. (Calyptozetes)]
tridactylus (Cosmopirnodus)
tridactylus (Hydrozetes)
tridactylus (Sphodrocepheus)
tridactylus [H. (Tuberemaeus)]
tridentata (Cultroribula) sp. inq.
tridentata (Furcoribula)
tridentata (Lauroppia)
tridentata (Oppia) (=neonominata)
tridentata (Rhinoppia)
tridentatus (Birsteinius) (=neonominatus)
tridentatus (Mycobates)
tridentatus (Neomycobates)
tridentifera (Pyroppia)
trifasciata (Suctobelbila)
trifolius (Lepidozetes)
triforata (Paraphauloppia)
trifoveolatus (Carinozetes)
trifurcata (Cultroribula) (=bicultrata)
trifurcata (Schalleria)
trifurcus (Eremaeozetes)
triglavensis (Eueremaeus) (=quadrilamellatus)
triglochin (Brachioppia)
trigona (Suctobelba)
trigonalis [D. (Epidamaeus)]
trigonella [O. (Zygoribatula)] (=arcuatissima)
trigonosternum (Cavernocarabodes)
triheterodactylis (Acrotritia) (=americana)
trilabiata (Oripoda)
trilobata (Rhinoppia)
trilobus (Edwardzetes) sp. inq.
trimaculata (Oromurcia) (=lucens)
trimaculatus (Trichoribates) (?=berlesei)
trimorphus (Rostrozetes) (=ovulum)
trimucronata (Wallworkoppia)
trimucronatus (Birsteinius)
trimucronatus (Dolicheremaeus)
trimucronatus (Leptotocepheus)
trinacriae (Peloptulus) (=reticulatus)
trinebulosa (Hermannia) sp. inq.
trinidadensis (Paraleius)
trinidadensis (Plenotocepheus)
trinodosa (Zeasuctobelba)
trionus (Eueremaeus)
trionus (Medioxyoppia)
triops (Galumna)
tripartita (Arcoppia)
tripartita (Hoplophorella)
tripartita (Indotritia)
tripartita (Suctobelbila)
tripartitus [H. (Besuchetacarus)]
tripartitus [S. (Makischeloribates)]

triplicatulus (Unguizetes) (=sphaerula)
triplicicornutus [O. (Acrotocepheus)]
tripuraensis (Arcoppia)
tripuraensis (Peloribates)
tripurensis (Striatoppia)
tripurensis (Trimalaconthrus)
triquetra (Apoplophora)
triquetra (Galumna)
triramosa (Arcoppia)
triramosa (Brachioppia) sp. inq.
triramosa (Brachioppiella)
trirostrata [O. (Zygoribatula)]
trirugis (Scapheremaeus)
triseta (Apoplophora) (=marcuardi)
triseta [H. (Tanzoppia)]
trisetosa (Oribotritia)
trisetosus (Austrodamaeus) (=elegantulus)
trisetosus [E. (Cerostocepheus)]
trisetosus (Hammerabates)
tristani (Stomacarus)
tristis (Phthiracarus)
tristius (Pedrocortesella)
trisulca (Hoplophorella)
tritici [O. (Zygoribatula)] (=connexa)
trituberculatus (Zetorchestes) sp. inq.
tritylos [D. (Spatiodamaeus)]
triumnasus [P. (Neopilizetes)]
triungulatus [I. (Haplozetes)]
triungulatus (Trachyoribates)
trivandricus (Annectacarus)
trivestigius [H. (Notophthiracarus)]
trivialis (Cosmochthonius) (=reticulatus)
troisi (Amerus)
trojani (Hoplophthiracarus)
trojani [H. (Steganacarellus)]
tropica (Cultroribula)
tropica (Dometorina)
tropica (Indotritia) (=krakatauensis)
tropica (Microtritia)
tropica (Pseudantarcticola)
tropicalis (Brachioppia)
tropicus (Hoplophthiracarus) (=concinuus)
tropicus (Sellnickochthonius)
trowella (Trichogalumna)
truku (Tectodamaeus)
truncata (Berlesiella)
truncata (Eremobelba)
truncata (Macrogena)
truncata (Membranoppia)
truncata (Notogalumna) sp. inq.
truncata (Pedrocortesella)
truncata [H. (Phyllhermannia)]
truncata (Rhinoppia)
truncata [C. (Triachipteria)]
truncata [O. (Zygoribatula)]
truncatum (Adoristes) (=ovatus)
truncatus (Bunabodes)
truncatus (Eremulus)
truncatus (Euphthiracarus)
truncatus (Nothrus)
truncatus (Oxyamerus)
truncatus [U. (Parauracrobates)]
truncatus (Scapheremaeus)
truncicola (Suctobelbata)
trupchumi (Melanozetes) sp. inq.
tryjanowskii (Crotonia)
trypasis (Leobodes)
tryphosa (Camisia)
tryssos [P. (Archiphthiracarus)]
tsalakpmenoi (Trichocarabodes)
tsaoshanensis (Lasiobelba)
tsavoensis (Eremaeozetes)
tsavoensis (Pergalumna)
tschabovskyi (Suctobelbella)
tschernovi (Punctoribates)
tsengi (Galumna)
tsengi (Peloribates)
tshendsureni (Xenillus)
tsitsikamaensis [H. (Notophthiracarus)]
tsurusakii (Pergalumna)
tsurutomiensis (Eremulus)
tsushimaensis (Carabodes)
tuberclesejugalis (Pergalumna)
tuberculata [P. (Baloghates)]
tuberculata (Carinabella)
tuberculata (Crotonia)
tuberculata (Ctenobelba) (=pilosella)
tuberculata (Cyrthermannia)
tuberculata (Dometorina)
tuberculata (Eremobelba)
tuberculata (Galumna)
tuberculata (Jacotella) (=ornata)
tuberculata (Kuklosuctobelba)
tuberculata (Machadobelba)
tuberculata [H. (Phyllhermannia)]
tuberculata (Ramusella) (=tokyoensis)
tuberculata (Rhinoppia) (=subpectinata)
tuberculata (Suctobelbila)
tuberculatus (Archegozetes) (=magnus)
tuberculatus (Belbodamaeus)
tuberculatus (Bulleremaeus)
tuberculatus (Cryptacarus)
tuberculatus (Eremaeozetes)
tuberculatus (Exochocepheus)
tuberculatus (Gibbicepheus)
tuberculatus (Gymnodamaeus)
tuberculatus [E. (Licnocepheus)] (?=kaszabi)
tuberculatus (Liochthonius)
tuberculatus (Microzetes)
tuberculatus (Neoribates)
tuberculatus [H. (Notophthiracarus)]
tuberculatus (Ocellotocepheus)
tuberculatus (Papillocepheus)
tuberculatus (Pilizetes)
tuberculatus (Scheloribates)
tuberculatus (Sphodrocepheus)
tuberculatus (Striatobates)
tuberculatus [H. (Tuberemaeus)]
tuberculatus [T. (Viracochiella)]
tuberculatus (Xenillus)
tuberculosissima [H. (Kakophthiracarus)]
tuberculosus (Ametroproctus)
tuberculosus (Cepheus)
tuberculosus (Machadocepheus)
tuberculosus (Scapheremaeus)
tuberculus [H. (Notophthiracarus)]
tuberosa (Hoplophorella) (=praeoccupata)
tuberosa (Jugatala)
tuberosa [H. (Kakophthiracarus)] (=tuberculosissima)
tuberosa (Lineoppia)
tuberosa (Phauloppia) (=saxicola)
tuberosa (Setoppia)
tuberosa (Suctobelbella) (=duplex)
tuberosa [S. (Ussuribata]
tuberosa (Wallworkoppia)
tuberosus (Charassobates)
tuberosus (Eremaeus)
tubifer (Liacarus)
tubuaiensis (Scheloribates)
tubulifera (Monstroripoda)
tubulus [P. (Archiphthiracarus)]
tuloyus (Meristacarus)
tumenensis (Indotritia)
tumescitus (Suctotegeus)
tumida (Microtritia)
tumida (Suctobelbella)
tumida (Suctobelbila)
tumidisetosus (Ocesobates)
tumidus (Euphthiracarus)
tumidus (Liochthonius)
tumidus [A. (Rafacarus)]
tumidus (Scapheremaeus)

tumulata (Suctobelba)
tumulosus (Liochthonius)
tunicatus (Cosmobates)
tunicatus (Loferemaeus) sp. inq.
tunicatus (Tegeozetes)
tunisica (Dissorhina) ornata
tunisiensis (Peloribates)
tupasae [O. (Acrotocepheus)]
tupi (Dampfiella)
turanicus [H. (Simkinia)]
turbulentus (Ramsayellus)
turcica [Q. (Coronoquadroppia)] michaeli
turcica (Enisella)
turcica (Machuella)
turcica (Moritzoppia)
turcica (Multioppia)
turcica (Oribotritia)
turcica (Perlohmannia)
turcica [O. (Perspicuoppia)]
turcmenica (Lohmannia)
turcmenicus (Ghilarovus)
turcmensis (Scheloribates)
turgidus [P. (Archiphthiracarus)]
turgidus (Peloribates)
turgidus (Podoribates)
turgiseta (Karenella)
turialbaiensis (Mixacarus)
turianiensis (Hoplophorella)
turkeyensis (Allogalumna)
turki [L. (Hamoppia)]
turrialbai (Costacarabodes)
tuxeni (Liochthonius) Fors., 57
tuxeni (Liochthonius) Chin., 74 *(=moritzi)*
tuxeni (Membranoppia)
tuxeni (Pantelozetes) (=paolii)
tuxtlasensis (Allonothrus)
tyrrhenica (Bursoplophora)
tyrrhenica (Oribatella)
tyrrhenicus (Carabodes)
tyrrhenicus (Liochthonius)
tzanoudakisi [P. (Archipththiracarus)] (=bryobius)
tzitzikamaensis [S. (Perscheloribates)]
uapoui (Pergalumna) bryani ssp. inq.
uapoui (Scheloribates) mumfordi
ubali (Edwardzetes)
uberabensis (Hydrozetes)
ucrainica [O. (Zygoribatula)] excavata
ueckermanni [H. (Urubambates)]
uenoi (Campachipteria)
uenoi [D. (Epidamaeus)]
ugamaensis (Cosmochthonius)
ugandaensis (Machadobelba)
ugraseni (Thalassozetes)
uherkovichi (Moritzoppia) (=keilbachi)
uliginosa (Oppiella) nova
ulneungensis (Pyroppia)
ultraciliata [L. (Antennoppia)]
ultraforaminosus (Topobates)
uludagensis (Dissorhina)
uluguruensis [H. (Notophthiracarus)]
uluguruensis [E. (Pocsia)]
uluguruensis (Scheloribates)
ulykpani [I. (Haplozetes)]
umaetluisorum (Oribatella)
umbellatus (Lepidozetes)
umbraili (Topobates)
umbraticus (Gymnodamaeus) sp. inq.
umbratilis (Camisia) sp. inq.
umukusumae (Gephyrazetes)
uncinata [O. (Dzarogneta)]
uncinatus [H. (Notophthiracarus)]
uncinatus (Scapheremaeus)
uncinulus [H. (Notophthiracarus)]
uncunguis (Psednobates)
undatus (Phthiracarus) sp. inq.
undatus (Plenotocepheus)
undirostratus (Papillacarus)
undosa [N. (Leptosuctobelba)]
undulata [G. (Indogalumna)]
undulata (Indotritia)
undulata (Oribatella)
undulata (Rhinoppia)
undulata (Suctobelbila)
undulata [O. (Zygoribatula)] Berl., 16
undulata [O. (Zygoribatula)] Bal., 66 *(=baloghi)*
undulatus (Afroleius)
undulatus [M. (Archegotocepheus)]
undulatus (Cavernocepheus)
undulatus (Eremaeozetes)
undulatus (Licnodamaeus)
undulatus (Microtegeus)
undulatus (Nothrus)
undulatus [Z. (Protozetomimus)]
undulatus (Sadocepheus)
undulatus (Tereticepheus)
undulatus [T. (Tyrphonothrus)]
undulatus (Unduloribates)
unguifera (Crotonia)
unica (Galumna)
unica (Kunstogalumna)
unica (Oribatula) (=tibialis)
unicarinata (Austrotritia)
unicarinata (Moritzoppia)
unicarinatoides (Moritzoppia) unicarinata
unicarinatus [H. (Steganacarellus)]
unicorniculatus (Zetorchestes) micronychus ssp. inq.
unicornis (Belba)
unilateralis (Annectacarus)
unilateralis (Liochthonius)
unimaculatus (Diapterobates)
uniporosa (Vaghia)
unisetosus (Scheloribates)
unispinata (Oribatella)
unitjumenienesis (Pantelozetes)
universitatum (Tectocepheus) velatus
unjangensis (Liacarus)
unqus (Hoplophorella)
unsui (Lohmannia)
unumnasus [P. (Neopilizetes)]
upelbensis (Basiceramerus)
upicentenarius (Dolicheremaeus)
upoluensis (Allogalumna)
uracasensis (Peloribates)
urbanlus [P. (Triaunguis)]
ureaceus (Eupelops)
urenicus (Scheloribates)
urhani [C. (Caucasiobelba)]
uropygium (Dicatozetes)
ursina (Subbelba) (=montana)
ursulae (Eremaeozetes)
urticinus (Gehypochthonius)
uruguayensis (Pheroliodes)
uruguayensis (Sphaerochthonius)
usambarensis (Indotritia) (=nuda)
usheri [B. (Gressittoppia)]
usitatus [H. (Notophthiracarus)]
usnea (Dometorina)
uspiensis (Teratoppia)
ussurica (Nanhermannia) (=comitalis)
ussuricus (Ophidiotrichus)
utricularia (Crotonia)
uttarkashii (Galumna) crenata
vacua (Aeroppia)
vaesterbottensis (Palaeacarus) (=kamenskii)
vagorum (Papuacepheus)
valbehanae [L. (Incabates)]
valdemoricus (Cryptacarus) (=promecus)
valdivia (Crotonia)
valdiviaensis [H. (Protophthiracarus)]
valentianus [H. (Platynothrus)] (=punctatus)
valerieae (Afroleius)
valerieae (Camisia)

valerieae (Ceratoppia)
valerieae [M. (Cristonothrus)] sp. inq.
valerieae [O. (Monoribatella)]
valerieae [A. (Rafacarus)]
valerieae (Trichoribates)
valida (Anachipteria)
valida (Galumna)
validus (Phthiracarus) (=sarahae)
valkanovi (Eueremaeus) (=oblongus)
vallei (Phauloppia)
vanalinearis (Dampfiella)
vanderhammeni (Hoplophthiracarus) (=illinoisensis)
vanderhammeni (Lanceoppia)
vanderhammeni (Zetorchestes)
vaneki [L. (Lancelalmoppia)]
vanga (Setoppia)
vanharteni (Ethiovertex)
vanharteni (Lohmannia)
vanharteni [H. (Tuberemaeus)]
vanharteni [O. (Zygoribatula)]
vanhonggui (Mixacarus)
vanuatuensis (Mixacarus)
vanzwaluwenburgi (Scheloribates)
varablancus (Hoplophorella)
vargai (Zetorchella)
varia (Arcoppia)
varia (Galumna)
varia (Hoplophorella)
varia (Oribotritia)
varia [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)
variabilis [P. (Archiphthiracarus)] (=peristomaticus)
variabilis [N. (Confinoppia)]
variabilis (Diapterobates)
variabilis [D. (Epidamaeus)]
variabilis (Gittella)
variabilis (Haplochthonius)
variabilis [C. (Klapperiches)]
variabilis (Liebstadia) (=pannonica)
variabilis (Microtegeus)
variabilis [C. (Paraceratorchestes)]
variabilis (Paraphauloppia)
variabilis (Pilogalumna)
variabilis (Scheloribates)
variabilis (Sellnickochthonius)
variabilis (Suctobelbella)
variabilis (Truncopes) moderatus
variabilis (Xenillus)
variabilis [O. (Zygoribatula)] (=frisiae)
varians (Hoplophorella)
varians [R. (Insculptoppiella)]
variaporosa (Oribatula)
variatepictus (Bipassalozetes) (=intermedius)
variatus (Eupelops)
variatus [M. (Phyllolohmannia)]
variesetosus (Sphaerochthonius)
variolatus (Dolicheremaeus)
variolobatus (Dolicheremaeus)
variolosus (Birsteinius)
variolosus (Eupelops) (=torulosus)
variolosus [H. (Notophthiracarus)]
variolosus (Xenillus) sp. inq.
variopectinata (Ctenoppia)
variopectinata [R. (Paramedioppia)]
variosculpturata (Pergalumna)
variosetosa (Fusuloppia)
variosetosa [S. (Ussuribata)]
variosetosus [T. (Cristonothrus)]
varisculptus (Peloribates)
varisculptus [P. (Triaunguis)]
varisetiger (Protoribates)
varius (Humerobates)
vartismithi (Chamobates) sp. inq.
vasiliorum [A. (Conchogneta)]
vasiliui (Topobates)
vastus (Liacarus) (=major)
vastus (Protoribates) (=dentatus)
vaucheri (Austrocarabodes)
vazdemelloi [E. (Licnocepheus)]
vegeta [O. (Zygoribatula)]
velata (Geminoppia)
velata (Topalia)
velatus (Kaszabozetes)
velatus [C. (Tanzaniacepheus)]
velatus (Tectocepheus)
venetiolana (Crotonia)
venetiolanus (Holonothrus)
venezolanus [C. (Klapperiches)]
venezolanus [H. (Notophthiracarus)]
venezuelanus (Xenillus)
venosus (Platyliodes) (?=doderleini)
ventosus [H. (Protophthiracarus)]
ventralis (Pergalumna)
ventricosa (Camisia) (=segnis)
ventricosus (Hypochthonius) sp. inq.
ventrisetosa (Machuella)
ventroacutus (Totobates)
ventrolaminata (Membranoppia)
ventronodosa [S. (Lalmoppia)] (=maculata)
ventrosquamosa (Neoamerioppia)
ventrostriatus (Austrocarabodes)
venusta (Ceratozetella)
venusta (Oribatula) (=tibialis)
venusta (Hoplophorella)
venustus (Circellobates)
vera (Oribatula) (=caliptera)
vera (Rhinoppia)
vera (Suctobelbella) subcornigera
veracruzensis (Archegozetes) (=magnus)
verae [A. (Dyobelba)]
verai (Eremaeozetes)
veriornatus (Gymnodamaeus)
vermicula [H. (Phyllhermannia)]
vermicularis (Eohypochthonius)
vermicularis (Pheroliodes)
vermiculatus (Carabodes) (=labyrinthicus)
vermiculatus (Cosmozetes)
vermiculatus (Neoliodes)
vermiculatus [H. (Tuberemaeus)]
vermiseta (Perxylobates)
verna (Nanhermannia)
vernaculus (Steganacarus)
vernoncrookensis (Austrocarabodes)
vernoncrookensis (Globoppia)
vernonensis [H. (Notophthiracarus)]
verrucatus (Austrocarabodes)
verrucatus (Costacarabodes)
verrucatus [D. (Kunstidamaeus)]
verrucosa (Achipteria)
verrucosa (Belba) (=compta)
verrucosa (Epilohmannia) (=cylindrica)
verrucosa [S. (Flagrosuctobelba)]
verrucosa [H. (Kakophthiracarus)] (=tuberculosissima)
verrucosa (Setoppia)
verrucosus [O. (Acrotocepheus)]
verrucosus (Cepheus)
verrucosus (Plenotocepheus)
verticillatus (Hymenozetes)
verticillipes [D. (Spatiodamaeus)]
vesca (Mesoplophora)
vesciculus (Euphthiracarus)
vestigia (Indotritia)
vestigia [M. (Parplophora)]
vestigius [H. (Protophthiracarus)]
vestita (Acrotritia)
vestita (Eremella)
vestita (Lyrifissisella)
vestitus (Steganacarus)
veteratorius [H. (Notophthiracarus)]
vetula (Dissorhina) (=ornata)
vibrissa (Wallworkoppia)
vicarius (Hydrozetes) sp. inq.
vicarius (Pseudotocepheus)

vicarius (Tectocepheus) (=velatus)
vicina (Neoamerioppia)
vicina [E. (Neoepilohmannia)]
vicina (Oribatella)
vicina (Oribotritia)
vicina (Sternoppia)
vicina [O. (Zygoribatula)]
vicinicornuta (Cyrthermannia)
vicinus (Aleurodamaeus)
vicinus (Bipassalozetes) (=bidactylus)
vicinus [H. (Calyptophthiracarus)] pavidus
vicinus (Euphthiracarus)
vicinus (Fissicepheus)
vicinus (Hoplophthiracarus)
victoriae (Crotonia)
victoriae (Joshuella)
videor (Hydrozetes)
viedmai (Microzetes)
vietnamensis (Allosuctobelba)
vietnamensis (Granuloppia)
vietnamensis (Liacarus)
vietnamensis (Perxylobates)
vietnamese (Paulianacarus)
vietnamica (Lasiobelba)
vietnamica [N. (Leptosuctobelba)]
vietnamica (Multipulchroppia) (=pectinata)
vietnamica (Neoamerioppia)
vietnamica (Pedrocortesella)
vietnamica (Ramuselloppia)
vietnamica (Roynortonia)
vietnamica (Schalleriella)
vietnamica (Trichogalumna)
vietnamicus [O. (Acrotocepheus)]
vietnamicus (Adrodamaeus)
vietnamicus (Euphthiracarus)
vietsi [M. (Trimalaconothrus)]
viguerasis (Scheloribates)
viktortsoii (Trachyoribates)
vilagiorum (Rugoppia)
vilhenarum [T. (Cristonothrus)] sp. inq.
vilhenarum (Dolicheremaeus)
vilhenarum (Eohypochthonius) (=gracilis)
villiersensis (Dimidiogalumna)
villosa (Archoplophora) (=rostralis)
villosa [M. (Parplophora)] (=polita)
villosus (Odontocepheus)
villosus [H. (Protophthiracarus)]
vinalesensis (Annectacarus)
vinalesensis (Hoplophthiracarus)
vindobonensis [I. (Haplozetes)]
vindobonensis (Ophidiotrichus)
violabilis (Ceratoppia)
viperea (Arcoppia)
virga (Pergalumna)
virgatus (Euphthiracarus)
virginalis (Hydrozetes) dimorphus
virginalis (Quadroppia) (=quadricarinata)
virginiana [A. (Hoffmanacarus)]
virginicus (Ceratozetes)
virginiensis (Galumna)
virginiensis (Mesotritia)
virgulata (Oribotritia)
virungensis (Holonothrus)
visayasensis (Dolicheremaeus)
visayasensis (Philippotocepheus)
viscaensis (Dolicheremaeus)
visnyai (Hungarobelba)
vitiosa (Beckiella)
vitis (Papillacarus)
vitraeus (Dolicheremaeus)
vitrea (Oppia)
vitrina (Hoplophorella)
vitrina (Rhinoppia) (=obsoleta)
vittata (Arcoppia)
viviparus (Totobates)
vladopesici [F. (Cosmogalumna)]
vohimana (Hermanniella)
vohimana (Parasuctobelba)
voigtsi [C. (Xiphobates)]
vojnitsi (Allogalumna)
volcanensis (Moritzoppia)
volcanensis (Scheloribates)
volcanicus (Scapheremaeus)
volgini (Ceratozetes)
volgini (Zachvatkinibates)
vombi (Liacarus) (=coracinus)
voskresenskii (Stomacarus)
vtorovi [F. (Mexicoppia)]
vtorovi [O. (Oxyoppiella)]
vulcania (Lohmannia)
vulgaris [N. (Leptosuctobelba)]
vulgaris (Pheroliodes)
vulgaris (Scheloribates)
vulgaris (Totobates)
vulgaris [P. (Triaunguis)]
vulgaris (Xenillus) (=tegeocranus)
vulgaris [O. (Zygoribatula)]
vulpes (Arthrhoplophora)
wachteli [S. (Bischeloribates)]
wadatsumi (Peloptulus)
waitere [H. (Notophthiracarus)]
wakensis (Neoliodes)
walalensis (Muliercula)
walbranensis (Metrioppia)
walkeri (Apotritia)
walkeri (Brachioppiella)
wallacei [O. (Acrotocepheus)]
wallacei (Dolicheremaeus)
wallworki (Acrotritia) (=rustica)
wallworki (Annectacarus)
wallworki [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
wallworki (Belloppia)
wallworki (Cosmochthonius) (=lanatus)
wallworki (Crotonia)
wallworki (Dolicheremaeus)
wallworki (Epilohmannoides)
wallworki (Membranoppia)
wallworki [P. (Neophthiracarus)]
wallworki (Pergalumna) (=obvia)
wallworki (Sphaerochthonius)
wallworki (Steganacarus)
wallworki (Tyrphonothrus)
wallworki [A. (Uluguroides)]
walteri (Eremaeus)
walteri (Novazelandiella)
walteri [H. (Rhacaplacarus)]
walteri (Scapheremaeus)
walteri (Tegoribates)
wandae (Atropacarus)
wangae (Fissicepheus)
wangi (Dolicheremaeus)
waray (Dolicheremaeus)
warburtonensis [H. (Protophthiracarus)]
washburni (Oppiella) (=nova)
watanabei (Banksinoma)
waterhousei (Arcoppia)
waterhousei (Gibbicepheus)
waterhouseri (Suctobelbila)
watertonensis (Ceratozetes)
watsoni (Stomacarus)
weberi (Pergalumna)
wehnckei (Pheroliodes)
weigmanni [P. (Archiphthiracarus)]
weigmanni [A. (Conchogneta)]
weigmanni (Corynoppia)
weigmanni [D. (Epidamaeus)]
weigmanni [P. (Minguezetes)]
weigmanni (Porobelba)
weigmanni [C. (Triachipteria)]
weigmanni [M. (Trimalaconothrus)]
weiri (Crotonia)
weldboroughensis [H. (Protophthiracarus)]

weni (Galumna)
werneri (Basilobelba)
werneri (Steganacarus)
wettsteini (Carabodes)
whakau [H. (Steganacarellus)]
whanganuiensis (Pseudotocepheus)
whartoni (Jacotella)
whirinaki [H. (Notophthiracarus)]
whitteni (Scheloribates) fimbriatus
whitteni [P. (Vepracarus)]
widagdoi (Rhynchoppia)
williamsae (Anakingia)
willmanni [H. (Austrophthiracarus)]
willmanni [A. (Conchogneta)]
willmanni [S. (Grandjeanobates)]
willmanni [C. (Klapperiches)]
willmanni (Lanceoppia)
willmanni (Liacarus) (=subterraneus)
willmanni (Liebstadia) (=pannonica)
willmanni (Mucronothrus)
willmanni (Nothrus)
willmanni (Oppia) (=denticulata)
willmanni (Oribatella)
willmanni (Pergalumna)
willmanni [C. (Triachipteria)] (=fanzagoi)
wilsoni [M. (Hammeroppia)]
wilsoni (Maudheimia)
winchesteri (Sphaerozetes)
windsori (Sphaerochthonius)
winkleri (Arcoppia) cronus
witfonteinensis (Rhopalozetes)
wittmeri (Eremobelba)
wittmeri (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
woasii (Aleurodamaeus)
woasi [H. (Heterohermannia)]
woelkei (Eremaeozetes)
wojciechniedbalai (Eurostocepheus)
wojciechniedbalai (Galumna)
wolwekransensis (Bipassalozetes)
womersleyi [S. (Ussuribata)]
wonalancetanus (Carabodes)
wongi [M. (Megazetes)]
woodringi (Lanceoppia)
woolleyi (Eueremaeus)
woolleyi (Neoamerioppia)
woolleyi (Protoripoda)
woonhahi (Adrodamaeus)
woschitzi (Galumnella)
wulongensis (Tectodamaeus)
wuyanensis [T. (Tyrphonothrus)]
wuzhishanensis (Galumna)
wynadensis (Meristacarus)
xanthoparmeliae (Phylloribatula)
xarifae (Gehypochthonius)
xavieri (Haplacarus)
xena (Arthrovertex)
xena [E. (Neoepilohmannoides)]
xena [N. (Leptosuctobelba)]
xena (Orthogalumna)
xena (Pilobatella)
xenus (Pseudocarabodes)
xerophilus [H. (Simkinia)] (=ovalis)
xilofila (Microtritia) (=minima)
xinjiangensis (Ceratozetes)
xinjiangensis (Multioppia)
xinjiangensis (Phauloppia)
xishuangbanna (Pergalumna) magnipora
xizangensis (Eupterotegaeus)
xuansoni (Aokiella)
xuejianensis (Nothrus)
xylariae (Liacarus)
xylobatoides (Scheloribates)
yachidairaensis [M. (Trimalaconothrus)]
yaginumai (Calipteremaeus)
yakuensis (Sadocepheus)
yamaeensis (Scheloribates)
yamamotoi [T. (Cristonothrus)]
yamasakii [H. (Capillonothrus)]
yamashitai (Scapheremaeus)
yamatogracilis [M. (Hammeroppia)]
yamizoensis (Kuklosuctobelba)
yangensis (Neoribates)
yanoi (Nehypochthonius)
yaoi (Gymnodampia)
yaoi (Tectodamaeus)
yarovenkoi (Atropacarus)
yasumai (Hermanniella)
yatsushiroensis (Peloribates)
yayeyamensis (Liacarus)
ybarrai (Xenillus)
yeatesi (Crotonia)
yemeniticus (Unguizetes)
yepesensis [O. (Dzarogneta)]
yezoensis (Ceratozetella)
yezoensis (Diapterobates) variabilis
yezoensis [L. (Dorycranosus)]
yezoensis (Peloribates)
yezoensis (Protodamaeus)
yezoensis (Protoribates)
yezoensis (Scheloribates)
yezoensis (Suctobelbella)
yichunensis (Furcoribula)
yilanensis [D. (Kunstidamaeus)]
yinae (Leobodes)
yinae (Malaconothrus)
yinae [M. (Phyllolohmannia)]
yodai (Lasiobelba) (=kuehnelti)
yoichi (Ameronothrus)
yonaguniensis [F. (Cosmogalumna)]
yorubaensis (Scheloribates)
yoshidai (Truncopes)
yoshii [L. (Antennoppia)]
yoshii [P. (Aokibates)]
yoshii (Dolicheremaeus)
yoshii (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
youngai [L. (Longocepheus)]
yozgatensis (Moritzoppia) unicarinata
ypsilon (Hymenobelba)
ypsilonsignata (Suctobelbata)
yukiguni (Symbioribates)
yukonensis (Eueremaeus)
yukonensis (Mycobates)
yukonensis (Oribatella)
yunkeri (Fortuynia)
yunnanensis [P. (Archiphthiracarus)]
yunnanensis [M. (Dicondyla)]
yunnanensis (Eremobelba)
yunnanensis (Gymnodampia)
yunnanensis [D. (Kunstidamaeus)]
yunnanensis (Lasiobelba)
yunnanensis (Peloribates)
yunnanensis [T. (Tyrphonothrus)]
yurtaevi (Pergalumna)
yushuensis [D. (Spatiodamaeus)]
yuwana (Medioxyoppia)
yuwanensis (Nippobodes)
zaballosi (Odontocepheus)
zaballosi (Rhinoppia)
zachvatkini (Allobelba)
zachvatkini [P. (Apolohmannia)]
zachvatkini (Arthrhoplophora)
zachvatkini (Beklemishevia)
zachvatkini [L. (Dorycranosus)]
zachvatkini (Galumna)
zachvatkini (Lauroppia)
zachvatkini [P. (Semipunctoribates)]
zaherii (Scheloribates) (=praeincisus)
zangherii (Camisia) sp. inq.
zangherii (Indotritia)
zanini (Cosmochthonius)
zanzibarensis (Dolicheremaeus)
zanzibarensis (Strinatacarus)

zarae (Plasmobates)
zealandica (Miroppia)
zealandicus [T. (Cristonothrus)]
zealandicus (Neophysobates)
zealandicus (Scheloribates)
zebra [H. (Notophthiracarus)]
zehntneri (Machuella) ventrisetosa
zelawaiensis (Sellnickochthonius)
zellwegeri (Dampfiella)
zephyrus (Scapheremaeus)
zeteki (Ceratozetes) (=enodis)
zeucta [G. (Erogalumna)]
zeukta (Hoplophorella)
zeugus (Compactozetes)
zeyensis [S. (Lalmoppia)]
zhangi (Oribatula)
zhengi (Hermanniella)
zhuzhikovi (Mixacarus)
zicmani (Phthiracarus)
zicsica [L. (Lancelalmoppia)]
zicsii (Cultroribula) (=bicuspidata)
zicsii (Eremobelba)
zicsii [H. (Rhacaplacarus)]
zicsii [O. (Zygoribatula)] (=exilis)
ziemowiti [D. (Spatiodamaeus)]
ziemowiti [P. (Triaunguis)]
zigzag (Microtegeus)
zikani (Heterobelba) sp. inq.
zikani (Teleioliodes)
zimbabwae [A. (Synkrotima)]
zimmermani (Neoliodes)
zingerlei (Trichoribates)
ziweiensis (Ocesobates)
zlotini (Metrioppia)
zryanini (Gigantoppia)
zsilavii (Oribatella)
zsuzsankae (Acroppia)
zululandensis [H. (Notophthiracarus)]
zumpti (Humerobates)
zushi [N. (Confinoppia)]
zwarti [E. (Neoepilohmannia)]